

Arcus Zuid Projectontwikkeling bv
Ecologisch onderzoek De Rosslag – Actualisatie voorjaar 2013

Inleiding

In vervolg op onderstaande onderzoeken:

- nr. 1868-A d.d. 07-05-2007: Plan Jachthaven De Rosslag – Quickscan flora en fauna;
- nr. 00379-A d.d. 07-07-2010: De Rosslag Herten – Actualisatie flora- en faunaonderzoek;
- nr. 00379-C d.d. 24-05-2011: De Rosslag, Herten – Flora- en faunaonderzoek 2011;

is voorjaar 2013 een actualisatie uitgevoerd van het voorjaarsaspect met betrekking tot de natuurwaarden binnen het plangebied van de jachthaven. Op 11 en 20 april hebben veldbezoeken plaatsgevonden, waarbij in het bijzonder is gelet op de aanwezigheid van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde diersoorten, alsmede sporen van de bever langs de oever. Opgemerkt moet worden dat de oever over vrijwel de gehele lengte van het plangebied was vrijgezet van bomen en struiken, behalve ter plaatse van de noordelijke 'landtongen' tussen de plas en de Maas, vergelijk foto 1.



figuur 1: Ligging plangebied De Rosslag



foto 1: Oever langs het populierenbosje

Resultaten

In het poplierenbos is gelet op de aanwezigheid van roek en buizerd, aangezien beide soorten in het verleden nesten hadden in het bos, zie eerdere onderzoeken. Van beide soorten zijn de nestplaatsen jaarrond beschermd. Echter, geen van beide soorten zijn aangetroffen tijdens de veldbezoeken, terwijl de omstandigheden voor het doen van waarnemingen zeer gunstig waren. De bomen hadden nog geen bladeren en eventuele nesten zijn daardoor zeer goed zichtbaar, vergelijk bovengenoemd onderzoek in 2011.

In het populierenbos zijn wel minimaal een roepende groene specht en minimaal een roepende grote bonte specht aangetroffen. Het is zeer waarschijnlijk dat er sprake is van territoria van beide soorten. Dit geldt ook van de boomklever, die ter plaatse is waargenomen. Van alle drie genoemde soorten is de nestplaats alleen tijdens het broedseizoen beschermd.

Langs de oever van de plas zijn fitis en meerkoet aangetroffen, waarschijnlijk betreft het doortrekkers, hoewel een aantal meerkoeten ook ter plaatse wel zullen broeden. In de noordelijke landtong zijn enkele uittreedplekken van bever aangetroffen, namelijk in het gedeelte waar niet in de oever gekapt is, vergelijk foto 2. Verder zijn binnen het plangebied geen sporen van bever aangetroffen.

Verder zijn ook van geen van de andere in 2011 onderzochte soorten sporen gevonden of zichtwaarnemingen gedaan: bunzing, eekhoorn, fret, gierzwaluw, steenmarter en vos.

Conclusies

Bij het veldonderzoek zijn geen nestplaatsen van buizerd of roek aangetroffen binnen het plangebied, in tegenstelling tot eerdere jaren. Van andere broedvogelsoorten zijn wel territoriale activiteiten waargenomen, maar het betreft geen soorten met een jaarrond beschermde nestplaats.



foto 2: Uittreedplaats bever in de noordelijke landtong