

Tabel 7.3 Inschatting van geschikt leefgebied, effectbepaling en voorbeelden mogelijke mitigerende maatregelen van enkele soorten voor deelgebied Zunasche Heide. Vet schuingedrukt betreft soorten, die op de Rode lijst zijn opgenomen. Schuingedrukt zijn de effecten en maatregelen voor de eindfase weergegeven

Soort	Inschatting geschikt	Mogelijke effecten leefgebied	Mogelijke mitigerende maatregelen
Levendbarende hagedis, zandhagedis, hazelworm	Verblijfplaatsen langs de Lage Esweg	Verstoring verblijfplaatsen tijdens de werkzaamheden <i>Verbetering leefgebied na afronding werkzaamheden</i>	Wegvangen reptielen uit werkgebied Sparen waardevol landbiotooop <i>Geen maatregelen nodig na afronding werkzaamheden</i>
Buizerd, havik (het nest is jaarrond beschermd)	Broedend in bomen in het plangebied. Het plangebied heeft een foerageerfunctie.	Door het kappen van bomen verdwijnt broedgelegenheid en mogelijk een jaarrond beschermde verblijfplaats <i>Achteruitgang in beschikbaar broedgelegenheid in bomen Behoud foerageerfunctie in het plangebied</i>	Werken buiten de periode van broeden (globaal tussen maart en medio juli) <i>Geen maatregelen nodig na afronding werkzaamheden. Buizerd en havik wijken uit naar broedgelegenheid in bosgebied hoger op de Sallandse Heuvelrug</i>
Ransuil, kerkuil, boomvalk, raaf, slechtvalk (het nest is jaarrond beschermd)	Het plangebied heeft een foerageerfunctie.	Verstoring foerageergebied tijdens de werkzaamheden <i>Mogelijk lichte achteruitgang in de mogelijkheden voor foerageren door bomenkap</i>	Werkzaamheden overdag uitvoeren om nachtactieve roofvogels niet te verstoren <i>Geen maatregelen nodig na afronding werkzaamheden. Soorten wijken uit naar foerageergelegenheid in bosgebied hoger op de Sallandse Heuvelrug</i>
Huismus	Veel type gebouwen (woningen, schuren etc.) herbergen potentiële verblijfplaatsen. Dit is buiten het werkgebied.	Nesten en foerageergebied worden niet aangetast <i>Nesten en foerageergebied worden niet aangetast</i>	Geen
Gewone en ruige dwergvleermuis, Laatvlieger, rosse vleermuis, watervleermuis	Vliegroutes en foerageergebieden aanwezig in en bij het plangebied, vooral langs randen van bosschages. In het hele plangebied wordt gefoerageerd. Er zijn geen verblijfplaatsen aangetroffen in bomen.	Verstoring foerageergebied en vliegrouete tijdens de werkzaamheden <i>Bij de kap van bomen gaat de functie van het plangebied als vliegrouete en foerageergebied verloren.</i>	De werkzaamheden overdag uitvoeren voorkomt de kans op verstoring van vleermuizen <i>Nagaan mogelijkheden voor mitigatie door nieuwe groenaanplant</i>

Poelkikker	Schone, voedselarme(re), stilstaande wateren zoals vennen en poelen in bossen/heide en hoogveen. Overwintert op het land, zoals onder bosschages en in muizenhollen.	Verstoring landbiotoop bij bomenkap en verwijderen topklaag van de bodem <i>Achteruitgang in geschikt landbiotoop in het plangebied</i>	Werken buiten de periode van overwintering (globaal tussen november en april). Wegvangen kikkers op het land voor de start van het werk Voorkomen verstoring van voortplantingsplaatsen in watergangen <i>Behoud van voldoende geschikt landbiotoop</i>
Appelvink, Grauwe vliegenvanger, groene specht, kneu	Mogelijk broedend in bomen/struiken	Door het kappen van bomen/struiken verdwijnt broedgelegenheid Mogelijk achteruitgang in beschikbaar broedbiotoop in het plangebied	Werken buiten het broedseizoen (globaal tussen maart en juli) Geen maatregelen. <i>Geen maatregelen nodig, Voldoende alternatieven in de omgeving van het plangebied</i>
Blauwe knoop, borstelgras, heidekartelblad, klokjesgentiaan, jeneverbess, moeraskartelblad, parnassia, stijve ogentroost, vlottende bies, wilde gagel	Voorkomen in schrale graslanden in het plangebied	Mogelijk komt een enkele groeiplaats in het geding bij het verwijderen van de topklaag van de bodem Positief effect nadat de topklaag van de bodem is verwijderd	Indien noodzakelijk groeiplaatsen sparen <i>Geen maatregelen</i>
Boerenwaluw, huiswaluw	Broedend in gebouwen buiten het werkgebied. Foeragerend in het plangebied	Geen	Geen
Gele kwikstaart, graspieper, grutto, tureluur, veldleeuwerik, slobeend, Koekoek	Broedend in het plangebied in grasland of langs de waterkant	Door het verwijderen van de topklaag van de bodem worden mogelijk broedvogels verstoord	Werken buiten het broedseizoen
Kramsvogel, paapje, patrijs, tapuit, watersnip, wintertaling, velduil,	Mogelijk rustend of foeragerend in het plangebied	Geen	Geen