

AANVULLING MER CRISIS HERSTELWET BESTEMMINGSPLAN OOSTERWOLD

Effecten op Natura 2000-gebieden door stikstofdepositie

16 DECEMBER 2015

Arcadis Nederland B.V.

Postbus 264
6800 AG Arnhem
Nederland
+31 (0)88 4261 261

www.arcadis.com

Projectnummer: C05058.000206
Onze referentie:078725900:C

Contactpersonen

**ARJEN GOUTBEEK
PAUL HARTSKEERL
BENO KOOLSTRA**

Arcadis Nederland B.V.
Postbus 264
6800 AG Arnhem
Nederland

Inhoudsopgave

1 INLEIDING	7
1.1 Aanleiding aanvulling	7
1.2 Plangebied en bestemmingsplan	7
Ligging en begrenzing	7
Toelichting bestemmingsplan	8
1.3 Uitgangspunten	8
Algemeen	8
Agrarische functies en mogelijkheden	9
Verzuring en vermesting	9
2 WETTELIJKE KADER	10
2.1 Natuurbeschermingswet	10
2.2 Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)	10
3 RESULTAAT	12
3.1 Effectbepaling	12
Planbijdrage aan stikstofemissie	12
Planbijdrage aan deposities	12
3.2 Effectbeoordeling	13
3.3 Juridische toets	13
Mogelijkheden	13
Plantoets en -regels	14
LITERATUUR	16
BIJLAGE I	17
BIJLAGE II	19
BIJLAGE III	20
BIJLAGE IV	22

1 INLEIDING

1.1 Aanleiding aanvulling

De gemeente Almere wil tot 2030 onder meer de bouw van maximaal 4.575 woningen, 41 hectare bedrijventerrein en 549 hectare stadslandbouw mogelijk maken op het grondgebied van Almere, ten zuiden van de Rijksweg A27. Hiervoor is het bestemmingsplan Oosterwold (Grontmij, 2015) opgesteld, een plan dat is aangemeld onder de Crisis- en herstelwet. Voor de besluitvorming daarover wordt de procedure voor milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. De gemeente gebruikt het milieueffectrapport (MER) en de aanvulling daarop voor de Intergemeentelijke Structuurvisie Oosterwold als basis, omdat het Crisis- en herstelwet-bestemmingsplan Oosterwold geen gedetailleerder kader biedt dan vastgelegd in de Structuurvisie.


De Commissie m.e.r. heeft gesignaleerd dat met het bestemmingsplan uitbreiding en nieuwvestiging van melkveehouderijen mogelijk is en wellicht ook activiteiten met verkeersaantrekkende werking. Uit de effectbeschrijving in het MER en in het ontwerpbestemmingsplan wordt niet duidelijk of dergelijke ontwikkelingen, door de ermee gepaarde gaande stikstofemissies en –deposities, significant negatieve gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. De Commissie adviseert om, vooraf aan de besluitvorming over het bestemmingsplan, in een aanvulling op het MER na te gaan wat de maximaal te verwachte stikstofdepositie is als gevolg van mogelijk te maken nieuwvestiging van melkveehouderijen en eventuele andere activiteiten. Op welke wijze kunnen significante gevolgen voor c.q. aantasting van de natuurlijke kenmerken van Natura-2000 gebieden worden uitgesloten?

Deze rapportage vormt de geadviseerde aanvulling.

1.2 Plangebied en bestemmingsplan

Ligging en begrenzing

Het bestemmingsplan gaat over fase 1. Dit is het Almeerse grondgebied van het plangebied Oosterwold, ten zuiden van de A6 en ten westen van A27 (Figuur 1). In aanvulling op het plangebied voor fase 1 is een gebied begrensd als “wetgevingzone-wijzigingsgebied”. Voor dit deel is in het plan een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de ontwikkelregels op een groter deel van Oosterwold toe te passen, dan dat op grond van het provinciale Omgevingsplan mogelijk wordt. De reservering van de Stichtse lijn ligt buiten de gronden waarvoor de wijzigingsbevoegdheid geldt.



Figuur 1 begrenzing plangebied bestemmingsplan Oosterwold

Toelichting bestemmingsplan

Op pagina 33 van de *Toelichting op het bestemmingsplan* staat het programma vermeld voor geheel Oosterwold en voor het Almeerse deel (= fase 1 + “wetgevingzone-wijzigingsgebied”). Voor wonen en bedrijven is het aantal uit fase 1 het uitgangspunt. Voor de agrarische functies en stadslandbouw is de werkelijk bruikbaar oppervlak het uitgangspunt. De concrete cijfers staan in Tabel 1 voor fase 1. De mogelijkheden in de wetgevingszone-wijzigingsgebied zijn hierin niet meegenomen. Dat is wel gebeurd in deze aanvulling op het MER.

Tabel 1 Verdeling per functie totaal Oosterwold en Fase 1 (excl. wetgevingzone-wijzigingsgebied).

Functie	Hoeveelheden totaal Oosterwold	Hoeveelheden fase 1
Wonen	15.000 woningen	4.575 woningen
Kantoren	20 hectare	6,1 hectare
Bedrijventerreinen	135 hectare	41,175 hectare
Stedelijke voorzieningen	25 hectare	7,625 hectare
Grote toeristisch-recreatieve en/of economische concepten	150 hectare	45,75 hectare
Stadslandbouw	1.800 hectare	549 hectare
Nieuwe groenstructuren	450 hectare	137,25 hectare
Doorontwikkeling bestaande hoofdgroenstructuur	290 hectare	88,45 hectare

1.3 Uitgangspunten

Algemeen

De regels en het plangebied zijn maatgevend voor de ontwikkelingsruimte en vertaald naar een “worstcase-model”. Met dit model is de stikstofdepositie op de Natura-2000 gebieden in de omgeving van het plangebied, berekend. Het plan maakt het volgende mogelijk aan potentiële emissiebronnen voor stikstofdepositie op Natura-2000 gebieden:

- Agrarische functies
- Stadslandbouw
- Verkeer
- Wonen
- Bedrijven

Het worst-case model is geen optelsom van alle mogelijke functies met bijbehorende stikstofbronnen. Het is niet reëel om gelijktijdig alle functies maximaal in te vullen. De fysieke ruimte voor een maximale invulling van zowel veehouderij, stadslandbouw, woningen en bedrijven, is eenvoudig te beperkt. Omdat depositie aandeel vanuit de veehouderij veruit het grootst is, is in de berekening uitgegaan van een worst-case scenario van een volledige agrarische invulling. De functies wonen en bedrijven zijn buiten beschouwing gelaten. Verkeer is wel berekend, maar is niet in de beoordeling meegenomen gezien de ondergeschikte rol hiervan ten opzichte van de emissies van de agrarische functies. Dit is gemotiveerd op het niveau van emissies met de achtergrondgegevens in Bijlage I. De achtergrondgegevens van de agrarische functies zijn ook in de volgende paragraaf beschreven.

Agrarische functies en mogelijkheden

De mogelijkheden van agrarische activiteiten in het bestemmingsplan zijn verdeeld in drie categorieën. Deze zijn hieronder toegelicht, waarbij tevens is aangegeven welke voorwaarden en uitgangspunten zijn gehanteerd voor de depositieberekening:

- Agrarische functies (grondgebonden).
 - 11 bestaande landbouwkavels met 12,038 ha aan totaal oppervlak.
 - 22.114 kg/jaar aan NH₃-emissie.
 - Maximaal opvullen bestaande bouwblokken met melkrundvee volgens gangbare bezettingsnorm van de commissie van Doorn: ca. 200 nge¹/ha (= 167 melk- en kalfkoeien, emissie 167*11 kg/jaar = 1.837 kg NH₃/jaar per hectare bouwblok).
- Agrarische functies (aanduiding intensieve veehouderij)
 - 2 bestaande landbouwkavels met 3,183 ha aan totaal oppervlak.
 - 17.316 kg/jaar aan NH₃-emissie.
 - Maximaal opvullen met intensieve veehouderij volgens gangbare bezettingsnorm van de commissie van Doorn: ca. 200 nge/ha; 80.000 leghennen (= 80.000 * 0,068 kg NH₃/jaar = 5.440 kg/jaar per hectare bouwblok).
- Stadslandbouw²
 - Maximaal 1.205 ha aan bedrijven met biologische legkippen op standaard- en landbouwkavels in de zones: “overige zone-ontwikkelregels” & “wetgevingzone-wijzigingsgebied”.
 - Dit is maximaal 1.205*125 = 150.625 kg/jaar aan NH₃-emissie.

Verzuring en vermesting

Verzuring van bodem of water is een gevolg van de uitstoot (emissie) van vervuilende gassen door bijvoorbeeld industrie, landbouwbedrijven en verkeer. De uitstoot bevat onder andere zwaveldioxide (SO₂), stikstofoxide (NO_x), ammoniak (NH₃) en vluchtige organische stoffen (VOS). Deze verzurende stoffen komen via lucht of water in de grond terecht en leiden tot het zuurder worden van het biotische milieu. Vermesting is de letterlijke verrijking van ecosystemen vooral met stikstof en fosfaat. Het kan gaan om aanvoer door de lucht (droge en natte neerslag van ammoniak en stikstofoxiden) of nitraat- en fosfaataanvoer door het oppervlakte- of grondwater. De effecten van beide zijn niet altijd te scheiden, omdat een deel van de verzurende stoffen ook vermestend werkt (aanvoer van stikstof). Vermesting en verzuring kan zowel effect hebben op habitattypen als op leefgebied van habitat- en vogelrichtlijnsoorten.

¹ NGE staat voor Nederlandse grootte-eenheid. Dit is een economische maat voor de omvang van een agrarisch bedrijf. Per gewas en diercategorie worden normen vastgesteld. De NGE van een bedrijf is de som van de totale NGE van alle gewassen en dieren.


² Er is geen harde definitie van stadslandbouw. Zie Bijlage I voor een toelichting.

2 WETTELIJKE KADER

2.1 Natuurbeschermingswet

Natura 2000 is het netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie, die worden beschermd op grond van de Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992). De richtlijnen bepalen welke typen natuur en soorten beschermd moeten worden. De EU-lidstaten hebben daarvoor speciale beschermingszones aangewezen en zijn verplicht instandhoudingsmaatregelen te nemen voor de bescherming van deze gebieden. De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn in Nederland geïmplementeerd in de Natuurbeschermingswet 1998. Deze wet kent voor de Natura 2000-gebieden een vergunningstelsel en beheerplannen. Hiermee is een zorgvuldige afweging van activiteiten in en rond de natuurgebieden die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden en hun natuurwaarden gewaarborgd. Activiteiten en projecten mogen in principe alleen uitgevoerd worden wanneer geen significante schade aan de beschermde natuurwaarden wordt gedaan.

Het beschermingsregime van de Natuurbeschermingswet strekt zich uit tot gebieden die zijn aangewezen of aangemeld onder de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn en de Beschermde Natuurmonumenten. Het plangebied ligt niet binnen de begrenzing van een Natura 2000-gebied (Figuur 2).



Figuur 2 Plangebied en Natura 2000-gebieden

2.2 Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)


Al jaren lang vormt de hoge depositie van stikstof, afkomstig van landbouw, verkeer en industrie een grote belemmering voor de besluitvorming rond projecten die stikstof emitteren. Het Rijk en de provincies hebben de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) ontwikkeld, om deze impasse te doorbreken, die op 1 juli 2015 in werking is getreden.

De essentie van de PAS is dat extra geïnvesteerd wordt in emissiebeperkende maatregelen in de landbouw en in het herstel van habitattypen en leefgebieden binnen de Natura 2000-gebieden.

Een deel van de extradaling van de stikstofdepositie die hiermee wordt bereikt, wordt opnieuw ingezet voor economische ontwikkeling (zogenaamde ontwikkelingsruimte), terwijl de herstelmaatregelen waarborgen dat de instandhoudingsdoelen voor de Natura 2000-gebieden worden gerealiseerd.

De ontwikkelingsruimte kan op drie manieren worden toegekend (Figuur 3):

- Projecten die een depositie veroorzaken van minder dan 1 mol/ha/jaar (berekend met het programma AERIUS). Deze projecten dienen zich aan te melden, hiervoor is in beginsel ontwikkelingsruimte beschikbaar³.
- Prioritaire projecten (segment 1), die in de Regeling PAS zijn genoemd. De ontwikkelingsruimte voor deze projecten is op voorhand gereserveerd; op basis hiervan kan GS een vergunning verlenen.
- Overige projecten dienen een vergunning aan te vragen in de vorm van een toestemmingsbesluit van GS.



Figuur 3 Verdeling van ontwikkelingsruimte onder de PAS

In vergelijking met de andere provincies pakt de PAS in Flevoland anders uit. Zo zijn er in Flevoland geen Natura 2000-gebieden die stikstof gevoelig zijn. Ook is de provincie geen bevoegd gezag in het kader van de Natuurbeschermingswet. Dit betekent dat bij uitbreidingen Flevolandse ondernemers dus een vergunning moeten aanvragen bij de provincies Gelderland, Overijssel, Friesland of Noord-Holland.

De ontwikkelruimte ligt in andere provincies maar Flevoland heeft onder de noemer 'prioritaire projecten' - te weten de Floriade, woningbouw Almere Hout, industrieterrein Flevokust en de landbouw in Flevoland- vooraf wel ontwikkelruimte gereserveerd in de Natura 2000-gebieden van deze provincies. Dat betekent bijvoorbeeld dat Flevolandse veehouders geen 'concurrentie' van collega's uit de andere provincies hebben met de uitstoot van stikstof. De provincie Flevoland heeft (nog) geen beleidsregel voor de toedeling van deze ontwikkelingsruimte. De provincies Gelderland en Noord-Holland hebben deze al wel. Deze beide provincie kennen per project maximaal 3 mol N/ha/jaar ontwikkelingsruimte toe. De maximale toename per bouwblok is op basis van deze beleidsregels dus 3 mol N/ha/jaar. Het gaat hier om een maximalisering van de ontwikkelruimte die per initiatief wordt uitgedeeld. Dit betekent niet dat die ruimte er ook daadwerkelijk is.

³ Wanneer de gereserveerde meldingsruimte op is, wordt de drempel verlaagd van 1 mol naar 0,05 mol.

3 RESULTAAT

3.1 Effectbepaling

De stikstofemissie en –depositie op Natura 2000-gebieden in Nederland en Duitsland zijn uitgerekend met het model AERIUS (versie 2014.1). Hierbij zijn drie scenario's doorgerekend:

- De huidige situatie, waarbij uitgegaan is van een 60% bezetting⁴,
- De plansituatie (worst-case).
- De planbijdrage: het verschil tussen de huidige situatie en de plansituatie.

Planbijdrage aan stikstofemissie

In de huidige situatie in het plangebied is sprake van een totale emissie van 7,39 ton NH₃ per jaar. In een worst-case scenario van het plan, waarbij alle agrarische ruimte die het bestemmingsplan biedt gebruikt wordt, is sprake van een totale emissie van 188,48 ton NH₃ per jaar. Dit is een toename (een verschil) van 181,09 ton NH₃ per jaar. Dit is 24,5 maal zoveel dan de emissie in de huidige situatie.

Planbijdrage aan deposities

In de huidige situatie is sprake van stikstofdepositie op achttien zogenaamde PAS-gebieden⁵. De hoogste depositie, 0,50 mol N/ha/jaar, ligt op het Natura 2000-gebied Naardermeer. Voor vijf van deze achttien Natura 2000-gebieden overschrijdt de planbijdrage de beschikbare ontwikkelingsruimte voor stikstofdepositie.

Bij invulling van de plansituatie (worst-case agrarische functies) blijkt uit de berekening dat voor veel Natura 2000-gebieden in Nederland geldt dat de kritische depositiewaarde van een of meer habitattypen overschreden wordt en dus mogelijk sprake is van een overbelaste situatie. Het gebied met de hoogste toename is het Natura 2000-gebied **Naardermeer** met een maximale depositie van 12,60 mol N/ha/jaar. In totaal komt in 28 Natura 2000-gebieden de stikstofdepositie boven de 1,00 mol N/ha jaar uit (Bijlage II).

Uit de modellering blijkt tevens dat ondanks de overschrijding van de KDW er nog wel ontwikkelingsruimte beschikbaar is. Er is ruimte voor een stijging van de stikstofdepositie omdat ook herstelmaatregelen getroffen worden. Voor vijf gebieden geldt echter dat daar geen ontwikkelingsruimte meer beschikbaar is (op minimaal één habitatype) (

⁴ De uitgangspunten voor de huidige situatie zijn opgenomen in Bijlage III

⁵ Dit zijn gebieden waar stikstofdepositie een probleem vormt en waar herstelmaatregelen getroffen worden om ontwikkelingsruimte te creëren.

Tabel 2). Voor deze gebieden geldt de grens van 0,05 mol N/ha/jaar. Een totaaloverzicht van de AERIUS-resultaten is opgenomen als Bijlage II.

Tabel 2 Plansituatie (worst-case agrarische functies). Natura 2000-gebieden waar geen ontwikkelingsruimte meer beschikbaar is op minimaal één habitatype. Het habitatype met de hoogste depositie is weergegeven. Voor details zie Bijlage II.

Natura 2000-gebied	Hectare met hoogste depositie (mol/ha/j)	Habitatype met hoogste depositie
Veluwe	9,80	Beuken-eikenbossen met hulst
Polder Westzaan	1,92	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietl.)
Noordhollands Duinreservaat	1,57	Duinbossen (droog), berken-eikenbos
Kennemerland-Zuid	1,46	Duinbossen (droog), berken-eikenbos
Duinen en Lage Land Texel	0,50	Grijze duinen (kalkarm)

Effect verkeer

Met de verkeerscijfers (Gemeente Almere; d.d. 5 november 2015) is voor de plansituatie (2030 Variant met kern) het netwerkeffect bepaald o.b.v. een toe- en afname van meer dan 500 motorvoertuigen op de etmaalintensiteit. Dit is berekend t.o.v. de autonome situatie (2030 Variant 0) en met het AERIUS-model. De totale emissie van het wegverkeer bedraagt:

- Autonome situatie (2030 Variant 0):
0,3 ton/jaar NO_x
0,1 ton/jaar NH₃
- Plansituatie (2030 Variant met kern):
1,9 ton/jaar NO_x
0,3 ton/jaar NH₃

In totaal is het effect van al het verkeer 800 kg NO_x/jaar en 200 kg NH₃/jaar. Dit is zoals al in de uitgangspunten gesteld ondergeschikt aan de emissies van de agrarische functies. Tevens zal verkeer nooit alleen optreden, maar is altijd het gevolg van de invulling van de functies wonen en werken.

3.2 Effectbeoordeling

Het vaststellen van de plansituatie leidt tot een toename van de stikstofdepositie in een overbelaste situatie met mogelijk negatieve effecten op habitattypen en soorten. Voor de gebieden (zie Bijlage II) waar geen ontwikkelingsruimte meer beschikbaar is kan niet op voorhand worden uitgesloten dat het plan een significante verslechtering van habitattypen, vegetaties en leefgebieden van soorten die gevoelig zijn voor een toename van stikstof tot gevolg heeft.

3.3 Juridische toets

Mogelijkheden

Wanneer een berekening wordt uitgevoerd van één individueel bouwblok met een maximale emissielast van 10.000 kg NH₃/jaar (groter dan een maximale input voor de totale plandoorrekening, daar is de maximale emissie last 9.440 kg NH₃/jaar), komt de depositie op het Naardermeer uit op maximaal 0,70 mol N/ha/jaar. Dit ligt dus (ver) beneden de 3 mol N/ha/jaar (uit de beleidsregels van Noord-Holland en Gelderland). Dit zou betekenen dat, op basis van de beleidsregels, de individuele ontwikkelingen uit het bestemmingsplan mogelijk zijn, voor zover er nog meldingsruimte beschikbaar is bij een Natura 2000-gebied.

In de praktijk is echter op moment van opstellen van deze rapportage bij 20 Natura 2000-gebieden deze meldingsruimte op, waaronder ook het Natura 2000-gebied Veluwe. Hierdoor is voor de Veluwe zowel de ontwikkelingsruimte als de meldingsruimte op. De constatering dat voor individuele initiatieven (projecten) de depositie onder de grenswaarde van 1 mol N/ha/jaar blijft is dan ook niet hanteerbaar, met als gevolg dat het bestemmingsplan niet zondermeer vast te stellen is.

In het bestemmingsplan zal dan ook geborgd moeten worden dat geen ontwikkelingen mogelijk gemaakt worden die een ontoelaatbare toename van stikstofdepositie veroorzaken. Dit kan door een planregeling in het bestemmingsplan op te nemen waarin de koppeling wordt aangebracht met de depositieruimte voor de grenswaarden.

De planregels zullen neerkomen dat een toename van ammoniakemissie slechts is toegestaan wanneer, als gevolg van deze emissie, de depositietoename op een Natura 2000-gebied:

- Kleiner is dan 0,05 mol N/ha/jaar
(bij benadering is dit een toename per bedrijf van minder dan 1.000 kg aan ammoniakemissie per jaar.
- Hoger is dan 0,05 mol N/ha/jaar
(nadat verzekerd is dat dan wel gebruik gemaakt kan worden van een melding, dan wel dat er ontwikkelingsruimte beschikbaar is).

Plantoets en -regels

Het plan voldoet aan artikel 19j van de Natuurbeschermingswet als een toename van stikstofdepositie op de relevante stikstofgevoelige habitats, in omliggende Natura 2000-gebieden, kan worden uitgesloten. Het plangebied van het Chw-bestemmingsplan Oosterwold is op ruime afstand gelegen van kwalificerende stikstofgevoelige habitats in Natura 2000-gebieden. Zo ligt het Naardermeer op ruim elf kilometer en de Veluwe op ruim vijftien kilometer afstand van het plangebied. Weliswaar liggen op kortere afstand eveneens Natura 2000-gebieden, maar in die Natura 2000-gebieden zijn geen stikstofgevoelige habitats aangewezen of ligt de kritische depositiewaarde ruim boven de achtergrondconcentratiewaarde (reden waarom die Natura 2000-gebieden ook niet zijn opgenomen in de Programmatische Aanpak Stikstof). Desalniettemin is een maximale stikstofdepositie mogelijk van 10,30 mol N/ha/jaar op de Veluwe door de zeer ruime ontwikkelingsmogelijkheden van het plan. Reden om in het plan de mogelijkheden voor wat betreft de uitstoot van stikstof te beperken zonder daarbij de ontwikkelingen volledig op slot te zetten. Het plan is immers ontwikkelingsgericht. Aansluiten bij de depositieruimte, zoals opgenomen in het PAS voor de verschillende Natura 2000-gebieden, ligt hierbij voor de hand. De depositieruimte voor grenswaarden maakt (juist gelet op de afstand tot de Natura 2000-gebieden) de nodige ontwikkelingen mogelijk.

Omdat het bestemmingsplan een Chw-bestemmingsplan betreft kan in beginsel, als bedoeld in artikel 19db Nbw, ook ontwikkelingsruimte uit het PAS worden toebedeeld (zie artikel 19km Nbw). Dit betreft ruimte uit het PAS dat is gereserveerd voor segment 1- en segment 2-projecten. Nader onderzoek is echter nodig om te beoordelen in hoeverre in met planregels al geanticipeerd kan worden op deze ruimte.

In bijlage IV is voor het bestemmingsplan een specifieke bestemmingsplanregeling voorgesteld die enerzijds moet borgen dat de uitvoering van het bestemmingsplan niet zal leiden tot extra stikstofdepositie op de relevante stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden en anderzijds recht moet doen aan de ruime ontwikkelingsmogelijkheden die het plan met zich brengt. Deze regeling maakt uitsluitend gebruik van de depositieruimte voor grenswaarden die kan fluctueren tussen een depositie van 0,05 en 1 mol N/ha/jaar gedurende de looptijd van het plan.

Op onderdelen van de planregeling kan geen juridische zekerheid worden geboden (gezien de stand van zaken in de regelgeving en de jurisprudentie).

Daardoor is de als tekstsuggestie voorgestelde planregeling zodanig geredigeerd dat onderdelen daarvan in een eventuele beroepsprocedure kunnen worden “geschrapt” zonder dat daarbij de overige planregels- en delen worden geraakt.

LITERATUUR

Dobben, H. van., R. Bobbink, D. Bal, A. Van Hinsberg, 2012. Overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof, toegepast op habitattypen en leefgebied van Natura 2000. Alterra-rapport 2397. Alterra, Wageningen.

Hartskeerl, 2015. Memo CHW Bestemmingsplan Oosterwold: uitgangspunten berekenen stikstofdepositie op Natura 2000. ARCADIS, Arnhem

Ministerie van EL&I. 2012 Gebiedendatabase Natura 2000 (<http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000>)

Grontmij, 2015. Ontwerp Chw bestemmingsplan Oosterwold - Bestemmingsplan met verruimde reikwijdte. Grontmij

BIJLAGE I

Achtergrondgegevens functies bestemmingsplan

Emissiebron	Worstcase	Toelichting
Agrarische functies (grondgebonden)	11 bestaande landbouwkavels met 12,038 ha aan totaal oppervlak en 22.114 kg/jaar aan NH3-emissie.	Maximaal opvullen bestaande bouwblokken met melkrundvee volgens gangbare bezettingsnorm van de commissie van Doorn: ca. 200 nge/ha (= 167 melk- en kalfkoeien, emissie 167*11 kg/jaar = 1837 kgNH3/jaar per hectare bouwblok).
Agrarische functies (aanduiding intensieve veehouderij)	2 bestaande landbouwkavels met 3,183 ha aan totaal oppervlak en 17.316 kg/jaar aan NH3-emissie.	Maximaal opvullen met intensieve veehouderij volgens gangbare bezettingsnorm van de commissie van Doorn: ca. 200 nge/ha; 80.000 leghennen (= 80.000 * 0,068 kgNH3/jaar = 5440 kg/jaar per hectare bouwblok).
Stadslandbouw	Maximaal 1205 ha aan bedrijven met biologische legkippen op standaard- en landbouwkavels in de zones: "overige zone-ontwikkelregels" & "wetgevingzone-wijzigingsgebied". Dit is maximaal 1205*125 = 150.625 kg/jaar aan NH3-emissie.	Zie toelichting onder de tabel
Verkeer	Stikstofdepositie a.g.v. van de verkeerstoename op lokale wegen, is maximaal 800 kg NOx/jaar en 200 kg NH3/jaar. Extra stikstofdepositie door verkeerstoename op het hoofdwegennet is geregeld in het PAS.	Het geluidsmodel (Gemeente Almere; d.d. 5 november 2015) vergelijkt de situatie in 2030 variant 0 (= autonome ontwikkeling) met situatie 2030 met kern. Ter controle is een vergelijk met huidig (2010) gedaan, hierbij is hetzelfde beeld te zien. Er vinden om het gebied heen flinke toenames plaats, m.n. doordat er wegvakken zijn waar nu geen verkeer op zit en door grote verschillen die optreden op de rijkswegen. Echter voor rijkswegen is voor de toekomstige groei van het wegverkeer via het NSL al ontwikkelruimte in het PAS gereserveerd (prioritair project, segment 1). Naar deze veiligstelling wordt verwezen. Dat geldt ook voor de verbreding van de "Waterlandsweg" (N305) in het jaar 2017. Bij de prognose van de verkeerstoename op deze weg is rekening gehouden met de ontwikkelingen in Almere (incl. Oosterwold) en getoetst aan de Natuurbeschermingswet (of in het kader van de DHW rechtstreeks aan de Habitatrictlijn). De lokale wegen zijn in de wegverbredingsprojecten en in NSL niet of te beperkt meegenomen. De stikstofdepositie als gevolg van de verkeerstoename op lokale wegen in en rondom het plangebied worden wel berekend. Nog even los van de vraag of dat deze verschillen een gevolg zijn van 'ons' project, neigt dit er naar om de wegen toch mee te nemen in een berekening.
Wonen	Maximaal 4.575 aan woningen volgens het programma met CV's. Dit komt neer op 7.869 NOx kg/jr. Aangevuld met CV's voor	Voor wat betreft de woningen (4575) komt het vanwege de CV's neer op 7869 NOx kg/jr. Deze emissie wordt aangevuld met de CV's van kantoren en stedelijke voorzieningen (14 ha totaal). Het aantal CV's is gebaseerd op de verhouding in oppervlak

Emissiebron	Worstcase	Toelichting
	kantoren en stedelijke voorzieningen.	ontwikkelingszone waarin woningen, kantoren en stedelijke voorzieningen mogelijk zijn.
Bedrijven	Maximaal 42 (41,175) ha aan bedrijventerrein volgens het programma. Dit komt neer op 14.700 kg/ha/jr NOx en 630 kg/ha/jaar NH3	Betreft milieucategorie 1-3 bedrijven. Hiervoor geldt 350kg NOx/ha/jr en 15 NH3kg/ha/jr. In categorie 3 zitten verder geen bedrijven met verbrandingsovens

Toelichting Stadslandbouw

Uitgangspunt is een maximale invulling van het gebied met stadslandbouw. Het bestemmingsplan staat stadslandbouw toe in het overgrote deel van het plangebied:

- Stadslandbouw is mogelijk in het gebied “overige zone – ontwikkelregels”.
- Stadslandbouw (van enige omvang) is niet mogelijk in “Gemengd 1” en “Gemengd 2”.
- Stadslandbouw (van enige omvang) is niet mogelijk in “overige zone – Eemvallei 1.”
- Stadslandbouw is mogelijk/verplicht op standaardkavels en landbouwkavel, niet op landschapskavel.

Er is geen “harde” definitie van stadslandbouw. Het is niet duidelijk wat precies stadslandbouw is, wat daar niet onder valt en hoe dat in het bestemmingsplan wordt afgedwongen. De “landbouwkavel” en “standaardkavel” zijn niet onderscheidend voor wat betreft de maximaal mogelijke invulling met stadslandbouw (zie tabel 13.3.5 “kavelsamenstelling”). Stadslandbouw mag dus op alle kavels, behalve op de landschapskavels.

Uitgangspunt is dat, in principe in de gebiedsdelen waar stadslandbouw is toegestaan, een soort van grondgebonden veehouderij zou kunnen komen. Een biologische pluimveehouderij (grondgebonden pluimveehouderij) valt volgens het bestemmingsplan niet onder de definitie van een intensieve veehouderij, daarom kan “stadslandbouw” worden ingevuld met een biologisch legkippenbedrijf, met een vrije uitloop volgens de richtlijnen Landbouwkwaliteitswet. Voor een worst-case scenario is het uitgangspunt dat overal waar in het plangebied stadslandbouw mogelijk is dit ingevuld gaat worden met biologische legkippenhouderij. Dit levert waarschijnlijk de maximaal mogelijke ammoniakemissie (NH3) op bij vaststelling bestemmingsplan.

De eis voor de vrije uitloop is minimaal 8m² per dier. Daarbij opgeteld komen nog de m² per dier voor stallen, overige gebouwen/functies. In totaal zal het dan gaan om ongeveer 10 m² per dier, of 1000 leghennen per hectare. De ammoniakemissie is, uitgaand van 0,125 kg/dier/jaar, 125 kg/jaar pr hectare.

Gebied waar stadslandbouw is toegestaan is 1.512 ha groot. Voor een deel van dat gebied (Eemvallei 2), groot 148 ha, is 50% landschapskavel voorzien, dus 74 ha stadslandbouw mogelijk. Voor de rest van het gebied, 1.363 ha is 17% landschapskavel voorzien en daarmee is 1.131 ha stadslandbouw mogelijk (uitgaand van de aanname dat de percentages oppervlaktepercentages zijn). In totaal is dan 1205 ha stadslandbouw mogelijk. In een worst-case scenario is de totale ammoniakemissie dan $1.205 \times 125 = 150.625$ kg/jaar.

BIJLAGE II

AERIUS berekeningen en uitkomsten

AERIUS resultaat: Veehouderij Huidige situatie 60% bezetting.

AERIUS resultaat: Veehouderij Worst-case.

AERIUS resultaat: Veehouderij verschil worst-case en huidige situatie 60% bezetting.

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U kan dit document gebruiken voor de onderbouwing van depositie onder de drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, afhankelijk van de door u gekozen rekeninstellingen.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en stikstofoxide (NO_x), of één van beide. Hiermee is de depositie van de activiteit berekend en uitgewerkt. Op basis van de gekozen rekeninstellingen zijn de resultaten op Natura 2000-gebieden, als wel voor overige natuurgebieden inzichtelijk gemaakt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Voor meer toelichting verwijzen we u naar de websites www.aerius.nl pas.naturazoo.nl.

Berekening Situatie 1

- Kenmerken
- Emissie
- Depositie natuurgebieden
- Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
ARCADIS	-

Activiteit

Omschrijving

Oosterwold Almere

Datum berekening	Rekenjaar
------------------	-----------

27 november 2015, 15:31 2015

Rekeninstellingen

Berekend voor Nb-wet.

Totale emissie

	Situatie 1
--	------------

NOx -

NH₃ 7.387,00 kg/j

Depositie

Hectare met
hoogste project-
bijdrage (mol/ha/j)

Natuurgebied	Provincie
--------------	-----------

Naardermeer Noord-Holland


Situatie 1

0,50


Toelichting

huidig situatie 60% bezetting

Locatie
Situatie 1




Emissie
(per bron)
Situatie 1




Naam 1349CB12
Locatie (X,Y) 149540, 486399
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH3 741,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	741	NH3	1,000	741,00 kg/j




Naam 1349RA7
Locatie (X,Y) 152680, 482995
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 1.399,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	1.399	NH ₃	1,000	1.399,00 kg/j




Naam 1349RB6
Locatie (X,Y) 153149, 481671
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 818,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	818	NH ₃	1,000	818,00 kg/j



Naam 1349CZ58
Locatie (X,Y) 153716, 480736
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 891,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	891	NH ₃	1,000	891,00 kg/j




Naam 1349CX55
Locatie (X,Y) 152315, 480716
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 1.247,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	1.247	NH ₃	1,000	1.247,00 kg/j



Naam 1349CB2
Locatie (X,Y) 150671, 484606
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 1.090,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	1.090	NH ₃	1,000	1.090,00 kg/j



Naam 1349CC5
Locatie (X,Y) 151563, 483370
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 1.201,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	1.201	NH ₃	1,000	1.201,00 kg/j

Depositie
natuur-
gebieden



 Hoogste projectbijdrage
(Naardermeer)

 Hoogste projectbijdrage per
natuurgebied

-  Habitatrichtlijn
-  Vogelrichtlijn
-  Beschermd natuurgebied
-  Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn
-  Habitatrichtlijn, Beschermd
natuurgebied
-  Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied
-  Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Depositie PAS-
gebieden

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Naardermeer	0,50		
Veluwe	0,46		 
Oostelijke Vechtplassen	0,31		
Rijntakken	0,10		
Botshol	0,09		
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck	0,08		
De Wieden	0,08		
Polder Westzaan	0,07		
Kolland & Overlangbroek	0,07		
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske	0,07		
Binnenveld	0,07		
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht	0,06		
Weerribben	0,06		
Noordhollands Duinreservaat	0,06		
Kennemerland-Zuid	0,06		
Vecht- en Beneden-Reggegebied	>0,05		
Lingegebied & Diefdijk-Zuid	>0,05		
Schoorlse Duinen	0,05		

-  Geen overschrijding
-  Wel overschrijding
-  Ontwikkelingsruimte beschikbaar*
-  Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar
-  In tenminste één hectare is meer dan 60% van de ontwikkelingsruimte uitgegeven

* Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie per
habitattype Naardermeer

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H91Do Hoogveenbossen	0,50	●	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,43	●	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,43	●	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,40	○	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,40	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,39	●	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,38	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,26	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,25	●	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,16	●	✓

Veluwe

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,46	●	 
H4030 Droge heiden	0,42	●	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,37	●	
ZGH4030 Droge heiden	0,36	●	
H2330 Zandverstuivingen	0,33	●	
H9190 Oude eikenbossen	0,32	●	
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,31	●	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,28	●	
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,27	●	
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,27	●	 
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,26	●	
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,24	●	
H3160 Zure vennen	0,22	●	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,22	●	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,20	●	
H623odka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,19	●	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,14	●	
H7230 Kalkmoerassen	0,14	●	

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,13	●	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,11	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,08	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,07	●	✓

Oostelijke Vechtplassen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,31	●	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,30	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,28	●	✓
H9999:95 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,27	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,27	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,20	●	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,19	●	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,18	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,13	●	✓

Rijntakken

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,10	●	✓
H91EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	0,08	○	✓
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,07	●	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,07	●	✓
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,07	○	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,07	●	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	>0,05	○	-

Botshol

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,09	○	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,09	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,09	○	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,09	●	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,09	○	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,06	○	✓

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,08	●	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,07	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,06	●	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,06	○	✓

De Wieden

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,08	●	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,08	●	✓
H9999:35 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,08	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,07	●	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,07	○	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,07	●	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,06	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,06	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,06	●	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,06	○	-
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,06	●	✓
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	>0,05	○	✓
H7210 Galigaanmoerassen	>0,05	●	✓

Polder Westzaan

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,07	●	✓

Kolland & Overlangbroek

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07	●	✓

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H91Do Hoogveenbossen	0,07	○	✓
H401oB Vochtige heiden (laagveengebied)	0,07	●	✓
H714oB Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,07	●	✓
H314olv Kranswierwateren, in laagveengebieden	>0,05	○	-

Binnenveld

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H714oA Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,07	●	✓

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,06	●	✓
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,06	●	✓
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,06	●	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,06	●	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	>0,05	○	-

Weerribben

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg1Do Hoogveenbossen	0,06	●	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,06	●	✓
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,06	○	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,06	○	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,06	●	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,06	○	✓
ZGHg1Do Hoogveenbossen	0,06	●	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,06	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,06	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,06	●	✓
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,06	●	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	>0,05	○	✓

Noordhollands Duinreservaat

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,06	●	✗
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,06	●	✗
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,06	●	✓
H216o Duindoornstruwelen	0,06	●	✓
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,06	●	✓
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,06	○	✓
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,06	●	✓
H217o Kruipwilgstruwelen	0,06	○	✓
H212o Witte duinen	0,06	●	✓
H643oC Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,06	○	✓
H213oC Grijze duinen (heischraal)	0,06	●	✓
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	>0,05	●	✓
H9999:87 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H213oB, H213oC)	>0,05	●	✓

Kennemerland-Zuid

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,06	●	✓
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,06	●	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,06	○	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	>0,05	○	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	>0,05	●	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	>0,05	●	✓
H9999:88 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B, H2130C)	>0,05	●	✓

Vecht- en Beneden-Reggegebied

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H5130 Jeneverbesstruwelen	>0,05	●	✓
H4030 Droge heiden	>0,05	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,05	●	✓

Lingegebied & Diefdijk-Zuid

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:70 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7230)	>0,05	●	✓

Schoorlse Duinen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,05		

 Geen overschrijding Wel overschrijding Ontwikkelingsruimte beschikbaar* Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar In tenminste één hectare is meer dan 60% van de ontwikkelingsruimte uitgegeven

* Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie
resterende
gebieden

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Veluwerandmeren	0,60	●	-
Arkemheen	0,22	●	-
Markermeer & IJmeer	0,21	○	-
WATERLAND AEEN EN DRIEEN	0,10	○	-
Zwarte Meer	0,07	○	-
Ketelmeer & Vossemeer	0,07	○	-
Polder Zeevang	>0,05	○	-

- Geen overschrijding
● Wel overschrijding

Depositie per
habitatype

Veluwerandmeren

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:76 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,60		-

Arkemheen

Markermeer & IJmeer

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,21		-

WATERLAND ALEN EN DRIEN

Zwarte Meer

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:74 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6510B)	0,07		-
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	>0,05		-

Ketelmeer & Vossemeer

Polder Zeevang

-  Geen overschrijding
-  Wel overschrijding

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in de Benelux. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2014.1_20150903_de05cf2bce

Database versie 2014.1_20150825_fb538daf31

Meer informatie over de gebruikte data, zie www.aerius.nl/methodiek

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U kan dit document gebruiken voor de onderbouwing van depositie onder de drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, afhankelijk van de door u gekozen rekeninstellingen.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en stikstofoxide (NO_x), of één van beide. Hiermee is de depositie van de activiteit berekend en uitgewerkt. Op basis van de gekozen rekeninstellingen zijn de resultaten op Natura 2000-gebieden, als wel voor overige natuurgebieden inzichtelijk gemaakt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Voor meer toelichting verwijzen we u naar de websites www.aerius.nl pas.naturazoo.nl.

Berekening Situatie 1

- Kenmerken
- Emissie
- Depositie natuurgebieden
- Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
ARCADIS	-

Activiteit

Omschrijving

Oosterwold Almere

Datum berekening	Rekenjaar
------------------	-----------

26 november 2015, 11:46 2015

Rekeninstellingen

Berekend voor Nb-wet.

Totale emissie

	Situatie 1
--	------------

NOx -

NH₃ 188,48 ton/j

Depositie

Hectare met
hoogste project-
bijdrage (mol/ha/j)

Natuurgebied	Provincie
--------------	-----------

Naardermeer Noord-Holland


Situatie 1

13,10

Toelichting

Oosterwold worst case veehouderij

Locatie
Situatie 1



Emissie
(per bron)
Situatie 1




Naam 43926
Locatie (X,Y) 148940, 486886
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 142,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	142	NH ₃	1,000	142,00 kg/j



Naam 43927
Locatie (X,Y) 148710, 487403
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 2.808,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	2.808	NH ₃	1,000	2.808,00 kg/j




Naam 44239
Locatie (X,Y) 149705, 482582
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 2.556,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	2.556	NH ₃	1,000	2.556,00 kg/j



Naam 44240
Locatie (X,Y) 149676, 483258
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 1.859,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	1.859	NH ₃	1,000	1.859,00 kg/j




Naam 44241
Locatie (X,Y) 149640, 484500
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 4.098,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	4.098	NH ₃	1,000	4.098,00 kg/j




Naam 44242
Locatie (X,Y) 149509, 485500
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 6.936,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	6.936	NH ₃	1,000	6.936,00 kg/j




Naam 44243
Locatie (X,Y) 149500, 486500
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 8.320,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	8.320	NH ₃	1,000	8.320,00 kg/j



Naam 44244
Locatie (X,Y) 149456, 487403
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 4.937,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	4.937	NH ₃	1,000	4.937,00 kg/j




Naam 44555
Locatie (X,Y) 150558, 481500
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 4.264,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	4.264	NH ₃	1,000	4.264,00 kg/j




Naam 44556
Locatie (X,Y) 150500, 482500
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 9.275,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	9.275	NH ₃	1,000	9.275,00 kg/j



Naam 44557
Locatie (X,Y) 150500, 483500
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 9.449,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	9.449	NH ₃	1,000	9.449,00 kg/j



Naam 44558
Locatie (X,Y) 150343, 484592
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 7.661,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	7.661	NH ₃	1,000	7.661,00 kg/j



Naam 44559
Locatie (X,Y) 150500, 485500
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 9.096,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	9.096	NH ₃	1,000	9.096,00 kg/j




Naam 44560
Locatie (X,Y) 150154, 486438
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 2.796,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	2.796	NH ₃	1,000	2.796,00 kg/j



Naam 44871
Locatie (X,Y) 151500, 480684
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 2.060,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	2.060	NH ₃	1,000	2.060,00 kg/j



Naam 44872
Locatie (X,Y) 151500, 481500
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 7.152,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	7.152	NH ₃	1,000	7.152,00 kg/j



Naam 44873
Locatie (X,Y) 151659, 482500
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 7.080,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	7.080	NH ₃	1,000	7.080,00 kg/j



Naam 44874
Locatie (X,Y) 151500, 483500
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 8.039,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	8.039	NH ₃	1,000	8.039,00 kg/j




Naam 44875
Locatie (X,Y) 151497, 484500
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 6.307,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	6.307	NH ₃	1,000	6.307,00 kg/j



Naam 44876
Locatie (X,Y) 151158, 485228
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 754,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	754	NH ₃	1,000	754,00 kg/j





Naam 45188
Locatie (X,Y) 152500, 480607
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 6.611,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	6.611	NH ₃	1,000	6.611,00 kg/j



Naam 45189
Locatie (X,Y) 152500, 481500
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 9.102,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	9.102	NH ₃	1,000	9.102,00 kg/j



Naam 45190
Locatie (X,Y) 152500, 482500
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 9.384,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	9.384	NH ₃	1,000	9.384,00 kg/j




Naam 45191
Locatie (X,Y) 152561, 483266
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 2.389,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	2.389	NH ₃	1,000	2.389,00 kg/j



Naam 45505
Locatie (X,Y) 153500, 480667
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 4.764,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	4.764	NH ₃	1,000	4.764,00 kg/j




Naam 45506
Locatie (X,Y) 153500, 481500
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 8.500,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	8.500	NH ₃	1,000	8.500,00 kg/j




Naam 45507
Locatie (X,Y) 153132, 482375
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 2.058,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	2.058	NH ₃	1,000	2.058,00 kg/j




Naam 45822
Locatie (X,Y) 154126, 480900
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 298,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	298	NH ₃	1,000	298,00 kg/j




Naam 45823
Locatie (X,Y) 154117, 481165
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 400,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	400	NH ₃	1,000	400,00 kg/j




Naam 1349CB12
Locatie (X,Y) 149540, 486399
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 2.215,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	2.215	NH ₃	1,000	2.215,00 kg/j




Naam 1349CB8
Locatie (X,Y) 149827, 485878
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 1.833,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	1.833	NH ₃	1,000	1.833,00 kg/j



Naam 1349CB6
Locatie (X,Y) 150314, 485081
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 1.833,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	1.833	NH ₃	1,000	1.833,00 kg/j




Naam 1349CC1
Locatie (X,Y) 151179, 483813
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 1.351,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	1.351	NH ₃	1,000	1.351,00 kg/j




Naam 1349RA7
Locatie (X,Y) 152680, 482995
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 8.323,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	8.323	NH ₃	1,000	8.323,00 kg/j




Naam 1349RA5
Locatie (X,Y) 153238, 481914
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 1.465,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	1.465	NH ₃	1,000	1.465,00 kg/j




Naam 1349RA3
Locatie (X,Y) 152942, 481719
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 1.870,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	1.870	NH ₃	1,000	1.870,00 kg/j




Naam 1349RB6
Locatie (X,Y) 153149, 481671
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 2.743,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	2.743	NH ₃	1,000	2.743,00 kg/j




Naam 1349CZ58
Locatie (X,Y) 153716, 480736
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 1.997,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	1.997	NH ₃	1,000	1.997,00 kg/j



Naam 1349CZ56
Locatie (X,Y) 152520, 480750
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 1.894,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	1.894	NH ₃	1,000	1.894,00 kg/j




Naam 1349CX55
Locatie (X,Y) 152315, 480716
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 8.992,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	8.992	NH ₃	1,000	8.992,00 kg/j




Naam 1349CB2
Locatie (X,Y) 150671, 484606
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH3 2.446,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	2.446	NH3	1,000	2.446,00 kg/j



Naam 1349CC5
Locatie (X,Y) 151563, 483370
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH3 2.424,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	2.424	NH3	1,000	2.424,00 kg/j

Depositie
natuur-
gebieden

Hoogste projectbijdrage
(Naardermeer)



Hoogste projectbijdrage per
natuurgebied



Habitatrichtlijn



Vogelrichtlijn



Beschermde natuurgebied



Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn



Habitatrichtlijn, Beschermde
natuurgebied



Vogelrichtlijn, Beschermde
natuurgebied



Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn, Beschermde
natuurgebied

Depositie PAS-
gebieden

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Naardermeer	13,10		
Veluwe	10,30		 
Oostelijke Vechtplassen	8,53		
Rijntakken	2,35		
Botshol	2,28		
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck	2,12		
Polder Westzaan	2,00		 
De Wieden	1,95		
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske	1,88		
Kolland & Overlangbroek	1,80		
Binnenveld	1,68		
Noordhollands Duinreservaat	1,63		 
Weerribben	1,61		
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht	1,55		
Kennemerland-Zuid	1,52		 
Lingegebied & Diefdijk-Zuid	1,35		
Vecht- en Beneden-Reggegebied	1,34		
Schoorlse Duinen	1,33		

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder	1,23	●	✓
Zouweboezem	1,22	●	✓
Holtingerveld	1,21	●	✓
Dwingelderveld	1,21	●	✓
Olde Maten & Veerslootslanden	1,20	●	✓
Landgoederen Brummen	1,18	●	✓
Boetelerveld	1,17	●	✓
Rottige Meenthe & Brandemeer	1,15	●	 ✓
Sallandse Heuvelrug	1,12	●	✓
Drents-Friese Wold & Leggelderveld	1,00	●	✓
Meijndel & Berkheide	1,00	●	✓
Zwanenwater & Pettemerduinen	0,91	●	✓
Mantingerzand	0,91	●	✓
Coepelduynen	0,90	●	✓
Borkeld	0,86	●	✓
Duinen Den Helder-Callantsoog	0,82	●	✓
Eilandspolder	0,82	●	✓
Engbertsdijksvenen	0,80	●	✓

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Wierdense Veld	0,76	●	✓
Biesbosch	0,75	●	✓
Mantingerbos	0,73	●	✓
Alde Feanen	0,68	●	✓
Uiterwaarden Lek	0,67	●	✓
Elperstroomgebied	0,67	●	✓
Bargerveen	0,65	●	✓
Van Oordt's Mersken	0,65	●	✓
Fochteloërveen	0,64	●	✓
Westduinpark & Wapendal	0,64	●	✓
Sint Jansberg	0,64	●	✓
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem	0,63	●	✓
Drentsche Aa-gebied	0,62	●	✓
Stelkampsveld	0,62	●	✓
Solleveld & Kapittelduinen	0,61	●	✓
Springendal & Dal van de Mosbeek	0,60	●	✓
Drouwenerzand	0,59	●	✓
Wijnjeterper Schar	0,56	●	✓
Bakkeveense Duinen	0,56	●	✓

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen	0,54	●	✓
De Bruuk	0,53	●	✓
Witterveld	0,53	●	✓
Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek	0,52	●	✓
Duinen Vlieland	0,52	●	✓
Duinen en Lage Land Texel	0,52	●	✗
Lonnekermeer	0,50	●	✓
Duinen Schiermonnikoog	0,50	●	✓
Duinen Terschelling	0,50	●	✓
Lemselermaten	0,50	●	✓
Waddenzee	0,49	●	✓
Zeldersche Driessen	0,49	●	✓
Norgerholt	0,49	●	✓
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek	0,49	●	✓
Buurserzand & Haaksbergerveen	0,48	●	✓
Landgoederen Oldenzaal	0,48	●	✓
Langstraat	0,48	●	✓
Maasduinen	0,46	●	✓
Bergvennen & Brecklenkampse Veld	0,45	●	✓

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Dinkelland	0,45	●	✓
Korenburgerveen	0,44	●	✓
Voornes Duin	0,44	●	✓
Duinen Ameland	0,42	●	✓
Kampina & Oisterwijkse Vennen	0,41	●	✓
Witte Veen	0,41	●	✓
Oeffelter Meent	0,40	●	✓
Boschhuizerbergen	0,38	●	✓
Bekendelle	0,38	●	✓
Krammer-Volkerak	0,37	●	✓
Aamsveen	0,37	●	✓
Lieftinghsbroek	0,37	●	✓
Willinks Weust	0,35	●	✓
Wooldse Veen	0,35	●	✓
Grevelingen	0,33	●	✓
Deurnsche Peel & Mariapeel	0,33	●	✓
Ulvenhoutse Bos	0,32	●	✓
Duinen Goeree & Kwade Hoek	0,32	●	✓
Strabrechtse Heide & Beuven	0,29	●	✓

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Kempenland-West	0,27	●	✓
Regte Heide & Riels Laag	0,27	●	✓
Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux	0,26	●	✓
Kop van Schouwen	0,25	●	✓
Groote Peel	0,24	●	✓
Weerter- en Budelerbergen & Ringselven	0,23	●	 ✓
Leudal	0,22	●	✓
Brabantse Wal	0,21	●	✓
Meinweg	0,21	●	✓
Swalmdal	0,21	●	✓
Sarsven en De Banen	0,20	●	✓
Oosterschelde	0,20	●	✓
Roerdal	0,19	●	✓
Manteling van Walcheren	0,17	●	✓
Brunsummerheide	0,16	●	✓
Geleenbeekdal	0,14	●	✓
Bunder- en Elslooërbos	0,13	●	✓
Geuldal	0,12	●	✓

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Bemelerberg & Schiepersberg	0,12	●	✓
Westerschelde & Saeftinghe	0,11	●	✓
Savelsbos	0,11	●	✓
Sint Pietersberg & Jekerdal	0,10	●	✓
Kunderberg	0,10	●	✓
Noorbeemden & Hoogbos	0,09	●	✓
Zwin & Kievittepolder	0,07	●	✓

- Geen overschrijding
- Wel overschrijding
- ✓ Ontwikkelingsruimte beschikbaar*
- ✗ Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar
-  In tenminste één hectare is meer dan 60% van de ontwikkelingsruimte uitgegeven

* Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie per
habitattype Naardermeer

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H91Do Hoogveenbossen	13,10	●	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	11,50	●	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	11,30	●	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	11,10	○	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	10,60	●	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	10,60	●	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	10,10	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	6,88	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	6,52	●	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	4,53	●	✓

Veluwe

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	10,30		 
H4030 Droge heiden	10,10		 
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	8,61		 
ZGH4030 Droge heiden	8,38		
H2330 Zandverstuivingen	7,60		 
ZGH9190 Oude eikenbossen	7,55		 
H9190 Oude eikenbossen	7,47		
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	6,70		
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	6,54		 
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	6,25		
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	5,84		
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	5,56		 
H3160 Zure vennen	5,36		
H3130 Zwakgebufferde vennen	5,30		
H5130 Jeneverbesstruwelen	4,88		
H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	4,36		
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	3,51		
H7230 Kalkmoerassen	3,27		

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	3,21	●	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	2,52	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	1,86	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1,74	●	✓

Oostelijke Vechtplassen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	8,53	●	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	8,21	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	7,49	●	✓
H9999:95 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	7,05	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	7,00	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	5,27	●	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	4,94	●	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	4,60	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	3,31	●	✓

Rijntakken

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H91Fo Droge hardhoutooibossen	2,35	●	✓
H91EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	2,06	●	✓
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	1,85	●	✓
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	1,77	○	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	1,77	●	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	1,69	●	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	1,26	●	✓
ZGH91Fo Droge hardhoutooibossen	0,80	○	-
ZGH91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,65	○	✓
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,63	○	✓
H9999:38 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6120)	0,63	●	✓

Botshol

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H7210 Galigaanmoerassen	2,28	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	2,28	○	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	2,28	○	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	2,25	●	✓
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	2,21	○	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	1,58	○	✓

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	2,12	●	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	1,78	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	1,68	●	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	1,51	○	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	1,18	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1,06	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	1,06	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,75	○	✓

Polder Westzaan

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	2,00		 
H91Do Hoogveenbossen	1,29		
ZGH91Do Hoogveenbossen	1,05		
H9999:91 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7140B)	0,98		
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,83		
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,78		

De Wieden

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:35 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	1,95	●	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	1,95	●	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,95	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	1,87	●	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	1,79	○	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	1,70	●	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	1,62	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	1,55	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1,54	●	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	1,42	○	✓
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,41	●	✓
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	1,38	○	✓
H7210 Galigaanmoerassen	1,31	●	✓

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg1Do Hoogveenbossen	1,88		
H714oB Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,76		
H401oB Vochtige heiden (laagveengebied)	1,76		
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	1,34		

Kolland & Overlangbroek

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1,80		

Binnenveld

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H714oA Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1,68		
H714oB Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,23		
H641o Blauwgraslanden	1,17		

Noordhollands Duinreservaat

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	1,63	●	 
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	1,63	●	 
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	1,62	●	 
H2180B Duinbossen (vochtig)	1,60	○	
H2160 Duindoornstruwelen	1,60	●	 
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	1,59	●	 
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	1,57	●	 
H2170 Kruipwilgstruwelen	1,55	○	 
H2120 Witte duinen	1,55	●	 
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	1,51	○	
H2130C Grijze duinen (heischraal)	1,48	●	 
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	1,37	●	 
H9999:87 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B, H2130C)	1,33	●	 
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	1,28	●	
H2150 Duinheiden met struikhei	1,27	●	
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	1,22	●	
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,97	●	 

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H7210 Galigaanmoerassen	0,72		
H6410 Blauwgraslanden	0,72		

Weerribben

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg1Do Hoogveenbossen	1,61	●	✓
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	1,56	○	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	1,56	○	✓
H7210 Galigaanmoerassen	1,55	●	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	1,54	○	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,54	●	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	1,54	●	✓
ZGHg1Do Hoogveenbossen	1,54	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	1,53	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1,53	●	✓
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,46	●	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	1,41	○	✓
ZGH4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	1,13	●	✓
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1,11	●	✓
H9999:34 Habitatype onbekend/onzekeer KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	1,01	●	✓

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	1,55	●	✓
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	1,54	●	✓
H91Fo Droge hardhoutooibossen	1,51	●	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	1,31	●	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	1,21	○	-
H6410 Blauwgraslanden	1,07	●	✓

Kennemerland-Zuid

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	1,52	●	✓
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	1,52	●	⚠ ✗
H2160 Duindoornstruwelen	1,46	●	⚠ ✗
H2180B Duinbossen (vochtig)	1,43	●	⚠ ✗
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	1,40	●	⚠ ✗
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	1,36	●	⚠ ✗
H9999:88 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B, H2130C)	1,34	●	⚠ ✗
H2120 Witte duinen	1,31	●	⚠ ✗
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	1,18	●	⚠ ✗
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	1,11	●	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	1,10	●	⚠ ✗
ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)	1,09	○	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	1,09	○	⚠ ✗
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,92	●	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,89	●	✓
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,63	●	✓
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,63	○	⚠ ✗

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,59		
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,54		
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,53		 
H2110 Embryonale duinen	0,50		

Lingegebied & Diefdijk-Zuid

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:70 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7230)	1,35		
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1,12		
H91EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	0,89		
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,89		
H7230 Kalkmoerassen	0,62		
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,45		-

Vecht- en Beneden-Reggegebied

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H5130 Jeneverbesstruwelen	1,34	●	✓
H4030 Droge heiden	1,32	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	1,26	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	1,23	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	1,22	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1,21	●	✓
ZGH3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	1,21	●	✓
H3160 Zure vennen	1,19	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1,18	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	1,17	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	1,17	●	✓
ZGH7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	1,14	●	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1,05	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	1,01	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1,01	●	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	1,01	●	✓
ZGH5130 Jeneverbesstruwelen	1,00	●	✓
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,98	●	✓

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,91		
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,87		

Schoorlse Duinen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	1,33	●	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	1,24	●	✓
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	1,21	●	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	1,21	●	✓
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	1,21	●	✓
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	1,15	●	✓
H2120 Witte duinen	1,05	●	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	1,00	○	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	1,00	●	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,91	○	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,86	●	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,85	●	✓
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,77	●	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,51	○	✓
H2110 Embryonale duinen	0,50	○	✓

Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,23	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	1,07	○	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,93	●	✓

Zouweboezem

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	1,22	●	✓
Lg03 Zwakgebufferde sloot	1,16	●	✓
H9999:105 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6410)	1,04	●	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,58	○	-
H6410 Blauwgraslanden	0,56	●	✓

Holtingerveld

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9190 Oude eikenbossen	1,21	●	✓
H4030 Droge heiden	1,15	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	1,10	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	1,10	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	1,07	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1,07	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	1,04	●	✓
ZGH7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	1,00	●	✓
H3160 Zure vennen	1,00	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,99	●	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,97	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,93	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,93	●	✓
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,92	●	✓
ZGH2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,86	●	✓

Dwingelderveld

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	1,21	●	✓
ZGH2330 Zandverstuivingen	1,15	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	1,12	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	1,11	●	✓
H4030 Droge heiden	1,11	●	✓
H9999:30 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	1,10	●	✓
ZGH6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	1,10	●	✓
H3160 Zure vennen	1,09	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1,08	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	1,08	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	1,08	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	1,07	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	1,05	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	1,05	●	✓
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	1,02	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,97	●	✓
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,93	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,82	●	✓

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
ZGH7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,73		-
ZGH3160 Zure vennen	0,67		

Olde Maten & Veerslootslanden

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,20		
H9999:37 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7140B)	1,13		
H6410 Blauwgraslanden	1,10		
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,96		

Landgoederen Brummen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H6410 Blauwgraslanden	1,18	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	1,18	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1,15	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	1,13	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	1,12	●	✓
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	1,01	●	✓
H401oA Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1,01	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,82	●	✓

Boetelerveld

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	1,17	●	✓
H401oA Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1,15	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	1,15	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	1,06	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,94	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,93	●	✓
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,89	●	✓

Rottige Meenthe & Brandemeer

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H91Do Hoogveenbossen	1,15		 
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,08		 
ZGH315obaz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	1,00		
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,95		
H7210 Galigaanmoerassen	0,95		
H6410 Blauwgraslanden	0,90		
H315obaz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,89		
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,81		

Sallandse Heuvelrug

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H4030 Droge heiden	1,12	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	1,09	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1,06	●	✓
H9999:42 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3160, H6230)	1,04	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	1,03	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,92	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,81	●	✓
H3160 Zure vennen	0,74	●	✓

Drents-Friese Wold & Leggelderveld

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1,00	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	1,00	●	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	1,00	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	1,00	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,99	●	✓
H4030 Droge heiden	0,98	●	✓
H3160 Zure vennen	0,97	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,96	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,91	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,86	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,86	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,76	●	✓
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,69	●	✓

Meijendel & Berkheide

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	1,00	●	✓
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,99	●	✓
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,98	●	✓
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,98	●	✓
H218oAo Duinbossen (droog), overig	0,97	●	✓
ZGH216o Duindoornstruwelen	0,95	○	✓
H212o Witte duinen	0,95	●	✓
ZGH218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,94	●	✓
ZGH218oAo Duinbossen (droog), overig	0,94	●	✓
H216o Duindoornstruwelen	0,93	●	✓
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,89	○	✓
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,87	●	✓
ZGH213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,81	●	✓
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,76	●	✓
H219oAe Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	0,74	○	✓
ZGH213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,54	●	✓
ZGH218oB Duinbossen (vochtig)	0,54	○	✓
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,45	●	✓

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,41		

Zwanenwater & Pettemerduinen

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,91	○	✓
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,90	●	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,90	●	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,87	●	✓
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,84	●	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,81	●	✓
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,81	○	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,80	○	✓
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,80	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,77	●	✓
H2120 Witte duinen	0,72	●	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,65	●	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,61	●	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,61	○	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,59	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,55	●	✓
H9999:85 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B, H6230)	0,54	●	✓

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
ZGH2120 Witte duinen	0,49		
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,46		
H2110 Embryonale duinen	0,42		
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,41		

Mantingerzand

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H4030 Droge heiden	0,91		
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,84		
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,84		
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,83		
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,75		
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,75		
H2330 Zandverstuivingen	0,74		
H3160 Zure vennen	0,73		
H9190 Oude eikenbossen	0,71		
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,55		

Coepelduynen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,90	●	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,77	○	✓
H2120 Witte duinen	0,61	●	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,40	○	✓

Borkeld

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,86	●	✓
H4030 Droge heiden	0,83	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,79	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,72	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,69	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snabelbiezen	0,58	●	✓
H3160 Zure vennen	0,55	●	✓

Duinen Den Helder-Callantsoog

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,82	●	✓
H2120 Witte duinen	0,72	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,71	●	✓
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,68	○	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,66	●	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,63	●	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,52	○	✓
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,50	●	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,50	○	✓
H9999:84 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B, H2130C)	0,42	●	✓
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,36	●	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,29	●	✓
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,25	●	✓

Eilandspolder

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,82	●	✓

Engbertsdijkswenen

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,80	●	✓
H4030 Droge heiden	0,73	●	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,54	●	✓

Wierdense Veld

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,76	●	✓
H4030 Droge heiden	0,72	●	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,61	●	✓

Biesbosch

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H91EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	0,75	○	✓
ZGH91EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	0,75	○	-
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,44	○	-
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,43	●	✓
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,42	○	-
H6120 Stroomdalgraslanden	0,32	○	✓

Mantingerbos

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,73	●	✓

Alde Feanen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,68	○	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,68	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,66	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,63	○	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,45	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,43	○	✓

Uiterwaarden Lek

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H6120 Stroomdalgraslanden	0,67	●	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,57	●	✓

Elperstroomgebied

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,67	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,51	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,49	●	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,47	●	✓

Bargerveen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,65	●	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,65	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,47	●	✓
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,46	●	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,39	●	✓

Van Oordt's Mersken

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,65	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,59	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,59	●	✓

Fochteloërveen

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,64	●	✓
H4030 Droge heiden	0,64	●	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,62	●	✓
H9999:23 Habitatype onbekend/onzekeer KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7110A, H7120)	0,51	●	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,42	●	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,40	●	✓

Westduinpark & Wapendal

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,64	●	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,59	●	✓
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,59	●	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,59	●	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,58	●	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,54	●	✓
H2180Ao Duinbossen (droog), overig	0,54	●	✓
H2120 Witte duinen	0,51	●	✓

Sint Jansberg

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,64	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,62	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,61	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,59	●	✓

Loevesteyn, Pompveld & Kornsche Boezem

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H91EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	0,63	○	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,56	●	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,44	○	-
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,42	●	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,39	○	-
H6120 Stroomdalgraslanden	0,36	●	✓

Drentsche Aa-gebied

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
ZGH4030 Droge heiden	0,62	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,52	○	✓
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,52	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,52	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,52	○	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,49	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,49	●	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,48	●	✓
H4030 Droge heiden	0,47	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,46	●	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,45	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,45	●	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,44	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,44	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,42	●	✓
H3160 Zure vennen	0,41	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,41	○	✓
ZGH3160 Zure vennen	0,41	●	✓

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,39		

Stelkampsveld

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,62		
H401oA Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,61		
H403o Droge heiden	0,59		
H313o Zwakgebufferde vennen	0,59		
H715o Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,57		
H641o Blauwgraslanden	0,55		
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,54		
H723o Kalkmoerassen	0,51		

Solleveld & Kapittelduinen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,61	●	✓
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,58	●	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,57	●	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,56	●	✓
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,47	●	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,47	●	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,47	●	✓
H2120 Witte duinen	0,36	●	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,30	○	✓

Springendal & Dal van de Mosbeek

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H4030 Droge heiden	0,60	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,57	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,56	●	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,55	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,55	●	✓
H9999:45 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230)	0,55	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,54	●	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,54	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,53	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,52	●	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,51	●	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,51	●	✓
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,49	●	✓
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,49	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,47	●	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,46	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,46	●	✓

Drouwenerzand

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H2330 Zandverstuivingen	0,59	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,57	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,53	●	✓
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,46	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,44	●	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,41	●	✓

Wijnjeterper Schar

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,56	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,56	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,56	●	✓
H4030 Droge heiden	0,56	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,48	●	✓

Bakkeveense Duinen

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,56	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,56	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,48	●	✓
H3160 Zure vennen	0,48	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,48	●	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,40	●	✓

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9190 Oude eikenbossen	0,54	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,52	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,50	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,49	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,46	●	✓
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,44	●	✓

De Bruuk

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H6410 Blauwgraslanden	0,53	●	✓

Witterveld

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,53	●	✓
H4030 Droge heiden	0,46	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,45	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,45	○	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,44	●	✓

Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,52	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,51	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,48	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,48	●	✓

Duinen Vlieland

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,52	●	✓
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,51	●	✓
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,51	○	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,49	●	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,48	●	✓
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,48	●	✓
H2120 Witte duinen	0,47	●	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,46	○	✓
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,45	●	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,45	●	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,42	●	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,38	○	✓
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,37	●	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,33	○	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,29	●	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,27	○	-
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,27	○	✓
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,27	○	✓

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,25	☐	
H2110 Embryonale duinen	0,24	☐	

Duinen en Lage Land Texel

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,52	●	✓
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,51	○	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,51	●	✗
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,51	○	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,49	●	✓
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,49	●	✓
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,47	●	✓
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,46	○	✓
ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,46	○	✓
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,45	●	✓
H9999:2 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B, H2130C)	0,42	●	✓
H2120 Witte duinen	0,42	○	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,41	●	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,38	○	✗
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,37	●	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,36	●	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,35	●	✓

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H7210 Galigaanmoerassen	0,35		
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,34		
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,33		
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,31		
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,28		
H2110 Embryonale duinen	0,28		
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,26		
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,24		
H6230 Heischrale graslanden	0,23		

Lonnekermeer

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,50		
H4030 Droge heiden	0,50		
H3160 Zure vennen	0,50		
H6410 Blauwgraslanden	0,49		
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,48		
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,42		
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,40		

Duinen Schiermonnikoog

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,50	●	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,50	●	✓
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,48	●	✓
H9999:6 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B, H2130C)	0,48	●	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,47	●	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,46	○	✓
ZGH2130B Grijs duinen (kalkarm)	0,46	●	✓
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,44	○	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,44	●	✓
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,41	●	✓
H2130C Grijs duinen (heischraal)	0,41	●	✓
ZGH2120 Witte duinen	0,40	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,40	●	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,39	●	✓
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,37	○	✓
ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,36	○	✓
ZGH2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,29	●	✓

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,25		

Duinen Terschelling

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,50	●	✓
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,50	●	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,50	●	✓
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,50	○	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,50	●	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,49	○	✓
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,49	●	✓
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,47	●	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,47	○	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,46	●	✓
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,45	●	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,44	●	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,43	○	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,43	●	✓
H2120 Witte duinen	0,41	●	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,38	○	✓
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,36	○	✓
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,36	○	✓

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,34	○	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,32	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,31	●	✓
ZGH2120 Witte duinen	0,28	○	✓
H2110 Embryonale duinen	0,27	○	✓
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,27	○	✓
ZGH2130C Grijze duinen (heischraal)	0,27	●	✓
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,26	○	-
ZGH2110 Embryonale duinen	0,25	○	✓

Lemselermaten

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,50	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,47	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,47	●	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,46	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,46	●	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,45	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,41	●	✓

Waddenzee

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,49	●	✓
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,43	○	✓
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,40	○	-
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,40	●	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,40	●	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,35	●	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,35	●	✓
H9999:1 Habitattype onbekend/onzekeer KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B)	0,34	●	✓
H1320 Slijkgrasvelden	0,32	○	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,31	○	✓
H2110 Embryonale duinen	0,31	○	✓
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,29	○	✓
H2120 Witte duinen	0,28	○	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,26	○	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,26	●	✓
H6230 Heischrale graslanden	0,22	●	✓
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,22	○	-
ZGH2120 Witte duinen	0,22	○	-

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
ZGH1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,19		-
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,17		-

Zeldersche Driessen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,49		
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,45		
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,43		
H6120 Stroomdalgraslanden	0,43		

Norgerholt

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,49		

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,49	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,44	●	✓
ZGH3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,40	●	✓
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,39	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,33	●	✓

Buurserzand & Haaksbergerveen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,48	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,47	●	✓
H4030 Droge heiden	0,46	●	✓
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,45	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,45	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,45	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,42	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,41	●	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,36	●	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,36	●	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,35	●	✓

Landgoederen Oldenzaal

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,48	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,47	●	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,46	●	✓
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,45	●	✓
ZGH9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,43	●	✓
H9999:50 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H9120, H9160A)	0,38	●	✓

Langstraat

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H6410 Blauwgraslanden	0,48	●	✓
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,48	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,47	●	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,45	●	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,31	○	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,26	●	✓
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,26	●	✓

Maasduinen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,46	●	✓
H4030 Droge heiden	0,46	●	✓
H3160 Zure vennen	0,43	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,43	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,43	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,43	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,42	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,40	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,40	●	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,40	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,40	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,36	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,36	●	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,29	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,29	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,29	●	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,28	●	✓
H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,27	●	✓

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H6120 Stroomdalgraslanden	0,27	●	✓

Bergvennen & Brecklenkampse Veld

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,45	●	✓
H4030 Droge heiden	0,44	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,44	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,44	●	✓
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,44	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,44	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,43	●	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,42	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,41	●	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,35	●	✓

Dinkelland

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,45	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,40	●	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,39	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,37	●	✓
H4030 Droge heiden	0,37	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,37	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,35	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,33	●	✓
H9999:49 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130)	0,33	●	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,31	●	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,30	●	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,30	●	✓

Korenburgerveen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,44	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,44	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,42	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,42	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,40	●	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,40	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,40	●	✓
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,37	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,37	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,35	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,32	○	-

Voornes Duin

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,44		
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,43		
H218oAo Duinbossen (droog), overig	0,43		
H9999:100 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H213oC)	0,43		
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,43		
H216o Duindoornstruwelen	0,43		
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,42		
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,40		
H219oAe Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	0,35		
H212o Witte duinen	0,34		
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,33		
H213oC Grijze duinen (heischraal)	0,31		
H217o Kruipwilgstruwelen	0,21		

Duinen Ameland

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,42	●	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,41	●	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,40	○	✓
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,40	○	✓
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,38	●	✓
H9999:5 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B, H2130C, H6230)	0,35	●	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,33	●	✓
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,33	○	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,32	○	✓
ZGH2120 Witte duinen	0,30	●	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,30	○	✓
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,30	○	✓
H2120 Witte duinen	0,29	○	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,29	●	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,28	●	✓
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,28	○	✓
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,28	●	✓

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,27		
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,27		
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,27		
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,26		
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,26		
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,24		
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,23		
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,23		
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,22		

Kampina & Oisterwijkse Vennen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H3160 Zure vennen	0,41	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,40	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,39	●	✓
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,39	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,39	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,39	●	✓
ZGH3160 Zure vennen	0,38	●	✓
H4030 Droge heiden	0,37	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,37	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,36	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,35	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,33	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,32	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,28	●	✓

Witte Veen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H4030 Droge heiden	0,41	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,41	●	✓
H3160 Zure vennen	0,38	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,37	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,36	○	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,34	●	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,34	●	✓

Oeffelter Meent

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,40	●	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,35	●	✓

Boschhuizerbergen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,38	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,38	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,38	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,29	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,29	●	✓

Bekendelle

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,38	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,37	●	✓
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,37	●	✓

Krammer-Volkerak

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:114 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2190B, H2190B)	0,37	●	✓
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,18	○	-
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,16	○	✓
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,16	○	-
H91EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	0,14	○	-
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,13	●	✓

Aamsveen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,37	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,37	●	✓
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,36	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,34	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,34	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,33	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,33	●	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,32	●	✓
H4030 Droge heiden	0,31	●	✓

Lieftingsbroek

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,37	●	✓
Hg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,37	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,35	●	✓

Willinks Weust

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,35	●	✓
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,35	●	✓
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,33	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,33	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,33	●	✓

Wooldse Veen

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,35	●	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,31	●	✓

Grevelingen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H216o Duindoornstruwelen	0,33		
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,30		
H217o Kruipwilgstruwelen	0,30		
H213oC Grijze duinen (heischraal)	0,29		
H131oA Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,28		
H133oB Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,24		
H131oB Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,14		
ZGH216o Duindoornstruwelen	0,13		

Deurnsche Peel & Mariapeel

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H712oah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,33		
ZGH712oah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,30		
H711oA Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,22		
H403o Droge heiden	0,22		

Ulvenhoutse Bos

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,32	●	✓
Hg16oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,32	●	✓
Hg12o Beuken-eikenbossen met hulst	0,32	●	✓

Duinen Goeree & Kwade Hoek

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,32	●	✓
H216o Duindoornstruwelen	0,32	○	✓
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,29	●	✓
H133oA Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,29	●	✓
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,21	●	✓
H212o Witte duinen	0,19	○	✓
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,19	●	✓
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,19	●	✓
H131oB Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,18	○	✓
H213oC Grijze duinen (heischraal)	0,18	●	✓
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,18	●	✓
H131oA Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,15	○	✓
H211o Embryonale duinen	0,14	○	✓

Strabrechtse Heide & Beuven

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,29	●	✓
H4030 Droge heiden	0,29	●	✓
H3160 Zure vennen	0,28	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,28	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,27	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,26	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,24	●	✓
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,23	●	✓

Kempenland-West

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,27	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,27	●	✓
H4030 Droge heiden	0,26	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,26	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,25	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,25	●	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,25	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,24	●	✓
H3160 Zure vennen	0,23	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,20	●	✓

Regte Heide & Riels Laag

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H4030 Droge heiden	0,27	●	✓
H3160 Zure vennen	0,27	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,26	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,25	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,24	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,24	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,20	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,19	●	✓

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H4030 Droge heiden	0,26	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,26	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,25	●	✓
H3160 Zure vennen	0,25	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,25	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,25	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,25	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,25	●	✓
H9999:136 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130)	0,24	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,24	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,24	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,19	●	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,19	●	✓

Kop van Schouwen

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,25	●	✓
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,25	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,23	●	✓
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,23	●	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,23	○	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,23	○	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,22	●	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,22	●	✓
H9999:116 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B, H2130C)	0,21	●	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,20	●	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,18	●	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,16	●	✓
H2190A Vochtige duinvalleien (open water)	0,15	●	✓
H2170 Kruiwilgstruwelen	0,15	○	✓
H2120 Witte duinen	0,14	○	✓
H2110 Embryonale duinen	0,12	○	-

Groote Peel

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,24	●	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,20	●	✓
H4030 Droge heiden	0,20	●	✓

Weerter- en Budelerbergen & Ringselven

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,23	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,22	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,22	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,22	●	⚠ ✓
H4030 Droge heiden	0,21	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,20	●	✓

Leudal

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,22	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,22	●	✓
ZGH9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,22	●	✓

Brabantse Wal

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H3160 Zure vennen	0,21	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,19	●	✓
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,19	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,19	●	✓
H4030 Droge heiden	0,19	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,19	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,17	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,17	●	✓
H9999:128 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130)	0,17	●	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,16	●	✓
ZGH3160 Zure vennen	0,16	●	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,16	●	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,16	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,16	●	✓

Meinweg

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,21	●	✓
H4030 Droge heiden	0,20	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,20	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,20	●	✓
H3160 Zure vennen	0,19	●	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,19	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,19	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,17	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,17	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,16	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,15	●	✓

Swalmdal

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,21	●	✓
H9999:148 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6120)	0,20	●	✓
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,17	●	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,15	○	-

Sarsven en De Banen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,20	●	✓
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,20	●	✓
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,19	●	✓

Oosterschelde

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,20	●	✓
H1320 Slijkgrasvelden	0,16	●	✓
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,12	○	-
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,12	○	✓
H2120 Witte duinen	0,11	○	-
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,10	○	-
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,08	●	✓
H2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,08	●	✓

Roerdal

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,19	●	✓
ZGHg1Do Hoogveenbossen	0,17	●	✓
Hg1Do Hoogveenbossen	0,16	●	-

Manteling van Walcheren

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H218oA Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,17	●	✓
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,17	●	✓
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,16	●	✓
H216o Duindoornstruwelen	0,16	○	✓
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,16	○	✓
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,15	●	✓
H219oA Vochtige duinvalleien (open water)	0,15	●	✓
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,15	○	✓
H212o Witte duinen	0,12	○	✓
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,11	○	✓
Hg999:117 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H213oB)	0,09	●	✓

Brunssummerheide

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H91Do Hoogveenbossen	0,16	●	✓
H4030 Droge heiden	0,15	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,15	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,15	●	✓
ZGH6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,15	●	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,14	○	-
H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,14	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,14	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,13	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,13	●	✓
H3160 Zure vennen	0,13	●	✓

Geleenbeekdal

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,14	●	✓
Hg12o Beuken-eikenbossen met hulst	0,14	●	✓
ZGHg12o Beuken-eikenbossen met hulst	0,13	●	✓
ZGHg16oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,13	●	✓
Hg16oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,13	●	✓
ZGHg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,12	●	✓
H723o Kalkmoerassen	0,11	●	✓

Bunder- en Elsllooërbos

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,13	●	✓
Hg16oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,13	●	✓
H722o Kalktufbronnen	0,13	○	✓
H643oC Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,13	○	✓
ZGH643oC Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,11	●	✓

Geuldal

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,12	●	✓
H9110 Veldbies-beukenbossen	0,12	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,12	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,11	○	✓
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,11	○	✓
H7220 Kalktufbronnen	0,11	○	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,11	●	✓
H6210 Kalkgraslanden	0,11	●	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,10	●	✓
H6230dkr Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,10	●	✓
H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,09	●	✓
H6130 Zinkweiden	0,08	●	✓

Bemelerberg & Schiepersberg

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
ZGH6210 Kalkgraslanden	0,12	●	✓
ZGH6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,11	●	✓
ZGH9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,11	●	✓
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,11	●	✓
H6210 Kalkgraslanden	0,10	●	✓
H6230dkr Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,09	●	✓
H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,09	●	✓

Westerschelde & Saeftinghe

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,11	●	✓
H1320 Slijkgrasvelden	0,11	○	-
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,11	○	-
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,09	○	-
H2160 Duindoornstruwelen	0,08	○	-
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,07	○	-
H9999:122 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2110, H2120, H2190B)	0,06	○	-
H2120 Witte duinen	0,06	○	-
H2110 Embryonale duinen	0,06	○	-
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,05	○	-

Savelsbos

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,11	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,11	●	✓
ZGH6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,10	○	✓
H6210 Kalkgraslanden	0,10	●	✓
H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,10	●	✓

Sint Pietersberg & Jekerdal

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
ZGH916oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,10	●	✓
H916oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,10	●	✓
H623odkr Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,10	●	✓
H621o Kalkgraslanden	0,10	●	✓
H611o Pionierbegroeiingen op rotsbodern	0,09	●	✓
H651oA Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,09	●	✓

Kunderberg

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H916oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,10	●	✓
H621o Kalkgraslanden	0,09	○	✓

Noorbeemden & Hoogbos

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
ZGH916oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,09	●	✓
H916oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,09	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,08	○	-
H722o Kalktufbronnen	0,08	○	-

Zwin & Kievittepolder

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H2160 Duindoornstruwelen	0,07		
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,06		-
H2120 Witte duinen	0,06		
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,06		
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	>0,05		-
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	>0,05		-

 Geen overschrijding Wel overschrijding Ontwikkelingsruimte beschikbaar* Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar In tenminste één hectare is meer dan 60% van de ontwikkelingsruimte uitgegeven

* Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie
resterende
gebieden

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Veluwerandmeren	14,10	●	-
Markermeer & IJmeer	5,70	○	-
Arkemheen	5,43	●	-
WATERLAND AEEN EN DRIEEN	2,96	○	-
Ketelmeer & Vossemeer	1,85	○	-
Zwarte Meer	1,85	○	-
Polder Zeevang	1,43	○	-
Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving	1,09	○	-
Itterbecker Heide	0,96	○	-
Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'	0,85	○	-
Wyler Meer (Teilfläche des NSG Düffel)	0,84	○	-
Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef	0,69	○	-
Dornicksche Ward	0,64	○	-
IJsselmeer	0,63	●	✓
NSG Salmorth, nur Teilfläche	0,63	○	-
Ems	0,60	○	-
NSG Kranenburger Bruch	0,57	○	-
Reichswald	0,57	○	-
NSG Emmericher Ward	0,56	○	-
Dalum-Wietmarscher Moor und Georgsdorfer Moor	0,56	○	-

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Oude Maas	0,55	☐	-
Wisseler Dünen	0,51	☐	-
NSG Bienener Altrhein, Millinger u. Hurler Meer u. NSG Empeler M	0,51	☐	-
Hügelgräberheide Halle-Hesingen	0,50	☐	-
Esterfelder Moor bei Meppen	0,47	☐	-
Moorschlatts und Heiden in Wachendorf	0,47	☐	-
Hollands Diep	0,47	☐	-
Bentheimer Wald	0,46	☐	-
Lüntener Fischteich u. Ammeloer Venn	0,44	☐	-
Vogelschutzgebiet 'Moore und Heiden des westlichen Münsterlandes	0,44	☐	-
Klevsche Landwehr, Anholt. Issel, Feldschlaggr. u. Regnieter Bac	0,42	☐	-
NSG Grietherorter Altrhein	0,42	☐	-
Stillgewässer bei Kluse	0,42	☐	-
Untere Haseniederung	0,41	☐	-
Tillenberge	0,41	☐	-
NSG Kellener Altrhein, nur Teilfläche, mit Erweiterung	0,40	☐	-
'Brutbaeume' des Heldbock (Grosser Eichenbock) in Emmerich	0,40	☐	-
Schwattet Gatt	0,39	☐	-
Tinner Dose, Sprakeler Heide	0,39	☐	-
Engdener Wüste	0,39	☐	-

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Heseper Moor, Engdener Wüste	0,39	☐	-
Uedemer Hochwald	0,39	☐	-
Diersfordter Wald/ Schnepfenberg	0,38	☐	-
NSG Hetter-Millinger Bruch, mit Erweiterung	0,37	☐	-
Kalflack	0,37	☐	-
Zwillbrocker Venn u. Ellewicker Feld	0,37	☐	-
Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer	0,37	☐	-
Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Küstenmeer	0,37	☐	-
Berkel	0,36	☐	-
Witte Venn, Krosewicker Grenzwald	0,36	☐	-
Gildehauser Venn	0,36	☐	-
Emstal von Lathen bis Papenburg	0,36	☐	-
Schwarzes Wasser	0,35	☐	-
Amtsvenn u. Hündfelder Moor	0,35	☐	-
Grosses Veen	0,35	☐	-
Erlenwälder bei Gut Hovesaat	0,34	☐	-
NSG Sonsfeldsche Bruch, Hagener Meer und Düne, mit Erweiterung	0,34	☐	-
Eper-Graeser Venn/ Lasterfeld	0,33	☐	-
Graeser Venn - Gut Moorhof	0,33	☐	-
Fleuthkuhlen	0,33	☐	-

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Samerrott	0,33	☐	-
Kleingewässer Achterberg	0,33	☐	-
NSG Altrhein Reeser Eyland, mit Erweiterung	0,33	☐	-
NSG Weseler Aue	0,33	☐	-
NSG Gut Grindt u. NSG Rheinaue zw. Km 830,7 - 833,2 , nur Teilfl	0,32	☐	-
Wacholderheide Hörsteloe	0,32	☐	-
Rünenberger Venn	0,32	☐	-
NSG - Komplex In den Drevenacker Dünen, mit Erweiterung	0,31	☐	-
NSG Lohwardt/Reckerfeld, Hübsche Grändort, nur Teilfl., mit Erw.	0,31	☐	-
Herrenholz und Schöppinger Berg	0,31	☐	-
NSG Rheinaue Bislich-Vahnum, nur Teilfläche	0,31	☐	-
Liesner Wald	0,31	☐	-
Vechte	0,31	☐	-
Syen-Venn	0,30	☐	-
Burlo-Vardingholter Venn und Entenschlatt	0,30	☐	-
Kaninchenberge	0,30	☐	-
NSG Reeser Schanz	0,30	☐	-
Feuchtwiese Ochtrup	0,30	☐	-
Ahlder Pool	0,29	☐	-
Kirchheller Heide und Hiesfelder Wald	0,29	☐	-

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Harskamp	0,29		-
Berger Keienvenn	0,28		-
Gutswald Stovern	0,28		-
Wald bei Haus Burlo	0,28		-
NSG Lippeaue bei Damm u. Bricht und NSG Loosenberge, nur Teilfl	0,28		-
Dämmer Wald	0,27		-
Gartroper Mühlenbach	0,27		-
Krummhörn	0,27		-
VSG Feuchtwiesen im nördlichen Münsterland	0,27		-
Schnippenpohl	0,27		-
Weiher am Syenvenn	0,27		-
Fehntjer Tief und Umgebung	0,27		-
Lichtenhagen	0,26		-
Noordzeekustzone	0,26		
Steinbach	0,26		-
Krickenbecker Seen - Kl. De Witt-See	0,26		-
Stollbach	0,26		-
Vogelschutzgebiet 'Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg	0,26		-
Stollen im Rothenberg bei Wettringen	0,26		-
Alter Bierkeller bei Ochtrup	0,26		-

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Unterems und Außenems	0,26	☐	-
Emsmarsch von Leer bis Emden	0,26	☐	-
Salzbrunnen am Rothenberg	0,25	☐	-
Rheiderland	0,25	☐	-
Üfter Mark	0,25	☐	-
NSG Bislicher Insel, nur Teilfläche	0,25	☐	-
Niederkamp	0,25	☐	-
Bachsystem des Wienbaches	0,25	☐	-
Felsbachaue	0,25	☐	-
Heidesee in der Kirchheller Heide	0,25	☐	-
NSG Rheinvorland im Orsoyer Rheinbogen, mit Erweiterung	0,25	☐	-
Haringvliet	0,25	☒	
NSG Droste Woy und NSG Westerheide	0,24	☐	-
Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigro	0,24	☐	-
Wälder und Heiden bei Brüggen-Bracht	0,24	☐	-
VSG 'Heubachniederung, Lavesumer Bruch und Borkenberge'	0,24	☐	-
Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout	0,24	☐	-
NSG Rheinaue Walsum	0,24	☐	-
Lippeaue	0,24	☐	-
Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout	0,24	☐	-

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Köllnischer Wald	0,23		-
Sundern	0,23		-
Staatsforst Rheurdt / Littard	0,23		-
KORVERSKOOI	0,23		
Fürstenkuhle im Weissen Venn	0,23		-
NSG Rheinvorland bei Perrich	0,23		-
Lauwersmeer	0,23		-
Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Waterin	0,22		-
Roruper Holz mit Kestenbusch	0,22		-
Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariaho	0,22		-
Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en h	0,22		-
WeiBes Venn / Geisheide	0,22		-
Elmpter Schwalmbruch	0,22		-
Tantelbruch mit Elmpter Bachtal und Teilen der Schwalmaue	0,22		-
Ronde Put	0,22		-
Kranenmeer	0,22		-
Spanjaards Duin	0,21		
Voordelta	0,21		
OUDE DIJK VAN WAAL EN BURG	0,21		

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Lüsekamp und Boschbeek	0,21	☐	-
Helpensteiner Bachtal-Rothenbach	0,21	☐	-
Abeek met aangrenzende moerasgebieden	0,21	☐	-
Schwarzes Venn	0,21	☐	-
Ostfriesische Meere	0,20	☐	-
Großes Meer, Loppersumer Meer	0,20	☐	-
Postwegmoore u. Rütterberg-Nord	0,20	☐	-
De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld	0,20	☐	-
De Kalmthouse Heide	0,20	☐	-
Meinweg mit Ritzroder Dünen	0,20	☐	-
Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer	0,20	☐	-
Hangmoor Damerbruch	0,20	☐	-
Tote Rahm	0,20	☐	-
Kalmthoutse Heide	0,20	☐	-
Schaagbachtal	0,20	☐	-
Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen	0,19	☐	-
Klein en Groot Schietveld	0,19	☐	-
Schwalm, Knippertzbach, Raderveekes u. Lüttelforster Bruch	0,19	☐	-
NSG Rheinvorland nördl. der Ossenberger Schleuse, nur Teilfläche	0,19	☐	-
Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamander	0,19	☐	-

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Wienbecker Mühle	0,19	☐	-
Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek	0,19	☐	-
Westermarsch	0,19	☐	-
Ueberanger Mark	0,19	☐	-
Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor	0,18	☐	-
Latumer Bruch mit Buersbach, Stadtgräben und Wasserwerk	0,18	☐	-
Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglab	0,18	☐	-
Militair domein en vallei van de Zwarte Beek	0,18	☐	-
Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel	0,18	☐	-
Nette bei Vinkrath	0,18	☐	-
Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven	0,17	☐	-
Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrod	0,17	☐	-
Schorren en Polders van de Beneden-Schelde	0,17	☐	-
Ilvericher Altrheinschlinge	0,17	☐	-
Egelsberg	0,17	☐	-
Grensmaas	0,16	☐	-
Mechelse Heide en vallei van de Ziepbeek	0,16	☐	-
Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbee	0,16	☐	-

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
De Mechelse Heide en de Vallei van de Ziepbeek	0,16	☐	-
Bokrijk en omgeving	0,16	☐	-
Wurmtal südlich Herzogenrath	0,16	☐	-
Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat.	0,16	☐	-
De Maten	0,16	☐	-
Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer	0,15	☐	-
Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel	0,15	☐	-
Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent	0,15	☐	-
Die Spey	0,15	☐	-
Vijvercomplex van Midden Limburg	0,15	☐	-
Demervallei	0,15	☐	-
Teichfledermaus-Gewässer im Raum Aurich	0,14	☐	-
De Demervallei	0,14	☐	-
Teverener Heide	0,14	☐	-
De Maten	0,13	☐	-
Overgang Kempen-Haspengouw	0,13	☐	-
Kellenberg und Rur zwischen Flossdorf und Broich	0,13	☐	-
Schlangenbergr	0,13	☐	-
Osthertogenwald autour de Raeren (Raeren)	0,13	☐	-
Osthertogenwald autour de Raeren (Raeren)	0,13	☐	-

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Wurmtal nördlich Herzogenrath	0,13	☐	-
Vallée de la Gueule en aval de Kelmis (Plombières; Welkenraedt)	0,13	☐	-
Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw	0,13	☐	-
Lindenberger Wald	0,12	☐	-
Kuifeend en Blokkersdijk	0,12	☐	-
Münsterbachtal, Münsterbusch	0,12	☐	-
Brander Wald	0,12	☐	-
Jekervallei en bovenloop van de Demervallei	0,12	☐	-
Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen.	0,11	☐	-
Rur von Obermaubach bis Linnich	0,11	☐	-
Wehebachtäler und Leyberg	0,11	☐	-
Buchenwälder bei Zweifall	0,11	☐	-
De Zegge	0,11	☐	-
Basse Meuse et Meuse mitoyenne (Oupeye; Visé)	0,11	☐	-
Basse Meuse et Meuse mitoyenne (Blégny; Oupeye; Visé)	0,11	☐	-
Durme en Middenloop van de Schelde	0,11	☐	-
Voerstreek	0,11	☐	-
Vallée de la Gueule en amont de Kelmis (Kelmis; Lontzen; Raeren;	0,11	☐	-
Steinbruchbereich Bernhardshammer und Binsfeldhammer	0,11	☐	-
Montagne Saint-Pierre (Bassenge; Oupeye; Visé)	0,11	☐	-

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Indemündung	0,11	☐	-
Hammerberg	0,11	☐	-
Vallée de la Gueule en amont de Kelmis (Kelmis; Lontzen; Raeren)	0,10	☐	-
Yerseke en Kapelse Moer	0,10	☐	-
Basse vallée du Geer (Bassenge; Juprelle; Oupeye; Visé)	0,10	☐	-
Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten.	0,10	☐	-
Brockenberg	0,10	☐	-
Bärenstein	0,10	☐	-
Vallée du Ruisseau de Bolland (Blégny; Herve; Soumagne)	0,09	☐	-
Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek	0,09	☐	-
Vallée du Ruisseau de Bolland (Blégny; Herve; Soumagne)	0,09	☐	-
Polders	0,09	☐	-
Vallée de la Gueule en aval de Kelmis (Plombières)	0,09	☐	-
Veerse Meer	0,08	☒	
Krekengebied	0,08	☐	-
Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin.	0,08	☐	-
Werther Heide, Napoleonsweg	0,08	☐	-
Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist	0,07	☐	-
Canisvliet	0,07	☐	-
SBZ 3 / ZPS 3	0,07	☐	-

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Poldercomplex	0,06	☐	-
Het Zwin	0,06	☐	-
Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelijk	0,06	☐	-
Groote Gat	0,06	☐	-

☐ Geen overschrijding☒ Wel overschrijding

Depositie per
habitatype

Veluwerandmeren

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:76 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	14,10		-

Markermeer & IJmeer

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	5,70		-

Arkemheen

WATERLAND ALEN EN DRIEN

Ketelmeer & Vossemeer

Zwarte Meer

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:74 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6510B)	1,85		-
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	1,29		-

Polder Zeevang

Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	1,09	○	-
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,78	○	-

Itterbecker Heide

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1128 Habitatype onbekend/onzekeer (buitenland)	0,96	○	-

Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1198 Habitatype onbekend/onzekeer (buitenland)	0,85	○	-

Wyler Meer (Teilfläche des NSG Düffel)

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1180 Habitatype onbekend/onzekeer (buitenland)	0,84	○	-

Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1235 Habitatype onbekend/onzekeer (buitenland)	0,69	○	-

Dornicksche Ward

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1182 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,64		-

IJsselmeer

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:72 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7140A)	0,63		
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,52		-

NSG Salmorth, nur Teilfläche

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1181 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,63		-

Ems

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1117 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,60		-

NSG Kranenburger Bruch

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1193 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,57		-

Reichswald

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1194 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,57	○	-

NSG Emmericher Ward

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1183 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,56	○	-

Dalum-Wietmarscher Moor und Georgsdorfer Moor

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1129 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,56	○	-

Oude Maas

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H91EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutoibossen)	0,55	○	-

Wisseler Dünen

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1195 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,51	○	-

NSG Bienener Altrhein, Millinger u. Hurler Meer u. NSG Empeler M

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1187 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,51	○	-

Hügelgräberheide Halle-Hesingen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1132 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,50	○	-

Esterfelder Moor bei Meppen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1127 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,47	○	-

Moorschlatts und Heiden in Wachendorf

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1130 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,47	○	-

Hollands Diep

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg1EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutoibossen)	0,47	○	-

Bentheimer Wald

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1137 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,46	○	-

Lüntener Fischteich u. Ammeloer Venn

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1153 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,44	○	-

Vogelschutzgebiet 'Moore und Heiden des westlichen Münsterlandes

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1157 Habitatype onbekend/onzekeer (buitenland)	0,44	○	-

Klevsche Landwehr, Anholt. Issel, Feldschlaggr. u. Regnieter Bac

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1188 Habitatype onbekend/onzekeer (buitenland)	0,42	○	-

NSG Grietherorter Altrhein

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1197 Habitatype onbekend/onzekeer (buitenland)	0,42	○	-

Stillgewässer bei Kluse

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1122 Habitatype onbekend/onzekeer (buitenland)	0,42	○	-

Untere Haseniederung

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1126 Habitatype onbekend/onzekeer (buitenland)	0,41	○	-

Tillenberge

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1134 Habitatype onbekend/onzekeer (buitenland)	0,41	○	-

NSG Kellener Altrhein, nur Teilfläche, mit Erweiterung

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1184 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,40	○	-

'Brutbaeume' des Heldbock (Grosser Eichenbock) in Emmerich

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1185 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,40	○	-

Schwattet Gatt

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1165 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,39	○	-

Tinner Dose, Sprakeler Heide

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1124 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,39	○	-

Engdener Wüste

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1135 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,39	○	-

Hesep Moor, Engdener Wüste

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1133 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,39	○	-

Uedemer Hochwald

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1218 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,39		-

Diersfordter Wald/ Schnepfenberg

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1205 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,38		-

NSG Hetter-Millinger Bruch, mit Erweiterung

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1186 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,37		-

Kalflack

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1196 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,37		-

Zwillbrocker Venn u. Ellewicker Feld

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1164 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,37		-

Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1101 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,37		-

Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Küstenmeer

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1100 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,37	○	-

Berkel

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1172 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,36	○	-

Witte Venn, Krosewicker Grenzwald

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1155 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,36	○	-

Gildehauser Venn

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1143 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,36	○	-

Emstal von Lathen bis Papenburg

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1118 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,36	○	-

Schwarzes Wasser

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1223 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,35	○	-

Amtsvenn u. Hündfelder Moor

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1154 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,35	○	-

Grosses Veen

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1204 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,35	○	-

Erlenwälder bei Gut Hovesaat

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1217 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,34	○	-

NSG Sonfeldsche Bruch, Hagener Meer und Düne, mit Erweiterung

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1202 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,34	○	-

Eper-Graeser Venn/ Lasterfeld

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1158 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,33	○	-

Graeser Venn - Gut Moorhof

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1156 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,33	○	-

Fleuthkuhlen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1233 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,33	○	-

Samerrott

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1141 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,33	○	-

Kleingewässer Achterberg

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1145 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,33	○	-

NSG Altrhein Reeser Eyland, mit Erweiterung

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1201 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,33	○	-

NSG Weseler Aue

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1221 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,33	○	-

NSG Gut Grindt u. NSG Rheinaue zw. Km 830,7 - 833,2 , nur Teilfl

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1203 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,32	○	-

Wacholderheide Hörsteloe

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1166 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,32	○	-

Rüenberger Venn

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1144 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,32	○	-

NSG - Komplex In den Drevenacker Dünen, mit Erweiterung

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1226 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,31	○	-

NSG Lohwardt/Reckerfeld, Hübsche Grändort, nur Teilfl., mit Erw.

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1200 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,31	○	-

Herrenholz und Schöppinger Berg

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1168 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,31	○	-

NSG Rheinaue Bislich-Vahnum, nur Teilfläche

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1219 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,31	○	-

Liesner Wald

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1167 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,31		-

Vechte

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1160 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,31		-

Syen-Venn

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1136 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,30		-

Burlo-Vardingholter Venn und Entenschlatt

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1171 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,30		-

Kaninchenberge

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1227 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,30		-

NSG Reeser Schanz

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1199 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,30		-

Feuchtwiese Ochtrup

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1149 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,30	○	-

Ahlder Pool

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1140 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,29	○	-

Kirchheller Heide und Hiesfelder Wald

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1239 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,29	○	-

Harskamp

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1146 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,29	○	-

Berger Keienvenn

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1139 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,28	○	-

Gutswald Stovern

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1142 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,28	○	-

Wald bei Haus Burlo

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1169 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,28	○	-

NSG Lippeaue bei Damm u. Bricht und NSG Loosenberge, nur Teilfl

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1225 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,28	○	-

Dämmer Wald

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1206 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,27	○	-

Gartroper Mühlenbach

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1228 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,27	○	-

Krummhörn

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1108 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,27	○	-

VSG Feuchtwiesen im nördlichen Münsterland

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1163 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,27	○	-

Schnippenpohl

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1148 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,27		-

Weiher am Syenvenn

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1138 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,27		-

Fehntjer Tief und Umgebung

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1112 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,27		-

Lichtenhagen

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1207 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,26		-

Noordzeekustzone

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,26		
H9999:7 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2110, H2190B)	0,26		
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,26		
H2120 Witte duinen	0,26		
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,26		
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,26		
H2110 Embryonale duinen	0,26		
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,26		
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,26		
H2150 Duinheiden met struikhei	0,25		

Steinbach

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1231 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,26		-

Krickenbecker Seen - Kl. De Witt-See

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1246 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,26		-

Stollbach

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1229 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,26	○	-

Vogelschutzgebiet 'Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1247 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,26	○	-

Stollen im Rothenberg bei Wettringen

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1150 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,26	○	-

Alter Bierkeller bei Ochtrup

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1159 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,26	○	-

Unterems und Außenems

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1107 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,26	○	-

Emsmarsch von Leer bis Emden

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1113 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,26	○	-

Salzbrunnen am Rothenberg

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1147 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,25		-

Rheiderland

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1115 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,25		-

Üfter Mark

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1208 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,25		-

NSG Bislicher Insel, nur Teilfläche

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1220 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,25		-

Niederkamp

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1234 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,25		-

Bachsystem des Wienbaches

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1211 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,25		-

Felsbachaue

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1174 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,25	○	-

Heidesee in der Kirchheller Heide

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1241 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,25	○	-

NSG Rheinvorland im Orsoyer Rheinbogen, mit Erweiterung

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1237 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,25	○	-

Haringvliet

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg1EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutoibossen)	0,25	○	✓
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,22	●	✓

NSG Droste Woy und NSG Westerheide

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1224 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,24	○	-

Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigro

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1008 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,24		-

Wälder und Heiden bei Brüggen-Bracht

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1255 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,24		-

VSG 'Heubachniederung, Lavesumer Bruch und Borkenberge'

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1191 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,24		-

Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1009 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,24		-

NSG Rheinaue Walsum

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1238 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,24		-

Lippeaue

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1214 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,24		-

Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1016 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,24	○	-

Köllnischer Wald

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1240 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,23	○	-

Sundern

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1176 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,23	○	-

Staatsforst Rheurdt / Littard

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1243 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,23	○	-

KORVERSKOOI

Fürstenkuhle im Weissen Venn

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1173 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,23	○	-

NSG Rheinvorland bei Perrich

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1222 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,23	○	-

Lauwersmeer

Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Waterin

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1022 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,22	○	-

Roruper Holz mit Kestenbusch

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1175 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,22	○	-

Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariaho

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1040 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,22	○	-

Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en h

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1010 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,22	○	-

Weißes Venn / Geisheide

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1190 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,22	○	-

Elmpter Schwalmbruch

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1254 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,22	○	-

Tantelbruch mit Elmpter Bachtal und Teilen der Schwalmaue

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1256 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,22	○	-

Ronde Put

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1017 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,22	○	-

Kranenmeer

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1209 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,22	○	-

Spanjaards Duin

Voordelta

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,21	☐	
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,17	☐	-
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,16	☐	-
H1320 Slijkgrasvelden	0,12	☐	-

OUDE DIJK VAN WAAL EN BURG

Lüsekamp und Boschbeek

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1258 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,21	☐	-

Helpensteiner Bachtal-Rothenbach

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1262 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,21	☐	-

Abeek met aangrenzende moerasgebieden

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1023 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,21	☐	-

Schwarzes Venn

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1189 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,21		-

Ostfriesische Meere

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1110 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,20		-

Großes Meer, Loppersumer Meer

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1109 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,20		-

Postwegmoore u. Rütterberg-Nord

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1230 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,20		-

De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1015 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,20		-

De Kalmthouse Heide

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1013 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,20		-

Meinweg mit Ritzroder Dünen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1259 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,20		-

Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1036 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,20		-

Hangmoor Damerbruch

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1242 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,20		-

Tote Rahm

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1244 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,20		-

Kalmthoutse Heide

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1004 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,20		-

Schaagbachtal

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1261 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,20		-

Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1006 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,19		-

Klein en Groot Schietveld

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1005 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,19		-

Schwalm, Knippertzbach, Raderveekes u. Lüttelforster Bruch

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1260 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,19		-

NSG Rheinvorland nördl. der Ossenberger Schleuse, nur Teilfläche

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1236 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,19		-

Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamander

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1007 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,19		-

Wienbecker Mühle

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1210 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,19		-

Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1027 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,19		-

Westermarsch

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1103 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,19		-

Ueberanger Mark

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1252 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,19		-

Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1011 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,18		-

Latumer Bruch mit Buersbach, Stadtgräben und Wasserwerk

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1249 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,18		-

Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglab

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1032 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,18		-

Militair domein en vallei van de Zwarte Beek

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1037 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,18		-

Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1019 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,18		-

Nette bei Vinkrath

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1248 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,18		-

Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1024 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,17		-

Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrod

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1020 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,17		-

Schorren en Polders van de Beneden-Schelde

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1049 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,17		-

Ildericher Altrheinschlinge

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1257 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,17		-

Egelsberg

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1250 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,17		-

Grensmaas

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H91EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutoibossen)	0,16		-

Mechelse Heide en vallei van de Ziepbeek

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1025 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,16		-

Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbee

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1021 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,16		-

De Mechelse Heide en de Vallei van de Ziepbeek

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1035 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,16		-

Bokrijk en omgeving

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1033 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,16	○	-

Wurmtal südlich Herzogenrath

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1267 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,16	○	-

Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat.

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1012 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,16	○	-

De Maten

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1018 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,16	○	-

Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1039 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,15	○	-

Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1042 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,15	○	-

Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1043 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,15	○	-

Die Spey

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1251 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,15	○	-

Vijvercomplex van Midden Limburg

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1038 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,15	○	-

Demervallei

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1055 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,15	○	-

Teichfledermaus-Gewässer im Raum Aurich

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1102 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,14	○	-

De Demervallei

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1041 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,14	○	-

Teverener Heide

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1264 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,14	○	-

De Maten

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1034 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13	○	-

Overgang Kempen-Haspengouw

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1031 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13	○	-

Kellenberg und Rur zwischen Flossdorf und Broich

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1265 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13	○	-

Schlangenberg

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1277 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13	○	-

Osthertogenwald autour de Raeren (Raeren)

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1090 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13	○	-

Osthertogenwald autour de Raeren (Raeren)

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1091 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13	○	-

Wurmtal nördlich Herzogenrath

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1268 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13	○	-

Vallée de la Gueule en aval de Kelmis (Plombières; Welkenraedt)

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1076 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13	○	-

Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1028 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13	○	-

Lindenberger Wald

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1266 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	○	-

Kuifeend en Blokkersdijk

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1046 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	○	-

Münsterbachtal, Münsterbusch

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1276 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	○	-

Brander Wald

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1279 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	○	-

Jekervallei en bovenloop van de Demervallei

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1030 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	○	-

Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen.

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1054 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	○	-

Rur von Obermaubach bis Linnich

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1270 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	○	-

Wehebachtäler und Leyberg

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1271 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	○	-

Buchenwälder bei Zweifall

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1282 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11		-

De Zegge

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1014 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11		-

Basse Meuse et Meuse mitoyenne (Oupeye; Visé)

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1071 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11		-

Basse Meuse et Meuse mitoyenne (Blégny; Oupeye; Visé)

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1072 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11		-

Durme en Middenloop van de Schelde

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1048 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11		-

Voerstreek

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1029 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11		-

Vallée de la Gueule en amont de Kelmis (Kelmis; Lontzen; Raeren;

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1078 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11		-

Steinbruchbereich Bernhardshammer und Binsfeldhammer

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1278 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11		-

Montagne Saint-Pierre (Bassenge; Oupeye; Visé)

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1070 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11		-

Indemündung

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1269 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11		-

Hammerberg

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1275 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11		-

Vallée de la Gueule en amont de Kelmis (Kelmis; Lontzen; Raeren)

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1077 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10		-

Yerseke en Kapelse Moer

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,10		-
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,09		-

Basse vallée du Geer (Bassenge; Juprelle; Oupeye; Visé)

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1069 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10		-

Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten.

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1026 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10		-

Brockenberg

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1273 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10		-

Bärenstein

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1274 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10		-

Vallée du Ruisseau de Bolland (Blégny; Herve; Soumagne)

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1074 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09	○	-

Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1045 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09	○	-

Vallée du Ruisseau de Bolland (Blégny; Herve; Soumagne)

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1073 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09	○	-

Polders

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1058 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09	○	-

Vallée de la Gueule en aval de Kelmis (Plombières)

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1075 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09	○	-

Veerse Meer

Krekengebied

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1047 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08	○	-

Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin.

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1057 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08	○	-

Werther Heide, Napoleonsweg

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1272 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08	○	-

Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1062 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	○	-

Canisvliet

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,07	○	-

SBZ 3 / ZPS 3

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1098 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	○	-

Poldercomplex

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1060 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06		-

Het Zwin

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1061 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06		-

Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelij

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1059 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06		-

Groote Gat

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,06		-

 Geen overschrijding Wel overschrijding

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in de Benelux. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2014.1_20150903_de05cf2bce

Database versie 2014.1_20150825_fb538daf31

Meer informatie over de gebruikte data, zie www.aerius.nl/methodiek

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U kan dit document gebruiken voor de onderbouwing van depositie onder de drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, afhankelijk van de door u gekozen rekeninstellingen.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en stikstofoxide (NO_x), of één van beide. Hiermee is de depositie van de activiteit berekend en uitgewerkt. Op basis van de gekozen rekeninstellingen zijn de resultaten op Natura 2000-gebieden, als wel voor overige natuurgebieden inzichtelijk gemaakt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Voor meer toelichting verwijzen we u naar de websites www.aerius.nl pas.naturazoo.nl.

Berekening Situatie 1

- Kenmerken
- Emissie
- Depositie natuurgebieden
- Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
ARCADIS	-

Activiteit

Omschrijving

Oosterwold Almere

Datum berekening	Rekenjaar
------------------	-----------

27 november 2015, 13:29 2015

Rekeninstellingen

Berekend voor Nb-wet.

Totale emissie

	Situatie 1
--	------------

NOx -

NH₃ 181,09 ton/j

Depositie

Hectare met
hoogste project-
bijdrage (mol/ha/j)

Natuurgebied	Provincie
--------------	-----------

Naardermeer Noord-Holland


Situatie 1

12,60


Toelichting

verschil worst-case t.o.v. hs60%

Locatie
Situatie 1




Emissie
(per bron)
Situatie 1




Naam 1349CB12
Locatie (X,Y) 149540, 486399
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 1.474,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	1.474	NH ₃	1,000	1.474,00 kg/j




Naam 1349CB8
Locatie (X,Y) 149827, 485878
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 1.833,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	1.833	NH ₃	1,000	1.833,00 kg/j



Naam 1349CB6
Locatie (X,Y) 150314, 485081
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 1.833,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	1.833	NH ₃	1,000	1.833,00 kg/j




Naam 1349CC1
Locatie (X,Y) 151179, 483813
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 1.351,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	1.351	NH ₃	1,000	1.351,00 kg/j




Naam 1349RA7
Locatie (X,Y) 152680, 482995
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 6.924,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	6.924	NH ₃	1,000	6.924,00 kg/j




Naam 1349RA5
Locatie (X,Y) 153238, 481914
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 1.465,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	1.465	NH ₃	1,000	1.465,00 kg/j




Naam 1349RA3
Locatie (X,Y) 152942, 481719
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 1.870,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	1.870	NH ₃	1,000	1.870,00 kg/j




Naam 1349RB6
Locatie (X,Y) 153149, 481671
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 1.925,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	1.925	NH ₃	1,000	1.925,00 kg/j




Naam 1349CZ58
Locatie (X,Y) 153716, 480736
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 1.106,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	1.106	NH ₃	1,000	1.106,00 kg/j




Naam 1349CZ56
Locatie (X,Y) 152520, 480750
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 1.894,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	1.894	NH ₃	1,000	1.894,00 kg/j




Naam 1349CX55
Locatie (X,Y) 152315, 480716
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 7.745,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	7.745	NH ₃	1,000	7.745,00 kg/j



Naam 1349CB2
Locatie (X,Y) 150671, 484606
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 1.356,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	1.356	NH ₃	1,000	1.356,00 kg/j



Naam 1349CC5
Locatie (X,Y) 151563, 483370
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 1.223,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	1.223	NH ₃	1,000	1.223,00 kg/j




Naam 43926
Locatie (X,Y) 148940, 486886
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 142,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	142	NH ₃	1,000	142,00 kg/j




Naam 43927
Locatie (X,Y) 148710, 487403
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 2.808,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	2.808	NH ₃	1,000	2.808,00 kg/j




Naam 44239
Locatie (X,Y) 149705, 482582
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 2.556,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	2.556	NH ₃	1,000	2.556,00 kg/j



Naam 44240
Locatie (X,Y) 149676, 483258
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 1.859,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	1.859	NH ₃	1,000	1.859,00 kg/j



Naam 44241
Locatie (X,Y) 149640, 484500
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 4.098,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	4.098	NH ₃	1,000	4.098,00 kg/j




Naam 44242
Locatie (X,Y) 149509, 485500
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 6.936,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	6.936	NH ₃	1,000	6.936,00 kg/j




Naam 44243
Locatie (X,Y) 149500, 486500
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 8.320,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	8.320	NH ₃	1,000	8.320,00 kg/j




Naam 44244
Locatie (X,Y) 149456, 487403
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 4.937,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	4.937	NH ₃	1,000	4.937,00 kg/j




Naam 44555
Locatie (X,Y) 150558, 481500
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 4.264,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	4.264	NH ₃	1,000	4.264,00 kg/j




Naam 44556
Locatie (X,Y) 150500, 482500
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 9.275,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	9.275	NH ₃	1,000	9.275,00 kg/j



Naam 44557
Locatie (X,Y) 150500, 483500
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 9.449,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	9.449	NH ₃	1,000	9.449,00 kg/j



Naam 44558
Locatie (X,Y) 150343, 484592
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 7.661,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	7.661	NH ₃	1,000	7.661,00 kg/j



Naam 44559
Locatie (X,Y) 150500, 485500
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 9.096,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	9.096	NH ₃	1,000	9.096,00 kg/j




Naam 44560
Locatie (X,Y) 150154, 486438
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 2.796,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	2.796	NH ₃	1,000	2.796,00 kg/j



Naam 44871
Locatie (X,Y) 151500, 480684
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 2.060,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	2.060	NH ₃	1,000	2.060,00 kg/j



Naam 44872
Locatie (X,Y) 151500, 481500
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 7.152,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	7.152	NH ₃	1,000	7.152,00 kg/j



Naam 44873
Locatie (X,Y) 151659, 482500
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 7.080,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	7.080	NH ₃	1,000	7.080,00 kg/j



Naam 44874
Locatie (X,Y) 151500, 483500
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 8.039,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	8.039	NH ₃	1,000	8.039,00 kg/j




Naam 44875
Locatie (X,Y) 151497, 484500
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 6.307,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	6.307	NH ₃	1,000	6.307,00 kg/j




Naam 44876
Locatie (X,Y) 151158, 485228
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 754,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	754	NH ₃	1,000	754,00 kg/j




Naam 45188
Locatie (X,Y) 152500, 480607
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 6.611,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	6.611	NH ₃	1,000	6.611,00 kg/j



Naam 45189
Locatie (X,Y) 152500, 481500
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 9.102,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	9.102	NH ₃	1,000	9.102,00 kg/j




Naam 45190
Locatie (X,Y) 152500, 482500
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 9.384,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	9.384	NH ₃	1,000	9.384,00 kg/j




Naam 45191
Locatie (X,Y) 152561, 483266
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 2.389,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	2.389	NH ₃	1,000	2.389,00 kg/j




Naam 45505
Locatie (X,Y) 153500, 480667
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 4.764,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	4.764	NH ₃	1,000	4.764,00 kg/j




Naam 45506
Locatie (X,Y) 153500, 481500
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 8.500,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	8.500	NH ₃	1,000	8.500,00 kg/j




Naam 45507
Locatie (X,Y) 153132, 482375
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 2.058,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	2.058	NH ₃	1,000	2.058,00 kg/j




Naam 45822
Locatie (X,Y) 154126, 480900
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH3 298,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	298	NH3	1,000	298,00 kg/j



Naam 45823
Locatie (X,Y) 154117, 481165
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH3 400,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	totaal	400	NH3	1,000	400,00 kg/j

Depositie
natuur-
gebieden Hoogste projectbijdrage
(Naardermeer) Hoogste projectbijdrage per
natuurgebied

-  Habitatrichtlijn
-  Vogelrichtlijn
-  Beschermd natuurgebied
-  Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn
-  Habitatrichtlijn, Beschermd
natuurgebied
-  Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied
-  Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Depositie PAS-
gebieden

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Naardermeer	12,60		
Veluwe	9,80		 
Oostelijke Vechtplassen	8,22		
Rijntakken	2,26		
Botshol	2,20		
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck	2,03		
Polder Westzaan	1,92		 
De Wieden	1,88		
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske	1,81		
Kolland & Overlangbroek	1,73		
Binnenveld	1,62		
Noordhollands Duinreservaat	1,57		 
Weerribben	1,55		
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht	1,49		
Kennemerland-Zuid	1,46		 
Lingegebied & Diefdijk-Zuid	1,30		
Vecht- en Beneden-Reggegebied	1,29		
Schoorlse Duinen	1,28		

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder	1,18	●	✓
Zouweboezem	1,17	●	✓
Holtingerveld	1,16	●	✓
Dwingelderveld	1,16	●	✓
Olde Maten & Veerslootslanden	1,15	●	✓
Landgoederen Brummen	1,13	●	✓
Boetelerveld	1,13	●	✓
Rottige Meenthe & Brandemeer	1,10	●	 ✓
Sallandse Heuvelrug	1,08	●	✓
Drents-Friese Wold & Leggelderveld	0,97	●	✓
Meijndel & Berkheide	0,96	●	✓
Zwanenwater & Pettemerduinen	0,88	●	✓
Mantingerzand	0,87	●	✓
Coepelduynen	0,87	●	✓
Borkeld	0,82	●	✓
Duinen Den Helder-Callantsoog	0,79	●	✓
Eilandspolder	0,79	●	✓
Engbertsdijksvenen	0,77	●	✓

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Wierdense Veld	0,73	●	✓
Biesbosch	0,72	●	✓
Mantingerbos	0,70	●	✓
Alde Feanen	0,66	●	✓
Uiterwaarden Lek	0,64	●	✓
Elperstroomgebied	0,64	●	✓
Van Oordt's Mersken	0,62	●	✓
Bargerveen	0,62	●	✓
Fochteloërveen	0,62	●	✓
Westduinpark & Wapendal	0,62	●	✓
Sint Jansberg	0,61	●	✓
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem	0,60	●	✓
Drentsche Aa-gebied	0,59	●	✓
Stelkampsveld	0,59	●	✓
Solleveld & Kapittelduinen	0,58	●	✓
Springendal & Dal van de Mosbeek	0,58	●	✓
Drouwenerzand	0,57	●	✓
Wijnjeterper Schar	0,54	●	✓
Bakkeveense Duinen	0,54	●	✓

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen	0,52	●	✓
De Bruuk	0,51	●	✓
Witterveld	0,51	●	✓
Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek	0,50	●	✓
Duinen Vlieland	0,50	●	✓
Duinen en Lage Land Texel	0,50	●	✗
Duinen Schiermonnikoog	0,48	●	✓
Lonnekermeer	0,48	●	✓
Duinen Terschelling	0,48	●	✓
Lemselermaten	0,48	●	✓
Waddenzee	0,47	●	✓
Zeldersche Driessen	0,47	●	✓
Norgerholt	0,47	●	✓
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek	0,47	●	✓
Landgoederen Oldenzaal	0,46	●	✓
Buurserzand & Haaksbergerveen	0,46	●	✓
Langstraat	0,46	●	✓
Maasduinen	0,44	●	✓
Bergvennen & Brecklenkampse Veld	0,44	●	✓

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Dinkelland	0,43	●	✓
Korenburgerveen	0,43	●	✓
Voornes Duin	0,42	●	✓
Duinen Ameland	0,41	●	✓
Kampina & Oisterwijkse Vennen	0,40	●	✓
Witte Veen	0,40	●	✓
Oeffelter Meent	0,38	●	✓
Boschhuizerbergen	0,37	●	✓
Bekendelle	0,36	●	✓
Krammer-Volkerak	0,36	●	✓
Aamsveen	0,36	●	✓
Lieftinghsbroek	0,35	●	✓
Willinks Weust	0,34	●	✓
Wooldse Veen	0,33	●	✓
Grevelingen	0,32	●	✓
Deurnsche Peel & Mariapeel	0,32	●	✓
Ulvenhoutse Bos	0,31	●	✓
Duinen Goeree & Kwade Hoek	0,30	●	✓
Strabrechtse Heide & Beuven	0,28	●	✓

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Kempenland-West	0,26	●	✓
Regte Heide & Riels Laag	0,26	●	✓
Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux	0,25	●	✓
Kop van Schouwen	0,24	●	✓
Groote Peel	0,23	●	✓
Weerter- en Budelerbergen & Ringselven	0,22	●	 ✓
Leudal	0,21	●	✓
Brabantse Wal	0,20	●	✓
Meinweg	0,20	●	✓
Swalmdal	0,20	●	✓
Sarsven en De Banen	0,19	●	✓
Oosterschelde	0,19	●	✓
Roerdal	0,18	●	✓
Manteling van Walcheren	0,16	●	✓
Brunsummerheide	0,15	●	✓
Geleenbeekdal	0,13	●	✓
Bunder- en Elslooërbos	0,12	●	✓
Geuldal	0,12	●	✓

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Bemelerberg & Schiepersberg	0,11	●	✓
Westerschelde & Saeftinghe	0,11	●	✓
Savelsbos	0,10	●	✓
Sint Pietersberg & Jekerdal	0,10	●	✓
Kunderberg	0,10	●	✓
Noorbeemden & Hoogbos	0,09	●	✓
Zwin & Kievittepolder	0,07	●	✓

- Geen overschrijding
- Wel overschrijding
- ✓ Ontwikkelingsruimte beschikbaar*
- ✗ Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar
-  In tenminste één hectare is meer dan 60% van de ontwikkelingsruimte uitgegeven

* Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie per
habitattype Naardermeer

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg1Do Hoogveenbossen	12,60	●	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	11,00	●	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	10,90	●	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	10,70	○	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	10,30	●	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	10,20	●	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	9,73	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	6,63	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	6,28	●	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	4,36	●	✓

Veluwe

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	9,80	●	 
H4030 Droge heiden	9,67	●	 
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	8,24	●	 
ZGH4030 Droge heiden	8,02	●	
H2330 Zandverstuivingen	7,28	●	 
ZGH9190 Oude eikenbossen	7,25	●	 
H9190 Oude eikenbossen	7,15	●	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	6,42	●	
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	6,28	●	 
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	5,99	●	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	5,59	●	
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	5,33	●	 
H3160 Zure vennen	5,13	●	
H3130 Zwakgebufferde vennen	5,09	●	
H5130 Jeneverbesstruwelen	4,68	●	
H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	4,18	●	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	3,36	●	
H7230 Kalkmoerassen	3,13	●	

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	3,09	●	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	2,41	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	1,78	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1,67	●	✓

Oostelijke Vechtplassen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	8,22	●	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	7,91	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	7,22	●	✓
H9999:95 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	6,78	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	6,74	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	5,07	●	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	4,75	●	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	4,42	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	3,18	●	✓

Rijntakken

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H91Fo Droge hardhoutooibossen	2,26	●	✓
H91EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	1,98	●	✓
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	1,78	●	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	1,70	●	✓
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	1,70	○	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	1,62	●	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	1,21	●	✓
ZGH91Fo Droge hardhoutooibossen	0,77	○	-
ZGH91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,63	○	✓
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,61	○	✓
H9999:38 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6120)	0,60	●	✓

Botshol

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	2,20		
H7210 Galigaanmoerassen	2,20		
H91Do Hoogveenbossen	2,20		
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	2,17		
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	2,12		
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	1,53		

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	2,03		
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	1,71		
H91Do Hoogveenbossen	1,62		
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	1,45		
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	1,13		
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1,02		
H6410 Blauwgraslanden	1,02		
H7210 Galigaanmoerassen	0,72		

Polder Westzaan

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,92		 
H91Do Hoogveenbossen	1,24		
ZGH91Do Hoogveenbossen	1,01		
H9999:91 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7140B)	0,94		
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,80		
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,75		

De Wieden

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	1,88	●	✓
H9999:35 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	1,88	●	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,88	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	1,79	●	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	1,72	○	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	1,63	●	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	1,55	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	1,49	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1,48	●	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	1,36	○	✓
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,35	●	✓
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	1,32	○	✓
H7210 Galigaanmoerassen	1,26	●	✓

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg1Do Hoogveenbossen	1,81		
H4o1oB Vochtige heiden (laagveengebied)	1,69		
H714oB Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,69		
H314oLv Kranswierwateren, in laagveengebieden	1,29		

Kolland & Overlangbroek

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1,73		

Binnenveld

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H714oA Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1,62		
H714oB Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,18		
H641o Blauwgraslanden	1,12		

Noordhollands Duinreservaat

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	1,57	●	 
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	1,57	●	 
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	1,56	●	 
H218oB Duinbossen (vochtig)	1,54	○	
H216o Duindoornstruwelen	1,54	●	 
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	1,53	●	 
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	1,51	●	 
H212o Witte duinen	1,49	●	 
H217o Kruipwilgstruwelen	1,49	○	 
H643oC Ruigten en zomen (droge bosranden)	1,45	○	
H213oC Grijze duinen (heischraal)	1,43	●	 
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	1,32	●	 
H9999:87 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H213oB, H213oC)	1,28	●	 
H214oB Duinheiden met kraaihei (droog)	1,23	●	
H215o Duinheiden met struikhei	1,22	●	
H214oA Duinheiden met kraaihei (vochtig)	1,18	●	
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,93	●	 

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H7210 Galigaanmoerassen	0,70		
H6410 Blauwgraslanden	0,70		

Weerribben

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg1Do Hoogveenbossen	1,55	●	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	1,50	○	✓
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	1,50	○	✓
H7210 Galigaanmoerassen	1,49	●	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	1,48	●	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,48	●	✓
ZGHg1Do Hoogveenbossen	1,48	●	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	1,48	○	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1,47	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	1,47	●	✓
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,40	●	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	1,35	○	✓
ZGH4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	1,09	●	✓
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1,07	●	✓
H9999:34 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,97	●	✓

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	1,49	●	✓
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	1,48	●	✓
H91Fo Droge hardhoutooibossen	1,45	●	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	1,26	●	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	1,16	○	-
H6410 Blauwgraslanden	1,02	●	✓

Kennemerland-Zuid

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	1,46	●	
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	1,46	●	 
H2160 Duindoornstruwelen	1,41	●	 
H2180B Duinbossen (vochtig)	1,38	●	 
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	1,35	●	 
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	1,31	●	 
H9999:88 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B, H2130C)	1,29	●	 
H2120 Witte duinen	1,26	●	 
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	1,13	●	 
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	1,07	●	
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	1,06	●	 
H2170 Kruipwilgstruwelen	1,04	○	 
ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)	1,04	○	
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,89	●	
H2150 Duinheiden met struikhei	0,86	●	
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,60	○	 
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,60	●	

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,57		
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,52		
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,51		 
H2110 Embryonale duinen	0,48		

Lingegebied & Diefdijk-Zuid

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:70 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7230)	1,30		
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1,07		
H91EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	0,86		
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,85		
H7230 Kalkmoerassen	0,60		
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,43		-

Vecht- en Beneden-Reggegebied

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H5130 Jeneverbesstruwelen	1,29	●	✓
H4030 Droge heiden	1,27	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	1,21	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	1,18	●	✓
ZGH3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	1,17	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1,17	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	1,17	●	✓
H3160 Zure vennen	1,15	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	1,13	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1,13	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	1,12	●	✓
ZGH7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	1,10	●	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1,01	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,97	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,97	●	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,97	●	✓
ZGH5130 Jeneverbesstruwelen	0,96	●	✓
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,94	●	✓

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,87		
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,84		

Schoorlse Duinen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	1,28	●	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	1,19	●	✓
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	1,17	●	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	1,17	●	✓
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	1,16	●	✓
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	1,11	●	✓
H2120 Witte duinen	1,01	●	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,97	○	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,96	●	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,88	○	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,83	●	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,82	●	✓
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,74	●	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,49	○	✓
H2110 Embryonale duinen	0,48	○	✓

Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,18	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	1,03	○	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,90	●	✓

Zouweboezem

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	1,17	●	✓
Lg03 Zwakgebufferde sloot	1,11	●	✓
H9999:105 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6410)	1,00	●	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,56	○	-
H6410 Blauwgraslanden	0,54	●	✓

Holtingerveld

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9190 Oude eikenbossen	1,16	●	✓
H4030 Droge heiden	1,11	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	1,05	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	1,05	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1,03	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	1,02	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	1,00	●	✓
ZGH7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,96	●	✓
H3160 Zure vennen	0,96	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,95	●	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,94	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,89	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,89	●	✓
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,89	●	✓
ZGH2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,83	●	✓

Dwingelderveld

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	1,16	●	✓
ZGH2330 Zandverstuivingen	1,10	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	1,08	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	1,07	●	✓
H4030 Droge heiden	1,07	●	✓
H9999:30 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	1,06	●	✓
ZGH6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	1,05	●	✓
H3160 Zure vennen	1,05	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	1,04	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	1,03	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1,03	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	1,03	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	1,01	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	1,00	●	✓
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,98	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,93	●	✓
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,89	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,78	●	✓

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
ZGH7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,70		-
ZGH3160 Zure vennen	0,65		

Olde Maten & Veerslootslanden

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,15		
H9999:37 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7140B)	1,08		
H6410 Blauwgraslanden	1,06		
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,92		

Landgoederen Brummen

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H3130 Zwakgebufferde vennen	1,13	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	1,13	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1,10	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	1,09	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	1,07	●	✓
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,97	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,97	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,79	●	✓

Boetelerveld

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	1,13	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	1,10	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1,10	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	1,02	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,91	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,89	●	✓
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,85	●	✓

Rottige Meenthe & Brandemeer

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H91Do Hoogveenbossen	1,10		 
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,04		 
ZGH315obaz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,96		
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,92		
H7210 Galigaanmoerassen	0,92		
H6410 Blauwgraslanden	0,87		
H315obaz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,86		
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,78		

Sallandse Heuvelrug

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H4030 Droge heiden	1,08	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	1,04	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1,02	●	✓
H9999:42 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3160, H6230)	1,00	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,99	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,88	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,78	●	✓
H3160 Zure vennen	0,71	●	✓

Drents-Friese Wold & Leggelderveld

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9190 Oude eikenbossen	0,97	●	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,96	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,96	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,96	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,95	●	✓
H4030 Droge heiden	0,94	●	✓
H3160 Zure vennen	0,94	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,92	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,88	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,83	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,82	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,73	●	✓
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,66	●	✓

Meijendel & Berkheide

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,96	●	✓
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,95	●	✓
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,94	●	✓
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,94	●	✓
H218oAo Duinbossen (droog), overig	0,94	●	✓
H212o Witte duinen	0,91	●	✓
ZGH216o Duindoornstruwelen	0,91	○	✓
ZGH218oAo Duinbossen (droog), overig	0,90	●	✓
ZGH218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,90	●	✓
H216o Duindoornstruwelen	0,89	●	✓
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,86	○	✓
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,83	●	✓
ZGH213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,77	●	✓
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,73	●	✓
H219oAe Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	0,71	○	✓
ZGH213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,52	●	✓
ZGH218oB Duinbossen (vochtig)	0,52	○	✓
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,44	●	✓

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,40		

Zwanenwater & Pettemerduinen

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,88	○	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,86	●	✓
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,86	●	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,84	●	✓
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,81	●	✓
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,78	○	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,78	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,77	○	✓
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,77	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,74	●	✓
H2120 Witte duinen	0,70	●	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,63	●	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,58	●	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,58	○	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,57	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,53	●	✓
H9999:85 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B, H6230)	0,52	●	✓

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
ZGH2120 Witte duinen	0,47		
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,44		
H2110 Embryonale duinen	0,40		
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,39		

Mantingerzand

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H4030 Droge heiden	0,87		
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,80		
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,80		
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,79		
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,72		
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,72		
H2330 Zandverstuivingen	0,72		
H3160 Zure vennen	0,70		
H9190 Oude eikenbossen	0,68		
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,53		

Coepelduynen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,87	●	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,73	○	✓
H2120 Witte duinen	0,58	●	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,38	○	✓

Borkeld

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,82	●	✓
H4030 Droge heiden	0,80	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,76	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,70	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,66	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snabelbiezen	0,55	●	✓
H3160 Zure vennen	0,53	●	✓

Duinen Den Helder-Callantsoog

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,79	●	✓
H2120 Witte duinen	0,69	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,68	●	✓
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,66	○	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,63	●	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,61	●	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,50	○	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,48	○	✓
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,48	●	✓
H9999:84 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B, H2130C)	0,41	●	✓
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,35	●	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,28	●	✓
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,24	●	✓

Eilandspolder

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,79	●	✓

Engbertsdijkerven

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,77	●	✓
H4030 Droge heiden	0,70	●	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,52	●	✓

Wierdense Veld

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,73	●	✓
H4030 Droge heiden	0,70	●	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,59	●	✓

Biesbosch

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H91EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutoibossen)	0,72	○	✓
ZGH91EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutoibossen)	0,72	○	-
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,42	○	-
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,42	●	✓
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,40	○	-
H6120 Stroomdalgraslanden	0,31	○	✓

Mantingerbos

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,70	●	✓

Alde Feanen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,66	○	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,65	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,63	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,60	○	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,43	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,42	○	✓

Uiterwaarden Lek

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H6120 Stroomdalgraslanden	0,64	●	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,55	●	✓

Elperstroomgebied

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,64	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,49	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,47	●	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,45	●	✓

Van Oordt's Mersken

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,62	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,56	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,56	●	✓

Bargerveen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,62	●	✓
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,62	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,45	●	✓
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,44	●	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,37	●	✓

Fochteloërveen

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H4030 Droge heiden	0,62	●	✓
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,62	●	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,60	●	✓
H9999:23 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7110A, H7120)	0,49	●	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,40	●	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,38	●	✓

Westduinpark & Wapendal

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,62	●	✓
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,57	●	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,57	●	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,57	●	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,55	●	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,52	●	✓
H2180Ao Duinbossen (droog), overig	0,52	●	✓
H2120 Witte duinen	0,49	●	✓

Sint Jansberg

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,61	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,59	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,58	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,57	●	✓

Loevesteyn, Pompveld & Kornsche Boezem

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H91EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	0,60	○	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,53	●	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,42	○	-
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,41	●	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,37	○	-
H6120 Stroomdalgraslanden	0,35	●	✓

Drentsche Aa-gebied

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
ZGH4030 Droge heiden	0,59	●	✓
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,50	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,50	○	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,50	○	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,50	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,47	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,47	●	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,46	●	✓
H4030 Droge heiden	0,45	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,44	●	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,44	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,43	●	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,43	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,42	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,41	●	✓
H3160 Zure vennen	0,40	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,40	○	✓
ZGH3160 Zure vennen	0,39	●	✓

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,38		

Stelkampsveld

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,59		
H401oA Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,59		
H403o Droge heiden	0,56		
H313o Zwakgebufferde vennen	0,56		
H715o Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,55		
H641o Blauwgraslanden	0,52		
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,52		
H723o Kalkmoerassen	0,49		

Solleveld & Kapittelduinen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,58	●	✓
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,55	●	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,55	●	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,54	●	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,46	●	✓
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,46	●	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,45	●	✓
H2120 Witte duinen	0,34	●	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,29	○	✓

Springendal & Dal van de Mosbeek

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H4030 Droge heiden	0,58	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,55	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,54	●	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,53	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,53	●	✓
H9999:45 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230)	0,52	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,52	●	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,52	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,51	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,50	●	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,49	●	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,49	●	✓
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,47	●	✓
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,47	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,45	●	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,44	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,44	●	✓

Drouwenerzand

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H2330 Zandverstuivingen	0,57	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,54	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,51	●	✓
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,44	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,42	●	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,40	●	✓

Wijnjeterper Schar

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,54	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,54	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,54	●	✓
H4030 Droge heiden	0,54	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,46	●	✓

Bakkeveense Duinen

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,54	●	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,54	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,46	●	✓
H3160 Zure vennen	0,46	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,46	●	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,38	●	✓

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9190 Oude eikenbossen	0,52	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,50	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,48	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,47	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,44	●	✓
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,43	●	✓

De Bruuk

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H6410 Blauwgraslanden	0,51	●	✓

Witterveld

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,51	●	✓
H4030 Droge heiden	0,44	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,43	○	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,43	●	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,42	●	✓

Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,50	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,49	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,46	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,46	●	✓

Duinen Vlieland

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,50	●	✓
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,50	●	✓
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,49	○	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,47	●	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,46	●	✓
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,46	●	✓
H2120 Witte duinen	0,45	●	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,44	○	✓
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,43	●	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,43	●	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,41	●	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,36	○	✓
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,36	●	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,32	○	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,28	●	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,26	○	-
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,26	○	✓
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,26	○	✓

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,24	☐	
H2110 Embryonale duinen	0,23	☐	

Duinen en Lage Land Texel

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,50	●	✓
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,49	○	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,49	●	✗
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,49	○	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,47	●	✓
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,47	●	✓
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,45	●	✓
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,45	○	✓
ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,45	○	✓
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,43	●	✓
H9999:2 Habitatype onbekend/onzeer KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B, H2130C)	0,41	●	✓
H2120 Witte duinen	0,40	○	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,40	●	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,37	○	✗
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,35	●	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,34	●	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,33	●	✓

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H7210 Galigaanmoerassen	0,33		
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,33		
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,32		
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,30		
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,27		
H2110 Embryonale duinen	0,27		
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,25		
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,24		
H6230 Heischrale graslanden	0,22		

Duinen Schiermonnikoog

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,48	●	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,48	●	✓
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,46	●	✓
H9999:6 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B, H2130C)	0,46	●	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,45	●	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,45	○	✓
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,44	●	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,42	●	✓
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,42	○	✓
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,39	●	✓
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,39	●	✓
ZGH2120 Witte duinen	0,39	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,38	●	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,37	●	✓
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,36	○	✓
ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,34	○	✓
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,28	●	✓

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,24		

Lonnekermeer

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,48		
H4030 Droge heiden	0,48		
H3160 Zure vennen	0,48		
H6410 Blauwgraslanden	0,47		
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,46		
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,40		
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,38		

Duinen Terschelling

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,48	●	✓
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,48	●	✓
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,48	○	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,48	●	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,48	●	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,48	○	✓
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,47	●	✓
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,45	●	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,45	○	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,44	●	✓
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,44	●	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,42	●	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,42	○	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,41	●	✓
H2120 Witte duinen	0,40	●	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,37	○	✓
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,35	○	✓
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,35	○	✓

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,33		
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,31		
H6410 Blauwgraslanden	0,30		
ZGH2120 Witte duinen	0,27		
H2110 Embryonale duinen	0,26		
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,26		
ZGH2130C Grijze duinen (heischraal)	0,26		
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,25		-
ZGH2110 Embryonale duinen	0,25		

Lemselermaten

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,48		
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,45		
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,45		
H6410 Blauwgraslanden	0,44		
H7230 Kalkmoerassen	0,44		
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,43		
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,39		

Waddenzee

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,47	●	✓
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,41	○	✓
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,39	○	-
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,38	●	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,38	●	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,33	●	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,33	●	✓
H9999:1 Habitattype onbekend/onzekeer KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B)	0,33	●	✓
H1320 Slijkgrasvelden	0,31	○	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,30	○	✓
H2110 Embryonale duinen	0,29	○	✓
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,28	○	✓
H2120 Witte duinen	0,27	○	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,25	●	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,25	○	✓
H6230 Heischrale graslanden	0,21	●	✓
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,21	○	-
ZGH2120 Witte duinen	0,21	○	-

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
ZGH1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,18		-
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,16		-

Zeldersche Driessen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,47		
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,43		
H6120 Stroomdalgraslanden	0,41		
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,41		

Norgerholt

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,47		

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,47	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,43	●	✓
ZGH3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,38	●	✓
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,38	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,32	●	✓

Landgoederen Oldenzaal

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,46	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,45	●	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,44	●	✓
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,43	●	✓
ZGH9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,41	●	✓
H9999:50 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H9120, H9160A)	0,36	●	✓

Buurserzand & Haaksbergerveen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,46	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,45	●	✓
H4030 Droge heiden	0,44	●	✓
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,43	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,43	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,43	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,41	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,40	●	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,34	●	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,34	●	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,34	●	✓

Langstraat

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H6410 Blauwgraslanden	0,46	●	✓
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,46	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,46	●	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,44	●	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,30	○	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,25	●	✓
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,25	●	✓

Maasduinen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,44	●	✓
H4030 Droge heiden	0,44	●	✓
H3160 Zure vennen	0,42	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,41	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,41	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,41	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,41	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,39	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,39	●	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,38	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,38	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,35	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,34	●	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,28	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,28	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,28	●	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,27	●	✓
H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,26	●	✓

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H6120 Stroomdalgraslanden	0,26	●	✓

Bergvennen & Brecklenkampse Veld

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,44	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,42	●	✓
H4030 Droge heiden	0,42	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,42	●	✓
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,42	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,42	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,42	●	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,41	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,39	●	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,34	●	✓

Dinkelland

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,43	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,38	●	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,37	●	✓
H4030 Droge heiden	0,35	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,35	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,35	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,33	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,32	●	✓
H9999:49 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130)	0,32	●	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,30	●	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,29	●	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,28	●	✓

Korenburgerveen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,43	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,42	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,41	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,40	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,39	●	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,38	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,38	●	✓
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,36	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,36	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,33	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,31	○	-

Voornes Duin

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,42	○	✓
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,41	●	✓
H218oAo Duinbossen (droog), overig	0,41	●	✓
H9999:100 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H213oC)	0,41	●	✓
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,41	●	✓
H216o Duindoornstruwelen	0,41	○	✓
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,40	●	✓
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,39	●	✓
H219oAe Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	0,34	○	✓
H212o Witte duinen	0,32	●	✓
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,32	●	✓
H213oC Grijze duinen (heischraal)	0,30	●	✓
H217o Kruipwilgstruwelen	0,20	○	✓

Duinen Ameland

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,41	●	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,39	●	✓
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,39	○	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,38	○	✓
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,36	●	✓
H9999:5 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B, H2130C, H6230)	0,34	●	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,32	●	✓
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,31	○	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,30	○	✓
ZGH2120 Witte duinen	0,29	●	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,29	○	✓
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,29	○	✓
H2120 Witte duinen	0,28	○	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,28	●	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,27	●	✓
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,27	○	✓
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,26	●	✓

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,26		
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,26		
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,26		
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,25		
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,25		
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,23		
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,22		
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,22		
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,22		

Kampina & Oisterwijkse Vennen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H3160 Zure vennen	0,40	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,38	●	✓
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,38	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,38	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,37	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,37	●	✓
ZGH3160 Zure vennen	0,36	●	✓
H4030 Droge heiden	0,36	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,35	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,34	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,34	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,31	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,31	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,27	●	✓

Witte Veen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H4030 Droge heiden	0,40	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,40	●	✓
H3160 Zure vennen	0,36	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,36	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,34	○	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,33	●	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,32	●	✓

Oeffelter Meent

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,38	●	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,33	●	✓

Boschhuizerbergen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,37	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,36	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,36	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,28	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,28	●	✓

Bekendelle

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,36	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,36	●	✓
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,36	●	✓

Krammer-Volkerak

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:114 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2190B, H2190B)	0,36	●	✓
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,17	○	-
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,16	○	✓
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,16	○	-
H91EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	0,14	○	-
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,12	●	✓

Aamsveen

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,36	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,36	●	✓
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,35	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,33	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,33	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,32	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,31	●	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,30	●	✓
H4030 Droge heiden	0,30	●	✓

Lieftingsbroek

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,35	●	✓
Hg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,35	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,33	●	✓

Willinks Weust

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,34	●	✓
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,34	●	✓
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,32	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,32	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,32	●	✓

Wooldse Veen

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,33	●	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,30	●	✓

Grevelingen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H2160 Duindoornstruwelen	0,32	○	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,29	●	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,28	○	✓
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,28	●	✓
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,27	○	✓
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,23	●	✓
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,14	○	✓
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,13	○	✓

Deurnsche Peel & Mariapeel

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,32	●	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,28	●	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,21	●	✓
H4030 Droge heiden	0,21	●	✓

Ulvenhoutse Bos

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,31	●	✓
Hg16oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,31	●	✓
Hg12o Beuken-eikenbossen met hulst	0,31	●	✓

Duinen Goeree & Kwade Hoek

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H2160 Duindoornstruwelen	0,30	○	✓
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,30	●	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,28	●	✓
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,28	●	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,20	●	✓
H2120 Witte duinen	0,18	○	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,18	●	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,18	●	✓
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,17	○	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,17	●	✓
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,17	●	✓
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,14	○	✓
H2110 Embryonale duinen	0,13	○	✓

Strabrechtse Heide & Beuven

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H4030 Droge heiden	0,28	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,28	●	✓
H3160 Zure vennen	0,27	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,27	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,26	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,25	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,23	●	✓
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,22	●	✓

Kempenland-West

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,26	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,26	●	✓
H4030 Droge heiden	0,25	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,25	●	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,24	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,24	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,24	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,23	●	✓
H3160 Zure vennen	0,22	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,19	●	✓

Regte Heide & Riels Laag

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H4030 Droge heiden	0,26	●	✓
H3160 Zure vennen	0,26	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,25	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,24	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,23	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,23	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,19	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,18	●	✓

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H4030 Droge heiden	0,25	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,25	●	✓
H3160 Zure vennen	0,24	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,24	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,24	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,24	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,24	●	✓
H9999:136 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130)	0,24	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,24	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,23	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,23	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,19	●	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,18	●	✓

Kop van Schouwen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,24	●	✓
H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,24	●	✓
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,22	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,22	●	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,22	○	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,22	○	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,22	●	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,21	●	✓
H9999:116 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B, H2130C)	0,20	●	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,19	●	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,18	●	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,15	●	✓
H2190A Vochtige duinvalleien (open water)	0,15	●	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,14	○	✓
H2120 Witte duinen	0,13	○	✓
H2110 Embryonale duinen	0,11	○	-

Groote Peel

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,23	●	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,20	●	✓
H4030 Droge heiden	0,19	●	✓

Weerter- en Budelerbergen & Ringselven

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,22	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,22	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,22	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,21	●	⚠ ✓
H4030 Droge heiden	0,20	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,20	●	✓

Leudal

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,21	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,21	●	✓
ZGH9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,21	●	✓

Brabantse Wal

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H3160 Zure vennen	0,20	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,18	●	✓
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,18	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,18	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,18	●	✓
H4030 Droge heiden	0,18	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,17	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,16	●	✓
H9999:128 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130)	0,16	●	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,16	●	✓
ZGH3160 Zure vennen	0,15	●	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,15	●	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,15	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,15	●	✓

Meinweg

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,20	●	✓
H4030 Droge heiden	0,19	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,19	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,19	●	✓
H3160 Zure vennen	0,19	●	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,18	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,18	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,17	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,17	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,16	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,15	●	✓

Swalmdal

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,20	●	✓
H9999:148 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6120)	0,19	●	✓
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,17	●	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,14	○	-

Sarsven en De Banen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,19	●	✓
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,19	●	✓
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,18	●	✓

Oosterschelde

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,19	●	✓
H1320 Slijkgrasvelden	0,15	●	✓
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,12	○	✓
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,12	○	-
H2120 Witte duinen	0,10	○	-
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,09	○	-
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,08	●	✓
H2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,08	●	✓

Roerdal

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,18	●	✓
ZGHg1Do Hoogveenbossen	0,16	●	✓
Hg1Do Hoogveenbossen	0,15	●	-

Manteling van Walcheren

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H218oA Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,16	●	✓
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,16	●	✓
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,15	●	✓
H216o Duindoornstruwelen	0,15	○	✓
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,15	○	✓
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,15	●	✓
H219oA Vochtige duinvalleien (open water)	0,15	●	✓
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,14	○	✓
H212o Witte duinen	0,12	○	✓
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,10	○	✓
Hg999:117 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H213oB)	0,09	●	✓

Brunssummerheide

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H91Do Hoogveenbossen	0,15	●	✓
H4030 Droge heiden	0,15	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,14	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,14	●	✓
ZGH6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,14	●	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,14	○	-
H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,13	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,13	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,13	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,13	●	✓
H3160 Zure vennen	0,13	●	✓

Geleenbeekdal

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,13	●	✓
Hg12o Beuken-eikenbossen met hulst	0,13	●	✓
ZGHg16oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,13	●	✓
ZGHg12o Beuken-eikenbossen met hulst	0,13	●	✓
Hg16oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,12	●	✓
ZGHg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,12	●	✓
H723o Kalkmoerassen	0,11	●	✓

Bunder- en Elsllooërbos

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg16oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,12	●	✓
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,12	●	✓
H722o Kalktufbronnen	0,12	○	✓
H643oC Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,12	○	✓
ZGH643oC Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,10	●	✓

Geuldal

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,12	●	✓
H9110 Veldbies-beukenbossen	0,12	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,12	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,11	○	✓
H7220 Kalktufbronnen	0,11	○	✓
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,11	○	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,10	●	✓
H6210 Kalkgraslanden	0,10	●	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,10	●	✓
H6230dkr Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,09	●	✓
H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,09	●	✓
H6130 Zinkweiden	0,08	●	✓

Bemelerberg & Schiepersberg

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
ZGH6210 Kalkgraslanden	0,11	●	✓
ZGH9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,11	●	✓
ZGH6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,11	●	✓
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,11	●	✓
H6210 Kalkgraslanden	0,09	●	✓
H6230dkr Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,09	●	✓
H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,09	●	✓

Westerschelde & Saeftinghe

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,11	●	✓
H1320 Slijkgrasvelden	0,11	○	-
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,11	○	-
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,09	○	-
H2160 Duindoornstruwelen	0,07	○	-
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,07	○	-
H9999:122 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2110, H2120, H2190B)	0,06	○	-
H2120 Witte duinen	0,06	○	-
H2110 Embryonale duinen	>0,05	○	-

Savelsbos

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,10	●	✓
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,10	●	✓
ZGH6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,10	○	✓
H6210 Kalkgraslanden	0,10	●	✓
H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,09	●	✓

Sint Pietersberg & Jekerdal

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
ZGH9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,10	●	✓
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,10	●	✓
H6230dkr Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,09	●	✓
H6210 Kalkgraslanden	0,09	●	✓
H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,09	●	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,09	●	✓

Kunderberg

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,10	●	✓
H6210 Kalkgraslanden	0,09	○	✓

Noorbeemden & Hoogbos

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
ZGH9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,09	●	✓
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,09	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07	○	-
H7220 Kalktufbronnen	0,07	○	-

Zwin & Kievittepolder

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H2160 Duindoornstruwelen	0,07	○	✓
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,06	○	-
H2120 Witte duinen	0,06	○	✓
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	>0,05	●	✓
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	>0,05	○	-

○ Geen overschrijding

● Wel overschrijding

✓ Ontwikkelingsruimte beschikbaar*

✗ Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

 In tenminste één hectare is meer dan 60% van de ontwikkelingsruimte uitgegeven

* Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie
resterende
gebieden

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Veluwerandmeren	13,50	●	-
Markermeer & IJmeer	5,50	○	-
Arkemheen	5,21	●	-
WATERLAND AEEN EN DRIEEN	2,86	○	-
Zwarte Meer	1,78	○	-
Ketelmeer & Vossemeer	1,78	○	-
Polder Zeevang	1,37	○	-
Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving	1,05	○	-
Itterbecker Heide	0,92	○	-
Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'	0,82	○	-
Wyler Meer (Teilfläche des NSG Düffel)	0,81	○	-
Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef	0,66	○	-
Dornicksche Ward	0,62	○	-
IJsselmeer	0,61	●	✓
NSG Salmorth, nur Teilfläche	0,60	○	-
Ems	0,58	○	-
NSG Kranenburger Bruch	0,55	○	-
Reichswald	0,55	○	-
NSG Emmericher Ward	0,54	○	-
Dalum-Wietmarscher Moor und Georgsdorfer Moor	0,54	○	-

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Oude Maas	0,53	☐	-
Wisseler Dünen	0,49	☐	-
NSG Bienener Altrhein, Millinger u. Hurler Meer u. NSG Empeler M	0,49	☐	-
Hügelgräberheide Halle-Hesingen	0,48	☐	-
Esterfelder Moor bei Meppen	0,46	☐	-
Moorschlatts und Heiden in Wachendorf	0,45	☐	-
Hollands Diep	0,45	☐	-
Bentheimer Wald	0,45	☐	-
Lüntener Fischteich u. Ammeloer Venn	0,42	☐	-
Vogelschutzgebiet 'Moore und Heiden des westlichen Münsterlandes	0,42	☐	-
Klevsche Landwehr, Anholt. Issel, Feldschlaggr. u. Regnieter Bac	0,41	☐	-
NSG Grietherorter Altrhein	0,40	☐	-
Untere Haseniederung	0,40	☐	-
Stillgewässer bei Kluse	0,40	☐	-
Tillenberge	0,39	☐	-
NSG Kellener Altrhein, nur Teilfläche, mit Erweiterung	0,39	☐	-
'Brutbaeume' des Heldbock (Grosser Eichenbock) in Emmerich	0,38	☐	-
Schwattet Gatt	0,38	☐	-
Tinner Dose, Sprakeler Heide	0,38	☐	-
Engdener Wüste	0,38	☐	-

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hesepers Moor, Engdener Wüste	0,37	☐	-
Uedemer Hochwald	0,37	☐	-
Diersfordter Wald/ Schnepfenberg	0,37	☐	-
Kalflack	0,36	☐	-
NSG Hetter-Millinger Bruch, mit Erweiterung	0,36	☐	-
Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer	0,36	☐	-
Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Küstenmeer	0,36	☐	-
Zwillbrocker Venn u. Ellewicker Feld	0,36	☐	-
Berkel	0,35	☐	-
Witte Venn, Krosewicker Grenzwald	0,35	☐	-
Gildehauser Venn	0,35	☐	-
Emstal von Lathen bis Papenburg	0,35	☐	-
Schwarzes Wasser	0,34	☐	-
Amtsvenn u. Hündfelder Moor	0,33	☐	-
Grosses Veen	0,33	☐	-
Erlenwälder bei Gut Hovesaat	0,33	☐	-
NSG Sönsfeldsche Bruch, Hagener Meer und Düne, mit Erweiterung	0,33	☐	-
Eper-Graeser Venn/ Lasterfeld	0,32	☐	-
Graeser Venn - Gut Moorhof	0,32	☐	-
Fleuthkuhlen	0,32	☐	-

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Samerrott	0,31	☐	-
NSG Altrhein Reeser Eyland, met Erweiterung	0,31	☐	-
Kleingewässer Achterberg	0,31	☐	-
NSG Weseler Aue	0,31	☐	-
NSG Gut Grindt u. NSG Rheinaue zw. Km 830,7 - 833,2 , nur Teilfl.	0,31	☐	-
Wacholderheide Hörsteloe	0,31	☐	-
Rünenberger Venn	0,30	☐	-
NSG - Komplex In den Drevenacker Dünen, met Erweiterung	0,30	☐	-
NSG Lohwardt/Reckerfeld, Hübsche Grändort, nur Teilfl., mit Erw.	0,30	☐	-
NSG Rheinaue Bislich-Vahnum, nur Teilfläche	0,30	☐	-
Herrenholz und Schöppinger Berg	0,30	☐	-
Liesner Wald	0,29	☐	-
Vechte	0,29	☐	-
Syen-Venn	0,29	☐	-
Burlo-Vardingholter Venn und Entenschlatt	0,29	☐	-
NSG Reeser Schanz	0,29	☐	-
Kaninchenberge	0,29	☐	-
Feuchtwiese Ochtrup	0,29	☐	-
Ahlder Pool	0,28	☐	-
Kirchheller Heide und Hiesfelder Wald	0,28	☐	-

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Harskamp	0,28	☐	-
Berger Keienvenn	0,27	☐	-
Gutswald Stovern	0,27	☐	-
Wald bei Haus Burlo	0,27	☐	-
NSG Lippeaue bei Damm u. Bricht und NSG Loosenberge, nur Teilfl	0,27	☐	-
Dämmer Wald	0,26	☐	-
Gartroper Mühlenbach	0,26	☐	-
Krummhörn	0,26	☐	-
Schnippenpohl	0,26	☐	-
VSG Feuchtwiesen im nördlichen Münsterland	0,26	☐	-
Weiher am Syenvenn	0,26	☐	-
Fehntjer Tief und Umgebung	0,26	☐	-
Noordzeekustzone	0,25	☒	
Lichtenhagen	0,25	☐	-
Vogelschutzgebiet 'Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg	0,25	☐	-
Stollbach	0,25	☐	-
Krickenbecker Seen - Kl. De Witt-See	0,25	☐	-
Steinbach	0,25	☐	-
Stollen im Rothenberg bei Wettringen	0,25	☐	-
Alter Bierkeller bei Ochtrup	0,25	☐	-

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Emsmarsch von Leer bis Emden	0,25	☐	-
Unterems und Außenems	0,25	☐	-
Rheiderland	0,24	☐	-
Salzbrunnen am Rothenberg	0,24	☐	-
Üfter Mark	0,24	☐	-
Niederkamp	0,24	☐	-
NSG Bislicher Insel, nur Teilfläche	0,24	☐	-
Felsbachaue	0,24	☐	-
Bachsystem des Wienbaches	0,24	☐	-
Heidesee in der Kirchheller Heide	0,24	☐	-
NSG Rheinvorland im Orsoyer Rheinbogen, mit Erweiterung	0,24	☐	-
Haringvliet	0,24	☒	
NSG Droste Woy und NSG Westerheide	0,23	☐	-
Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigro	0,23	☐	-
VSG 'Heubachniederung, Lavesumer Bruch und Borkenberge'	0,23	☐	-
NSG Rheinaue Walsum	0,23	☐	-
Wälder und Heiden bei Brüggen-Bracht	0,23	☐	-
Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout	0,23	☐	-
Lippeaue	0,23	☐	-
Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout	0,23	☐	-

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Köllnischer Wald	0,22	☐	-
Sundern	0,22	☐	-
Staatsforst Rheurdt / Littard	0,22	☐	-
KORVERSKOOI	0,22	☒	
Lauwersmeer	0,22	☐	-
Fürstenkuhle im Weissen Venn	0,22	☐	-
NSG Rheinvorland bei Perrich	0,22	☐	-
Roruper Holz mit Kestenbusch	0,22	☐	-
Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariaho	0,22	☐	-
Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Waterin	0,22	☐	-
Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en h	0,21	☐	-
WeiBes Venn / Geisheide	0,21	☐	-
Elmpter Schwalmbruch	0,21	☐	-
Tantelbruch mit Elmpter Bachtal und Teilen der Schwalmaue	0,21	☐	-
Ronde Put	0,21	☐	-
Kranenmeer	0,21	☐	-
Spanjaards Duin	0,21	☒	
Voordelta	0,21	☒	
OUDE DIJK VAN WAAL EN BURG	0,20	☒	

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Lüsekamp und Boschbeek	0,20	☐	-
Abeek met aangrenzende moerasgebieden	0,20	☐	-
Helpensteiner Bachtal-Rothenbach	0,20	☐	-
Schwarzes Venn	0,20	☐	-
Großes Meer, Loppersumer Meer	0,20	☐	-
Ostfriesische Meere	0,20	☐	-
De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld	0,19	☐	-
Postwegmoore u. Rütterberg-Nord	0,19	☐	-
Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer	0,19	☐	-
De Kalmthouse Heide	0,19	☐	-
Meinweg mit Ritzroder Dünen	0,19	☐	-
Hangmoor Damerbruch	0,19	☐	-
Schaagbachtal	0,19	☐	-
Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen	0,19	☐	-
Kalmthoutse Heide	0,19	☐	-
Tote Rahm	0,19	☐	-
Klein en Groot Schietveld	0,18	☐	-
Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamander	0,18	☐	-
Wienbecker Mühle	0,18	☐	-
Schwalm, Knippertzbach, Raderveekes u. Lüttelforster Bruch	0,18	☐	-

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
NSG Rheinvorland nördl. der Ossenberger Schleuse, nur Teilfläche	0,18	☐	-
Ueberanger Mark	0,18	☐	-
Westermarsch	0,18	☐	-
Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor	0,18	☐	-
Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek	0,18	☐	-
Latumer Bruch mit Buersbach, Stadtgräben und Wasserwerk	0,18	☐	-
Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglab	0,17	☐	-
Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel	0,17	☐	-
Militair domein en vallei van de Zwarte Beek	0,17	☐	-
Nette bei Vinkrath	0,17	☐	-
Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven	0,17	☐	-
Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrod	0,16	☐	-
Schorren en Polders van de Beneden-Schelde	0,16	☐	-
Ilvericher Altrheinschlinge	0,16	☐	-
Egelsberg	0,16	☐	-
Grensmaas	0,16	☐	-
Mechelse Heide en vallei van de Ziepbeek	0,16	☐	-
De Mechelse Heide en de Vallei van de Ziepbeek	0,15	☐	-

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangbeek en Roosterbeek	0,15	☐	-
Wurmtal südlich Herzogenrath	0,15	☐	-
Bokrijk en omgeving	0,15	☐	-
De Maten	0,15	☐	-
Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat.	0,15	☐	-
Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer	0,15	☐	-
Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel	0,14	☐	-
Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent	0,14	☐	-
Die Spey	0,14	☐	-
Vijvercomplex van Midden Limburg	0,14	☐	-
Demervallei	0,14	☐	-
De Demervallei	0,14	☐	-
Teichfledermaus-Gewässer im Raum Aurich	0,14	☐	-
De Maten	0,13	☐	-
Teverener Heide	0,13	☐	-
Overgang Kempen-Haspengouw	0,13	☐	-
Kellenberg und Rur zwischen Flossdorf und Broich	0,13	☐	-
Schlangenbergr	0,13	☐	-
Osthertogenwald autour de Raeren (Raeren)	0,12	☐	-
Osthertogenwald autour de Raeren (Raeren)	0,12	☐	-

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw	0,12	☐	-
Wurmtal nördlich Herzogenrath	0,12	☐	-
Vallée de la Gueule en aval de Kelmis (Plombières; Welkenraedt)	0,12	☐	-
Lindenberger Wald	0,12	☐	-
Kuifeend en Blokkersdijk	0,12	☐	-
Münsterbachtal, Münsterbusch	0,11	☐	-
Brander Wald	0,11	☐	-
Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen.	0,11	☐	-
Jekervallei en bovenloop van de Demervallei	0,11	☐	-
Rur von Obermaubach bis Linnich	0,11	☐	-
De Zegge	0,11	☐	-
Durme en Middenloop van de Schelde	0,11	☐	-
Buchenwälder bei Zweifall	0,11	☐	-
Wehebachtäler und Leyberg	0,11	☐	-
Basse Meuse et Meuse mitoyenne (Oupeye; Visé)	0,11	☐	-
Voerstreek	0,11	☐	-
Basse Meuse et Meuse mitoyenne (Blégny; Oupeye; Visé)	0,11	☐	-
Vallée de la Gueule en amont de Kelmis (Kelmis; Lontzen; Raeren;	0,11	☐	-
Montagne Saint-Pierre (Bassenge; Oupeye; Visé)	0,10	☐	-
Steinbruchbereich Bernhardshammer und Binsfeldhammer	0,10	☐	-

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Indemündung	0,10	☐	-
Hammerberg	0,10	☐	-
Vallée de la Gueule en amont de Kelmis (Kelmis; Lontzen; Raeren)	0,10	☐	-
Yerseke en Kapelse Moer	0,10	☐	-
Basse vallée du Geer (Bassenge; Juprelle; Oupeye; Visé)	0,10	☐	-
Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten.	0,09	☐	-
Brockenberg	0,09	☐	-
Bärenstein	0,09	☐	-
Vallée du Ruisseau de Bolland (Blégny; Herve; Soumagne)	0,09	☐	-
Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek	0,09	☐	-
Vallée du Ruisseau de Bolland (Blégny; Herve; Soumagne)	0,08	☐	-
Polders	0,08	☐	-
Vallée de la Gueule en aval de Kelmis (Plombières)	0,08	☐	-
Veerse Meer	0,08	☒	
Krekengebied	0,08	☐	-
Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin.	0,08	☐	-
Werther Heide, Napoleonsweg	0,08	☐	-
Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist	0,07	☐	-
Canisvliet	0,07	☐	-
SBZ 3 / ZPS 3	0,07	☐	-

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Het Zwin	0,06	☐	-
Poldercomplex	0,06	☐	-
Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelijk	0,06	☐	-
Groote Gat	0,06	☐	-

☐ Geen overschrijding☒ Wel overschrijding

Depositie per
habitatype

Veluwerandmeren

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:76 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	13,50	●	-

Markermeer & IJmeer

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	5,50	○	-

Arkemheen

WATERLAND ALEN EN DRIEN

Zwarte Meer

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:74 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6510B)	1,78	○	-
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	1,24	○	-

Ketelmeer & Vossemeer

Polder Zeevang

Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	1,05	○	-
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,75	○	-

Itterbecker Heide

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1128 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,92	○	-

Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1198 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,82	○	-

Wyler Meer (Teilfläche des NSG Düffel)

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1180 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,81	○	-

Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1235 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,66	○	-

Dornicksche Ward

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1182 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,62		-

IJsselmeer

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:72 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7140A)	0,61		
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,50		-

NSG Salmorth, nur Teilfläche

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1181 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,60		-

Ems

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1117 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,58		-

NSG Kranenburger Bruch

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1193 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,55		-

Reichswald

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1194 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,55	○	-

NSG Emmericher Ward

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1183 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,54	○	-

Dalum-Wietmarscher Moor und Georgsdorfer Moor

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1129 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,54	○	-

Oude Maas

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H91EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutoibossen)	0,53	○	-

Wisseler Dünen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1195 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,49	○	-

NSG Bienener Altrhein, Millinger u. Hurler Meer u. NSG Empeler M

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1187 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,49	○	-

Hügelgräberheide Halle-Hesingen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1132 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,48	○	-

Esterfelder Moor bei Meppen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1127 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,46	○	-

Moorschlatts und Heiden in Wachendorf

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1130 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,45	○	-

Hollands Diep

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg1EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutoibossen)	0,45	○	-

Bentheimer Wald

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1137 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,45	○	-

Lüntener Fischteich u. Ammeloer Venn

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1153 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,42	○	-

Vogelschutzgebiet 'Moore und Heiden des westlichen Münsterlandes

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1157 Habitatype onbekend/onzekeer (buitenland)	0,42	○	-

Klevsche Landwehr, Anholt. Issel, Feldschlaggr. u. Regnieter Bac

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1188 Habitatype onbekend/onzekeer (buitenland)	0,41	○	-

NSG Grietherorter Altrhein

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1197 Habitatype onbekend/onzekeer (buitenland)	0,40	○	-

Untere Haseniederung

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1126 Habitatype onbekend/onzekeer (buitenland)	0,40	○	-

Stillgewässer bei Kluse

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1122 Habitatype onbekend/onzekeer (buitenland)	0,40	○	-

Tillenberge

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1134 Habitatype onbekend/onzekeer (buitenland)	0,39	○	-

NSG Kellener Altrhein, nur Teilfläche, mit Erweiterung

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1184 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,39	○	-

'Brutbaeume' des Heldbock (Grosser Eichenbock) in Emmerich

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1185 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,38	○	-

Schwattet Gatt

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1165 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,38	○	-

Tinner Dose, Sprakeler Heide

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1124 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,38	○	-

Engdener Wüste

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1135 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,38	○	-

Hesep Moor, Engdener Wüste

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1133 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,37	○	-

Uedemer Hochwald

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1218 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,37	○	-

Diersfordter Wald/ Schnepfenberg

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1205 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,37	○	-

Kalflack

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1196 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,36	○	-

NSG Hetter-Millinger Bruch, mit Erweiterung

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1186 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,36	○	-

Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1101 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,36	○	-

Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Küstenmeer

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1100 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,36	○	-

Zwillbrocker Venn u. Ellewicker Feld

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1164 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,36	○	-

Berkel

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1172 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,35	○	-

Witte Venn, Krosewicker Grenzwald

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1155 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,35	○	-

Gildehauser Venn

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1143 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,35	○	-

Emstal von Lathen bis Papenburg

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1118 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,35	○	-

Schwarzes Wasser

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1223 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,34	○	-

Amtsvenn u. Hündfelder Moor

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1154 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,33	○	-

Grosses Veen

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1204 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,33	○	-

Erlenwälder bei Gut Hovesaat

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1217 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,33	○	-

NSG Sonfeldsche Bruch, Hagener Meer und Düne, mit Erweiterung

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1202 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,33	○	-

Eper-Graeser Venn/ Lasterfeld

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1158 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,32	○	-

Graeser Venn - Gut Moorhof

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1156 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,32	○	-

Fleuthkuhlen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1233 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,32	○	-

Samerrott

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1141 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,31	○	-

NSG Altrhein Reeser Eyland, mit Erweiterung

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1201 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,31	○	-

Kleingewässer Achterberg

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1145 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,31	○	-

NSG Weseler Aue

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1221 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,31	○	-

NSG Gut Grindt u. NSG Rheinaue zw. Km 830,7 - 833,2 , nur Teilfl

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1203 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,31	○	-

Wacholderheide Hörsteloe

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1166 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,31	○	-

Rünenberger Venn

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1144 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,30	○	-

NSG - Komplex In den Drevenacker Dünen, mit Erweiterung

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1226 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,30	○	-

NSG Lohwardt/Reckerfeld, Hübsche Grändort, nur Teilfl., mit Erw.

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1200 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,30	○	-

NSG Rheinaue Bislich-Vahnum, nur Teilfläche

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1219 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,30	○	-

Herrenholz und Schöppinger Berg

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1168 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,30	○	-

Liesner Wald

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1167 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,29	○	-

Vechte

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1160 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,29	○	-

Syen-Venn

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1136 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,29	○	-

Burlo-Vardingholter Venn und Entenschlatt

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1171 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,29	○	-

NSG Reeser Schanz

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1199 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,29	○	-

Kaninchenberge

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1227 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,29	○	-

Feuchtwiese Ochtrup

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1149 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,29	○	-

Ahlder Pool

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1140 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,28	○	-

Kirchheller Heide und Hiesfelder Wald

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1239 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,28	○	-

Harskamp

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1146 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,28	○	-

Berger Keienvenn

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1139 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,27	○	-

Gutswald Stovern

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1142 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,27	○	-

Wald bei Haus Burlo

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1169 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,27	○	-

NSG Lippeaue bei Damm u. Bricht und NSG Loosenberge, nur Teilfl

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1225 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,27	○	-

Dämmer Wald

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1206 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,26	○	-

Gartroper Mühlenbach

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1228 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,26	○	-

Krummhörn

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1108 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,26	○	-

Schnippenpohl

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1148 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,26	○	-

VSG Feuchtwiesen im nördlichen Münsterland

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1163 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,26	○	-

Weiher am Syenvenn

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1138 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,26	○	-

Fehntjer Tief und Umgebung

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1112 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,26	○	-

Noordzeekustzone

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,25		
H9999:7 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2110, H2190B)	0,25		
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,25		
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,25		
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,25		
H2120 Witte duinen	0,25		
H2110 Embryonale duinen	0,25		
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,25		
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,25		
H2150 Duinheiden met struikhei	0,25		

Lichtenhagen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1207 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,25		-

Vogelschutzgebiet 'Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1247 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,25		-

Stollbach

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1229 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,25		-

Krickenbecker Seen - Kl. De Witt-See

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1246 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,25		-

Steinbach

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1231 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,25		-

Stollen im Rothenberg bei Wetringen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1150 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,25		-

Alter Bierkeller bei Ochtrup

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1159 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,25		-

Emsmarsch von Leer bis Emden

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1113 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,25		-

Unterems und Außenems

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1107 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,25		-

Rheiderland

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1115 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,24		-

Salzbrunnen am Rothenberg

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1147 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,24		-

Üfter Mark

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1208 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,24		-

Niederkamp

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1234 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,24		-

NSG Bislicher Insel, nur Teilfläche

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1220 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,24		-

Felsbachaue

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1174 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,24	○	-

Bachsystem des Wienbaches

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1211 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,24	○	-

Heidesee in der Kirchheller Heide

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1241 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,24	○	-

NSG Rheinvorland im Orsoyer Rheinbogen, mit Erweiterung

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1237 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,24	○	-

Haringvliet

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg1EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutoibossen)	0,24	○	✓
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,21	●	✓

NSG Droste Woy und NSG Westerheide

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1224 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,23	○	-

Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigro

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1008 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,23	○	-

VSG 'Heubachniederung, Lavesumer Bruch und Borkenberge'

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1191 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,23	○	-

NSG Rheinaue Walsum

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1238 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,23	○	-

Wälder und Heiden bei Brüggen-Bracht

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1255 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,23	○	-

Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1009 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,23	○	-

Lippeaue

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1214 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,23	○	-

Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1016 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,23	○	-

Köllnischer Wald

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1240 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,22	○	-

Sundern

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1176 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,22	○	-

Staatsforst Rheurdt / Littard

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1243 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,22	○	-

KORVERSKOOI

Lauwersmeer

Fürstenkuhle im Weissen Venn

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1173 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,22	○	-

NSG Rheinvorland bei Perrich

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1222 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,22	○	-

Roruper Holz mit Kestenbusch

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1175 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,22	○	-

Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariaho

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1040 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,22	○	-

Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Waterin

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1022 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,22	○	-

Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en h

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1010 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,21	○	-

Weißes Venn / Geisheide

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1190 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,21	○	-

Elmpter Schwalmbruch

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1254 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,21	○	-

Tantelbruch mit Elmpter Bachtal und Teilen der Schwalmaue

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1256 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,21	○	-

Ronde Put

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1017 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,21	○	-

Kranenmeer

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1209 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,21	○	-

Spanjaards Duin

Voordelta

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,21	☐	
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,16	☐	-
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,15	☐	-
H1320 Slijkgrasvelden	0,11	☐	-

OUDE DIJK VAN WAAL EN BURG

Lüsekamp und Boschbeek

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1258 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,20	☐	-

Abeek met aangrenzende moerasgebieden

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1023 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,20	☐	-

Helpensteiner Bachtal-Rothenbach

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1262 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,20	☐	-

Schwarzes Venn

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1189 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,20	○	-

Großes Meer, Loppersumer Meer

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1109 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,20	○	-

Ostfriesische Meere

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1110 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,19	○	-

De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1015 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,19	○	-

Postwegmoore u. Rütterberg-Nord

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1230 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,19	○	-

Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1036 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,19	○	-

De Kalmthouse Heide

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1013 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,19		-

Meinweg mit Ritzroder Dünen

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1259 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,19		-

Hangmoor Damerbruch

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1242 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,19		-

Schaagbachtal

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1261 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,19		-

Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1006 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,19		-

Kalmthoutse Heide

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1004 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,19		-

Tote Rahm

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1244 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,19	○	-

Klein en Groot Schietveld

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1005 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,18	○	-

Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamander

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1007 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,18	○	-

Wienbecker Mühle

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1210 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,18	○	-

Schwalm, Knippertzbach, Raderveekes u. Lüttelforster Bruch

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1260 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,18	○	-

NSG Rheinvorland nördl. der Ossenberger Schleuse, nur Teilfläche

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1236 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,18	○	-

Ueberanger Mark

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1252 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,18		-

Westermarsch

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1103 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,18		-

Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1011 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,18		-

Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1027 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,18		-

Latumer Bruch mit Buersbach, Stadtgräben und Wasserwerk

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1249 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,18		-

Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglab

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1032 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,17		-

Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1019 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,17	○	-

Militair domein en vallei van de Zwarte Beek

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1037 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,17	○	-

Nette bei Vinkrath

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1248 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,17	○	-

Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1024 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,17	○	-

Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrod

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1020 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,16	○	-

Schorren en Polders van de Beneden-Schelde

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1049 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,16	○	-

Iivericher Altrheinschlinge

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1257 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,16		-

Egelsberg

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1250 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,16		-

Grensmaas

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H91EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutoibossen)	0,16		-

Mechelse Heide en vallei van de Ziepbeek

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1025 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,16		-

De Mechelse Heide en de Vallei van de Ziepbeek

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1035 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,15		-

Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbee

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1021 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,15		-

Wurmtal südlich Herzogenrath

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1267 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,15	○	-

Bokrijk en omgeving

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1033 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,15	○	-

De Maten

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1018 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,15	○	-

Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat.

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1012 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,15	○	-

Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1039 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,15	○	-

Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1042 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,14	○	-

Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1043 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,14	○	-

Die Spey

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1251 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,14	○	-

Vijvercomplex van Midden Limburg

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1038 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,14	○	-

Demervallei

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1055 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,14	○	-

De Demervallei

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1041 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,14	○	-

Teichfledermaus-Gewässer im Raum Aurich

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1102 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,14	○	-

De Maten

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1034 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13	○	-

Teverener Heide

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1264 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13	○	-

Overgang Kempen-Haspengouw

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1031 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13	○	-

Kellenberg und Rur zwischen Flossdorf und Broich

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1265 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13	○	-

Schlangenberg

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1277 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13	○	-

Osthertogenwald autour de Raeren (Raeren)

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1090 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	○	-

Osthertogenwald autour de Raeren (Raeren)

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1091 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	○	-

Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1028 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	○	-

Wurmtal nördlich Herzogenrath

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1268 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	○	-

Vallée de la Gueule en aval de Kelmis (Plombières; Welkenraedt)

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1076 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	○	-

Lindenberger Wald

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1266 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	○	-

Kuifeend en Blokkersdijk

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1046 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	○	-

Münsterbachtal, Münsterbusch

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1276 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	○	-

Brander Wald

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1279 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	○	-

Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen.

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1054 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	○	-

Jekervallei en bovenloop van de Demervallei

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1030 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	○	-

Rur von Obermaubach bis Linnich

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1270 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	○	-

De Zegge

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1014 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	○	-

Durme en Middenloop van de Schelde

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1048 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	○	-

Buchenwälder bei Zweifall

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1282 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	○	-

Wehebachtäler und Leyberg

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1271 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	○	-

Basse Meuse et Meuse mitoyenne (Oupeye; Visé)

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1071 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	○	-

Voerstreek

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1029 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	○	-

Basse Meuse et Meuse mitoyenne (Blégny; Oupeye; Visé)

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1072 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	○	-

Vallée de la Gueule en amont de Kelmis (Kelmis; Lontzen; Raeren;

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1078 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11		-

Montagne Saint-Pierre (Bassenge; Oupeye; Visé)

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1070 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10		-

Steinbruchbereich Bernhardshammer und Binsfeldhammer

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1278 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10		-

Indemündung

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1269 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10		-

Hammerberg

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1275 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10		-

Vallée de la Gueule en amont de Kelmis (Kelmis; Lontzen; Raeren)

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1077 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10		-

Yerseke en Kapelse Moer

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,10		-
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,09		-

Basse vallée du Geer (Bassenge; Juprelle; Oupeye; Visé)

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1069 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10		-

Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten.

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1026 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09		-

Brockenberg

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1273 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09		-

Bärenstein

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1274 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09		-

Vallée du Ruisseau de Bolland (Blégny; Herve; Soumagne)

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1074 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09		-

Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1045 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09		-

Vallée du Ruisseau de Bolland (Blégny; Herve; Soumagne)

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1073 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08		-

Polders

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1058 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08		-

Vallée de la Gueule en aval de Kelmis (Plombières)

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1075 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08		-

Veerse Meer

Krekengebied

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1047 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08	○	-

Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin.

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1057 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08	○	-

Werther Heide, Napoleonsweg

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1272 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08	○	-

Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1062 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	○	-

Canisvliet

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,07	○	-

SBZ 3 / ZPS 3

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1098 Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	○	-

Het Zwin

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1061 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06		-

Poldercomplex

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1060 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06		-

Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelij

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1059 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06		-

Groote Gat

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,06		-

 Geen overschrijding Wel overschrijding

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in de Benelux. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2014.1_20150903_de05cf2bce

Database versie 2014.1_20150825_fb538daf31

Meer informatie over de gebruikte data, zie www.aerius.nl/methodiek

BIJLAGE III

Vergunde situatie agrarische bestemmingen plangebied

Volg nr.	Naam vergunninghouder	Straatnaam inrichting	Huisnr. inrichting	Postcode	Plaats	Datum beschikking	Soort beschikking	RAV- code	Diersoort (bij onbreken RAV- code)	Omschrijving stalsysteem	Dieraantal vergund	Dieraantal werkelijk
1	Maatschap Gebr. G.J. Grimme	Paradijsvogelweg	6	1349 CB	Almere	22-4-1994	art. 8.40 AMvB Akkerbouwbedrijven milieubeheer					
2	J,A. en E. Verschueren	Paradijsvogelweg	2-4	1349 CA	Almere	10-2-1992	Hinderwet		rundvee melk&kalf	Ammoniakemissie 1995: 968 kg/jaar	127 grootvee/52 jongvee/9 kalveren/	110
						28-4-2003	art. 8.19 melding			4 paardenboxen		
3	Gebr. Knoop Maatschap	Paradijsvogelweg	8	1349 CB	Almere	13-4-1994	art. 8.40 AMvB Akkerbouwbedrijven milieubeheer					
4	kC.G. Zwanenburg	Kluutweg	3	1349 RA	Almere	2-9-1994	art. 8.40 AMvB Akkerbouwbedrijven milieubeheer					
5	Maatschap D&WAC van Dogterom	Kluutweg	7	1349 RA	Almere	24-1-1992	Besluit melkrundveehouderij Hinderwet (<100 stuks)					
						10-5-2011	Besluit landbouw milieubeheer		165 melkvee, 130 jongvee, 2 stieren			
								A1.100.2	melkvee		90	
								A1.1.13.2	melkvee		75	
								A3	jongvee		130	
								A7	stieren		2	
6	P. Ferket	Kluutweg	5	1349 RA	Almere	03-101994	Besluit Akkerbouwbedrijven milieubeheer					
7	Modelvliegtuigsport Ver. Almere	Kluutweg	1	1349 RA	Almere	14-1-2002	Wm					
8	Maatschap Olieman	Kluutweg	6				zie mail laatste gegevens					
9	J.J. Tensen	Tureluurweg	56	1349 CZ	Almere	30-11-1994	Besluit Akkerbouwbedrijven milieubeheer					
10	Maatschap P.J. van den Hengel	Tureluurweg	55	1349 CX	Almere	6-4-1992	Besluit melkrundveehouderij Hinderwet (<100 stuks)					
						30-11-2011	Besluit landbouw milieubeheer		rundvee			
								A 1.13.2	melkvee weidegang		200	
								A3	jongvee		140	
11	P. Vermeij	Tureluurweg	58	1349 CA	Almere	31-7-1992	Hinderwet		melkvee	controle 2003: aantal < 100/vergunning vervallen en autom. Onder \besluit melkrundvee		
						18-11-2011	Besluit landbouw milieubeheer		melkvee, vr.jongvee en 4 stieren+aantal paarden en pony's			
								A 1.100.1	melkkoeien		91	
								A3	vr.jongvee < 2jaar		72	
								A7	fokstieren > 2 jaar		3	
12	L. van Schie	Paradijsvogelweg	12	1349 CB	Almere	25-1-1993	Hinderwet		melkvee		100	

Volg nr.	Naam vergunninghouder	Straatnaam inrichting	Huisnr. inrichting	Postcode	Plaats	Datum beschikking	Soort beschikking	RAV- code	Diersoort (bij ontbreken RAV- code)	Omschrijving stalsysteem	Dieraantal vergund	Dieraantal werkelijk
						15-9-2000	Besluit melkrundveehouderij Hinderwet (<100 stuks)					
13	Pimaniba BV	Paradijsvogelweg	53		Almere	29-6-2005	Besluit Detailhandel Ambacht Wm					
14	K.C. Willesens	Goudplevierweg	1	1349 CC	Almere	2-7-2001			akkerbouwbedrijf	landbouwschuur van 540 m2		
15		Goudplevierweg	5		Almere				melk- en vleeshouderij; 160 stuks			
						17-9-2003			paardenstal			

BIJLAGE IV

Memo voorstel planregels stikstof: "Stikstofregeling Chw bestemmingsplan Oosterwold"

Memo

Aan Dhr. P. Hartskeerl (Arcadis)

Van mr. drs. H. Witbreuk

Datum 14 december 2015

Inzake Stikstofregeling Chw bestemmingsplan Oosterwold

1. Inleiding

Ten behoeve van het bestemmingsplan “Chw bestemmingsplan Oosterwold” sturen wij u in het kader van de verplichte plantoets als bedoeld in artikel 19j Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw) een specifieke bestemmingsplanregeling, die enerzijds moet borgen dat de uitvoering van het bestemmingsplan niet zal leiden tot extra stikstofdepositie op de relevante stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden en anderzijds recht moet doen aan de ruimte ontwikkelingsmogelijkheden die het plan met zich brengt.

In dat kader zij opgemerkt dat als bestendige lijn in de jurisprudentie heeft te gelden dat in beginsel iedere toename van ammoniakdepositie binnen een overbelast Natura 2000-gebied significante effecten kan hebben. Daarbij is van belang dat het onderhavige plan voorziet aan een groot scala van planologische mogelijkheden. Om de plantoets als bedoeld in artikel 19j Nbw met succes te doorlopen, dient uitgesloten te worden dat het plan voorziet in een toename van stikstofdepositie op de relevante stikstofgevoelige habitats in omliggende Natura 2000-gebieden. Het plangebied van het Chw bestemmingsplan Oosterwold is op ruime afstand gelegen van kwalificerende stikstofgevoelige habitats in Natura 2000-gebieden. Zo ligt het Naardermeer op ca. 11,5 km en de Veluwe op ca. 15,5 km afstand van het plangebied. Weliswaar zijn er op kortere afstand eveneens Natura 2000-gebieden gelegen, evenwel bevinden zich in die Natura 2000-gebieden of geen stikstofgevoelige habitats, dan wel is de kritische depositiewaarde zeer ruim boven de achtergrondconcentratiewaarde gelegen (reden waarom die Natura 2000-gebieden ook niet zijn opgenomen in het PAS). Desalniettemin zal, gelet op de zeer ruime ontwikkelingsmogelijkheden van het plan, op de Veluwe maximaal 10,3 mol N/ha/jaar kunnen neerslaan, zo volgt uit de aan mij toegezonden stikstofberekeningen. Reden om in het plan de mogelijkheden voor wat betreft de uitstoot van stikstof te beperken. Daarbij is de wens, ter voorkoming dat het plan niet volledig de ontwikkelingen op slot zet (hetgeen zich niet verdraagt met het ontwikkelingsgerichte karakter van het plan), om aan te sluiten bij de depositieruimte zoals opgenomen in het PAS voor de onderscheiden Natura 2000-gebieden. De depositieruimte voor grenswaarden maakt (juist gelet op de afstand tot de Natura 2000-gebieden) reeds de nodige ontwikkelingen mogelijk.

Expliciet zij opgemerkt dat het bestemmingsplan een Chw-bestemmingsplan betreft. Aan een dergelijk bestemmingsplan als bedoeld in artikel 19db Nbw kan in beginsel ook ontwikkelingsruimte uit het PAS worden toebedeeld (zie artikel 19km Nbw). Dit betreft ruimte uit het PAS dat is gereserveerd voor segment 1 en segment 2 projecten. Nader onderzoek is noodzakelijk om te beoordelen in hoeverre in het onderhavige bestemmingsplan in de planregels reeds geanticipeerd zou kunnen worden op deze ruimte. In de onderhavige regeling is daar niet op geanticipeerd; uitsluitend wordt gebruik gemaakt van de depositieruimte voor grenswaarden die kan fluctueren tussen de 0,05 en 1 mol depositie N/ha/jaar gedurende de looptijd van het plan. Weliswaar is de segment 2-pot voor ontwikkelingen op de Veluwe thans

leeg. In het PAS is voor diverse prioritaire (segment 1) projecten ontwikkelingsruimte gereserveerd.

Als prioritair project is voor Flevoland onder meer opgenomen (Staatscourant 14 december 2015, nr. 44851):

- *Landbouw in Flevoland zone 0–5km; Autonome ontwikkeling van de veehouderijen in Flevoland; Provincie Flevoland;*
- *Landbouw in Flevoland zone 5–10 km; Autonome ontwikkeling van de veehouderijen in Flevoland; Provincie Flevoland;*
- *Landbouw in Flevoland zone 10–99 km; Autonome ontwikkeling van de veehouderijen in Flevoland; Provincie Flevoland.”*

In paragraaf 2 vindt u een voorstel van een planregeling met stikstofplafond. Ondanks het stikstofplafond, biedt de planregeling ruimte voor de nog niet benutte gebruiks- en bouw mogelijkheden waar reeds een artikel 19d Nbw-vergunning voor is verleend en die (ten tijde van de vaststelling van het plan) onherroepelijk is (zal zijn). Die zijn als planologisch toegestaan aangemerkt. Voorts is in deze regeling aansluiting gezocht bij de (in beginsel; deze kan fluctueren) 1 mol N/ha/jaar depositie-ondergrens zoals die voor projecten is gaan gelden na inwerkingtreding van het PAS (en de daarbij behorende wet- en regelgeving), zodat het bestemmingsplan die ontwikkelingsmogelijkheden ook toestaat (in zoverre is er geen sprake van een emissieplafond, maar van een depositieplafond. In paragraaf 3 is een tekstvoorstel gegeven om eventueel in een plantoelichting op te nemen, waarin ook nader in wordt gegaan op de regeling. Een nadere toelichting van de planregeling wordt gegeven in paragraaf 4 van dit memo.

Opgemerkt zij dat thans op onderdelen van de planregeling geen juridische zekerheid kan worden geboden (gezien de stand van zaken in de regelgeving en de jurisprudentie). Daardoor is de als tekstsuggestie voorgestelde planregeling zodanig geredigeerd dat onderdelen daarvan in een eventuele beroepsprocedure kunnen worden “geschrapt” zonder dat daarbij de overige planregels- en delen worden geraakt.

2. Voorstel planregeling stikstofemissieplafond

Onder wijziging van het bestaande artikel 15 in artikel 15.1, stellen wij voor om het volgende artikel toe te voegen:

“15.2 Strijdig gebruik:

Tot een met de bestemming strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt verstaan het gebruiken of het laten gebruiken van:

(...)

15.2.1 gronden en bouwwerken niet behorende tot een inrichting waarbij een toename van stikstofemissie plaatsvindt vanuit de betreffende gronden of bouwwerken.”

15.2.2 gronden en bouwwerken behorende tot een inrichting, waarbij een toename van stikstofemissie plaatsvindt vanuit de betreffende inrichting.

15.2.3 Tot het strijdige gebruik als bedoeld in 15.2.1 en 15.2.2 wordt niet gerekend het nog niet gerealiseerde gebruik conform een ten tijde van de vaststelling van het plan verleende en onherroepelijke vergunning als bedoeld in artikel 19d Natuurbeschermingswet 1998.

15.3 Afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden

Bij het toepassen van een afwijkings- of wijzigingsbevoegdheid op basis van dit plan, is artikel 15.2 van overeenkomstige toepassing en is artikel 15.2 op het betreffende gebruik onverminderd van kracht.”

Toevoeging 1.61 begrip “toename van stikstofemissie”

De volgende definitiebepaling kan aan artikel 1 worden toegevoegd (onder wijziging van de huidige artikelen 1.61 t/m 1.68 naar 1.62 t/m 1.69):

“1.61 toename van stikstofemissie

- 1. Er is sprake van een toename van stikstofemissie als bedoeld in artikel 15.2.1 wanneer de emissie N/ha/jaar meer bedraagt dan:
- de emissie N/ha/jaar afkomstig van het ten tijde van de vaststelling van het plan aanwezige gebruik van de betreffende gronden en opstallen.*
- 2. Er is sprake van een toename van stikstofemissie als bedoeld in artikel 15.2.2 wanneer de emissie N/ha/jaar meer bedraagt dan:
- de emissie N/ha/jaar afkomstig van het ten tijde van de vaststelling van het plan aanwezige gebruik van de betreffende gronden en opstallen behorend tot de inrichting.*
- 3. Als uitzondering op lid 1 en lid 2 van dit artikel geldt het volgende. Er is geen sprake van een toename van stikstofemissie wanneer:
- het gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in lid 1 of het gebruik van gronden en bouwwerken behorend tot de inrichting als bedoeld in lid 2 een stikstofdepositie veroorzaakt op voor stikstof gevoelige habitats in een Natura 2000-gebied die afzonderlijk en, ingeval het project of de handeling betrekking heeft op een inrichting als bedoeld in artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer, in cumulatie met andere projecten of handelingen met betrekking tot dezelfde inrichting in de periode waarvoor het programma aanpak stikstof geldt, niet de van toepassing zijnde waarde(n) als bedoeld in artikel 2 leden 1 en 3 Besluit grenswaarden aanpak stikstofdepositie overschrijdt.*
- 4. Onder ‘programma aanpak stikstof’ als bedoeld in lid 3 van dit artikel wordt verstaan het programma als bedoeld in artikel 19kg, eerste lid van de Natuurbeschermingswet 1998.”*

3. Tekstvoorstel voor de toelichting in het bestemmingsplan

“Stikstofemissie/plantoets artikel 19j Natuurbeschermingswet 1998

Het bestemmingsplan maakt diverse ontwikkelingen ten opzichte van de feitelijk bestaande situatie mogelijk. Evenwel geldt bij deze gebruiksmogelijkheden dat de ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan bestaande stikstofemissie niet mag toenemen (hetgeen verankerd is in artikel 15.2.

De reden daarvoor is gelegen in het feit dat een toename van stikstofemissie kan leiden tot een toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden. Door die toename zijn significante effecten op voor stikstofgevoelige habitattypen en -soorten niet zonder meer uit te sluiten vanwege de veelal hoge achtergronddepositie binnen Natura 2000-gebieden. Om het bestemmingsplan in overeenstemming met artikel 19j Natuurbeschermingswet te kunnen vaststellen is daarom gekozen voor het opnemen van een stikstofemissieplafond in de gebruiksregels. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een dergelijke aanpak nadrukkelijk geaccordeerd in onder meer ABRS 6 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1411 (bestemmingsplannen “Delfzijl – Buitengebied Zuid” en “Delfzijl – Buitengebied Noord”). Door deze gebruiksregel is op bedrijfsniveau voor de inrichtingen en ook anderszins verzekerd dat een wijziging of uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden niet zal leiden tot een mogelijk significant effect op enig Natura 2000-gebied vanwege stikstofdepositie.

Uitgangspunt van de stikstofemissieplafondregeling is dat er geen sprake mag zijn van een toename van stikstofemissie ten opzichte van de ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan feitelijk bestaande situatie. Laatstgenoemde situatie is blijkens de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak in beginsel de referentiesituatie in het kader van de habitattoets zoals vereist in artikel 19j Natuurbeschermingswet 1998. Uitzondering daarop lijkt gerechtvaardigd voor zover voor een bepaald gebruik ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan reeds een onherroepelijke vergunning op grond van artikel 19d Natuurbeschermingswet 1998 is verleend. Uit de uitspraak ABRS 15 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1161 (bestemmingsplan “[locatie 1] Leende”) kan worden afgeleid dat de voor het (stikstofemitterende) gebruik opgestelde passende beoordeling tevens kan dienen als onderbouwing van het bestemmingsplan waarin dat gebruik wordt mogelijk gemaakt. Om die reden is de stikstofemissieplafondregeling niet van toepassing op nog niet gerealiseerd gebruik conform een ten tijde van de vaststelling van het plan verleende en onherroepelijke vergunning als bedoeld in artikel 19d Natuurbeschermingswet 1998. Daarbij is relevant dat niet is gebleken van nieuwe elementen die niet bij de eerder gemaakte passende beoordeling zijn betrokken.

In artikel 1.61 lid 3 van de planregels is een koppeling aangebracht met het Programma Aanpak Stikstof (PAS), Staatscourant 2015, 18411, en de daarmee samenhangende regelgeving (onder meer de Wet van 8 oktober 2014, houdende wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof), Staatsblad 2014, 419 en het Besluit grenswaarden programmatische aanpak stikstof Staatsblad 2015, 227). Het PAS maakt stikstofdepositieruimte beschikbaar voor projecten, andere handelingen en overige ontwikkelingen die stikstofdepositie veroorzaken. De depositieruimte bestaat uit twee delen. Een deel van deze algemene depositieruimte is beschikbaar voor projecten en andere handelingen die slechts een geringe stikstofdepositie veroorzaken op Natura 2000-gebieden. Het betreft de “depositieruimte voor grenswaarden”. De Natuurbeschermingswet 1998 voorziet erin dat wanneer onder deze grenswaarden wordt gebleven er geen vergunningplicht ex artikel 19d Natuurbeschermingswet 1998 geldt voor een project of andere handeling (hooguit geldt onder omstandigheden daarvoor een (niet appellabele meldingsplicht). De grenswaarden zijn zodanig vastgesteld dat op voorhand op grond van objectieve gegevens kan worden uitgesloten dat projecten of andere handelingen die onder deze grenswaarden blijven afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten de natuurlijke kenmerken van een Natura 2000-gebied niet zullen

aantasten. Bij deze regeling is met dit bestemmingsplan aangesloten. In overeenstemming met artikel 19kh lid 8 Natuurbeschermingswet 1998 juncto art. 2 leden 1 en 3 Besluit grenswaarden aanpak stikstofdepositie volgt uit artikel 1.61 lid 3 van de planregels dat van een toename van stikstofemissie geen sprake is voor zover het gebruik niet leidt tot een toename van de depositie van 1 mol dan wel 0,05 mol N/ha/jr of meer (de hoogte van de grenswaarde is afhankelijk van de beschikbare depositieruimte in het PAS).

Wanneer voor een ontwikkeling een omgevingsvergunning bouwen wordt aangevraagd, zal uit de aanvraag moeten blijken dat het beoogde gebruik van het bouwwerk niet in strijd komt met de stikstofemissieplafondregeling. Daarbij is van belang dat voor inrichtingen de stikstoftoename berekend wordt op inrichtingsniveau (zodat interne saldering is toegestaan).

Voor in rechte onaantastbaar geworden omgevingsvergunningen voor het bouwen (kan ook een voormalige bouwvergunning zijn waarvan het bouwwerk nog niet is verwezenlijkt), zal de stikstofemissieplafondgebruiksregel overigens geen effect hebben voor zover in de omgevingsvergunning (dan wel de bijbehorende aanvraag) het beoogde gebruik van het bouwwerk uitdrukkelijk is aangeduid en overeenkomstig dat gebruik wordt gehandeld."

4 Opmerkingen ter onderbouwing van de planregeling en de –toelichting (te gebruiken ten behoeve van politieke beraadslagingen, de zienswijzenfase en/of de beroepsfase alsmede in het kader van de uitvoering van het bestemmingsplan)

- 1 Bij het formuleren van de stikstofemissieregeling is zoveel mogelijk aangesloten bij de formulering zoals gebezigd in de bestemmingsplannen waarop de uitspraak ABRS 6 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1411 (bestemmingsplannen “Delfzijl – Buitengebied Zuid” en “Delfzijl – Buitengebied Noord”) ziet. Nu het onderhavige bestemmingsplan voorziet in een groot scala aan planologische (gebruiks)mogelijkheden is gekozen om deze regeling in een algemeen gebruiksverbod te vervatten. Immers, niet alleen veehouderijen, maar ook wegen, woningbouw, recreatie etc, kan leiden tot een toename van stikstof ten opzichte van de feitelijk bestaande situatie.
- 2 Thans is gekozen om in lijn met de uitspraak ABRS 6 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1411 (bestemmingsplannen “Delfzijl – Buitengebied Zuid” en “Delfzijl – Buitengebied Noord”) voor een stikstofemissieplafond in de vorm van een algemeen gebruiksverbod te kiezen.

Een andere optie is (maar die is ons inziens op enkele onderdelen juridisch risicovoller) om een stikstofemissieplafond op te nemen in de bouwregels. De Afdeling accordeert een dergelijke planregeling in ABRS 29 oktober 2014, nr. 201307656/1/R4 en meer recent (en onder een uitgebreide motivering) in ABRS 28 augustus 2015, nr. 201308141/1/R3 (zie met name r.o. 55.7 en 55.8 en de door de Afdeling getroffen voorlopige voorzieningen in het dictum van die uitspraak). Het voordeel van een emissieplafond op te nemen in de bouwregels/afwijgingsregels zit hem met name in de handhavingssfeer. Uitsluitend bij het aanvragen van een daartoe strekkende omgevingsvergunning vindt er een toetsing plaats.

Door het opnemen ervan in de gebruiksregels in plaats van de bouwregels kan echter verweer worden gevoerd tegen een grief inhoudende dat het plan voorziet in de mogelijkheid om bijvoorbeeld in bestaande stallen het aantal dieren te vergroten (een dergelijke grief was in vorenbedoelde uitspraken niet aan de orde). Voorts kan eenvoudiger verweer worden gevoerd tegen een grief inhoudende dat het plan voorziet in de mogelijkheid om (scharrel)dieren buiten de stallen te houden onder gebruik making van bijvoorbeeld een bestaande stal. Verweer tegen dergelijke grieven is niet goed te voeren, wanneer gekozen wordt voor een emissieplafond in de bouwregeling, nu voor dergelijke wijzigingen het niet altijd noodzakelijk is om een omgevingsvergunning (voor het bouwen) aan te vragen.

Wel hebben wij onlangs een stikstofemissieplafondregeling gekoppeld aan de bouwregels uit een bestemmingsplan buitengebied bij de Afdeling mogen verdedigen. In die procedure werden voornoemde grieven expliciet aangevoerd door enkele appellanten (milieuverenigingen). De zitting bij de Afdeling verliep positief en wij kunnen ons voorstellen dat in de uitspraak dit aspect terugkomt. Wanneer de uitspraak wordt gewezen zullen wij die aan u toezenden. Mocht u een regeling wensen om op te nemen in de bouwregels en ontheffingsregels, dan verzoek ik u mij dit te berichten. Wij kunnen daartoe een tekstsuggestie verwoorden.

- 3 Er is een uitzondering op het stikstofemissieplafond gemaakt in situaties waarin voor een bepaald nog niet gestart gebruik reeds een Nbw 1998-vergunning is verleend en die vergunning ten tijde van het vaststellen van het bestemmingsplan onherroepelijk was. In de toelichting is dat gemotiveerd door te wijzen op de uitspraak ABRS 15 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1161 (bestemmingsplan “[locatie 1] Leende”; zie onze [noot](#)

hierbij op onze website www.soppegw.nl onder het tabblad publicaties. Of de uitzondering het in rechte gaat halen (mocht die worden aangevochten) is niet zeker. Veel meer zekerheid kan worden verkregen als voor alle Nbw 1998-vergunningen die nog niet volledig waren “gerealiseerd” op tijdstip vaststellen bestemmingsplan, kan worden aangetoond dat er geen nieuwe elementen zijn die niet bij de voor de Nbw 1998-vergunningen opgestelde passende beoordelingen zijn betrokken. Dat is arbeidsintensief. Als dat niet wordt gedaan, zou de Afdeling er desnoods een streep door kunnen zetten. Dat betekent niet dat alsdan de Nbw 1998-vergunningen geen betekenis meer hebben. Wel zal dan moeten worden afgeweken van het bestemmingsplan via een projectafwijakingsbesluit dan wel zal er een partiële bestemmingsplanherziening nodig zijn. In die kaders kan dan wederom aansluiting worden gezocht bij de uitspraak van 15 april 2015 en behoeft in beginsel geen nieuwe passende beoordeling en een plan-MER (voor zover er wordt gekozen voor een partiële bestemmingsplanherziening) te worden gemaakt als niet is gebleken van nieuwe elementen die niet bij de eerder gemaakte passende beoordeling zijn betrokken.

Belangrijk aandachtspunt is nog het volgende. Wanneer in het gebied voor vaststelling van het bestemmingsplan überhaupt geen artikel 19d Nbw-vergunning voor ontwikkelingen verleend zijn die nog niet zijn gerealiseerd, biedt deze uitzondering geen meerwaarde en kan deze worden geschrapt (die is dan immers sowieso niet van toepassing). In dat geval dient de toelichting ook te worden aangepast.

- 4 Om toch bij recht extra stikstofemitterende activiteiten mogelijk te maken, is aangesloten bij de in het PAS gereserveerde depositieruimte voor projecten en andere handelingen die beneden de grenswaarde blijven als bedoeld in artikel 19kh lid 8 Nbw 1998 (zoals die sinds 1 juli jl. luidt). Deze grenswaarde wordt zodanig vastgesteld dat op voorhand op grond van objectieve gegevens kan worden uitgesloten dat projecten of andere handelingen die onder deze grenswaarde blijven afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten de natuurlijke kenmerken van een Natura 2000-gebied zullen aantasten (zie artikel 19kh lid 8 aanhef en sub 2 Nbw 1998). Uit artikel 2 lid 1 van het Besluit grenswaarden programmatische aanpak stikstof volgt dat de drempelwaarde in beginsel 1 mol N/ha/jaar depositie op de desbetreffende habitattypen bedraagt. Als de in het PAS gereserveerde ontwikkelingsruimte voor activiteiten en andere handelingen zodanig is benut dat er 5% of minder resteert, dan zakt de drempelwaarde naar 0,05 mol N/ha/jr (artikel 2 lid 3 Besluit grenswaarden programmatische aanpak stikstof). Wanneer een project of andere handeling minder dan 0,05 mol N/ha/jr deponeert op een gevoelig habitatype, kan gebruik worden gemaakt van artikel 19kh lid 7 Nbw 1998 (hetgeen inhoudt dat geen artikel 19d Nbw 1998-vergunning nodig is). Een melding aan het bevoegd gezag is dan niet nodig. Bedraagt de toename meer dan 0,05 maar minder dan 1 mol N/ha/jr, dan kan eveneens gebruik worden gemaakt van artikel 19kh lid 7 Nbw 1998, maar geldt er wel een meldingsplicht (in de regel moet de melding worden gedaan aan gedeputeerde staten) die kan worden gedaan met gebruikmaking van AERIUS Calculator. Het meldingsinstrument heeft enkel tot doel om bij te houden hoeveel ontwikkelingsruimte in het PAS (voor de grenswaardegevallen) nog beschikbaar is. De grenswaarderegeling ziet niet (mede) op bestemmingsplannen. Artikel 19kh lid 7 Nbw 1998 geeft aan dat artikel 19d Nbw 1998 in voorkomende gevallen niet van toepassing is, maar niet dat artikel 19j Nbw 1998 in die gevallen evenzeer buiten toepassing blijft. Desalniettemin wordt in de voorgestelde planregels (via het voorgestelde artikel 1.61 lid 3 van de planregels) aangesloten bij de grenswaarderegeling. Daarmee wordt beoogd om gebruik waarvoor op grond van artikel 19kh lid 7 Nbw 1998 geen Nbw 1998-vergunningplicht geldt, planologisch toe te staan.

Er is vooralsnog geen zekerheid te geven omtrent de juridische houdbaarheid van de hier bedoelde planregel. Indien de Afdeling bestuursrechtspraak over de constructie krijgt te oordelen, zal met name de vraag aan de orde komen of de “koppeling” met de drempelwaarderegeling leidt tot een ontoelaatbare delegatie dan wel tot een doorkruising van de in de Nbw 1998 opgenomen bevoegdheden. Wij merken op dat de grenswaarderegeling geen inhoudelijke ecologische beoordeling vergt. Activiteiten die minder dan 1 dan wel 0,05 mol N/ha/jr deposeren op enig overbelast habitattypen, behoeven in het geheel niet ecologisch te worden beoordeeld in het Nbw 1998-spoor. Van een ontoelaatbare delegatie op doorkruising lijkt ons om die reden geen sprake. Bovendien volgt uit Vz ABRS 6 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3491 dat de meldingsbevestiging niet een besluit betreft dat op rechtsgevolg is gericht, waartegen dan ook geen bezwaar en beroep bij de bestuursrechter open staat. Verder is gegarandeerd dat er stikstofdepositieruimte is. Die is immers gereserveerd in het PAS. Mocht de Afdeling bestuursrechtspraak de aangebrachte koppeling ontoelaatbaar vinden, dan kan het artikel 1.61 lid 3 van de planregels worden vernietigd zonder de rest van het de stikstofemissieplafondregeling “mee te nemen”.

- 5 Anders dan in de Delfzijl-uitspraak (ABRS 6 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1411 (bestemmingsplannen “Delfzijl – Buitengebied Zuid” en “Delfzijl – Buitengebied Noord”)) is gekozen voor een stikstofemissieplafond en niet voor een stikstofdepositieplafond. Op het moment dat er geen stikstofemissietoename is, zal er ook nergens binnen enig Natura 2000-gebied sprake kunnen zijn van een toename van stikstofdepositie. Het opnemen van een emissieplafond is door de Afdeling dan evenzeer toegestaan (zie ABRS 29 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3866 (bestemmingsplan “Buitengebied Tynaarlo”).
- 6 Uit ABRS 6 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1411 (bestemmingsplannen “Delfzijl – Buitengebied Zuid” en “Delfzijl – Buitengebied Noord”) lijkt te volgen dat bij de aanvraag om een omgevingsvergunning voor bouwen ten behoeve van een dierenhouderij, door de aanvrager zal moeten worden aangetoond dat het gebruik van het aangebouwde bouwwerk niet zal leiden tot een toename van de stikstofemissie in vergelijking met de feitelijk bestaande (legale) situatie. Een andere optie is om aan de te verlenen omgevingsvergunning voor het bouwen een voorschrift te verbinden “dat bewerkstelligt dat de toename van stikstofdepositie wordt voorkomen”. In de voorgestelde toelichting is dat laatste niet vermeld.
- 7 Als er sprake is van een (al dan niet voor vaststelling van het onderhavige plan) in rechte onaantastbaar geworden omgevingsvergunning voor het bouwen (kan ook een voormalige bouwvergunning zijn), dan zal de stikstofemissieplafondgebruiksregel niet kunnen worden tegen geworpen aan de vergunninghouder ook al is het gebruik van het bouwwerk strijdig met de gebruiksregel. Voorwaarde daarbij is nadrukkelijk dat in de omgevingsvergunning voor het bouwen (waaronder begrepen de bijbehorende aanvraag) het beoogde gebruik van het bouwwerk uitdrukkelijk wordt aangeduid en overeenkomstig dat gebruik wordt gehandeld. Zie ook in dat verband ABRS 6 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1411 (bestemmingsplannen “Delfzijl – Buitengebied Zuid” en “Delfzijl – Buitengebied Noord”).

Als uit de (aanvraag om een) dergelijke omgevingsvergunning voor bouwen niet blijkt wat het beoogde gebruik is en of dat gebruik al dan niet in overeenstemming is met een gebruiksregel, maar het gebouwde niettemin zodanig wordt gebruikt dat de gebruiksregel wordt overtreden, dan zal het bevoegd gezag daartegen, ondanks de verleende vergunning, handhavend kunnen (en in beginsel moeten) optreden.

De vorenstaande lijn wijkt deels af van de lijn die de Afdeling eerder uiteenzette in ABRS 6 augustus 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2942 (bestemmingsplan “Buitengebied Westerveld”). De Afdeling merkt dat in haar uitspraak van 6 mei 2015 ook nadrukkelijk op. De reden voor de gedeeltelijke koerswijziging is gelegen in de vaste rechtspraak van de Afdeling waaruit volgt dat een verleende omgevingsvergunning voor het bouwen een titel oplevert het vergunde bouwwerk te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor deze is opgericht.

In de planregels hoeft geen expliciete verwijzing te worden opgenomen naar eerder verleende omgevingsvergunningen voor bouwen.

- 8 Door het opnemen van een stikstofemissieplafond is het opstellen van een passende beoordeling en een plan-MER op grondslag van art. 7.2a lid 1 Wm voor wat betreft stikstof niet nodig. Dat impliceert overigens niet dat er geen grondslag is om een plan-MER te moeten opstellen. Die plicht bestaat onverkort indien het bestemmingsplan kaderstellend is voor bijvoorbeeld de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren waarbij de drempel(s) kunnen worden overschreden (zie de onderdelen C-14 en met name D-14 van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage), dan wel vanwege overige mogelijke effecten op de Natura 2000-gebieden (anders dan stikstof).
- 9 Het opnemen van een stikstofemissieplafond kan een beperking opleveren van de gebruiksmogelijkheden zoals die onder het huidige planologische regime bestaan. Eventuele gedupeerden zouden wellicht een verzoek om planschade kunnen indienen. Of dergelijke verzoeken moeten worden ingewilligd, is niet met zekerheid te zeggen. Concrete jurisprudentie hieromtrent ontbreekt.