

Ecologische inventarisatie Oosterwoldseweg 72 te Oldeberkoop

Inleiding

Om de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Buitengebied, plan van wijziging Oosterwoldseweg 72 te Oldeberkoop te toetsen, is een ecologische inventarisatie uitgevoerd. Tevens is gekeken naar de effecten op beschermde gebieden in de omgeving. Het doel hiervan is om na te gaan of een vooronderzoek in het kader van de Flora- en faunawet en/of een oriënterend onderzoek in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 of het Streekplan Fryslân 2007 (Verordening Romte Fryslân) noodzakelijk is. Het plangebied is daartoe op 3 mei 2012 bezocht door een ecooloog van BügelHajema Adviseurs.

Het plangebied ligt in een coulisselandschap met houtwallen, houtsingels en kleine bosjes. Langs de Oosterwoldseweg staan zomereiken en beuken. Het plangebied zelf bestaat grotendeels uit akkerland. Ten westen van het plangebied ligt een loofbosje.

Ten tijde van het veldbezoek was de grond recent bewerkt (geploegd en geëgaliseerd).



Aanzicht plangebied vanuit het zuiden

Soortenbescherming

Flora en faunawet

Met ingang van 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Het soortenbeleid uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn van de Europese Unie is hiermee in de nationale wetgeving verwerkt.

Achter de Flora- en faunawet staat het idee van de zorgplicht voor in het wild levende beschermde dieren en planten en hun leefomgeving. Beschermde soorten worden opgesomd in de 'lijsten beschermde inheemse planten- en diersoorten'. De Algemene Maatregel van Bestuur ex artikel 75 van de Flora- en faunawet van 23 februari 2005, kent een driedeling voor het beschermingsniveau van planten- en diersoorten, namelijk: licht beschermd,

middelzwaar beschermd en streng beschermd. De inheemse vogelsoorten hebben een eigen afwijkend beschermingsregime; ze vallen zowel onder het middelzware als strenge beschermingsregime.



Aanzicht plangebied vanuit het noorden

Inventarisatie

Binnen het plangebied zijn geen (resten van) wilde beschermde vaatplanten aangetroffen en deze worden gezien de terreinomstandigheden hier ook niet verwacht.

Tijdens het veldbezoek werden op het betreffende agrarische perceel, maar buiten het plangebied, een paartje scholekster en kievit aangetroffen. In het aangrenzende loofbosje werden verschillende vogelsoorten (o.a. geelgors, kneu, tuinfluiter en zwartkop) waargenomen. Naast verschillende zangvogels, zullen hier mogelijk ook roofvogels (nesten van verschillende roofvogelsoorten zijn jaarrond beschermd) tot broeden komen.

In de recent bewerkte grond werden binnen het plangebied op verschillende plaatsen snuitputjes, mestputjes en prenten van das aangetroffen. Het plangebied zal een onderdeel vormen van het foerageergebied van das. Ook werd een wissel vanuit het plangebied over de Oosterwoldseweg en richting het aangrenzende loofbosje aangetroffen. In het aangrenzende loofbosje was een dassenburcht aanwezig met verse graafsporen. Het plangebied heeft voor de betreffende dassen naast een voedselfunctie, dan ook tevens een belangrijke corridorfunctie.

In één van de binnen het plangebied staande dikke bomen is een oude nestholte van grote bonte specht aanwezig. Rond de invliegopening is een vettige aanslag aanwezig. De kans is groot dat deze holte als verblijfplaats door vleermuizen wordt gebruikt. Vleermuizen gebruiken regelmatig oude spechtenholten. Mogelijk vormen de bomen langs de Oosterwoldseweg en de randen van het loofbosje belangrijke foerageerroutes voor vleermuizen.

Gebiedsbescherming

Natuurbeschermingswet 1989

Op 1 oktober 2005 is de Natuurbeschermingswet 1989 van kracht geworden. Deze wet bundelt de gebiedsbescherming van nationaal begrensde

natuurgebieden. In de Natuurbeschermingswet zijn ook de bepalingen vanuit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verwerkt.

Onder de Natuurbeschermingswet zijn drie typen gebieden aangewezen en beschermd: Natura 2000-gebieden, Beschermde natuurmonumenten en Wetlands.

Ecologische Hoofdstructuur

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland en vormt de basis voor het natuurbeleid. De EHS is als beleidsdoel opgenomen in de Nota Ruimte en voor de provincie Fryslân uitgewerkt in het Streekplan Fryslân 2007.

Natuur buiten EHS


Vanuit het Streekplan Fryslân 2007 (Verordening Romte Fryslân) wordt buiten de EHS-gebieden bij ruimtelijke planningspecifiek ingezet op de bescherming van bestaande natuurgebieden en natuurwaarden in agrarisch gebied. Ten behoeve van de bescherming van weidevogelgebieden is aanvullend het Werkplan Weidevogels Fryslân 2007-2013 opgesteld.

Inventarisatie

Het plangebied ligt niet binnen en grenst niet aan een beschermd gebied in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Het meest nabij gelegen gebied betreft het Beschermde natuurmonument Delleburen dat gelegen is op een afstand van ongeveer 700 meter. Op een afstand van ongeveer 7 kilometer ligt het Natura 2000-gebied Drents-Friese Wolde & Leggelderveld. Beide beschermde gebieden zijn aangewezen voor soorten en habitattypen die gevoelig zijn voor vermeting en verzuring.

Het eerder genoemde Delleburen betreft tevens het meest nabijgelegen beschermde gebied in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur (zie afbeelding 1, groene gebied). Het plangebied ligt niet in of in een zone van 250 m rond een kwetsbaar gebied in het kader van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav).

Aan de zuidwestzijde grenst het plangebied aan een loofbosje. Dit loofbosje en een aantal omliggende houtwallen en -singels zijn in het kader van het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid aangewezen als “Natuur buiten de EHS” (zie afbeelding 1, bruine gebieden). Als gevolg van de aanwezige bosjes, houtwallen en -singels en de Oosterwoldseweg is het plangebied geen belangrijk weidevogelgebied (verstoringzone openheid en rust).



Afbeelding 1 Kaart Ecologische Hoofdstructuur (bron: provincie Fryslân)

Effecten

Gezien de ligging van het plangebied en de aard van de ontwikkelingen kunnen op voorhand negatieve effecten (verzuring en vermesting), als gevolg van de toename van de ammoniakemissie vanuit het plangebied, op het Beschermd natuurmonument Delleburen en het Natura 2000-gebied Drents-Friese Wolde & Leggelderveld niet worden uitgesloten (externe werking). Door de verplaatsing (dichter bij het Beschermd natuurmonument) en de uitbreiding van de veestapel is de afstand van 700 meter geen veilige afstand. Tevens is gezien de nabije ligging van beschermde gebieden in het kader van het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid overleg met het bevoegd gezag, de provincie Fryslân, noodzakelijk.

Conclusie

Op basis van het veldbezoek blijkt dat het plangebied een relatief hoge natuurwaarde heeft. Als gevolg van de nieuwbouwplannen kunnen onder meer vaste verblijfplaatsen van das, vleermuizen en vogels worden verstoord. Op basis van de voorliggende ecologische inventarisatie kan worden geconcludeerd dat het noodzakelijk is om een nader vooronderzoek in het kader van de Flora- en faunawet uit te voeren, waarbij gericht onderzoek naar de aanwezigheid van das, vleermuizen en vogels dient te worden verricht.

Uit de ecologische inventarisatie komt verder naar voren dat er een noodzaak is voor het uitvoeren van een Voortoets in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Hierbij is gericht onderzoek noodzakelijk naar de ammoniakemissie en -depositie en de exacte ligging van de voor verzuringgevoelige habitattypes. Het is verstandig om dit onderzoek met het bevoegd gezag af te stemmen.

Tot slot bestaat er een noodzaak voor een vooroverleg met het bevoegd gezag in het kader van het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid.

De uitvoerbaarheid van het plan voor wat betreft de natuurwetgeving hangt af van de uitkomsten van dit nadere onderzoek en genoemd overleg.