

Legenda

1. Herbestemmen naar natuur en omvormen naar bos ca. 9.000 m2
maatregelen:
 - scheuren grasland
 - aanplanten bosplantsoen
 - eerste 3 jr maaien tussen bosplan
2. Herbestemmen naar natuur en omvormen naar extensief grasland ca. 3732 m2

De KGO zal bestaan uit de aanplant van een nieuw bosperceel. En het omvormen naar extensief grasland. Deze zal het gehele tussen liggende perceel zijn met een strook van ca. 25 m1 aan de westzijde van het zuidelijke bosperceel.

Beschrijving: De Berken-Elzenbroekbossen komen voor op natte, voedselarme en zure standplaatsen. De boomlaag wordt gedomineerd door Zomereik, Zachte berk en Zwarte els. Zachte berk domineert in zuur milieu; Zwarte els in minder zuur tot basisch milieu. In de struiklaag is Sporkehout (vuilboom) het vaakst aanwezig. De meest voorkomende soort in de kruidlaag is Pijpenstrootje. Deze soort heeft een brede ecologische amplitude en kan zowel op droge (Dennen-Eikenbossen) als op vochtige standplaatsen (Berken-Elzenbossen) domineren, zolang het gaat om zure, relatief voedselarme bodems. Daarnaast vind je in de kruidlaag zowel soorten van de Dennen-Eikenbossen en Eiken-Beukenbossen (Smalle en Brede stekelvaren, Bochtige smele, Blauwe bosbes, Valse salie) als soorten van de Elzenbroekbossen (Grote wederik, Riet, Bitterzoet, Wolfspoot, Moeraswalstro, Hennegras). De moslaag is meestal goed ontwikkeld en bevat verschillende Veenmossoorten.

Na 10 jaar 1/3 van het kappen en overstaanders laten staan.
Beplantingssoorten zie bijlage 2 bij de regels.

