

Nijhof Wassink B.V.
T.a.v. de heer Nijhof
Huurnerweg 17
7642 NS WIERDEN

Goor, 20 oktober 2011

Betreft : Inspectie flora en fauna Hexelseweg Wierden
Ref. nr. : 4417/SB
Cont. pers. : Mark Elshof

Geachte heer Nijhof,

Eelerwoude heeft een inspectie uitgevoerd in het kader van de Flora- en faunawet aan de Hexelseweg 67 te Wierden. Dit in verband met de voorgenomen realisatie van een compensatiewoning in het kader van de rood voor rood regeling. Met deze brief doen wij verslag van onze bevindingen.

Projectlocaties

Onderstaande foto's geven een overzicht van de locatie. Het betreft een weiland met aan de oost- en zuidzijde een rij bomen. Deze bomen vallen buiten het plangebied en worden niet gekapt. Langs de zuidzijde van het plangebied ligt een greppel welke ten tijde van het onderzoek niet watervoerend was.



Foto's 1 & 2. Impressie van het plangebied.

Methode

De inspectie is op 17 mei 2011 uitgevoerd. Het bezoek heeft plaatsgevonden in de middag bij bewolkt weer bij 15° graden. De locatie is eenmalig geïnspecteerd op de aanwezigheid van (verblijfplaatsen van) beschermde soorten. Ook de directe omgeving is hierbij meegenomen.

Resultaten veldinspectie

Tabel 1-soorten

Binnen het plangebied kunnen algemene zoogdieren (o.a. egel en mol) en amfibieën (o.a. gewone pad en bruine kikker) voorkomen van tabel 1 van de Flora- en faunawet. De ingreep zal naar verwachting leiden tot een beperkt verlies van leefgebied van tabel 1-soorten zoogdieren en amfibieën. Dit heeft geen negatieve invloed op de gunstige staat van instandhouding van de lokale populatie. Voor deze soorten geldt een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Tabel 2 en 3-soorten

Tijdens het veldbezoek zijn in en rondom het plangebied geen sporen (uitwerpselen, krabsporen) aangetroffen van zwaarder beschermde soorten, zoals steenmarter. Mogelijk dat de steenmarter en vleermuizen (o.a. gewone dwergvleermuis en laatvlieger) het plangebied gebruiken als foerageergebied. Foerageergebied is alleen beschermd indien het een essentieel onderdeel uitmaakt van de functionele leefomgeving van de soort. Met andere woorden, zonder dit foerageergebied kunnen deze soorten zich niet handhaven in een gebied. In deze situatie is daar geen sprake van. Het leef- en foerageergebied van deze soorten omvat vele (tientallen) hectares. Daarbij komt dat deze soorten ook foerageren in en rond bebouwing, tuinen, etc. De nieuwe situatie kan in die zin zelfs een verbetering van het foerageergebied betekenen.


Andere zwaarder beschermde soorten (o.a. amfibieën en reptielen) worden niet binnen het plangebied verwacht vanwege het ongeschikte biotoop en/of het bekende verspreidingsgebied van de soorten.

Ook de bomen aangrenzend het plangebied zijn geïnspecteerd. Deze bomen zijn over het algemeen te jong om holten te bevatten die een functie kunnen hebben als verblijfplaats voor strikt beschermde soorten zoals vleermuizen. De ligging van de landschapselementen (bomenrij/singel) langs een drukke, doorgaande weg zonder fysieke aansluiting met opgaande groenelementen met het aangrenzende agrarisch landschap, maken het zeer onwaarschijnlijk dat de elementen een belangrijke functie hebben voor kritisch beschermde soorten als foerageergebied of ecologische verbinding. Daarbij komt dat de elementen bovendien gehandhaafd blijven.

Gezien de geringe huidige functie en grootte van het plangebied worden tijdens en na de realisatie van de ruimtelijke ontwikkelingen geen negatieve effecten verwacht op zwaarder beschermde soorten. Wel dient in de nieuwe situatie rekening gehouden te worden met nachttactieve soorten (uilen, vleermuizen en steenmarter) door verlichting tot een minimum te beperken (figuur 1).

Vogels

Binnen en direct rondom de projectlocatie zijn enkele algemene vogelsoorten aangetroffen; houtduif, koolmees, merel, pimpelmees en winterkoning. Mogelijk dat algemene broedvogels binnen en rondom het plangebied broeden. In het plangebied zijn geen (sporen van) zeldzame en kritische vogelsoorten, evenals verblijfplaatsen en sporen van vogelsoorten die jaarrond van vaste rust- en verblijfplaatsen gebruik maken aangetroffen of te verwachten. Ook in de bomen buiten het plangebied zijn geen nesten of verblijfplaatsen aangetroffen. Indien gewerkt wordt buiten het broedseizoen, worden geen negatieve effecten verwacht op vogels.



Figuur 1: Voorbeelden van verschillende type armaturen en plaatsingen om lichthinder te voorkomen.

Conclusies en advies

Geconcludeerd wordt dat het projectgebied wel een geschikt leefgebied vormt voor een aantal beschermde diersoorten in het kader van de Flora- en faunawet. Het gaat om algemene en licht beschermde soorten, zoals zoogdieren en amfibieën, maar ook strikt beschermde soorten zoals (broed)vogels, steenmarter en vleermuizen.

Met de voorgenoemde ruimtelijke ingrepen gaat voor tabel 1-soorten weliswaar leefgebied verloren, maar van negatieve effecten op populaties is geen sprake. Wel kunnen op individueel niveau (tijdelijk) negatieve effecten optreden, bijvoorbeeld door verlies van leefgebied. Deze licht beschermde soorten behoren tot de categorie 'niet ontheffingsplichtig bij ruimtelijke ingrepen'. Wel geldt ook voor deze soorten de algemene zorgplicht.

Door de voorgenoemde ontwikkelingen worden verder geen negatieve effecten verwacht op zwaarder beschermde soorten zoals steenmarter en vleermuizen. Hiermee kunnen de plannen doorgang hebben in het kader van de Flora- en faunawet en de woning gerealiseerd worden. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet is niet aan de orde. Wel dient rekening gehouden te worden met het broedseizoen van vogels en verlichting te beperken tot een minimum.

Binnen het plangebied kunnen enkele algemene broedvogels voorkomen. Voor alle beschermde, inheemse (ook de algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt vanuit de Flora- en faunawet een verbod op handelingen die nesten of eieren beschadigen of verstoren. In de praktijk betekent dit dat versturende werkzaamheden alleen buiten het broedseizoen uitgevoerd mogen worden. In verband met broedende vogels wordt geadviseerd om de realisatie van de kapschuur buiten het broedseizoen uit te voeren. Globaal loopt het broedseizoen van 1 maart tot 15 juli. Voor het broedseizoen wordt echter geen standaardperiode gehanteerd. Van belang is of een broedgeval verstoord wordt, ongeacht de datum.

Verwacht wordt dat met de uitgevoerde inspectie en de beschreven adviezen negatieve effecten op beschermde soorten worden voorkomen, en dat zo een goede invulling wordt gegeven aan de zorgplicht die de Flora- en faunawet oplegt. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de Flora- en faunawet de uitvoerbaarheid van het plan in de weg staat.

Met vriendelijke groet,
Eelerwoude BV



Sharon Boekhout
Adviseur ecologie