

Beheerplan



Project: **Het Broekhuys**

Opdrachtgever:

Dhr. van Harmelen & mevr. Passmann


Richterslaan 5

7091 RA Dinxperlo

Inhoudsopgave

Overzicht van beheergroepen	3
Hoogstamboomgaard	4
Houtsingels en houtwallen	6
Meidoornhaag	8
Solitaire boom en groepen	9
Elzensingels	10
Ruig gras	11
Totaaloverzicht van beheergroepen en gewenst beheer	12
Beheerkalender	13
Algemeen informatie over beplanting planten en onderhouden	14

Overzicht van beheergroepen



Hoogstamboomgaard.



Een hoogstamboomgaard is een karakteristiek landschapselement en bestaan uit meerdere fruitbomen zoals: appel, peer, kers, pruim en bijvoorbeeld walnoot. Deze soorten staan vaak in een bepaald patroon en zijn beschermd of omkadert door een haag of muur. Nabij boerderijen fungeert de boomgaard tevens als weide. Bij een hoogstamboomgaarden begint de eerste zijtak vanaf 180cm vanaf het maaiveld. Oorspronkelijk zijn deze boomgaarden te vinden bij de boerderijen (eigenproductie) maar ook bij kastelen en landhuizen komen ze voor. Er bestaan verschillende benamingen voor een boomgaarden zoals: *bongerd*, *bogaard* en *bommel*.

Oude rassen zijn waardevol.


Veel oude rassen zijn inmiddels verdwenen en dat is zonde, want het gaat hier niet alleen om levend erfgoed. Oude rassen zijn vaak erg sterk.



Door een grote collectie aan te leggen met veel verschillende rassen, verzamel je veel erfelijke eigenschappen (genen). De oude rassen van toen kunnen van groot belang zijn voor het behoud van de gewassen van de toekomst. Nieuwe rassen kunnen via de oude eigenschappen resistent worden gemaakt tegen ziekten en plagen.

Vorm snoei

De vorm snoei is vooral belangrijk bij de jonge bomen. Elke soort heeft zijn eigen specifieke vorm. Bij de appel wordt over het algemeen een bolvorm aangehouden zonder harttak. Peren vormen van nature meer een kroon met een harttak. Deze kroon krijgt meer een piramidale vorm. Nadat de fruitboom is aangeplant is het belangrijk direct de eerste vorm snoei toe te passen. Uit het gestel worden vaak niet meer dan 4 gesteltakken aangehouden, de overige takken kunnen worden weggesnoeid. Afhankelijk van de soort kunt u kiezen voor het behouden of weghalen van de harttak.



Onderhoud snoei

Fruitbomen kunnen het beste jaarlijks gesnoeid worden. Het gaat daarbij om vervanging van minder vitaal, afgedragen vruchthout, het verwijderen van ziek hout en het verwijderen van verkeerd geplaatste nieuwe scheuten. In een regelmatig onderhouden, vitale Hoogstamfruitboom zullen elk jaar nieuwe scheuten ontstaan. Een deel kan worden gehandhaafd en gebruikt als nieuwe vruchttakken. Een ander deel dient te worden verwijderd.

Snoeiafval

Het vrijkomende kleine snoeiafval kan op locatie worden verwerkt in een composthoop. De vrijkomen stammen en takken kunnen worden verwerkt in een houttrillen. Hierdoor kan het snoeiafval dat vrijkomt bijdragen aan het ontwikkelen van de biodiversiteit.

Soorten volgens beplantingsplan

Boomgaard 18 st (plantafstand 7mtr)

1	<i>Malus domestica</i> Glorie van Holland	3 st	16-18	verband zie tekening
2	<i>Malus domestica</i> 'Groninger Kroon'	3 st	16-18	verband zie tekening
3	<i>Malus domestica</i> Notarisappel	2 st	16-18	verband zie tekening
4	<i>Pyrus</i> Clapp's	2 st	16-18	verband zie tekening
5	<i>Pyrus</i> Doyenne	3 st	16-18	verband zie tekening
6	<i>Prunus</i> Anna Späth	2 st	16-18	verband zie tekening
7	<i>Prunus</i> Reine Claude	3 st	16-18	verband zie tekening

Houtsingels en houtwallen




Een houtsingel is een brede landschappelijk waardevolle afscheiding, vaak ook tussen weilanden, die bestaat uit bomen struiken. Een houtsingel is een lijnvormig landschapselement van 4 tot maximaal 20 meter breed. Een houtsingel bestaat uit inheemse soorten (die van oorsprong hier groeien) Houtsingels lijken veel ophoutwallen. Een houtwal is er sprake van talud grondwal, waar de beplanting op staat.

Beheer

Goed onderhouden houtwallen en houtsingels bestaan uit een boom-, kruid- en struiklaag. Na ongeveer 5-6 jaar zullen de takken in de houtsingel of wal elkaar gaan raken en dient er waar nodig gesnoeid en gedund worden. Na 10-12 jaar is de eerste keer onderhoud noodzakelijk d.m.v. afgezet.

Afzetten betekent dat de bomen en struiken tot 10 à 20 cm boven de grond worden afgezaagd. De bomen en struiken groeien uit zichzelf weer uit. Bij voorkeur dient er kleinschalig gewerkt te worden waarbij niet alle singels tegelijk een onderhoudsbeurt krijgen. Om de variatie in leeftijd te waarborgen dient ieder jaar, afhankelijk van het onderhoudsinterval, een gedeelte van de singel te worden afgezet.



houtsingel met hakhoutbeheer

Bij het afzetten is het in elk geval van belang dat er genoeg licht op de bodem valt om de stobben te laten uitlopen. Dat betekent vaak een vrij drastische dunning. Oude bomen blijven meestal staan, evenals bomen met holten die vaak het domein van vogels en vleermuizen zijn.

Snoeiafval

Het vrijkomende kleine snoeiafval kan op locatie worden verwerkt in een composthoop. De vrijkomen stammen en takken kunnen worden verwerkt in een houtrillen. Hierdoor kan het snoeiafval dat vrijkomt bijdragen aan het ontwikkelen van de biodiversiteit.

Bosplantsoen 390st (plantafstand 1,5x1,5mtr 875m2) hoger gelegen zijde

AC	<i>Acer campestre</i>	70	st	100-120	<i>Veld esdoorn</i>
CA	<i>Corylus avellana</i>	70	st	100-120	<i>Hazelaar</i>
EE	<i>Euonymus europaeus</i>	60	st	100-120	<i>Wilde kardinaalsmuts</i>
PA	<i>Prunus avium</i>	60	st	100-120	<i>Zoete Kers</i>
PS	<i>Prunus spinosa</i>	20	st	100-120	<i>Sleedoorn</i>
SN	<i>Sambucus nigra</i>	40	st	100-120	<i>Gewone vlier</i>
VO	<i>Viburnum opulus</i>	50	st	100-120	<i>Gelderse roos</i>
RA	<i>Rosa arvensis</i>	20	st	100-120	<i>Viltroos</i>

Bosplantsoen 60st (plantafstand 1,5x1,5mtr 135m2) bij de brug

SA	<i>Salix alba</i>	1	st	20-25	<i>Schietwilg</i>
AG	<i>Alnus glutinosa</i>	25	st	80-100	<i>Zwarte Els</i>
EE	<i>Euonymus europaeus</i>	10	st	80-100	<i>Wilde kardinaalsmuts</i>
RA	<i>Rosa arvensis</i>	25	st	60-80	<i>Viltroos</i>

Bosplantsoen 160 st (plantafstand 1,5x1,5mtr 350m2) links van de inrit toevoegen aan bestaand bosplantsoen


AC	<i>Acer campestre</i>	st	120-150	<i>Veld esdoorn</i>
CA	<i>Corylus avellana</i>	st	120-150	<i>Hazelaar</i>
VO	<i>Euonymus europaeus</i>	st	100-120	<i>Wilde kardinaalsmuts</i>
PA	<i>Prunus avium</i>	st	120-150	<i>Zoete Kers</i>
EE	<i>Viburnum opulus</i>	st	120-150	<i>Gelderse roos</i>

Meidoornhaag



Een knip- en scheerhaag is een lijnvormig landschapselement, met aaneengesloten begroeiing van inheemse struiken, dat regelmatig wordt geknipt of geschoren. De frequentie van de snoei hangt af van een aantal factoren: de soort, de vorm, de functie en de eisen die we aan de heg stellen. In het algemeen worden de meeste heggen ongeveer 2 keer per jaar geknipt. Als haag heeft de inheemse meidoorn verschillende interessante troeven en is ze een zeer warendol voor de biodiversiteit.

Bij een meidoornheg is het belangrijk de eerste keer te knippen voor de langste dag van het jaar, in mei-juni. Dit maakt het knippen van deze heg een stuk aangenamer, omdat de doorns dan nog niet houtig zijn. Knip de heg wanneer het bewolkt en niet te warm is. Belangrijk is dat de onderkant van de heg iets breder uitgroeit dan de bovenkant, zodat de zon ook op de onderkant van de heg kan schijnen. De heg behoudt dan zijn besloten karakter.



Beheer

Na het eerste jaar de haag goed innemen zodat deze van onderuit gaat vertakken en er een mooi volle haag ontstaat. De afbeelding hiernaast laat zien hoe de haag de eerste 3 jaar te knippen.

Eventueel kan er ook gekozen worden om er een vlechthege van te maken.

Snoeiafval

Het vrijkomende kleine snoeiafval kan op locatie worden verwerkt in een composthoop. De vrijkomen stammen en takken kunnen worden verwerkt in een houtrillen. Hierdoor kan het snoeiafval dat vrijkomt bijdragen aan het ontwikkelen van de biodiversiteit.

Haag (Meidoorn bij boomgaard)

H1 *Crataegus monogyna*

1000 st

80-100

Eenstijlige meidoorn

Solitaire boom en groepen

Solitaire bomen zijn, in tegenstelling tot bomen die in een bos staan, in staat zich volledig vrij groeiend te ontwikkelen met een natuurlijke kroonvorm en zijn daarom kenmerkende elementen in het landschap.



Beheer

Beheer is bij een bomengroep niet of nauwelijks nodig. Door middel van een visuele beoordeling kan worden bekeken of onderhoudssnoei noodzakelijk is. Het verdient aanbeveling om regelmatig zogeheten zuigers, schurende takken en dood hout te verwijderen. Snoeien kan over het algemeen in de wintermaanden, met uitzondering van haagbeuk, walnoot, wilde paardenkastanje, esdoorn en berk. Deze soorten kunt u het beste snoeien in de periode september-begin januari in verband met sap uittreding of bloeden. Ook dient u de boomband te controleren en na 4 tot 5 jaar te verwijderen.

Snoeiafval

Het vrijkomende kleine snoeiafval kan op locatie worden verwerkt in een composthoop. De vrijkomen stammen en takken kunnen worden verwerkt in een houtrillen. Hierdoor kan het snoeiafval dat vrijkomt bijdragen aan het ontwikkelen van de biodiversiteit.

Bomen (volgens plan)

QR	<i>Quercus robur</i>	4 st	20-25	Zomereik
BP	<i>Betula pendula</i>	4 st	18-20	Berk
FSP	<i>Fagus sylvatica Purpurea</i>	1 st	40-45	Rode Beuk
SA	<i>Salix alba</i>	1 st	20-25	Schietwilg

Bomen (volgens plan)

QR	<i>Quercus robur</i>	2 st	20-25	Zomereik
BP	<i>Betula pendula</i>	3 st	18-20	Berk
SA	<i>Salix alba</i>	2 st	20-25	Schietwilg

Elzensingels




Een elzensingel is een één- of meerrijige singel van hoofdzakelijk zwarte els (*Alnus glutinosa*). De singel heeft vaak de functie als erfscheiding en beschutting tegen de wind. Op erven staan elzensingels meestal daar waar weinig ruimte is en zijn dan een rij breed. Elzen staan houden van een vochtige tot natte grond. Door afzetten van de els op kniehoogte (hakhoutbeheer) ontstaan stobben of stoven waaruit de nieuwe takken ontspringen. Stobben bieden plaats aan mossen, korstmossen, paddenstoelen, insecten, vogels en kleine zoogdieren. De ondergroei wisselt sterk, na de kap is er veel licht op de bodem, waardoor veel planten een kans krijgen, deze verdwijnen na verloop van tijd als de singel hoger en dichter van structuur wordt.

Beheer

Elzensingels worden op verschillende manieren beheerd, de twee belangrijkste zijn:

- Elzensingels die meer achter op het erf of in het landschap staan, worden beheerd als hakhout, dit is een vorm van beheer waarbij met tussenpozen het hout tot op kniehoogte gekapt wordt en de overblijvende stobben opnieuw uitlopen. De singel wordt eens in de 10 jaar afgezet. De singel krijgt hierdoor zijn vitaliteit terug en wordt weer mooi dicht van vorm. De beste tijd voor snoeien is de winterperiode.



Snoeiafval

Het vrijkomende kleine snoeiafval kan op locatie worden verwerkt in een composthoop. De vrijkomen stammen en takken kunnen worden verwerkt in een houtrillen. Hierdoor kan het snoeiafval dat vrijkomt bijdragen aan het ontwikkelen van de biodiversiteit.

Ruig gras



Kruiden - en faunairijk grasland wordt bij een goede kwaliteit gekenmerkt door variatie en structuren (ruigte en plaatselijk struweel, hogere en lage vegetatie) wat waarde vol is in het landschap. Naast de esthetisch waarden voegt het erg veel toe voor flora en fauna.

De frequentie ligt bij ruig gras op ca. 1-3 keer per jaar. 1x per jaar houdt in lang en hoog gras en ruig gras 2-3 per jaar afzetten. Belangrijk is dat het maaisel na het maaien wordt afgevoerd. Waardoor deze zones niet te veel worden bemest met organische stoffen maar juist worden verschaald. Op schrale gronden groeien veelal grassen bloemen. Er ontstaat uiteindelijk een natuurlijk beeld met daar in grassen en bloemen. Graslandbegroeiing wel dan niet kruidenrijk zijn erg waardevol voor kleine fauna zoals: vlinders en andere insecten, vogels en kleine zoogdieren. De graslanden worden doorgaans niet bemest echter kan om verzuring tegen te gaan kan, bij uitzondering, ruige stalmest of kalk toegepast worden.

Snoeiafval

Het vrijkomende (afgestorven) maai afval kruidenvegetatie wordt afgevoerd. Dit om de grond te versralen en meer diversiteiten te creëren in soorten.

Beheer.

1. Maaien en afvoeren Dit beheerbeleid wordt toegepast op bermen en ruig gras met een hogere natuurwaarde. Dit betreft vooral de bermen in de bebouwde kom, met name in het westelijk deel van Culemborg.
2. Begrazing Culemborg heeft een aantal gebieden waarop begrazing wordt toegepast.

Het waterschap zorgt voor het onderhoud van de sloot – watergang ter noorden van de villa. De zijde het dichtbij de villa zal door de opdrachtgever zelf worden onderhouden.

Beheerkalender	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Vissen												
Amfibieën												
Reptielen												
Zoogdieren												
Veermuizen												

Solitaire bomen							
		WATER	SNOEIEN	BOOMBAND	AFZETTEN	WIJKERS BLIJVERS	BESCHERMING
Quercus robuur	6st	ja	NIET	Verw. na 5 jr	nvt	nvt	nvt
Fagus sylvatica	1st	ja					
Salix	3st	ja					
Boom in groep							
		WATER	SNOEIEN	BOOMBAND	AFZETTEN	WIJKERS BLIJVERS	BESCHERMING
Berken	7st	ja	NIET	Verw. na 5 jr	nvt	nvt	nvt
Boomgaard Hoogstam							
		WATER	SNOEIEN	BOOMBAND	AFZETTEN	WIJKERS BLIJVERS	BESCHERMING
Appels	9st	ja	jaarlijks	Verw. na 5 jr	nvt	nvt	nvt
Peren	5st		jaarlijks	Verw. na 5 jr	nvt	nvt	nvt
Kersen / Pruim	4st		jaarlijks	Verw. na 5 jr	nvt	nvt	nvt
Bestaande Elzensingel							
		WATER	SNOEIEN	BOOMBAND	AFZETTEN	WIJKERS BLIJVERS	BESCHERMING
Elzen Lage Heurnseweg		nvt	nvt	nvt	6-10 jaar	nvt	
Hagen							
		WATER	SNOEIEN	BOOMBAND	AFZETTEN	WIJKERS BLIJVERS	BESCHERMING
Meidoorn	195m1	1 ^{ste} jr	2x per jr	nvt	½ 1 ^{ste} jr	nvt	nvt
Bosplantsoen bestaand en nieuw							
		WATER	SNOEIEN	BOOMBAND	AFZETTEN	WIJKERS BLIJVERS	BESCHERMING
Diversen inheemse soorten		1 ^{ste} jr	nee	nvt	1x per 10 jr	Ja 1xper 3jr	nee
Ruig gras							
		WATER	SNOEIEN	BOOMBAND	AFZETTEN	WIJKERS BLIJVERS	BESCHERMING
Gras of bloemenmengsel		nee	nee	nee	2x per jr	nvt	nvt


maaisel opnemen en afvoeren verschrallen van zones

Beheerkalender	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sept	okt	nov	dec	
Hagen													knippen
Bomen													doodhout
Bosplantsoen													doodhout en afzetten
Ruig gras													maaien

Algemeen aanleg instructie

1. Het seizoen om een boomgaard te creëren is vanaf half november tot half februari, mits het niet vriest. Gezien het veelal gaat om wortel en kluitgoed is het belangrijk het blad van de bomen is en daarmee de sappenstroom veel minder actief is.
2. Voor de aanplant van een boomgaard is het aan te bevelen om oude rassen van hoogstam fruitbomen. Oude rassen zijn vaak minder ziektegevoelig waardoor er minder bestrijdingsmiddelen nodig zijn.
3. Indien u niet direct alle bomen kunt planten is het verstandig de bomen tijdelijk in te kuilen. Zorg altijd bij wortelgoed dat de wortels niet in de zon of in de wind liggen hierdoor drogen ze uit waardoor de plant of boom minder goed zal aanslaan. Zie in stappenplan voor het inkuilen van beplanting.

Stappenplan voor inkuilen van beplanting.



1a grond uitscheppen en op een 'rug' zetten.

1b Bosjes plantsoen schuift tegen de rug aanzetten met de wortels in de kuil. De touwtjes rond de bosjes verwijderen de bosjes iets uit elkaar trekken.

1c Volgende streek grond over de wortels spreiden zodat ze goed togedekt zijn.

1d Volgende bos tegen de eerste zetten, touwtje weer verwijderen en de in 1c genoemde handeling herhalen.

1e als het plantsoen uit de kuil wordt gehaald, moet de aangegeven richting van de dichte pijl worden gevolgd. Lostrekken in de richting van de open pijl, beschadigt de wortels.

4. Controle beplanting Bij het ophalen van plantmateriaal bij de kweker zijn er een aantal aandachtspunten die u in acht moet nemen.

- Controleer uw bestelling op soorten en aantallen met de bestellijst.
- Let erop dat het wortelgestel goed is en of er geen wonden aan de bast zitten
- Bij de aanschaf van bomen moet u goed kijken of er geen dubbele kop inzit. Een dubbele kop heeft een boom wanneer er twee hoofdtakken zijn die doorlopen vanuit de stam. Een boom mag absoluut geen dubbele kop hebben. Dit geldt niet voor vruchtbomen. Bij vruchtbomen is een dubbele kop geen probleem omdat ook deze tak op den duur wordt gesnoeid.

5. Plantafstand een hoogstamboomgaard kunnen meer dan 10 meter hoog en breed worden. Het is daarom belangrijk bij aanplant de fruitbomen op ruime afstand van elkaar te planten. Plant daarom appelbomen, peren, en kersen minimaal tot 8-10 meter uit elkaar en pruimen mogen korter op elkaar geplant worden 6 meter. Van oudsher stond een boomgaard in een strak stramen tegenwoordig zien ook dat deze worden aangeplant in wildverband. Om de afstanden het patroon te bepalen adviseren wij om een meetlint en enkele paaltjes te gebruiken.

6. Afhankelijk van de grootte van de boom en of het gaat om een kluit of wortel bepaal je het formaat van het plantgat. Deze dient minimaal 2 tot 3 maal zo diep te worden uitgegraven als de hoogte van het wortelgestel. Het plantgat dient ongeveer 20cm breder te worden uitgegraven dan het wortelgestel.

Spit na het graven van het gat de bodem van het plantgat goed los. Als er een harde laag in de bodem zit, dan moet deze alsnog worden doorgespit. Dit is erg belangrijk. Als de harde laag blijft zitten is er geen tot onvoldoende capillaire werking. Dit betekent dat de boom geen grondwater en voeding kan opnemen. De wortels kunnen niet door de harde laag heen kunnen groeien, waardoor de boom na 2-3 jaar om kan vallen en er minder vitaal uit ziet dan wanneer de grond hieronder wel goed los is. Een boom die goed geplant is blijft er gezond uitzien.

7. Na het graven van het plantgat zet u de boom erin, (deze staat nu nog veel te diep) en draait u hem naar wens, met de mooiste kant in het zicht. Dan kijkt u of de boompaal op zijn plaats kan staan. De paal moet ongeveer 20-35 cm van de boom af staan, waarbij geldt: hoe zwaarder de boom, hoe groter deze afstand. De boompaal wordt altijd in zuidwestelijke richting geplaatst. Wanneer de maat van de boom formaat zijn kan men ook de keuze maken om er 2 boompalen bij te plaatsen mits u hem niet haaks op de windrichting zet, en bij 3 is de windrichting niet meer van belang. Past de boompalen niet i.v.m. de wortels dan mag u de boom een stukje draaien, beperkt het wegknippen van de wortels. Wanneer u de positie van de boompaal heeft bepaald. Verwijderd u de boom en boort u met een grondboor de gaten. Sla de palen aan met een zware grote moker, zodat deze stevig in de grond staan. De hoogte van de boompaal zit tussen de 120 en 150cm. Bevestig de boomband deze verankering moet ervoor zorgen dat de boom zo minimaal mogelijk wiebelt op de wind.

8. U heeft nu de boompalen staan en de boom naast het plantgat liggen. Verwijder nooit de ben (het metalen net) van de draadkluit! Hierdoor kunnen de zo belangrijke haarwortels van de boom beschadigen. U vult het gat weer aan tot de hoogte van het wortelgestel (afb. 2) en loopt dit stevig aan. Niet aanstampen! Vergeet niet de drain te plaatsen en zorg er voor dat deze een stukje boven de grond uit steekt, anders kunt u geen water geven en kan er grond in de drain komen. De boom moet 5 cm lager worden gepoot dan hij uit de grond kwam, dit is te zien aan het kleurverschil op de bast (vaak 10 cm boven de eerste wortel). Belangrijk is dat de aangevulde grond goed stevig met de hak (van de schoen!) wordt aangetrapt.

Vervoer

Zorg ervoor dat bij het vervoer van het plantmateriaal van de kweker naar uw woning de wortels niet uitdrogen. De wortels kunnen uitdrogen door een felle zon, maar ook door wind en droge warme lucht. Dek de wortels tijdens het vervoer af met plastic en kuil de beplanting gelijk na aankomst in.

Bescherming tegen vraat

Geiten, paarden, hazen en ander vee zijn dol op jonge blaadjes, takjes en boombast. Ze zijn in staat bomen in een korte tijd te schillen. Dit betekent meestal de dood voor de boom. Bescherm bomen, vruchtbomen, hagen en singels daarom goed door op ruime afstand van de boom gaas te spannen of een hekwerk te plaatsen. Zorg ervoor dat ook als de dieren op hun achterpoten staan, ze niet bij de bomen kunnen komen. Het is verstandig om bomen, ook al staan de geiten aan een ketting, te beschermen. Die ene keer dat ze losbreken of niet stak genoeg zijn aangebonden, weten ze een boom snel te vinden. Katten kunnen ook veel schade aan jonge bomen aanrichten als ze hun nagels aan de stam scherpen. Dit is te voorkomen door de stam op tijd in te gazen.

Water in droge perioden

Het wortelgestel van pas geplante bomen en stuiken is afhankelijk van hangwater. Om verdroging in de eerste tijd tegen te gaan is het noodzakelijk de jonge bomen, singels en hagen regelmatig water te geven in droge perioden (dit kan ook in de winter zijn). Geef de jonge aanplant, indien mogelijk, met name de eerste 2 jaar na aanplant voldoende water in droge perioden. Ga uit van 2 emmers per boom. Kan meer afhankelijk van standplaats, temperatuur, soort en grondsoort en grote van de boom. Vochtig houden is belangrijk, maar niet drijfnat beter 1 keer per week veel 4 of 5 emmers als iedere avond een ½ emmer. Bij voorkeur regenwater of water uit een sloot of vijver. Leidingwater kan in een warme zonnige periode te koud zijn voor de wortels.

Inboet

Het vervangen van dode of sterk beschadigde bomen in een jonge aanplant. Het is aan de opdrachtgever te zorgen dat er wordt voldaan aan inboet plicht. (uiteraard ligt dit afhankelijk van de constructie of prijsafspraken bij de groenaannemer – hovenier.