

Zonnepark Schaapsdijk

Aanvulling inrichtingsplan; maatregelen ten behoeve van de das

Datum: 13 december 2019

Op 11 december heeft de gemeenteraad van de gemeente Ermelo ingestemd met het toevoegen van zonnepark Schaapsdijk aan de lijst categorieën van gevallen. In de raadsbehandeling is gevraagd welke mogelijkheden er zijn om de eventuele effecten op het foerageergebied van de das te beperken.

In deze notitie gaan we in op de maatregelen die getroffen worden en op welke manier deze het foerageergebied beïnvloeden. Daarnaast komen enkele aanscherpingen van de landschappelijke inpassing aan bod die mogelijk de voedselbeschikbaarheid voor de das vergroten ten opzichte van de oorspronkelijk geschetste inrichting.

Inrichtingsmaatregelen

In het inrichtingsplan is voorzien in het plaatsen van zonnepanelen op een perceel momenteel in gebruik als maisland. Rondom het panelenveld wordt een hekwerk geplaatst. Tevens zal er een randbeplanting worden aangebracht in de vorm van een elzensingel en struweel.

- Hekwerk: Het hekwerk vormt mogelijk een barrière voor het foerageren van soorten op de betreffende percelen. Om het gebied toegankelijk te houden voor kleine zoogdieren (waaronder de das) wordt het hekwerk op ten minste 20 cm hoogte geplaatst. Hiermee gaat feitelijk geen oppervlakte verloren als foerageergebied.
- Randbeplanting: het plaatsen van met name struweel zorgt voor schuilmogelijkheden voor kleine zoogdieren en vogels. Ook de das kan gebruik maken van deze randbeplanting, hoewel dit niet noodzakelijk is voor deze soort.
- Kruidenrijk grasland: In de overhoeken en rond het zonnenveld zal een kruidenrijk mengsel worden ingezaaid dat een insect aantrekkende werking heeft. De grond zal verder ook niet bewerkt en niet bemest worden conform de gedragscode zon op land. Door een lokale dassenexpert is aangegeven dat vooral bemeste en liefst beweidde graslanden geschikt foerageergebied vormen, met een zeker aandeel maisland.

Mogelijke aanpassingen

- Randbeplanting: In de keuze voor soorten zullen ook besdragende soorten worden gekozen. Naast het stapelvoedsel in de vorm van regenwormen eten dassen ook bessen en vruchten. Hiermee wordt een alternatieve voedselbron aangeboden.
- Kruidenrijk grasland: Naast het kruidenrijke grasmengsel kan ook een dassenakker worden gerealiseerd. Hiervoor zal een akkermengsel worden ingezaaid in bepaalde hoeken. Dit akkermengsel zal samen met het besdragend

struweel meer voedselgewassen bevatten die de das, met name in het najaar kan eten. Door het laten liggen van de gewasresten gaat de opbouw van organisch materiaal door. Dit bevordert de mogelijkheden voor de aanwezigheid van regenwormen.

- Beheer: er wordt nog nagedacht over de mogelijkheden van beheer van het grasland. Mogelijk biedt beweiding met schapen een mogelijkheid voor het vergroten van de hoeveelheid organisch materiaal en bodemleven. Hier zal nader naar worden gekeken.