

Memo

Locatie	Groenewoudsedijk, Utrecht
Datum	29 oktober 2018
Onderwerp	Controle voorkomen soorten Utrechtse Soortenlijst
Projectnummer	162399
Opsteller	D. Boonstra, MSc.

Inleiding


Voor het project Groenewoud te Utrecht (Provincie Utrecht) is gevraagd het voorkomen van soorten van de Utrechtse Soortenlijst (Gemeente Utrecht, 2018) binnen het plangebied op basis van een bureaustudie in kaart te brengen. Hierbij worden bekende verspreidingsgegevens gecontroleerd op basis van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) en uit recentelijke naslagwerken (< 10 jaar oud).

Hieronder worden per, in de Utrechtse Soortenlijst (2018), genoemde soortgroep de binnen het plangebied aanwezige soorten besproken. Tevens worden soorten genoemd die in de directe omgeving voorkomen. Als aanwezige soorten bekend zijn, kan worden gekeken op welke manier er tijdens de ontwikkeling rekening kan worden gehouden met dergelijke flora en fauna.

Flora en Fauna Utrechtse Soortenlijst

Vogels

Binnen het plangebied zijn waarnemingen bekend van tjiftjaf, merel en blauwborst (NDFF, 2018; zie afbeelding 1). Het betreft in alle gevallen geen broedgevallen.



Afbeelding 1. Waarnemingen van vogels uit de Soortenlijst Utrecht binnen en in de omgeving van het plangebied (Aveco de Bondt, 2018).

Waarnemingen van tjiftjaf liggen in de groenstrook rondom het KWS terrein. Dit betreffen zingende dieren, wat kan duiden op mogelijke broedlocaties die gelegen zijn in de groenstrook. Van merel ligt een enkele waarneming langs de groenstrook rondom het KWS terrein, deze kan door merel gebruikt worden als broedlocatie. Op het zuidelijk gelegen weiland zijn waarnemingen bekend van blauwborst. Blauwborst maakt zijn nest op de grond tussen de vegetatie. De waarnemingen van blauwborst dateren uit 2013. Broedlocaties zijn op basis van deze bureaustudie niet uit te sluiten. In de omgeving liggen meer (en recentere) waarnemingen waardoor er vanuit kan worden gegaan dat er geschikte(re) nestlocaties in de omgeving aanwezig zijn. Ten westen van het plangebied zijn waarnemingen bekend van kleine karekiet (>300 meter afstand).

Om mogelijke verstoring van broedgevallen van tjiftjaf, merel, blauwborst en kleine karekiet te voorkomen, wordt het aangeraden om werkzaamheden te starten of uit te voeren buiten het broedseizoen. Alle nesten van vogelsoorten zijn tijdens het broedseizoen beschermd. Mochten werkzaamheden starten binnen het broedseizoen, dan dient een controle op broedvogels plaats te vinden. Pas na afgeven van een vrijgave mogen werkzaamheden starten.

Vissen

Ten zuiden van het plangebied zijn waarnemingen bekend van kleine modderkruiper (NDFF, 2018). Gezien de afstand tot het plangebied is het voorkomen van de kleine modderkruiper niet uit te sluiten binnen het plangebied. Kleine modderkruiper kan worden aangetoond middels een eDNA analyse van de watergang(en) binnen het plangebied. Op basis van resultaten uit dit onderzoek dienen vervolgstappen bepaald te worden.



Afbeelding 2. Waarnemingen van vissen uit de Soortenlijst Utrecht binnen en in de omgeving van het plangebied (Aveco de Bondt, 2018).

Wilde bijen

Binnen het plangebied zijn geen verspreidingsgegevens bekend van wilde bijen uit de Soortenlijst Utrecht (NDFF, 2018).

Planten

Binnen het plangebied is een waarneming bekend van grote kaardenbol. Deze is aan de zuidrand van het plangebied gelegen (zie afbeelding 3). In de omgeving van het plangebied zijn tevens enkele recentere waarnemingen bekend. Een onderzoek in het groeiseizoen dient uit te wijzen of de grote kaardenbol nog aanwezig is. Naar aanleiding van resultaten kunnen vervolgstappen bepaald worden.



Afbeelding 3. Waarnemingen van planten uit de Soortenlijst Utrecht binnen en in de omgeving van het plangebied (Aveco de Bondt, 2018).

Paddenstoelen

Binnen het plangebied zijn geen paddenstoelen waargenomen uit de beschermde Soortenlijst Utrecht.

Ecologisch advies

In de toekomstige situatie kan ruimte worden geboden aan verschillende soorten flora en fauna waaronder de soorten op de Soortenlijst van de Gemeente Utrecht. Door heggen en gelijkwaardige (hogere) groenstructuren te plaatsen, kan nestgelegenheid worden geboden aan verschillende soorten broedvogels, waaronder merel en tjiftjaf. Hierbij kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van sleedoorn of meidoorn, deze zijn voorzien van doorns en zijn besdragend. Hierdoor bieden ze naast nest- en schuilgelegenheid ook voedsel aan vogels.

Door rekening te houden met de aanplant van groen, kunnen tevens kansen ontstaan voor in de Soortenlijst genoemde wilde bijen. Wilde bijen hebben een specifieke voorkeur voor bepaalde planten, zoals grote wederik, grote kattenstaart, siererwt (*Lathyrus*) en klokjesbloemen (*campanula*) zoals, prachtklokje, grasklokje e.d. Dergelijke soorten planten staan tevens vermeld in de Soortenlijst.