

3.3 Haarrijnseplas

3.3.1 Biotoopbeschrijving

De Haarrijnseplas bestaat uit twee naast elkaar gelegen plassen die samen een oppervlakte van ongeveer 90 hectare hebben. De plassen worden van elkaar gescheiden door de Maarssenseweg. De plassen hebben zowel in de zomer als in de winter een belangrijke functie voor watervogels zoals eenden en ganzen. Rondom de oevers van de plassen liggen weilanden en moerasgedeelten. Deze groene zone rondom de plassen is leefgebied voor een verscheidenheid aan soorten. Een deel van de zuidelijk plas is ingericht als recreatiestrand. In dit afgeschermd deel van de plas kan men zwemmen. Het recreatie gedeelte heeft een zandstrand en een ligweide met speel en sport voorzieningen. Het recreatiestrand is open tussen zonsopgang en zonsondergang. Op het recreatiestrand worden tijdens het zwemseizoen weinig tot geen verstoringsgevoelige soorten verwacht. Het zwemseizoen loopt van 1 mei tot 1 oktober en het strandbad is open tussen zonsopgang en zonsondergang.

3.3.2 Risico's per soortgroep samengevat

Flora

De aanwezigheid van door Wnb beschermde soorten is op basis van verspreidingsgegevens en het aanwezige biotoop uitgesloten. De Utrechtse soorten dotterbloem, grote kaardenbol, rietorchis en zwanenbloem kunnen in de moeraszones aan de zuidelijke oevers groeien. Op het recreatiestrand worden deze soorten niet verwacht.

Vogels

De bomen, ruigten, oevers, moeraszones en graslanden in het gebied zijn geschikt als nestlocatie voor veel vogelsoorten. Uitzondering hierop is het recreatiestrand aan de noordelijke oever. Hier is weinig beschutting en veel verstoring door recreanten. In dit gedeelte wordt geen knelpunt met broedvogels verwacht. Graslanden (die mogelijk als parkeerplaatsen worden gebruikt) kunnen geschikt zijn voor broedende (weide)vogels. Hierdoor is voorafgaand een broedvogelcheck nodig om te bepalen of op deze graslanden of in de nabijheid van het recreatiestrand broedende vogels aanwezig zijn.

Vissen

Door Wnb beschermde soorten worden gelet op verspreidingsgegevens en het aanwezige biotoop echter niet verwacht.

Vlinders, bijen en libellen

In de hooilanden en oeverzones in het zuidelijke deel groeien voor bijen belangrijke planten zoals grote kattenstaart en veldlathyrus. Deze bloemrijke gebieden zijn tevens van belang voor vlinders. Wilde reseda is een belangrijke plant voor bijen en komt vooral voor op omgewerkte of braakliggende grond e.d. Aangezien aan de noordelijke oever recent graafwerkzaamheden zijn uitgevoerd, is geschikt biotoop voor deze plant aanwezig. Na verloop van tijd zal het geschikte biotoop echter dichtgroeien waardoor de plant weer verdwijnt. De moeraszone in het zuiden is zeer geschikt voor libellen. Voorgenoemde locaties zijn niet geschikt voor evenementen.

Amfibieën en reptielen

De watergangen en moeraszones aan de zuidelijke oever zijn geschikt habitat voor beschermde amfibieën (waaronder rugstreeppad) en reptielen (ringslang).

Grondgebonden zoogdieren

De zuidelijke oever biedt voor een verscheidenheid aan soorten een geschikt leefgebied. Alleen op het recreatiestrand is gelet op het gebruik en het biotoop geen geschikt leefgebied aanwezig.

Vleermuizen

Verblijfplaatsen van vleermuizen worden niet verwacht door de afwezigheid van geschikte gebouwen of bomen. Het open water en de beschutte zuidelijke oever zijn een geschikt foerageergebied voor vleermuizen. Deze delen dienen onbelicht te blijven.

Betreding

- Verspreid over het gebied zijn vegetaties aanwezig die gevoelig zijn voor betreding. Het betreft hooilanden, moerasvegetaties en oeverzones. Tijdens evenementen moeten deze locaties worden ontzien.
- Er mag onder de boomkroon geen zware belasting op de grond uitgeoefend worden. Het overgrote deel van het gebied bestaat uit open water, zand of moeraszones waardoor er maar weinig knelpunten ten aanzien van bomen zijn.
- Het geschikte terrein bestaat uit ligweides en zandstrand. Negatieve effecten door betreding zijn niet te verwachten. De herstelperiode is relatief kort.
- Het gebruik van de paden in het gebied leidt niet tot negatieve effecten door betreding.

3.3.3 Geschiktheid voor evenementen

Gelet op het voorgaande is alleen het recreatiestrand geschikt voor evenementen.



Figuur 3.3 Geschiktheid van Haarrijnseplas voor evenementen

(gekleurde delen komen overeen met onderzocht gebied)

3.3.4 Voorwaarden en maatregelen

- Het recreatiestrand wordt omringd door diverse soorten groen die kunnen dienen als broedgelegenheid voor vogels. Voorafgaand aan evenementen dient er daarom een broedvogelcontrole plaats te vinden. Tijdens de broedvogelcheck worden eventuele nestlocaties vastgesteld en terreinspecifieke maatregelen voorgesteld, zoals afscherming door middel van hekken.
- Verlichting niet richting open water richten. Hierdoor worden negatieve effecten voor vleermuizen voorkomen.
- Buiten het recreatiestrand zijn geen geschikte locaties voor evenementen. Hier zijn veel natuurwaarden aanwezig. Voor een evenement op deze locaties zal altijd een grondig natuuronderzoek uitgevoerd moeten worden en daar zullen waarschijnlijk ingrijpende maatregelen uit volgen.

Herstelperiode

Alleen op het recreatiestrand zijn grootschalige evenementen mogelijk. Gelet op het biotoop en het gebruik van dit recreatiestrand is geen herstelperiode noodzakelijk.