

Van Vliet Kastanjehout
Graaf van Lynden van
Sandenburgweg, Cothen

Landschappelijke inpassing

Primair
oppervlaktewater

Bloemrijk grasland

Houtsingel met boomvormers, 8-10 meter breed

Streekeigen soorten, zoals:
veldesdoorn (Acer campestre),
zwarte els (Alnus glutinosa),
schietwilg (Salix alba),
hazelaar (Corylus avellana),
gewone vogelkers (Prunus padus),
Gelderse roos (Viburnum opulus)

Haag: 1,2-1,4 m hoog

Streekeigen soorten, mix van bijv.:
veldesdoorn (Acer campestre),
meidoorn (Crataegus monogyna),
sleedoorn (Prunus spinosa) en/of
haagbeuk (Carpinus betulus)

Tamme kastanjes

Bosje met inheemse soorten, zoals
meidoorn, sleedoorn, hazelaar,
kardinaalsmuts, vlier en/of veldesdoorn

Wadi of open waterberging
en -zuivering

Hakhoutbosje, wordt elke 3-5 jaar afgezet.

Streekeigen soorten, zoals:
hazelaar (Corylus avellana), meidoorn (Crataegus monogyna),
schietwilg (Salix alba), geoorde wilg (Salix aurita), boswilg (Salix caprea),
grijze wilg (Salix cinerea), zwarte els (Alnus glutinosa)

Watergang voor
afwatering

Struinpad

Houtsingel met boomvormers, 8-10 meter breed

Streekeigen soorten, zoals:
veldesdoorn (Acer campestre),
zwarte els (Alnus glutinosa),
schietwilg (Salix alba),
hazelaar (Corylus avellana),
gewone vogelkers (Prunus padus),
Gelderse roos (Viburnum opulus)

Hoogstamboomgaard

Mix van streekeigen soorten, n.t.b.

Optioneel nieuw
fietspad



**buro
WAAL
BRUG**

ADVISEURS VOOR DE LEEFOMGEVING



datum: 11 maart 2024
schaal: 1.1000 (A2)