

Dit document bevat rekenresultaten van AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst berekende stikstofbijdragen per stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op basis van rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en/of stikstofoxide (NO_x).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer toelichting verwijzen wij u naar de website www.aerius.nl.

Berekening Vergunde situatie en Voorgenomen Omvang

- ▶ Kenmerken
- ▶ Samenvatting emissies
- ▶ Depositieresultaten
- ▶ Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Baltus	Westdijk 15, 1847 LH Zuidschermmer

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
Baltus	RaTjEnpKAsNv

Datum berekening	Rekenjaar	Rekenconfiguratie
21 oktober 2019, 16:19	2019	Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

	Situatie 1	Situatie 2	Vershil
NOx	-	-	-
NH ₃	3.077,30 kg/j	3.077,30 kg/j	-

Resultaten


Hectare met
hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied
Uw berekening heeft geen verschillen opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting

Vershil


Locatie
Vergunde situatie



Emissie
Vergunde situatie

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Stal 1 Landbouw Stalemissies	783,50 kg/j	-
2	Stal 3 Landbouw Stalemissies	176,00 kg/j	-
3	Stal 4 Landbouw Stalemissies	3,00 kg/j	-
4	Stal 5 Landbouw Stalemissies	396,00 kg/j	-
5	Stal 6 Landbouw Stalemissies	2,80 kg/j	-
6	Stal 9 Landbouw Stalemissies	1.716,00 kg/j	-

Locatie
Voorgenomen
Omvang



Emissie
Voorgenomen
Omvang

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Stal 1 Landbouw Stalemissies	783,50 kg/j	-
2	Stal 3 Landbouw Stalemissies	176,00 kg/j	-
3	Stal 4 Landbouw Stalemissies	3,00 kg/j	-
4	Stal 5 Landbouw Stalemissies	396,00 kg/j	-
5	Stal 6 Landbouw Stalemissies	2,80 kg/j	-
6	Stal 9 Landbouw Stalemissies	1.716,00 kg/j	-

Resultaten
stikstof
gevoelige
Natura 2000
gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		Verskil	Verskil op (bijna) overbelaste hexagonalen*
	Situatie 1	Situatie 2		
Noordhollands Duinreservaat	0,42	0,42	0,00	
Eilandspolder	0,25	0,25	0,00	
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder	0,11	0,11	0,00	
Polder Westzaan	0,07	0,07	0,00	
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske	0,06	0,06	0,00	
Schoorlse Duinen	0,06	0,06	0,00	
Duinen Den Helder-Callantsoog	0,05	0,05	0,00	
Naardermeer	0,04	0,04	0,00	
Zwanenwater & Pettemerduinen	0,03	0,03	0,00	
Kennemerland-Zuid	0,03	0,03	0,00	
Coepelduynen	0,02	0,02	0,00	
Oostelijke Vechtplassen	0,02	0,02	0,00	
IJsselmeer	0,02	0,02	0,00	
Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving	0,01	0,01	0,00	
Rottige Meenthe & Brandemeer	0,01	0,01	0,00	
Meijndel & Berkheide	0,01	0,01	0,00	
Botshol	0,01	0,01	0,00	
Rijntakken	0,01	0,01	0,00	
Sneekermeergebied	0,01	0,01	0,00	
Weerribben	0,01	0,01	0,00	

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil			Verskil op (bijna) overbelaste hexagonen*
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil	
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck	0,01	0,01	0,00	
Fochteloërveen	0,01	0,01	0,00	
Drents-Friese Wold & Leggelderveld	0,01	0,01	0,00	
Veluwe	0,01	0,01	0,00	
Alde Feanen	0,01	0,01	0,00	
Zwarte Meer	0,01	0,01	0,00	
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht	0,01	0,01	0,00	
Van Oordt's Mersken	0,01	0,01	0,00	
Wijnjeterper Schar	0,01	0,01	0,00	
Duinen en Lage Land Texel	0,01	0,01	0,00	
Solleveld & Kapittelduinen	0,01	0,01	0,00	
Holtingerveld	0,01	0,01	0,00	
Duinen Vlieland	0,01	0,01	0,00	
Olde Maten & Veerslootslanden	0,01	0,01	0,00	
De Wieden	0,01	0,01	0,00	
Norgerholt	0,01	0,01	0,00	
Zouweboezem	0,01	0,01	0,00	
Bakkeveense Duinen	0,01	0,01	0,00	
Dwingelderveld	0,01	0,01	0,00	
Witterveld	0,01	0,01	0,00	

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		Verskil	Verskil op (bijna) overbelaste hexagonen*
	Situatie 1	Situatie 2		
Sallandse Heuvelrug	0,01	0,01	0,00	
Drentsche Aa-gebied	0,01	0,01	0,00	
Vecht- en Beneden-Reggegebied	0,01	0,01	0,00	
Westduinpark & Wapendal	0,01	0,01	0,00	
Kolland & Overlangbroek	0,01	0,01	0,00	
Lingegebied & Diefdijk-Zuid	0,01	0,01	0,00	
Elperstroomgebied	0,01	0,01	0,00	
Boetelerveld	0,01	0,01	0,00	
Uiterwaarden Lek	0,01	0,01	0,00	
Drouwenerzand	0,01	0,01	0,00	
Mantingerzand	0,01	0,01	0,00	
Duinen Ameland	0,01	0,01	0,00	
Binnenveld	0,01	0,01	0,00	
Duinen Schiermonnikoog	0,01	0,01	0,00	
Waddenzee	0,01	0,01	0,00	
Voornes Duin	0,01	0,01	0,00	
Mantingerbos	0,01	0,01	0,00	
Biesbosch	0,01	0,01	0,00	
Landgoederen Brummen	0,01	0,01	0,00	
Noordzeekustzone	0,01	0,01	0,00	

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil			Verskil op (bijna) overbelaste hexagonen*
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil	
Duinen Terschelling	0,01	0,01	0,00	

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Resultaten
per
habitatype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige
Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Noordhollands Duinreservaat

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verschil	Verschil op (bijna) overbelaste hexagonen*
Situatie 1	Situatie 2			
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,48	0,48	0,00	
H2150 Duinheiden met struikhei	0,43	0,43	0,00	
H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,37	0,37	0,00	
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,31	0,31	0,00	
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,26	0,26	0,00	
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,21	0,21	0,00	
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,20	0,20	0,00	
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,17	0,17	0,00	
H7210 Galigaanmoerassen	0,16	0,16	0,00	
ZGH2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,15	0,15	0,00	
ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,15	0,15	0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,15	0,15	0,00	
H2190A Vochtige duinvalleien (open water)	0,11	0,11	0,00	
H2110 Embryonale duinen	0,10	0,10	0,00	
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,09	0,09	0,00	
H2120 Witte duinen	0,09	0,09	0,00	
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,09	0,09	0,00	
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,09	0,09	0,00	
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,09	0,09	0,00	
H2160 Duindoornstruwelen	0,09	0,09	0,00	

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil	Verskil op (bijna) overbelaste hexagonen*
	Situatie 1	Situatie 2		
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,05	0,05	0,00	

Eilandspolder

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil	Verskil op (bijna) overbelaste hexagonen*
	Situatie 1	Situatie 2		
H714oB Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,25	0,25	0,00	

Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil	Verskil op (bijna) overbelaste hexagonen*
	Situatie 1	Situatie 2		
H91Do Hoogveenbossen	0,12	0,12	0,00	
H401oB Vochtige heiden (laagveengebied)	0,11	0,11	0,00	
H714oB Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,08	0,08	0,00	

Polder Westzaan

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil	Verskil op (bijna) overbelaste hexagonen*
	Situatie 1	Situatie 2		
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,06	0,06	0,00	
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,06	0,06	0,00	
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,06	0,06	0,00	
H91Do Hoogveenbossen	0,06	0,06	0,00	
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,06	0,06	0,00	

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil	Verskil op (bijna) overbelaste hexagonen*
	Situatie 1	Situatie 2		
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,06	0,06	0,00	
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,06	0,06	0,00	
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,05	0,05	0,00	
H91Do Hoogveenbossen	0,05	0,05	0,00	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,05	0,05	0,00	
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,04	0,04	0,00	

Schoorlse Duinen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil	Verskil op (bijna) overbelaste hexagonalen*
	Situatie 1	Situatie 2		
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,42	0,42	0,00	
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,42	0,42	0,00	
H2150 Duinheiden met struikhei	0,25	0,25	0,00	
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,23	0,23	0,00	
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,18	0,18	0,00	
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,12	0,12	0,00	
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,11	0,11	0,00	
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,10	0,10	0,00	
H2120 Witte duinen	0,10	0,10	0,00	
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,10	0,10	0,00	
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,10	0,10	0,00	
H2160 Duindoornstruwelen	0,10	0,10	0,00	
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,07	0,07	0,00	
H2110 Embryonale duinen	0,06	0,06	0,00	
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,05	0,05	0,00	

Duinen Den Helder-Callantsoog

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Vershil	Vershil op (bijna) overbelaste hexagonen*
Situatie 1	Situatie 2			
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,12	0,12	0,00	
H7210 Galigaanmoerassen	0,09	0,09	0,00	
H6230 Heischrale graslanden	0,06	0,06	0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,06	0,06	0,00	
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,05	0,05	0,00	
H2150 Duinheiden met struikhei	0,05	0,05	0,00	
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,05	0,05	0,00	
H2180C Duinbossen (binnenduinarand)	0,04	0,04	0,00	
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,04	0,04	0,00	
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,03	0,03	0,00	
H2120 Witte duinen	0,03	0,03	0,00	
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,03	0,03	0,00	
H2110 Embryonale duinen	0,03	0,03	0,00	
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,02	0,02	0,00	
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,02	0,02	0,00	
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,02	0,02	0,00	
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,02	0,02	0,00	
H2160 Duindoornstruwelen	0,02	0,02	0,00	
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,02	0,02	0,00	

Naardermeer

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil	Verskil op (bijna) overbelaste hexagonen*
	Situatie 1	Situatie 2		
H91Do Hoogveenbossen	0,03	0,03	0,00	
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,03	0,03	0,00	
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,03	0,03	0,00	
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,03	0,03	0,00	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,03	0,03	0,00	
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,02	0,02	0,00	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,02	0,02	0,00	
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,02	0,02	0,00	
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,02	0,02	0,00	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,02	0,02	0,00	
H9999:94 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130;H3140)	0,02	0,02	0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,02	0,02	0,00	

Zwanenwater & Pettemerduinen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil	Verskil op (bijna) overbelaste hexagonen*
	Situatie 1	Situatie 2		
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,16	0,16	0,00	
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,10	0,10	0,00	
H2160 Duindoornstruwelen	0,08	0,08	0,00	
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,08	0,08	0,00	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,08	0,08	0,00	
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,08	0,08	0,00	
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,08	0,08	0,00	
H2150 Duinheiden met struikhei	0,07	0,07	0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,07	0,07	0,00	
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,07	0,07	0,00	
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,07	0,07	0,00	
ZGH2120 Witte duinen	0,06	0,06	0,00	
H2120 Witte duinen	0,06	0,06	0,00	
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,05	0,05	0,00	
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,05	0,05	0,00	
H7210 Galigaanmoerassen	0,05	0,05	0,00	
H9999:85 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230;H2130B;H6230;H2130B)	0,05	0,05	0,00	
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,05	0,05	0,00	
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,05	0,05	0,00	

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verschil	Verschil op (bijna) overbelaste hexagonalen*
	Situatie 1	Situatie 2		
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,05	0,05	0,00	
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,05	0,05	0,00	
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,05	0,05	0,00	
H2110 Embryonale duinen	0,03	0,03	0,00	


Kennemerland-Zuid

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil	Verskil op (bijna) overbelaste hexagonalen*
	Situatie 1	Situatie 2		
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,10	0,10	0,00	
ZGH218oA Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,08	0,08	0,00	
ZGH218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,08	0,08	0,00	
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,05	0,05	0,00	
H218oA Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,04	0,04	0,00	
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,04	0,04	0,00	
H216o Duindoornstruwelen	0,04	0,04	0,00	
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,04	0,04	0,00	
ZGH213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,04	0,04	0,00	
H211o Embryonale duinen	0,03	0,03	0,00	
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,03	0,03	0,00	
ZGH212o Witte duinen	0,03	0,03	0,00	
ZGH219oA Vochtige duinvalleien (open water)	0,03	0,03	0,00	
H219oA Vochtige duinvalleien (open water)	0,03	0,03	0,00	
H214oB Duinheiden met kraaihei (droog)	0,03	0,03	0,00	
H212o Witte duinen	0,03	0,03	0,00	
H9999:88 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H213oC;H714oB;H213oB)	0,02	0,02	0,00	
H217o Kruipwilgstruwelen	0,02	0,02	0,00	
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,02	0,02	0,00	

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Verskil op (bijna) overbelaste hexagonen*
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil	
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,02	0,02	0,00	
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,02	0,02	0,00	
H2150 Duinheiden met struikhei	0,02	0,02	0,00	
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,02	0,02	0,00	
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,02	0,02	0,00	
H7210 Galigaanmoerassen	0,01	0,01	0,00	
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,01	0,01	0,00	
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,01	0,01	0,00	

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Emissie
(per bron)
Vergunde situatie



Naam **Stal 1**
 Locatie (X,Y) **113024, 513608**
 Uitstoothoogte **5,0 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 NH₃ **783,50 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	58	NH ₃	13,000	754,00 kg/j
	C 1.100	overige huisvestingssystemen (Geiten; geiten ouder dan 1 jaar) (Overig)	5	NH ₃	1,900	9,50 kg/j
	K 1.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder)) (Overig)	4	NH ₃	5,000	20,00 kg/j




Naam **Stal 3**
 Locatie (X,Y) **113051, 513630**
 Uitstoothoogte **5,0 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 NH₃ **176,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	40	NH ₃	4,400	176,00 kg/j



Naam **Stal 4**
Locatie (X,Y) **113052, 513616**
Uitstoothoogte **5,0 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **3,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (Overig)	1	NH ₃	3,000	3,00 kg/j




Naam **Stal 5**
Locatie (X,Y) **113068, 513631**
Uitstoothoogte **5,0 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **396,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	90	NH ₃	4,400	396,00 kg/j




Naam **Stal 6**
Locatie (X,Y) **113056, 513574**
Uitstoothoogte **5,0 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **2,80 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg) (Overig)	4	NH ₃	0,700	2,80 kg/j



Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	132	NH3	13,000	1.716,00 kg/j

Emissie
(per bron)
Voorgenomen
Omvang



Naam **Stal 1**
Locatie (X,Y) **113024, 513608**
Uitstoothoogte **5,0 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **783,50 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	58	NH ₃	13,000	754,00 kg/j
	C 1.100	overige huisvestingssystemen (Geiten; geiten ouder dan 1 jaar) (Overig)	5	NH ₃	1,900	9,50 kg/j
	K 1.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder)) (Overig)	4	NH ₃	5,000	20,00 kg/j




Naam **Stal 3**
Locatie (X,Y) **113051, 513630**
Uitstoothoogte **5,0 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **176,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	40	NH ₃	4,400	176,00 kg/j



Naam **Stal 4**
Locatie (X,Y) **113052, 513616**
Uitstoothoogte **5,0 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **3,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (Overig)	1	NH ₃	3,000	3,00 kg/j




Naam **Stal 5**
Locatie (X,Y) **113068, 513631**
Uitstoothoogte **5,0 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **396,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	90	NH ₃	4,400	396,00 kg/j



Naam **Stal 6**
Locatie (X,Y) **113056, 513574**
Uitstoothoogte **5,0 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **2,80 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg) (Overig)	4	NH ₃	0,700	2,80 kg/j



Naam **Stal 9**
Locatie (X,Y) **113144, 513614**
Uitstoothoogte **5,0 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **1.716,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	132	NH ₃	13,000	1.716,00 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019_20191018_c53b8fdaa8

Database versie c53b8fdaa8

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg>