

**Quicksan Wet natuurbescherming
Huismansweg 10 te Schoorl**


Opdrachtgever: Dhr. C.H. Polle
Huismansweg 10
1871 CH Schoorl

Versienummer: 2.0

Datum: 14 juni 2021, aangepast op 5 oktober 2021

Auteur: mevrouw ir. L. van der Valk

Paraaf:



Colofon

Dresmé&vanderValk

Postbus 225

1970 AE IJmuiden

+31 (0)6 47570615

linda@dresmevandervalk.nl

www.dresmevandervalk.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch op geluidsband of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dresmé&vanderValk.

Inhoudsopgave

pagina

1	INLEIDING	4
1.1	AANLEIDING	4
1.2	DOEL	4
1.3	INDELING VAN DE RAPPORTAGE	4
2	WETTELIJK KADER	5
2.1	GEBIEDSBESCHERMING	5
2.2	BESCHERMDE SOORTEN	5
3	PROJECTBESCHRIJVING	8
3.1	LIGGING	8
3.2	BESCHRIJVING VAN HET PROJECT	8
4	BESCHERMDE GEBIEDEN	9
4.1	LIGGING TEN OPZICHTE VAN BESCHERMDE GEBIEDEN	9
4.2	EFFECTEN OP BESCHERMDE GEBIEDEN	10
5	ONDERZOEKSMETHODE	11
6	RESULTATEN	13
6.1	VLEERMUIZEN	13
6.2	BROEDVOGELS	14
6.3	GRONDGEBONDEN ZOOGDIEREN	15
6.4	FLORA	17
7	CONCLUSIE	18

1 INLEIDING

Op 14 mei 2021 is een Quickscan Wet natuurbescherming uitgevoerd voor een vrijstaande woning aan de Huismansweg 10 te Schoorl.

1.1 Aanleiding

De aanleiding van onderhavige onderzoek is het voornemen om de bestaande woning te slopen, waarna naar twee woningen worden gebouwd. Met de werkzaamheden kunnen negatieve effecten optreden voor beschermde plant- en of diersoorten. Mogelijk worden daarmee verblijfplaatsen van beschermde soorten zoals vleermuizen of huismus aangetast, waarbij strijdigheid met de Wet natuurbescherming kan ontstaan. De initiatiefnemer heeft op basis van de Zorgplicht een onderzoeksplicht. Onderhavige rapportage beschrijft het uitgevoerde oriënterende onderzoek naar beschermde soorten en gebieden.

1.2 Doel

Het doel van de Quickscan Wet natuurbescherming is meerledig:

- Vaststellen dan wel uitsluiten -voor zover mogelijk- van beschermde flora en fauna in het projectgebied en bepalen of een nader onderzoek nodig is.
- Vaststellen wat de mogelijke effecten zijn op beschermde flora en fauna en beschermde gebieden als gevolg van de herontwikkeling;
- Indien als gevolg van de renovatie en sloop negatieve effecten te verwachten zijn, dient te worden bepaald of een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming benodigd is.

1.3 Indeling van de rapportage

De Quickscan Wet natuurbescherming bestaat uit zeven hoofdstukken. Het wettelijk kader van natuurbescherming is te vinden in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 is het projectgebied en het voorgenomen initiatief beschreven. Hoofdstuk 4 beschrijft of sprake is van gebiedsbescherming. In hoofdstuk 5 is de methode van het onderzoek uiteengezet en in hoofdstuk 6 zijn de onderzoeksresultaten beschreven. Hoofdstuk 7 bestaat uit de conclusies.

2 WETTELIJK KADER

De Wet natuurbescherming heeft als doel het beschermen van flora en fauna, (natuur)gebieden en bossen. De Wet natuurbescherming bevat niet alleen regels ten aanzien van beschermde soorten flora en fauna en 'ruimtelijke ingrepen', maar ook andere onderwerpen zoals bezit en handel, gebiedsbescherming, houtopstanden, beheer en schadebestrijding. Voor plannen die betrekking hebben op 'ruimtelijke ingrepen', zoals sloop- en renovatiewerkzaamheden en nieuwbouwplanen zijn de onderwerpen soortenbescherming, gebiedsbescherming en soms ook houtopstanden relevant. Hierna zijn deze onderwerpen op een rij gezet.

2.1 Gebiedsbescherming

Voor gebiedsbescherming is weinig veranderd ten opzichte van de Natuurbeschermingswet 1998. Bij ruimtelijke ingrepen dient te worden nagegaan of initiatieven negatieve effecten kunnen hebben op aangewezen beschermde Natura 2000-gebieden. Gedacht kan worden aan negatieve effecten die samengaan met activiteiten in of aan de randen van een Natura 2000-gebied, zoals verstoring door licht of geluid. Een activiteit die op grotere afstand een negatief effect kan hebben op beschermde gebieden, is bijvoorbeeld de uitstoot van vermestende stoffen. Een wijdverspreid negatief effect is de depositie van stikstof die wordt uitgestoten door het verkeer of verwarmingsketels van gebouwen. Door de toename van stikstof verandert de vegetatie. Soorten als grassen, bramen en brandnetels profiteren hiervan en verdringen plantensoorten die zich gespecialiseerd hebben in schrale omstandigheden. Hierdoor neemt de biodiversiteit af.

Een andere vorm van gebiedsbescherming komt voort uit aanwijzing van een gebied als Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur of EHS). Voorts worden bijzondere provinciale natuurgebieden en bijzondere provinciale landschappen door de provincies aangewezen. Voor dergelijke gebieden geldt dat het natuurbelang prioriteit heeft en dat andere activiteiten niet mogen leiden tot aantasting van de natuurdoelen of landschappelijke waarden. Anders dan voorheen is de status als NNN verankerd in de Wet natuurbescherming.

2.2 Beschermde soorten

Europese soorten (bijlage IV Habitatrichtlijn, bijlage 1 verdrag van Bonn en bijlage 2 van verdrag van Bern)

De soorten die beschermd zijn op basis van het verdrag van Bern en Bonn zijn gelijkgesteld aan de soorten die genoemd zijn in de Habitatrichtlijn. Deze (Europese) soorten mogen niet **opzettelijk**¹ mogen worden beschadigd. Het is niet toegestaan deze soorten **opzettelijk** te vangen, te verstoren of te doden. Ook is het niet toegestaan eieren te vernietigen, te rapen of te vervoeren.

• ¹Met opzet wordt bedoeld: het willens en wetens met aanmerkelijke kans aanvaarden dat gedraging schadelijke gevolgen heeft voor beschermde soorten.

Beschermde planten uit deze categorie mogen niet **opzettelijk** worden geplukt of van hun groeiplaats worden verwijderd. Let op! Voor de Europees beschermde soorten geldt dat het niet is toegestaan vaste rust- of verblijfplaatsen **opzettelijk of niet**, te verstoren. Daarmee is het direct noodzakelijk te onderzoeken of binnen een plangebied sprake is van vaste verblijfplaatsen, zoals die van vleermuizen. Indien vaste verblijfplaatsen aanwezig zijn is een ontheffing nodig. Ontheffing voor activiteiten waarmee de verbodsbepalingen worden overtreden, kan alleen worden verleend op basis van de volgende voorwaarden:

1. Er bestaat geen andere bevredigende oplossing;
2. Er is sprake van een groot algemeen belang;
3. Effecten op populatieniveau zijn uitgesloten.

Het bevoegd gezag ten aanzien van het verlenen van ontheffingen is de provincie waarin de activiteit plaats vindt. In de ontheffing kunnen voorwaarden worden opgenomen ten aanzien van compenserende en mitigerende maatregelen.

Vogels

Alle in het wild levende vogels, hun eieren en vaste verblijfplaatsen mogen niet **opzettelijk** worden gevangen, beschadigd of verstoord. Ook geldt een Zorgplicht en dat houdt in dat verstoring tot een minimum wordt beperkt. De nuance tussen wat opzettelijk is en wanneer men kan worden aangesproken op de Zorgplicht, zal uit jurisprudentie moeten blijken.

Let op Een aantal vogelsoorten zijn beschermd op basis van het verdrag van Bern en Bonn. Voor deze soorten geldt dat nesten -tijdens het broeden of anderzijds als vaste rustplaats in gebruik zijn- niet (met of zonder opzet) mogen worden verstoord. Voorbeelden van soorten die genoemd zijn in het verdrag van Bern en die veel voorkomen nabij gebouwen zijn roodborst, pimpelmees en winterkoning. Het broedseizoen loopt globaal van 15 maart t/m 15 juli. Broeden begint enige tijd voor het leggen van het ei en eindigt nadat het nest niet meer wordt gebruikt. Sommige vogelsoorten hebben een tweede of derde leg. Ook is de start en einde van het broeden en gebruik van het nest verschillend per vogelsoort. Daarmee dient rekening gehouden te worden. Soorten zoals steenuil (bijlage 2 verdrag van Bern) gebruikt het nest bijvoorbeeld het hele jaar als vaste rustplaats en is daarmee het hele jaar beschermd. Ook kunnen foerageergebieden rondom nesten onderdeel zijn van vaste verblijfplaatsen. Activiteiten waarmee een van de verbodsbepalingen voor vogels wordt overtreden kunnen -uiteeraard onder voorwaarden- worden toegestaan op basis van een door de provincie verleende ontheffing.

Andere soorten

In bijlage A en B van de Wet natuurbescherming is een lijst opgenomen van beschermde fauna respectievelijk flora. Deze soorten mogen niet **opzettelijk** worden gevangen, beschadigd, verstoord of gedood respectievelijk **opzettelijk** van hun groeiplaats worden verwijderd.

Anders dan voor de Europese soorten, geldt een milder beschermingsregime: Vaste rust- of verblijfplaatsen van deze soorten mogen **niet opzettelijk** worden verstoord of vernietigd.

Bij wet zijn de bosmuis, de huisspitsmuis en de veldmuis die in en rondom gebouwen leven, vrijgesteld van de verboden.

De provincies kunnen generieke vrijstelling verlenen door het aangeven van een lijst van vrijgestelde beschermde soorten voor ruimtelijke ingrepen en bestendig beheer.

Ook kan de provincie ontheffing verlenen voor:

- Het opzettelijk verstoren van individuen of vaste rust- of verblijfplaatsen van deze soorten, bijvoorbeeld in het kader van het voorkomen van schade aan gewassen.
- Het opzettelijk verstoren van individuen of vaste rust- of verblijfplaatsen van soorten die niet zijn vrijgesteld bij provinciale verordening.

In de provincie Noord-Holland zijn alle diersoorten in de categorie 'andere soorten'² en die algemeen voorkomen, vrijgesteld bij ruimtelijke ingrepen. De volgende soorten die hoge eisen stellen aan hun omgeving zijn niet vrijgesteld:

Zoogdieren

boomarter
bunzing
das
edelhert
damhart
eekhoorn
eikelmuis
grijze zeehond
gewone zeehond
grote bosmuis
hermelijn
molmuis
steenarter
veldspitsmuis
waterspitsmuis
wezel
wild zwijn
alle vleermuisensoorten

Amfibieën en reptielen

alpenwatersalamander
vinpootsalamander
vuursalamander
adder
hazelworm
levendbarende hagedis
ringslang

libellen

bosbeekjuffer
beekkrombout
donkere waterjuffer
gevlekte glanslibel
hoogveenglanslibel
Kempense heidelibel
speerwaterjuffer

Dagvlinders

aardbeivlinder
bosparelmoervlinder
bruin dikkopje
bruine eikenpage
donker pimperlmoervlinder
duinparelmoervlinder
gentiaanblauwtje
grote parelmoervlinder
grote vos
grote vuurvlinder
grote weerschijnvlinder
iepenpage
kleine heivlinder
kleine ijsvogelvlinder
kommavvlinder
pimperlmoervlinder
sleedoornpage
spiegeldikkopje

veenbesblauwtje
veenbesparelmoervlinder
veenhooibeestje
veldparelmoervlinder
zilveren maan

vissen

beekdonderpad
beekprik
elrits
Europese rivierkreeft
gestippelde alver
grote modderkruiper
kwabaal

kevers

vliegend hert

² Behalve vogelsoorten

3 PROJECTBESCHRIJVING

3.1 Ligging

Het projectgebied bestaat uit een vrijstaande woning met omringende tuin met het adres Huismansweg 10 te Schoorl. De projectlocatie is gelegen in een groene woonomgeving van Schoorl in de provincie Noord-Holland. In afbeelding 1 en 2 is de ligging van het plangebied weergegeven.

Afbeelding 1 en 2. Ligging plangebied



3.2 Beschrijving van het project

De woning gebouwd in 1966 met het adres Huismansweg 10 wordt in zijn geheel gesloopt, waarna twee nieuwe woningen worden gebouwd. De aanwezige vrijstaande garage en schuur om het achtergelegen terrein blijven behouden. Een kleine schuur wordt gesloopt. Enkele bomen worden gekapt. Er is geen open water aanwezig. In afbeelding 3 is de bestaande situatie weergegeven en in afbeelding 4 de nieuwe situatie.

Afbeelding 3 en 4. Bestaande bestemmingsplan en beoogde bestemmingsplan



4 BESCHERMDE GEBIEDEN

4.1 Ligging ten opzichte van beschermde gebieden

Het projectgebied is niet in het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur, hierna NNN) of Natura 2000-gebieden gelegen, zie afbeelding 5 en 6. Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied is Schoorlse Duinen op circa 330 meter afstand van het projectgebied. Verder weg gelegen gebieden zijn: Noordhollands Duinreservaat op circa 3 kilometer, Abtskolk & De Putten op circa 4 kilometer, Noordzeekustzone op circa 5 kilometer, en Zwanenwater & Pettemerduinen op circa 8 kilometer afstand van het projectgebied.

Het meest nabijgelegen NNN ligt eveneens op circa 330 meter afstand van het projectgebied, zie afbeelding 6. Het projectgebied is niet gelegen in een gebied dat is aangewezen als belangrijk weidevogelleefgebied, strategische reservering natuur of recreatie rond de steden.

Afbeelding 5: Natura 2000-gebieden nabij het projectgebied (Locatie rode cirkel. www.atlasleefomgeving.nl)



Afbeelding 6: NNN nabij het projectgebied (Locatie rode cirkel. www.atlasleefomgeving.nl)



4.2 Effecten op beschermde gebieden

Vanwege de kleinschaligheid van het projectgebied en het ongewijzigd gebruik van het perceel als woonfunctie, kunnen negatieve effecten op beschermde gebieden bij voorbaat worden uitgesloten. Voor de bepaling van de stikstofdepositie op het nabijgelegen Schoorlse duinen (en verder weg gelegen gebieden) zal een aparte stikstofdepositieberekening worden uitgevoerd.

5 ONDERZOEKSMETHODE

De Quickscan is uitgevoerd door een ecooloog met kennis op het gebied van vleermuizen en broedvogels, mevrouw ir L. van der Valk. Voor het archiefonderzoek is onder andere NDFF en eerder uitgevoerde onderzoeken naar beschermde flora en fauna in de omgeving meegenomen. De te slopen woning en de tuin zijn met daglicht op 14 mei 2021 onderzocht. Gelet is op mogelijke invliegopeningen en is de woning ter plaatse beoordeeld op de geschiktheid als leefgebied voor vleermuizen, huismus en gierzwaluw.

De weersomstandigheden waren met 13° C, zware bewolking, geen neerslag, weinig wind, voldoende om een biotoopanalyse uit te voeren. De afbeeldingen 7-14 geven een indruk van het plangebied.

Afbeelding 7. Huismansweg 10 gezien vanaf de weg



Afbeelding 8. De te slopen woning



Afbeelding 9. De oostzijde van de woning



Afbeelding 10. De zuidzijde van de woning



Afbeelding 11. De te slopen schuurtje**Afbeelding 12. De tuin aan de zuidoostzijde****Afbeelding 13. De te behouden garage****Afbeelding 14. De tuin aan de oostzijde**

Het projectgebied is in een bomenrijk gebied gelegen, met rondom het perceel vrijstaande woningen op ruime percelen. Het aanwezige groen is als tuin in gebruik. Beschermd exemplaren van de soortengroepen vissen, amfibieën, reptielen en insecten kunnen op voorhand worden uitgesloten en worden buiten beschouwing gelaten. Tijdens het onderzoek is daarom aandacht besteed aan mogelijke locaties voor verblijfplaatsen van vleermuizen, grondgebonden zoogdieren, flora en jaarrond beschermde vogelnesten van soorten zoals gierwaluw en huismus.

Vleermuizen verblijven in bomen en gebouwen. Bomen zijn geschikt als verblijfplaats als deze holtes bevatten die naar boven toe zijn ingerot of in grote (verticale) spleten. Gebouwen zijn geschikt als verblijfplaats als een spouw aanwezig is, een holle ruimte aanwezig is tussen betimmering en de muur of dak, achter daklijsten, achter loodslabben of tussen dakpannen en de betimmering aan de binnenzijde van het dak. Sommige soorten zoals gewone grootoorvleermuis en baardvleermuis hangen ook in grote ruimten zoals kerkzolders en fabriekshallen. Broedvogels zoals huismus en gierwaluw broeden onder dakpannen (of losse loodslabben), als deze een geschikte opening bevatten.

6 RESULTATEN

6.1 Vleermuizen

Archiefonderzoek

Op basis van verspreidingsgegevens kunnen in de omgeving van Schoorl zeven soorten vleermuizen verwacht worden; gewone- en ruige dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, gewone grootoorvleermuis, watervleermuis en meervleermuis. Uit archiefonderzoek komen tientallen waarnemingen van foeragerende gewone- en ruige dwergvleermuizen en laatvlieger naar voren in en in de omgeving van het projectgebied. Er komen geen verblijfplaatsen van vleermuizen nabij het projectgebied naar voren uit het archiefonderzoek.

Veldonderzoek

Het dak heeft dakpannen die weinig toegankelijk is, de dakpannen sluiten goed aan. In de schoorsteen zijn open stootvoegen aanwezig, die toegankelijk zijn voor vleermuizen, zie afbeelding 13. Het dak is via de zijpannen niet bereikbaar, maar wel onder de daklijsten, zie afbeelding 14. De omgeving met veel inheemse bomen en afwissling in bosranden maakt de directe omgeving geschikt als foerageergebied van vleermuizen. Vaste verblijfplaatsen van vleermuizen kunnen derhalve niet worden uitgesloten. Een nader onderzoek naar vleermuizen is nodig. In de te verwijderen schuur (afbeelding 11), zijn geen geschikte invliegopeningen aanwezig.

Afbeelding 13. De muren hebben een spouw en in de schoorsteen zijn grote open stootvoegen aanwezig



Afbeelding 14. De muren hebben onder de daklijsten kleine openingen die groot genoeg zijn voor vleermuizen



6.2 Broedvogels

Archiefonderzoek


Er komen vanuit de NDFF en waarneming.nl, telmee.nl en verspreidingsatlassen, geen broedlocaties van gebouwbewonende broedvogels naar voren in of in de omgeving van het projectgebied.

Veldonderzoek

Tijdens het veldonderzoek is een nest van de witte kwikstaart vastgesteld in het dak van de te slopen woning. Het nest van de witte kwikstaart is vastgesteld op basis van een paartje die met prooidieren ergens onder het dak verdween. De soort nestelt vooral op het platteland, vaak op gebouwen of onder bruggen, en met een voorkeur voor de kleinschaliger landschapstypen. Hij bewoont echter ook natuurgebieden, waaronder stuifzanden, duinen of grote kaalslagen in bos, en soms ook stedelijk gebied. Het nest van deze soort is buiten het broedseizoen (april tot en met eind juli) niet beschermd. Sinds de jaren '90 van de vorige eeuw was sprake van een sterke aantalsafname van 5% per jaar, de laatste jaren is de populatie stabiel (Sovon).

Huismus is niet gezien in de tuin en wordt ook niet verwacht, het bosrijke biotoop maakt de kans op voorkomen in het plangebied erg klein. In tegenstelling tot de witte kwikstaart heeft de huismus een sterke voorkeur voor woonwijken. In onderstaande afbeelding te zien dat de habitatvoorkeur van de huismus voor bos niet populair is. (260 keer vaker geteld in bebouwd gebied dan in bosgebied). Het veldbezoek is uitgevoerd in de broedperiode van de huismus en als broedgevallen van huismus aanwezig waren geweest, dan was dat ongetwijfeld gezien. Huismussen broeden in kolonies en een kolonie huismussen is niet te missen. Ook wordt gierzwaluw niet verwacht vanwege de vele bomen, maar ook omdat geschikte invliegopeningen onder dakpannen ontbreken.

Afbeelding 15. Habitatvoorkeur van de huismus (van Manen 2020)



Figuur 7. Habitatvoorkeur van Huis- en Ringmus, weergegeven als de gemiddelde aantallen op punten die voor tenminste de helft waren omgeven door het betreffende habitat. *Habitat preference of House and Tree Sparrows, expressed as the mean number of birds at points dominated (>50%) by the specific habitats. Wet natural areas refer to wet open areas such as moors and marshes. Dry natural areas refer to dunes and heathland.*

In de struiken in de tuin komen mogelijk nesten voor van kleine zangvogels, zoals heggenmus. De nesten van deze soorten en die van de witte kwikstaart op het dak zijn in het broedseizoen beschermd. Deze soorten maken elk jaar een nieuw nest, waardoor een nest alleen in het broedseizoen (globaal van 15 maart t/m 15 juli) beschermd is. Indien gehouden wordt aan de zorgplicht, zie hoofdstuk 7, zijn geen aanvullende maatregelen nodig.

6.3 Grondgebonden zoogdieren

Archiefonderzoek

In de omgeving van het projectgebied, zijn waarnemingen bekend van de beschermde zoogdiersoorten boommarter, wezel en hermelijn. Bunzing wordt op basis van het relatief droge gebied (zandgrond zonder sloten) niet verwacht. Ook wordt de steenmarter niet verwacht. De provincie Noord-Holland is nog niet vastgesteld als onderdeel van het leefgebied van de steenmarter. Het aantal betrouwbare waarnemingen sinds 2018 op één hand te tellen³. De eerste waarneming van de steenmarter boven het Noordzeekanaal is in 2015 gemeld.

Veldonderzoek

Tijdens het veldbezoek is naast een geschikt biotoop eveneens gelet op mogelijke sporen van kleine marterachtigen en boommarter, zoals uitwerpselen en latrines. Deze zijn niet waargenomen.

Ten noorden van het plangebied biedt het bos een geschikt gebied voor kleine marterachtigen en dieper in het bos ook de boommarter, zie afbeelding 16. De wijk is te typeren als bos met woonfunctie. Er zijn veel houtwallen, heggen en stukken bos aanwezig. In de rustige en bosrijke delen van de wijk kunnen foerageergebied en verblijfplaatsen van kleine marterachtigen in houtwallen en ondergronds in de droge bosgrond verwacht worden. Kleine marterachtigen kunnen migrerend langs de randen van alle percelen in de wijk verwacht worden.

Afbeelding 16. Zicht op het perceel ten noorden van het plangebied, waar geen ruimtelijke ingrepen plaats vinden



Echter, op de locatie waar de woning wordt gesloopt en twee woningen worden gebouwd (zie afbeeldingen 3 en 4), is geen geschikt biotoop aanwezig voor kleine marterachtigen. Een groot deel van de tuin waar de sloop en nieuwbouw plaatsvinden, is verhard (oprijlaan, terras en paden) en dagelijks zijn mensen aanwezig door de huidige bewoning, zie afbeelding 17 en 18. Prooidieren van

³ <https://www.zoogdiervereniging.nl/nieuws/2018/eerste-beelden-van-steenmarter-het-noordhollands-duinreservaat>

kleine marterachtigen zoals woelmuizen en eekhoorn voor de boomarter ontbreken hier en er is onvoldoende beschutting of rommelhoeken aanwezig.

Afbeelding 17. Zicht op de locatie waar sloop en nieuwbouw plaatsvindt



Afbeelding 18. Zicht op de locatie waar sloop en nieuwbouw plaatsvindt



Het projectgebied is geschikt voor algemeen voorkomende zoogdiersoorten zoals egel en diverse muizensoorten. Omdat de sloop- en bouwactiviteiten zich concentreren binnen een tiental meter van de bestaande bebouwing die in gebruik is als woning, kan de aanwezigheid van beschermde grondgebonden zoogdieren op voorhand worden uitgesloten door de aanwezigheid van menselijke activiteiten. Met de sloop en nieuwbouw blijven de randen van de percelen, intact waar mogelijk kleine marterachtigen migreren. Ook heeft de sloop-nieuwbouw geen effecten op mogelijk verblijfplaatsen van kleine marterachtigen buiten het plangebied. Een nader onderzoek naar kleine marterachtigen is niet nodig, omdat met de sloop-nieuwbouw negatieve effecten op kleine marterachtigen zijn uitgesloten.

6.4 Flora

Archiefonderzoek

De aanwezigheid van beschermde plantensoorten kan op basis van verspreidingsgegevens worden uitgesloten.

Veldonderzoek

Het biotoop dat bestaat uit bomen en tuinplanten en is ongeschikt voor beschermde plantensoorten. Beschermde plantensoorten worden derhalve niet verwacht.

7 CONCLUSIE

Onderhavige Quickscan Wet natuurbescherming richt zich op een te slopen vrijstaande woning met omringende tuin aan de Huismansweg 10 te Schoorl. Als gevolg van de sloop en nieuwbouw worden geen effecten op de Ecologische Hoofdstructuur of Natura 2000-gebieden verwacht.

Omdat open water ontbreekt kunnen beschermde insecten, vissen, amfibieën en reptielen op voorhand worden uitgesloten. Omdat geschikte invliegopeningen in de vorm van open stootvoegen en kieren onder de daklijsten aanwezig zijn, kunnen verblijfplaatsen van vleermuizen momenteel niet worden uitgesloten. Een nader onderzoek naar vleermuizen is nodig om te bepalen of de te slopen woning door vleermuizen gebruikt (kunnen) worden.

De aanwezige gebouwen zijn ongeschikt als broedlocatie voor gierzwaluw. Huismus is ten tijde van het veldonderzoek in het broedseizoen niet gezien en wordt op basis van de bosrijke omgeving niet verwacht. Een nader onderzoek of ontheffing van de Wet natuurbescherming is ook voor huismus en gierzwaluw niet nodig. Vaste verblijfplaatsen van beschermde zoogdiersoorten kunnen in het plangebied op basis van de aanwezige menselijke activiteit en het ontbreken van beschutting uitgesloten worden. Mogelijke migratieroutes langs de randen van de percelen blijven intact. Een nader onderzoek naar kleine marterachtigen is niet nodig. Ook de aanwezigheid van beschermde plantensoorten kunnen uitgesloten worden.

Zorgplicht

Aan de zorgplicht wordt voldaan als:

- Nader onderzoek naar vleermuizen wordt uitgevoerd.
- Tijdens de werkzaamheden kleine zoogdieren de gelegenheid krijgen om weg te vluchten.
- In het dak (witte kwikstaart) en de aanwezige bomen en struiken kunnen mogelijk algemene vogelsoorten tot broeden komen. Indien het dak en groen wordt verwijderd, wordt geadviseerd om dit alleen uit te voeren als geen sprake is van broedgevallen. De meeste broedvogels broeden tussen 15 maart en 15 juli. Sommige soorten zoals bosuil broeden eerder of later zoals houtduif, maar nesten van deze soorten zijn niet waargenomen en worden ook niet ter plaatse van het plangebied verwacht. Met het vermijden van het broedseizoen wordt voorkomen dat nesten worden beschadigd en dat sprake is van overtreding van de Wet natuurbescherming.

Literatuurlijst

- Beer, R. de en M. van Maanen. VanderGoesenGroot. 2015. Heerweg 65-69 te Schoorl. Inventarisatie broedvogels met jaarrond beschermde nesten en vleermuizen in 2015, 18 p.
- Manen, van, W. Huismus en Ringmus in Nederland meer dan 40 jaar gevolgd. Limosa, 93(2020):49-58
- NDFF.
- Netwerk Groene Bureau gedragscode (2010), zie <http://netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/gedragscode>

Websites geraadpleegd op 13-04-2021:

- waarneming.nl
- www.sovon.nl