

QUICKSCAN SOORTENBESCHERMING

HOLLAAN 2 TE CASTRICUM

Colofon

Quicksan soortenbescherming

Projectnummer: EX.15.1267

Versie: 1

Datum: 10-05-2021

Opdrachtnemer

Agrifirm NWE BV
Bedrijfsontwikkeling Exlan
Waalkade 33
5347 KR Oss

Postbus 300
5340 AH Oss

Locatie

Hollaan 2 Castricum

Opdrachtgever

V.O.F. G.C.J. Veldt en W.M.M. Veldt-Min
Hollaan 2
1902 RW Castricum

Contactpersoon

Anton van Zeeland
T: 088 – 488 2929
F: 088 – 488 2102
E: a.vanzeeland@agrifirm.com

Uitvoerders

Ing. A. van Zeeland
L. Bos

Collegiale check

AvZ

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN VERVEELVOUDIGD DOOR MIDDEL VAN DRUK, FOTOKOPIE, MICROFILM, GELUUIDSBAND, ELEKTRONISCH OF OP WELKE ANDERE WIJZE DAN OOK, EN EVENMIN IN EEN GEAUTOMATISEERD GEGEVENSBESTAND WORDEN OPGESLAGEN, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN AGRIFIRM EXLAN.

Inhoudsopgave

Quickscan soortenbescherming

INLEIDING	4
HOOFDSTUK 1	6
TOETSINGSKADER	6
HOOFDSTUK 2	9
ONDERZOEKSRESULTATEN	9
HOOFDSTUK 3	23
CONCLUSIE	23
LITERATUUR	24
WAARNEMINGEN	25
EFFECTEN INDICATOR SOORTEN	31
PLAN PROJECTLOCATIE	38

Inleiding

Planbeschrijving

Aanleiding

Het plangebied is gelegen aan de Hollaan 2 Castricum. Op dit adres is de het bedrijf van de familie Veldt gevestigd. Het bedrijf kent een melkveetak, maar daarnaast is er ook een camping aanwezig met 25 kampeerplekken. De plannen omvatten het bouwen van een nieuwe ligboxenstal en het vergroten van het bouwblok. In dit kader wordt door het bevoegde gezag een toets aan de soortenbescherming noodzakelijk geacht. Bij de uitvoering van de voorgenomen ingrepen moet rekening worden gehouden met het huidige voorkomen van de, op grond van de Wet natuurbescherming, beschermde soorten. Als de voorgenomen ingreep leidt tot het overtreden van verbodsbepalingen betreffende beschermde soorten, moet vrijstelling of ontheffing worden verkregen.

De voorliggende quickscan bevat een inventarisatie van de huidige aanwezigheid van beschermde soorten planten en dieren in en om het plangebied. Tevens worden de te verwachten effecten van de ingreep in het plangebied beoordeeld.

Plangebied

Het plangebied ligt in de plaats Castricum in de gemeente Castricum. Het plangebied bevindt zich buiten de verkeerskundige en stedenbouwkundige bebouwde kom van Castricum.



• Afbeelding 1: luchtfoto plangebied (bron: streetsmart.cyclomedia.com/streetsmart)

Onderzoeksmethode

Om een goede indicatie van de natuurwaarden binnen het plangebied te krijgen, wordt het onderzoek in verschillende stappen uitgevoerd. Op basis van bronnenonderzoek is nagegaan of er wettelijk beschermde planten- of diersoorten in het gebied voor kunnen komen waaraan extra aandacht geschonken dient te worden tijdens het terreinbezoek.

Na het bronnenonderzoek is een verkennend terreinbezoek gebracht aan het plangebied. Hierbij is, op basis van de gegevens van het literatuuronderzoek, beoordeeld voor welke soorten het gebied daadwerkelijk een geschikte habitat biedt en daarmee welke soorten er daadwerkelijk voor kunnen komen. Vervolgens zijn de mogelijke effecten op de verwachte beschermde soorten beschreven.

Op basis van de doorlopen procedures zijn conclusies getrokken met betrekking tot de eventuele negatieve effecten en/of obstakels inzake de Wet natuurbescherming.

Op dinsdag 11 mei 2021 is de locatie tussen 11:00 tot 12:00 uur ter plaatse geïnventariseerd, om te onderzoeken of het plangebied een zodanig belangrijke status heeft dat een aanvullend veldonderzoek noodzakelijk is. Op het moment van inventarisatie was het 15 graden Celsius en wisselend bewolkt.

Op basis van terreinkenmerken is beoordeeld of het terrein geschikt is voor de, in de regio voorkomende, beschermde soorten.

Doelstelling

Om een indicatie te krijgen van de effecten die de bouwwerkzaamheden hebben op de natuurwaarden binnen het plangebied, dienen de volgende vragen te worden beantwoord:

1. Welke wettelijk beschermde soorten komen in het plangebied voor? Welke status hebben deze soorten?
2. Welke invloed heeft de geplande ingreep in het betreffende gebied op de beschermde soorten en komt daarmee de staat van instandhouding in gevaar?
3. Hoe dient omgegaan te worden met eventuele negatieve effecten van het plan op wettelijk beschermde planten- en diersoorten, en welke vervolgstappen zijn nodig?

1 Toetsingskader

Wet natuurbescherming

De bescherming van natuur is in Nederland vastgelegd in nationale wetgeving. De nationale wetgeving is een Nederlandse implementatie van de belangrijkste Europese wetgevingselementen. Per 1 januari 2017 zijn de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998 vervangen door de Wet natuurbescherming. De uitvoering van deze nieuwe wet is grotendeels in handen van de provincies gekomen.

1.1 Gebiedsbescherming

De Wet natuurbescherming noemt bekende maar ook enkele nieuwe soorten natuurgebieden die bescherming behoeven: de Natura 2000-gebieden, het Natuurnetwerk Nederland (NNN), bijzondere provinciale natuurgebieden en landschappen, bijzondere nationale natuurgebieden en de nationale parken. Bij ontwikkelingen met name in het buitengebied moet rekening worden gehouden met het al dan niet van toepassing zijn van de beschermingsregimes van deze natuurgebieden. Ieder gebied kent een eigen beschermingsregime dat afzonderlijk gewogen dient te worden in relatie tot plannen, projecten en andere handelingen met mogelijk nadelige effecten voor de beschermde natuurwaarden.

Natura 2000-gebieden

De bekendste natuurgebieden zijn de Natura 2000-gebieden, zij kennen tevens het meest strikte beschermingsregime. De basis voor Natura 2000 zijn de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. In Nederland zijn 164 gebieden als Natura 2000-gebied aangewezen. Voor ieder gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen bepaald die betrekking kunnen hebben op de bescherming van specifieke flora en fauna alsook leefgebieden van soorten. Alle projecten en handelingen binnen of buiten de gebiedsgrenzen mogen geen verstorend of verslechterend effect hebben op de instandhoudingsdoelstellingen. Voor de voorgenomen ontwikkeling is hier, voor zover van toepassing, separaat aan getoetst. In deze rapportage wordt hier verder niet op ingegaan.

Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS) is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. De provincies zijn belast met de taak een dergelijk netwerk tot stand te laten te komen en in stand te laten. De uitvoering hiervan is hoofdzakelijk gestuurd vanuit de ruimtelijke ordening (provinciale verordeningen). Binnen het Natuurnetwerk Nederland geldt een “nee, tenzij”- benadering.

Overige gebieden

Naast de bovengenoemde gebieden kunnen gebieden aangewezen worden als ‘bijzondere provinciale natuurgebieden’, ‘bijzondere provinciale landschappen’ of ‘nationaal park’. De bescherming van deze gebieden vindt net als bij het NNN plaats via het ruimtelijk spoor. Daarnaast kan een gebied aangewezen worden als ‘bijzonder nationaal gebied’, een soort voorloper van de aanwijzing als Natura 2000-gebied. De bescherming van deze gebieden stemt dan ook overeen met de bescherming van Natura 2000-gebieden.

1.2 Soortenbescherming

De Wet natuurbescherming deelt soorten in drie beschermingsregimes in. Daarnaast zijn er vrijgestelde soorten en jaarrond beschermde vogelnesten.

- 1) Beschermingsregime soorten vogelrichtlijn
- 2) Beschermingsregime soorten habitatrichtlijn
- 3) Beschermingsregime andere soorten
- 4) Vrijgestelde soorten
- 5) Jaarrond beschermde vogelnesten

Vogelrichtlijn

Onder de soorten van de Vogelrichtlijn vallen alle van nature in Nederland in het wild levende vogels. Het is verboden om:

- Opzettelijk vogels te doden of te vangen;
- Opzettelijk vogelnesten, -rustplaatsen en – eieren te vernielen of te beschadigen of vogelnesten weg te nemen;
- Eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben;
- Opzettelijk vogels te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

Habitatrichtlijn

Onder de soorten van de Habitatrichtlijn vallen soorten die genoemd zijn in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage I van het Verdrag van Bonn. In de Bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd.

Wat betreft deze soorten is het verboden om:

- Opzettelijk dieren te doden of te vangen;
- Opzettelijk dieren te verstoren;
- Opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen;
- Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
- Opzettelijk planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken, te verzamelen, af te snijden, te onttwortelen of te vernielen.

Ook is het verboden deze soorten te verkopen, te vervoeren voor verkoop, te verhandelen, te ruilen of te kopen, tenzij het gaat om gefokte of gekweekte dieren of planten.

Andere soorten

Onder het beschermingsregime andere soorten vallen soorten waarvan er geen Europese verplichting tot bescherming is. Dit zijn soorten die vanuit nationaal belang extra bescherming behoeven. Het beschermingsniveau van deze soorten kan per provincie verschillen.

Het is verboden om:

- 1) Opzettelijk dieren te doden of te vangen;
- 2) Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
- 3) Opzettelijk (vaat)planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken te verzamelen, af te snijden, te onttwortelen of te vernielen.

Provincies hebben de bevoegdheid om bij provinciale verordening vrijstelling te verlenen voor nationaal beschermde soorten.

Vrijgestelde soorten

De verboden zijn niet van toepassing op de bosmuis, de huisspitsmuis en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevinden. Ook vallen de zwarte rat, bruine rat, huismuis, de mol en exoten niet onder beschermingsregime van de Wet natuurbescherming en mogen opzettelijk gedood en gevangen worden. Daarnaast geldt, zoals hierboven reeds aangegeven, dat provincies de bevoegdheid hebben vrijstelling te verlenen voor bepaalde soorten.

Jaarrond beschermde vogelnesten

De opgestelde lijst met jaarrond beschermde nesten voor vogels is een beleidsdocument dat voortvloeit uit de voormalige Flora- en faunawet en meegenomen is onder de Wet natuurbescherming. De nesten zijn ingedeeld in categorieën (1 t/m 5) waarvan de categorie 1 t/m 4 jaarrond beschermd zijn. Nesten in categorie 5 zijn enkel beschermd bij afwezigheid van voldoende alternatieven.

- 1) Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats
- 2) Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
- 3) Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
- 4) Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen.
- 5) Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen.

1.3 Houtopstanden

De regels van de Boswet zijn grotendeels onveranderd opgenomen in de Wet natuurbescherming. Een houtopstand is een zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend, die een oppervlakte van 10 are of meer beslaat ofwel een rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat.

Buiten de bescherming vallen:

- houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom (voor deze wet);
- houtopstanden op erven of in tuinen
- fruitbomen en windschermen om boomgaarden;
- naaldbomen bedoeld als kerstbomen en niet ouder dan twintig jaar
- kweekgoed;
 - uit populieren of wilgen bestaande wegbeplantingen,
 - beplantingen langs waterwegen, en
 - eenrijige beplantingen langs landbouwgronden;
- Het dunnen van een houtopstand;
- uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die zijn bedoeld voor de productie van houtige biomassa indien zij:
 - ten minste eens per tien jaar worden geoogst;
 - bestaan uit minstens tienduizend per hectare per beplantingseenheid
 - bestaande uit een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee meter;
 - zijn aangelegd na 1 januari 2013.

2

Onderzoeksresultaten

2.1 Bronnenonderzoek

Gegevens van websites als www.waarneming.nl zijn geraadpleegd voor achtergrondinformatie. Een groot aantal amateurs en professionals publiceert op deze bekende websites zijn natuurwaarnemingen, die worden gecontroleerd door een validatiecommissie. Zodoende zijn de waarnemingen uit deze bronnen redelijk betrouwbaar, maar moeilijk te verifiëren. De waarnemingen geven eventueel wel een indicatie van soorten waar tijdens het veldonderzoek extra aandacht aan besteed dient te worden.


Natuurnetwerk Nederland

Het natuurbeheerplan is een beleidskader om het Europese, rijks- en provinciale natuur- en landschapsbeleid te realiseren. Het gaat hier om bestaande natuurgebieden, gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt, landbouwgebieden worden ingericht en beheerd volgens agrarisch natuurbeheer en de Natura 2000-gebieden.

Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland en buiten andere natuurgebieden zoals Natura 2000. Het meest dichtbijgelegen Natura 2000-gebied is het Natura 2000-gebied "Noord-Hollands Duinreservaat".



• Afbeelding 2: ligging Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000
(bron: atlasleefomgeving.nl/kaarten)



• Afbeelding 3: ligging plangebied (bron: ruimtelijkeplannen.nl.)

Het plangebied heeft op grond van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Castricum’ de enkelbestemming ‘Agrarisch met waarden’ en de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 2’.

2.2 Veldonderzoek

Op verschillende punten in het plangebied zijn waarnemingen verricht. Tijdens het veldbezoek is het gebied beoordeeld op de aanwezigheid van beschermde soorten en de habitatgeschiktheid voor beschermde soorten. Er is extra aandacht besteed aan de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen en vogelnesten.

De ecologische factoren in de omgeving zijn met behulp van een digitale fotocamera vastgelegd. Om de flora en fauna te kunnen determineren, is gebruik gemaakt van eigen kennis en literatuur.

• Afbeelding 4: locatie nieuwe stal



• Afbeelding 5: Plaats nieuw te bouwen ligboxenstal



• Afbeelding 6: Bewoonde nestkast kerkuil in werktuigenloods



- Afbeelding 7: Vaste mestopslag achterzijde paardenstal buurman met veel boerenzwaluwen



- Afbeelding 8: Woning waar verschillende vogelnesten zitten



• Afbeelding 9: Camping omringd door erfbeplanting




• Afbeelding 10: Sanitaire voorzieningen voor gasten



Afbeelding 11: Overgang stal camping



• Afbeelding 12: Binnenzijde ligboxenstal



- Afbeelding 13: Aanzicht vanaf de weg



- Afbeelding 14: Binnenzijde melkveestal



Flora algemeen

Bij de planlocatie zijn beplantingen aangetroffen. De beplanting is voornamelijk aanwezig om de camping heen, deze beplanting bestaat voornamelijk uit zwarte els, esdoorn en beuk. Met de voorgenomen wijzigingen zal deze beplanting zo blijven.

Grondgebonden zoogdieren

Specifiek wordt bekeken of binnen de betreffende inrichting verwacht kan worden of er streng beschermde zoogdieren; steenmarter, bunzing, hermelijn, wezel, eekhoorn, bever en das kunnen worden aangetroffen. Op de planlocatie waren enkele katten aanwezig.

Steenmarter

De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor de steenmarter. Steenmarters gebruiken hoozolders, loze ruimtes onder het dak, schuurtjes en dergelijke, als verblijfplaats. Een steenmarter heeft binnen zijn territorium verscheidene verblijfplaatsen. Daarnaast laten steenmarters enorm veel sporen achter. Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen, zoals uitwerpselen of prooiresten aangetroffen die duiden op het gebruik van de onderzoekslocatie als vaste rust- of verblijfplaats door deze soort.

Kleine marterachtigen

De onderzoekslocatie biedt geen geschikte verblijflocaaties voor de hermelijn, wezel en bunzing. De soorten maken gebruik van oude holen van onder andere mollen en muizen, maar ook houtwallen, steenhopen en ruimtes onder boomwortels. Desbetreffende soorten hebben binnen hun territorium verscheidene verblijfplaatsen. Tijdens het veldbezoek zijn er geen marters of sporen van marters aangetroffen op de onderzoek locatie. Echter, dit betekent niet dat het gebied niet potentieel in gebruik is door de hermelijn, wezel en/of bunzing als migratieroute. Gezien de onderzoekslocatie kleiner is dan één hectare kan gesteld worden dat deze geen essentieel onderdeel uitmaakt van het leefgebied van een van genoemde soorten (Bouwens 2017).

Eekhoorn

De onderzoekslocatie is vanwege de afwezigheid van voldoende bomen niet geschikt als habitat voor de eekhoorn. Er staan te weinig bomen rondom de projectlocatie. Tevens worden er met de werkzaamheden geen bomen verwijderd. Een negatief effect als gevolg van de werkzaamheden is uitgesloten.

Bever

Voor de bever is op de onderzoekslocatie geen geschikt habitat aanwezig. Vaste rust- en verblijfplaatsen van de bever kunnen worden uitgesloten.

Das

Tijdens het veldbezoek zijn op de onderzoekslocatie en de directe omgeving geen loop- of eetsporen, latrines en/of wissels aangetroffen die duiden op de aanwezigheid en/of het gebruik van de onderzoekslocatie door de das. Dassen zullen eerder hun leefgebied hebben in de nabijgelegen natuurgebieden en de aansluitende weilanden. Verstoring ten aanzien van de das als gevolg van de voorgenomen ingreep is niet aan de orde.

Het voorkomen van overige grondgebonden zoogdieren waarvoor geen vrijstelling geldt, is tijdens het veldbezoek niet vastgesteld. Vanwege het ontbreken van geschikt habitat kan het voorkomen ervan redelijkerwijs worden uitgesloten.

Vleermuizen

Het plangebied is zeer nauwkeurig beoordeeld op de mogelijke waarde voor vleermuizen. Hierbij is gelet op de geschiktheid van de aanwezige bebouwing als verblijfplaats voor deze dieren: aanwezigheid van spouwgangen en andere openingen in muren en daken, vetstrepen, uitwerpselen en prooiresten bij gevelopeningen.

Verblijfsruimte voor vleermuizen hebben specifieke voorwaarden zoals een stabiele temperatuur en het tochtvrij zijn. Bij vleermuizen worden vier verblijfplaatsen onderscheiden; winterverblijven, zomerverblijven, kraamverblijven en paarverblijven. Aan de winterverblijven

worden de hoogste eisen gesteld, daarna de kraamverblijven, dan de zomerverblijven en tenslotte de paarverblijven, waarbij de vleermuizen een zeer korte tijd op een bepaalde locatie kunnen verblijven.

De dakconstructie van de (bedrijfs)gebouwen bestaan uit daken met niet geïsoleerd damwandprofiel welke niet stabiel blijven qua temperatuur en gedurende de dag aan enorme temperatuurschommelingen onderhevig zijn. De dakconstructie is hierdoor geen geschikte verblijfsplaats voor vleermuizen.

Er zijn in en om de stallen geen sporen (vetstrepen, uitwerpselen, prooiresten) aangetroffen. Naast de onderzoekslocatie bevindt zich het woonhuis. Eventuele verblijfsplaatsen hierin ondervinden door de afstand en de aard van de ingreep geen hinder.

Foerageerhabitat

De onderzoekslocatie zal, gelet op de aanwezige habitat, gebruikt kunnen worden door in de omgeving verblijvende vleermuizen om te foerageren. De plannen zullen echter geen aantasting van belangrijk foerageerhabitat vormen. Door de voorgenomen ingreep zal het aanbod van foerageermogelijkheden niet in het geding komen. In de directe omgeving is meer geschikt foerageerhabitat voor vleermuizen aanwezig in de vorm van bomenrijen en bosranden.

Vliegroutes

Vleermuizen maken veelal gebruik van lijnvormige (donkere) landschapselementen zoals houtsingels, beken en lanen om zich te verplaatsen tussen verblijfsplaatsen en foerageergebieden. Doordat dergelijke lijnvormige elementen ontbreken op de onderzoekslocatie, worden er geen potentiële vliegroutes verstoord.

Vogels

Tijdens het bezoek is met name gelet op de aanwezigheid van nesten en rustplaatsen voor vogels.

Er zijn broedvogels waarvan de nesten ook beschermd zijn op het moment dat ze niet voor de voortplanting in gebruik zijn. Binnen het agrarische (buiten)gebied kunnen dit zijn: boomvalk, buizerd, havik, sperwer, wespendif, huismus, steenuil en de kerkuil.

Boomvalk

De boomvalk is een soort die geen eigen nest maakt, maar broedt in gebruikte kraaien- en/of eksternesten in verschillende typen bos(randen) of in solitaire bomen, populierensingels, of op erven. De soort komt vooral voor in open en halfopen landschappen zoals boerenland en dorpen, alsook in buitenwijken van steden. De bomen op- en nabij de projectlocatie zijn gecontroleerd op dergelijke nesten, deze zijn niet aangetroffen. Evenmin worden er met de beoogde werkzaamheden bomen verwijderd. Negatieve effecten op de boomvalk als gevolg van de werkzaamheden zijn derhalve niet aan de orde.

Buizerd en havik

De buizerd en havik broeden op grote nesten van ongeveer een meter in doorsnede en 60 centimeter diep. Dergelijke nesten zijn tijdens het veldbezoek niet waargenomen. Een broedgeval van de buizerd en havik is daarom uit te sluiten. Eveneens worden er met de beoogde werkzaamheden geen bomen gekapt, zodat het wegnemen van een jaarrond beschermd nest kan worden uitgesloten.

Wespendief en sperwer

De wespendif is doorgaans gebonden aan grotere bosgebieden van zowel loof- als naaldbomen. Bij voorkeur is er afwisseling binnen het bosgebied aanwezig in de vorm van open plekken. De sperwer broedt bij voorkeur meer verborgen in naaldbomen. Beide situaties zijn op de onderzoekslocatie niet aanwezig. Gezien de ligging van de onderzoek locatie binnen agrarisch gebied en de afwezigheid van voldoende dekking is een nestplaats van de sperwer

of wespendif niet te verwachten. Eveneens zijn er tijdens het veldbezoek geen nesten aangetroffen. Een broedgeval van zowel de wespendif als de sperwer zijn uitgesloten.

Steenuil en kerkuil

De kerkuil en steenuil hebben een voorkeur voor cultuurlandschappen met allerlei landschapselementen die voor afwisseling zorgen. Beide soorten broeden in gebouwen en gebruiken ook graag speciale nestkasten. Daarnaast worden door de steenuil ook wel boomholten gebruikt, mits er zich grote holten in bevinden. De gebouwen zijn in zijn geheel gecontroleerd op de aanwezigheid van steen- en kerkuilen en is vooral gelet op de aanwezigheid van sporen; braakballen, veren en uitwerpselen. Er zijn (sporen van) steen- en kerkuilen waargenomen. De nestkast van de kerkuil in de werktuigenberging wordt beheerd door de vogelwerkgroep. De nestkast is bewoond. Echter vormt het voorgenomen plan op planlocatie geen hinder voor de kerkuil. Er is geen sprake van een afname van belangrijk foerageergebied. Er blijft er voldoende foerageergebied aanwezig in de omgeving.

Huismus

Ook voor de huismus, die veel te vinden is in agrarisch gebied en vooral gebonden aan gebouwen is, is het nest jaarrond beschermd. De huismussen broeden in het woonhuis.

Overige broedvogels

De beplanting op de onderzoekslocatie kan nestgelegenheid bieden aan broedvogelsoorten zoals de merel en winterkoning. De nesten van deze soorten zijn alleen beschermd op het moment dat ze als zodanig in gebruik zijn. In het woonhuis broedt ook een spreeuw. Ook zijn er nesten gevonden van de boerenwaluw, deze broeden voornamelijk in de rundveestal en in de schuur op Hollaan 4, die naast de locatie ligt, broeden ook veel boerenwaluwen. Als laatste broedt er een scholekster op het platte dak van de woning.

Er zijn vogels gezien en gehoord, namelijk:

• Tabel 1: overzicht waargenomen vogels

Soort
Turkse tortels
Putters
Koolmees
Groenling
Zwartkop
Huismus
Ekster
Spreeuw
Kievit
Kauw
Merel
Wilde eens
Boerenwaluw
Scholekster
Kerkuil

• Tabel 2: overzicht waargenomen vogelnesten

Soort
Boerenwaluw (categorie indeling nestbescherming: 5)
Huismus (categorie indeling nestbescherming: 2)

Kerkuil (categorie indeling nestbescherming: 3)
Spreeuw (categorie indeling nestbescherming: 5)

Uitleg bij tabel:

Categorie 1:	Jaarrond gebruikte nesten (steenuil)
Categorie 2:	Zeer honkvaste koloniebroeders of afhankelijk bebouwing
Categorie 3:	Zeer honkvaste broeders of afhankelijk bebouwing (geen kolonie)
Categorie 4:	Vogels die ieder jaar terugkeren naar specifiek nest
Categorie 5:	Honkvaste broeders, maar voldoende flexibel

Reptielen, amfibieën en vissen

Er zijn tijdens het terreinbezoek geen reptielen, amfibieën en/of vissen waargenomen.

Voor de in Nederland voorkomende reptielsoorten zoals de hazelworm, de levendbarende hagedis en ringslang biedt de onderzoekslocatie geen geschikt habitat. Deze soorten worden vrijwel alleen aangetroffen in specifieke natuurgebieden.

Dit geldt ook voor de specifieke beschermende amfibieënsoorten die veel eisen stellen aan zijn habitat; alpenwatersalamander, heikikker, vinpootsalamander, poelkikker en rugstreeppad. Deze zijn allen uit te sluiten omdat de betreffende locatie geen goed habitat biedt voor deze soorten door het ontbreken van voldoende oppervlaktewater.

De onderzoekslocatie vormt wel een geschikt habitat voor algemene amfibieënsoorten als de bruine kikker en de gewone pad. De sloot die zich aan de zuidzijde van de onderzoekslocatie bevindt kan voortplantingshabitat bieden aan beide soorten. Op de onderzoek locatie kunnen deze soorten beschutting vinden tussen de begroeiing en onder de takken- of stenenhopen. Voor algemene amfibieënsoorten geldt in het kader van de Wet natuurbescherming een vrijstelling, zodat een ontheffing bij verstoring niet noodzakelijk is. Het is echter wel zaak om aandacht te schenken aan de zorgplicht.

Vissen

Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater op de onderzoek locatie kan deze soortgroep buiten beschouwing worden gelaten.

Overige

Van de overige soortgroepen, zoals dagvlinders, insecten en libellen, kan worden aangenomen dat deze soorten gedurende het jaar in het plangebied aanwezig kunnen zijn of dit gebied in de migratieroute hebben liggen.

Afhankelijk van het seizoen zijn mogelijk algemene soorten te vinden op/of binnen de planlocatie. Specifieke beschermende soorten zijn voornamelijk afhankelijk van specifieke terreinkenmerken met specifieke biotopen. Binnen het plangebied is een dergelijk biotoop niet aanwezig.

2.3 Effecten van de ingreep

De effecten op beschermde soorten zijn onderzocht op basis van het voornemen binnen het plangebied.

Flora algemeen

Er is geen bijzondere flora aangetroffen binnen het plangebied, negatieve effecten zijn uitgesloten.

Grondgebonden zoogdieren

Verstoring van algemene zoogdieren vindt mogelijk plaats. De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor een aantal soorten grondgebonden zoogdieren. Het gaat daarbij om algemene soorten als de egel, konijn en diverse muissoorten. Op de planlocatie zijn diverse katten aangetroffen. De verblijfsplaatsen van deze soorten worden door de voorgenomen ingreep echter niet aangetast.

Vleermuizen

Er zijn geen sporen van vleermuizen aangetroffen waaruit blijkt dat de gebouwen als verblijfplaats worden gebruikt. Nader onderzoek in het kader van de soortenbescherming is niet noodzakelijk.

Vogels

Door de voorgenomen ingreep worden geen vogels en jaarrond beschermde nesten aangetast.

Reptielen, amfibieën en vissen

Er zijn geen reptielen, amfibieën en/of vissen waargenomen. De instandhoudingsdoelstellingen komen niet in het gedrang.

Overige

Omdat er geen geschikt biotoop is waargenomen voor overige beschermde soorten, zijn negatieve effecten uitgesloten. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

3

Conclusie en aanbevelingen

Het natuuronderzoek is gebaseerd op inventarisatiegegevens van derden, literatuuronderzoek en een verkennend veldbezoek aan het plangebied. Het beeld dat uit het onderzoek naar voren is gekomen vormt voldoende basis om gefundeerd uitspraken te doen over de gevolgen van de voorgenomen werkzaamheden voor beschermde soorten en gebieden.

3.1 Conclusie

Voor de bepaling van de effecten en voor de beantwoording van de vraag of men in strijd komt met de Wet natuurbescherming, wordt de relatie gelegd tussen het initiatief met deze wet door waar mogelijk antwoord te geven op de volgende vragen:

1. *Welke wettelijk beschermde soorten komen in het plangebied voor? Welke status hebben deze soorten?*
2. *Welke invloed heeft de geplande ingreep in het betreffende gebied op de beschermde soorten en de staat van instandhouding?*
3. *Hoe dient omgegaan te worden met eventuele negatieve effecten van het plan op wettelijk beschermde planten- en diersoorten, en welke vervolgstappen zijn nodig?*

Het voornemen zoals opgenomen in de inleiding en de daarbij behorende werkzaamheden, zal naar verwachting geen negatief effect hebben op de staat van instandhouding van beschermde soorten. Binnen het plangebied zijn geen (verblijfplaatsen van) strikt beschermde soorten aangetroffen die door de werkzaamheden worden beïnvloed.

Uit de effectenbeschrijving blijkt dat er geen onevenredige directe of indirecte gevolgen zijn van de voorgenomen activiteiten op de voortplanting en instandhouding van beschermde dieren/of plantsoorten. Lokaal zullen mogelijk algemene soorten uit het plangebied trekken op zoek naar een vervangende biotoop. De bouw van de nieuwe ligboxenstal zal na het broedseizoen gerealiseerd worden.

Voor aanvang van de werkzaamheden dient derhalve geen aanvullend onderzoek plaats te vinden. Een ontheffing met betrekking tot aantasting van beschermde soorten is niet nodig. De werkzaamheden kunnen leiden tot een beschadiging of vernietiging van mogelijke verblijfplaatsen en/of verstoring van eventueel aanwezige algemene soorten. Een algehele vrijstelling op basis van de Verordening natuurbescherming voor ruimtelijke ontwikkelingen is hierop van toepassing. De algemene zorgplicht blijft onverminderd van toepassing.




Literatuur

- Broekhuizen, S., Hoekstra, B., Laar, van, V., Smeenk, C. & Thissen, J.B.M., 1992
Atlas van de Nederlandse zoogdieren. Stichting uitgeverij van de KNNV, Utrecht.
- Europese Gemeenschappen,
Richtlijn no 92/409 inzake het behoud van de vogelstand. Brussel, 1979.
- Europese Gemeenschappen,
Richtlijn no 92/43 inzake instandhouding van de natuurlijke habitat en de wilde flora en fauna. Brussel, 1992.
- Provinciale Verordening (Wet) natuurbescherming
- Hollander, H., & Geest, van der, P., 1994.
Rode-Lijst van bedreigde zoogdieren in Nederland.
Red data book of threatened mammals in the Netherlands. Vereniging voor Zoogkunde en Zoogdierbescherming, Utrecht.
- Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Ministerie van Volkshuisvesting.
Ruimtelijke Ordening en milieu, 2004. Nota Ruimte.
- De Nederlandse libellen, Nederlandse Fauna, deel 4
Nationaal historisch museum, KNNV-uitgeverij (2002)
- Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ)
- Vleermuizen en planologie, Zoogdierverseniging (2010)
- Wet natuurbescherming.
Vastgesteld d.d. 1 januari 2017.
- www.waarneming.nl
- www.synbiosys.alterra.nl
- www.atlasleefomgeving.nl
- www.ravon.nl
- www.sovon.nl
- www.google.nl
- www.ndff.nl
- www.floron.nl
- www.ruimtelijkeplannen.nl
- www.natura2000.nl
- www.ecologica.eu

1 Bijlage

Waarnemingen

Castricum - Castricumerpolder Zuid Noord-Holland



Details	Waarnemingen	Foto's	Geluiden	Soorten gezien	Ranglijst waarnemers	Projectbezoeken
---------	--------------	--------	----------	----------------	----------------------	-----------------

2020-05-10	2021-05-01	selecteer een soort ▾	Alle soortgroepen ▾	Alle zeldzaamheden ▾
Zoek:	waarnemingen van iedereen ▾	Filter	Wij filters	Als kaart ☐ Toon geavanceerd

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2021-05-20 14:05	▲ Gierzwaluw - <i>Apus apus</i>	2 adult, foeragerend, gezien	De Oude Venne	Piet Hollenberg	■
2021-05-20 11:30	▲ Veldzuring - <i>Rumex acetosa</i>	1 vegetatief, natuurlijk, veldwaarneming	De Oude Venne	Wessel Peters	📷
2021-05-19 14:35	▲ Grauwe Gans - <i>Anser anser</i>	1 adult, gezien	De Oude Venne	Piet Hollenberg	📷
2021-05-19 14:31	▲ Knobbelzwaan - <i>Cygnus olor</i>	1 adult, foeragerend, gezien	De Oude Venne	Piet Hollenberg	📷
2021-05-19 19:58	▲ Nijlgans - <i>Alopochen aegyptiaca</i>	1 gezien	Castricumerpolder Zuid	CS Roselaar	📷
2021-05-19 11:01	▲ Bergeend - <i>Tadorna tadorna</i>	1 adult, adult in broedbiotoop, gezien	Castricumerpolder Zuid	CS Roselaar	📷
2021-05-19 20:34	▲ Slobeend - <i>Spatula clypeata</i>	3 opvliegend, gezien	Castricumerpolder Zuid	Johannes Klinkenberg	■ 📷
2021-05-19 14:25	▲ Slobeend - <i>Spatula clypeata</i>	2 adult, paar in broedbiotoop, gezien	De Oude Venne	Piet Hollenberg	📷
2021-05-19 19:56	▲ Krakeend - <i>Mareca strepera</i>	1 ♂ adult, foeragerend, gezien	Castricumerpolder Zuid	CS Roselaar	📷
2021-05-19 14:25	▲ Krakeend - <i>Mareca strepera</i>	2 adult, paar in broedbiotoop, gezien	De Oude Venne	Piet Hollenberg	📷
2021-05-19 14:25	▲ Wilde Eend - <i>Anas platyrhynchos</i>	2 adult, paar in broedbiotoop, gezien	De Oude Venne	Piet Hollenberg	📷
2021-05-19 14:23	▲ Waterhoen - <i>Gallinula chloropus</i>	1 adult, gezien	De Oude Venne	Piet Hollenberg	📷
2021-05-19 14:25	▲ Meerkooit - <i>Fulica atra</i>	2 adult, paar in broedbiotoop, gezien	De Oude Venne	Piet Hollenberg	📷
2021-05-19 20:41	▲ Kievit - <i>Vanellus vanellus</i>	1 gezien en gehoord	Castricumerpolder Zuid	Johannes Klinkenberg	📷 📷
2021-05-19 14:25	▲ Kievit - <i>Vanellus vanellus</i>	2 adult, paar in broedbiotoop, gezien	De Oude Venne	Piet Hollenberg	📷
2021-05-19 11:01	▲ Kievit - <i>Vanellus vanellus</i>	2 adult zomerkleed, baltsend / zingend, gezien	Castricumerpolder Zuid	CS Roselaar	📷
2021-05-19 14:31	▲ Kauw - <i>Coloeus monedula</i>	2 adult, foeragerend, gezien	De Oude Venne	Piet Hollenberg	📷
2021-05-19 14:31	▲ Spreeuw - <i>Sturnus vulgaris</i>	2 adult, foeragerend, gezien	De Oude Venne	Piet Hollenberg	📷
2021-05-19 14:31	▲ Gele Kwikstaart - <i>Motacilla flava</i>	1 adult, foeragerend, gezien	De Oude Venne	Piet Hollenberg	■
2021-05-19 19:56	▲ Witte Kwikstaart - <i>Motacilla alba</i>	1 adult, foeragerend, gezien	Castricumerpolder Zuid	CS Roselaar	📷
2021-05-19 10:23	▲ Veelkleurig vergeet-mij-nietje - <i>Myosotis discolor</i>	1	De Oude Venne	Frans ten Berge	📷 📷

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2021-05-18 12:33	■ Oeverloper - <i>Actitis hypoleucos</i>	1	De Grootte Ven	Frans ten Berge	📷
2021-05-18 13:22	▲ Raapzaad - <i>Brassica rapa</i>	1	Heemskerker Noordbroekpolder	Linda	✅ 📷
2021-05-18 11:22	■ Dotterbloem - <i>Caltha palustris</i>	1	De Oude Venne	Frans ten Berge	📷
2021-05-18 12:12	▲ Slipbladige ooievaarsbek - <i>Geranium dissectum</i>	1	Castricumerpolder Zuid	Cees de Vries	📷
2021-05-18 12:12	▲ Slipbladige ooievaarsbek - <i>Geranium dissectum</i>	1	Castricumerpolder Zuid	Cees de Vries	✅ 📷
2021-05-18 13:23	▲ Witte dovenetel - <i>Lamium album</i>	1	Heemskerker Noordbroekpolder	Linda	✅ 📷
2021-05-18 11:41	▲ Waterzuring - <i>Rumex hydrolapathum</i>	1	Castricumerpolder Zuid	Frans ten Berge	✅ 📷
2021-05-17 10:32	▲ Bergeend - <i>Tadorna tadorna</i>	1 ♂ adult, adult in broedbiotoop, gezien	Castricumerpolder Zuid	CS Roselaar	📷
2021-05-17 10:31	▲ Krakeend - <i>Mareca strepera</i>	1 adult winterkleed, foeragerend, gezien	De Maden	CS Roselaar	📷
2021-05-17 10:31	▲ Kievit - <i>Vanellus vanellus</i>	1 adult zomerkleed, gezien	De Maden	CS Roselaar	📷
2021-05-17 11:34	▲ Raapzaad - <i>Brassica rapa</i> ?	1	De Grootte Ven	Wim	📷
2021-05-16 10:04	■ Kluut - <i>Recurvirostra avosetta</i>	23	De Grootte Ven	Micha de Heus	📷
2021-05-16 20:50	■ Kleine Plevier - <i>Charadrius dubius</i>	4 baltsend / zingend	De Grootte Ven	Rob van Bemmelen	📷
2021-05-16 10:20	■ Kleine Plevier - <i>Charadrius dubius</i>	2	De Grootte Ven	Micha de Heus	📷
2021-05-16 10:19	■ Kleine Plevier - <i>Charadrius dubius</i>	3 pas uitgevlogen/dons jongen	De Grootte Ven	Onne Muller	📷
2021-05-16 10:19	■ Kleine Plevier - <i>Charadrius dubius</i>	3 pas uitgevlogen/dons jongen	De Grootte Ven	Micha de Heus	📷
2021-05-16 20:43	■ Oeverloper - <i>Actitis hypoleucos</i>	1	De Grootte Ven	Rob van Bemmelen	📷
2021-05-16 13:01	▲ Visdief - <i>Sterna hirundo</i>	1 jagend, gezien en gehoord	De Grootte Ven	Marion Geerts	📷
2021-05-16 10:25	▲ Visdief - <i>Sterna hirundo</i>	10	De Grootte Ven	Onne Muller	■
2021-05-16 10:25	▲ Visdief - <i>Sterna hirundo</i>	10	De Grootte Ven	Micha de Heus	■
2021-05-16 10:41	■ Bosrietzanger - <i>Acrocephalus palustris</i>	2 roepend	De Grootte Ven	Onne Muller	■
2021-05-16 10:41	■ Bosrietzanger - <i>Acrocephalus palustris</i>	2 roepend	De Grootte Ven	Micha de Heus	■
2021-05-16 05:23	■ Nachttegaal - <i>Luscinia megarhynchos</i>	1 baltsend / zingend	Castricumerpolder Zuid	Rob van Bemmelen	■
2021-05-16 12:53	▲ Gele Kwikstaart - <i>Motacilla flava</i>	2 gezien en gehoord	De Grootte Ven	Marion Geerts	✅ 📷
2021-05-16 09:57	▲ Gele Kwikstaart - <i>Motacilla flava</i>	1	De Grootte Ven	Micha de Heus	■

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2021-05-15 16:21	▲ Bergeend - <i>Tadorna tadorna</i>	1 adult, rustend, gezien	Castricumerpolder Zuid	CS Roselaar	📷
2021-05-15 16:22	▲ Kievit - <i>Vanellus vanellus</i>	1 adult zomerkleed, baltsend / zingend, gezien	Castricumerpolder Zuid	CS Roselaar	📷
2021-05-15 16:21	▲ Kievit - <i>Vanellus vanellus</i>	3 adult zomerkleed, adult in broedbiotoop, gezien	De Maden	CS Roselaar	📷
2021-05-15 15:45	▲ Bruine Kiekendief - <i>Circus aeruginosus</i>	1 ♂ foeragerend	De Maden	Hans Groot	■
2021-05-15 20:21	■ Bosrietzanger - <i>Acrocephalus palustris</i>	1 baltsend / zingend, gehoord	Castricumerpolder Zuid	Roef Mulder	■ 🗨
2021-05-15 20:21	■ Bosrietzanger - <i>Acrocephalus palustris</i>	1 baltsend / zingend	Castricumerpolder Zuid	Roef Mulder	■ 🗨
2021-05-15 16:06	■ Bosrietzanger - <i>Acrocephalus palustris</i>	1 baltsend / zingend	Castricumerpolder Zuid	Hans Groot	■
2021-05-14 20:31	▲ Bergeend - <i>Tadorna tadorna</i>	2	De Groote Ven	Theo Admiraal	📷
2021-05-14 10:52	▲ Bergeend - <i>Tadorna tadorna</i>	2 adult zomerkleed, foeragerend, gezien	De Groote Ven	Willem Jas	📷 📷
2021-05-14 20:31	▲ Slobeend - <i>Spatula clypeata</i>	2	De Groote Ven	Theo Admiraal	📷
2021-05-14 20:33	▲ Wilde Eend - <i>Anas platyrhynchos</i>	1	De Groote Ven	Theo Admiraal	📷
2021-05-14 15:51	▲ Meerkoeit - <i>Fulica atra</i>	1 recent gebruikt nest, gezien	Castricumerpolder Zuid	Externe bron	📷 📷
2021-05-14 20:33	▲ Scholekster - <i>Haematopus ostralegus</i>	2	De Groote Ven	Theo Admiraal	📷
2021-05-14 20:36	■ Kluut - <i>Recurvirostra avosetta</i>	24	De Groote Ven	Theo Admiraal	📷
2021-05-14 10:19	■ Kluut - <i>Recurvirostra avosetta</i>	1 adult zomerkleed, gezien	De Groote Ven	Willem Jas	📷 📷
2021-05-14 20:32	▲ Kievit - <i>Vanellus vanellus</i>	8	De Groote Ven	Theo Admiraal	📷
2021-05-14 20:40	■ Kleine Plevier - <i>Charadrius dubius</i>	2	De Groote Ven	Theo Admiraal	📷
2021-05-14 10:14	■ Kleine Plevier - <i>Charadrius dubius</i>	1 adult zomerkleed, foeragerend, gezien	De Groote Ven	Willem Jas	📷 📷
2021-05-14 20:32	▲ Grutto - <i>Limosa limosa</i>	8	De Groote Ven	Theo Admiraal	📷
2021-05-14 10:27	▲ Grutto - <i>Limosa limosa</i>	1 adult zomerkleed, gezien en gehoord	De Groote Ven	Willem Jas	📷 🗨 📷
2021-05-14 20:44	▲ Tureluur - <i>Tringa totanus</i>	10	De Oude Venne	Theo Admiraal	📷
2021-05-14 20:40	▲ Vissdief - <i>Sterna hirundo</i>	2	De Groote Ven	Theo Admiraal	■
2021-05-14 20:33	▲ Kauw - <i>Coloeus monedula</i>	16	De Groote Ven	Theo Admiraal	📷
2021-05-14 10:16	▲ Boerenzwaluw - <i>Hirundo rustica</i>	4 adult zomerkleed, foeragerend, gezien	De Groote Ven	Willem Jas	📷 📷
2021-05-14 20:51	▲ Gele Kwikstaart - <i>Motacilla flava</i>	1	De Groote Ven	Theo Admiraal	■

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2021-05-14 10:31	▲ Gele Kwikstaart - <i>Motacilla flava</i>	1 adult zomerleed, gezien	De Groote Ven	Willem Jas	✓ 📷
2021-05-14 10:33	■ Engelse Kwikstaart - <i>Motacilla flava flavissima</i>	1 ♂ roepend	Castricumerpolder Zuid	Cees de Vries	■
2021-05-14 20:51	▲ Witte Kwikstaart - <i>Motacilla alba</i>	2	De Groote Ven	Theo Admiraal	🔍
2021-05-14 10:30	▲ Witte Kwikstaart - <i>Motacilla alba</i>	1 adult zomerleed, gezien en gehoord	De Groote Ven	Willem Jas	✓ 📷
2021-05-14 20:44	▲ Graspieper - <i>Anthus pratensis</i>	1	De Oude Venne	Theo Admiraal	🔍
2021-05-13 19:09	▲ Gierzwaluw - <i>Apus apus</i>	2 foeragerend	Castricumerpolder Zuid	Marian van leeuwen	■
2021-05-13 19:05	■ Bosrietzanger - <i>Acrocephalus palustris</i>	1 baltsend / zingend	Castricumerpolder Zuid	Marian van leeuwen	■
2021-05-13 10:14	● Muizenstaart - <i>Myosurus minimus</i>	31 bloeiend	De Oude Venne	Cees de Vries	🔍
2021-05-12 11:33	▲ Grauwe Gans - <i>Anser anser</i>	2 adult, foeragerend, gezien	Castricumerpolder Zuid	CS Roselaar	🔍
2021-05-12 11:32	▲ Grauwe Gans - <i>Anser anser</i>	3 foeragerend, gezien	De Maden	CS Roselaar	🔍
2021-05-12 19:59	▲ Bergeend - <i>Tadorna tadorna</i>	1 adult, gezien	Castricumerpolder Zuid	CS Roselaar	🔍
2021-05-12 11:33	▲ Kraakeend - <i>Mareca strepera</i>	1 ♂ adult winterleed, foeragerend, gezien	Castricumerpolder Zuid	CS Roselaar	🔍
2021-05-12 11:32	▲ Kraakeend - <i>Mareca strepera</i>	1 ♂ adult winterleed, gezien	De Maden	CS Roselaar	🔍
2021-05-12 12:48	▲ Gierzwaluw - <i>Apus apus</i>	2 foeragerend, gezien	De Groote Ven	Arjan Bakker	■
2021-05-12 14:07	▲ Meerkoet - <i>Fulica atra</i>	1 adult zomerleed, gezien	De Oude Venne	Willem Jas	✓ 📷
2021-05-12 15:09	▲ Fuut - <i>Podiceps cristatus</i>	1 adult zomerleed, foeragerend, gezien	Castricumerpolder Zuid	Willem Jas	✓ 🗨️ 📷
2021-05-12 14:34	■ Kluut - <i>Recurvirostra avosetta</i>	1 adult zomerleed, gezien	De Groote Ven	Willem Jas	✓ 📷
2021-05-12 11:32	▲ Kievit - <i>Vanellus vanellus</i>	3 adult zomerleed, adult in broedbiotoop, gezien	De Maden	CS Roselaar	🔍
2021-05-12 11:31	▲ Kievit - <i>Vanellus vanellus</i>	1 ♂ adult zomerleed, baltsend / zingend, gezien	Castricumerpolder Zuid	CS Roselaar	🔍
2021-05-12 19:36	■ Temmincks Strandloper - <i>Calidris temminckii</i>	1 foeragerend	De Groote Ven	Marian van leeuwen	■
2021-05-12 08:51	■ Temmincks Strandloper - <i>Calidris temminckii</i>	1	De Groote Ven	Christophe Reijman	■
2021-05-12 19:36	■ Oeverloper - <i>Actitis hypoleucos</i>	1 foeragerend	De Groote Ven	Marian van leeuwen	🔍
2021-05-12 19:37	▲ Tureluur - <i>Tringa totanus</i>	3 pas uitgevlogen/dons jongen	De Groote Ven	Marian van leeuwen	🔍 🗨️
2021-05-12 14:07	▲ Tureluur - <i>Tringa totanus</i>	1 adult zomerleed, foeragerend	De Oude Venne	Willem Jas	✓ 📷
2021-05-12 14:44	▲ Lepelaar - <i>Platalea leucorodia</i>	1 overvliegend noordoost, gezien	De Groote Ven	Willem Jas	✓ 📷

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2021-05-12 19:59	▲ Buizerd - <i>Buteo buteo</i>	1 adult, opvliegend, gezien	Castricumerpolder Zuid	CS Roselaar	📷
2021-05-12 15:05	▲ Buizerd - <i>Buteo buteo</i>	1 gezien	De Groote Ven	Willem Jas	✅ 📷
2021-05-12 09:36	▲ Spreeuw - <i>Sturnus vulgaris</i>	7 adult	Castricumerpolder Zuid	Wessel Peters	📷
2021-05-12 19:35	▲ Gele Kwikstaart - <i>Motacilla flava</i>	1	De Groote Ven	Marian van leeuwen	■
2021-05-12 15:06	▲ Brasem - <i>Abramis brama</i>	5 adult, paaiend, gezien	De Groote Ven	Willem Jas	✅ 📷
2021-05-12 09:35	▲ Zilver schoon - <i>Potentilla anserina</i>	1 vegetatief, natuurlijk, veldwaarneming	Uitgeest	Wessel Peters	📷
2021-05-11 09:53	■ Kleine Plevier - <i>Charadrius dubius</i>	1	De Groote Ven	Rob van Bemmelen	📷
2021-05-11 09:13	■ Kleine Plevier - <i>Charadrius dubius</i>	1 baltsend / zingend	Heemskerker Noordbroekpolder	Rob van Bemmelen	📷
2021-05-11 11:32	▲ Grutto - <i>Limosa limosa</i>	1 adult zomerkleed	De Groote Ven	Luc Aarts	📷 🗨️ 📷
2021-05-11 09:56	■ Temmincks Strandloper - <i>Calidris temminckii</i>	1 adult zomerkleed	De Groote Ven	Rob van Bemmelen	■
2021-05-11 09:53	■ Oeverloper - <i>Actitis hypoleucos</i>	2	De Groote Ven	Rob van Bemmelen	📷
2021-05-11 14:25	▲ Kleine Karekiet - <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	2 adult, gezien en gehoord	Castricumerpolder Zuid	Rene Hoogenboom	■ 📷
2021-05-11 09:09	■ Bosrietzanger - <i>Acrocephalus palustris</i>	1 baltsend / zingend	Krengbos e.o.	Rob van Bemmelen	■
2021-05-11 07:52	● Hermelijn - <i>Mustela erminea</i>	1 adult	De Groote Ven	H E Wondergem	📷
2021-05-11 10:35	■ Dotterbloem - <i>Caltha palustris</i>	7 bloeiend	De Oude Venne	Cees de Vries	📷
2021-05-11 14:27	▲ Gewone duivenkervel - <i>Fumaria officinalis</i>	5 bloeiend, natuurlijk, veldwaarneming	Castricumerpolder Zuid	Rene Hoogenboom	✅ 📷
2021-05-11 13:28	▲ Schijfkamille - <i>Matricaria discoidea</i>	3 bloeiend, veldwaarneming	De Oude Venne	Rene Hoogenboom	✅ 📷
2021-05-11 10:58	● Muizenstaart - <i>Myosurus minimus</i>	1 bloeiend	De Oude Venne	Cees de Vries	📷 📷
2021-05-10 19:55	▲ Slobeend - <i>Spatula clypeata</i>	2 adult, paar in broedbiotoop, gezien	De Oude Venne	Piet Hollenberg	📷
2021-05-10 16:54	▲ Slobeend - <i>Spatula clypeata</i>	2 ♂ foeragerend	De Groote Ven	Marian van leeuwen	📷
2021-05-10 13:28	▲ Slobeend - <i>Spatula clypeata</i>	2 ♀	De Groote Ven	Marian van leeuwen	📷
2021-05-10 19:52	▲ Meerkroet - <i>Fulica atra</i>	2 adult, bezet nest, gezien	De Oude Venne	Piet Hollenberg	📷
2021-05-10 19:52	■ Kluut - <i>Recurvirostra avosetta</i>	2 adult, bezet nest, gezien	De Oude Venne	Piet Hollenberg	📷
2021-05-10 13:28	■ Kluut - <i>Recurvirostra avosetta</i>	30	De Groote Ven	Marian van leeuwen	📷
2021-05-10 19:57	▲ Grutto - <i>Limosa limosa</i>	6 gezien en gehoord	De Oude Venne	Piet Hollenberg	📷 🗨️

2

Bijlage

Effecten indicator soorten

1 Locatie


2 Activiteiten

3 Indicatie

Zoek en selecteer een locatie op postcode, of zoom in op de kaart en teken de grenzen van het plangebied: zet punten en sluit af met een dubbel-klik.

Postcode

1902 rw



1 Locatie

2 Activiteiten

3 Indicatie

Geef aan voor welke [OLO-activiteit\(en\)](#) u een indicatie van effecten wilt ontvangen.

Top-10 activiteiten

[Alle activiteiten](#)

- ☐ Slopen en/of asbest verwijderen
- ☒ Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
- ☐ Bijbehorend bouwwerk bouwen
- ☐ Kappen
- ☒ Overig bouwwerk bouwen
- ☒ Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
- ☐ Dakkapel plaatsen
- ☐ Woning bouwen
- ☐ Nieuw kozijn plaatsen of bestaand kozijn of gevelpaneel veranderen
- ☐ Uitrit aanleggen of veranderen

Locatie: 4,6603/52,5366 Oppervlakte: 10,42 ha

Disclaimer

- > De dekkingsgraad van waarnemingen uit de NDFF per locatie wisselt sterk. Als er geen waarnemingen uit de NDFF zijn, kunnen er dus wél beschermde soorten voorkomen. Een gebruiker is zelf verantwoordelijk om (eventueel met hulp van de gemeente) te achterhalen of er daadwerkelijk beschermde soorten in het plangebied voorkomen.
- > Beschermde soorten die naar verwachting geen schadelijke effecten ondervinden, worden niet in de uitvoer getoond.
- > De informatie uit de effectenindicator soorten is generiek. Om vast te stellen of een activiteit in de praktijk daadwerkelijk schadelijk is, is meer specifieke informatie nodig over de betreffende activiteit, de werklocatie en over het voorkomen van beschermde soorten in en rond het plangebied.

Activiteiten

- ☐ [Overig bouwwerk bouwen](#)
- ☐ [Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening](#)
- ☐ [Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen \(Milieu\)](#)

Top 30 Wettelijk beschermde soorten

In het door u opgegeven plangebied komen de volgende soorten voor die het meest in het geding zijn bij ruimtelijke ingrepen en mogelijk schadelijke effecten ondervinden van de door u geselecteerde activiteit(en).

Vleermuizen

- ☐ [Rosse vleermuis](#)

Reptielen

- ☐ [Zandhagedis](#)

Overige Wettelijk beschermde soorten

In het door u opgegeven plangebied komen bovendien de volgende aantallen Wettelijk beschermde soorten per soortengroep voor volgens de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) die mogelijk schadelijke effecten ondervinden van de door u geselecteerde activiteit(en).

Soortgroepen

- ☐ [Vogels \(2\)](#)
- ☐ [Zoogdieren \(2\)](#)
- ☐ [Amfibieën en reptielen \(1\)](#)

Rosse vleermuis

Mogelijke negatieve effecten

Hieronder ziet u de storende factoren die op kunnen treden bij de geselecteerde activiteit en de hierboven genoemde soort. Per storende factor kunt u een korte toelichting lezen. Er is ook een pdf met  geraadpleegde literatuur over de effecten per soortgroep.

Storende factoren per verbodsbepaling	Gevoeligheid
Het is verboden (opzettelijk) nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of vernielen.	
☐ verlies vaste voortplantings- rust- of verblijfplaatsen	 gevoelig
☐ verlies functioneel leefgebied	 gevoelig
☐ versnippering leefgebied	... onbekend
☐ verzuring	... onbekend
☐ vermesting	 gevoelig
☐ verzoeting	☒ niet van toepassing
☐ verzilting	 gevoelig
☐ verontreiniging	 gevoelig
☐ verdroging	... onbekend
☐ vernatting	☒ niet van toepassing
☐ verandering stroomsnelheid	☒ niet van toepassing
☐ verandering overstromingsfrequentie	☒ niet van toepassing
☐ verandering dynamiek substraat	... onbekend
Het is verboden opzettelijk beschermde soorten te doden en vangen.	
☐ directe sterfte	 gevoelig

Mogelijke maatregelen bij negatieve effecten

Wanneer blijkt dat er schadelijke effecten te verwachten zijn op beschermde plant- en diersoorten, dan kan een activiteit soms zo aangepast worden dat schadelijke effecten kunnen worden voorkomen. Ook kunnen maatregelen deze effecten verminderen of herstellen. Zie de maatregelen hieronder. Meer informatie over mitigerende maatregelen voor deze soort is ook te vinden in de  Soortenstandaard. Overleg met uw gemeente welke maatregelen het beste passen bij de door u geplande activiteit.

Disclaimer

De effectenindicator geeft generieke informatie over mogelijke maatregelen om de effecten te verminderen. Voor het vaststellen van de werkelijk te nemen maatregelen heeft u meer locatie-specifieke informatie nodig

- ☐ Inschakelen van een soortdeskundige
- ☐ Opstellen en gebruik van een ecologisch werkprotocol
- ☐ Werkzaamheden buiten de kwetsbare periode
- ☐ Werkzaamheden faseren in ruimte en tijd
- ☐ Alternatieve verblijfplaatsen inrichten

Zandhagedis

Mogelijke negatieve effecten

Hieronder ziet u de storende factoren die op kunnen treden bij de geselecteerde activiteit en de hierboven genoemde soort. Per storende factor kunt u een korte toelichting lezen. Er is ook een pdf met  geraadpleegde literatuur over de effecten per soortgroep.

Storende factoren per verbodsbepaling	Gevoeligheid
Het is verboden (opzettelijk) nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of vernielen.	
☐ verlies vaste voortplantings- rust- of verblijfplaatsen	 gevoelig
☐ verlies functioneel leefgebied	 gevoelig
☐ versnippering leefgebied	 gevoelig
☐ verzuring	 gevoelig
☐ vermessing	 gevoelig
☐ verzoeting	 niet van toepassing
☐ verzilting	 niet gevoelig
☐ verontreiniging	... onbekend
☐ verdroging	 niet gevoelig
☐ vernatting	 gevoelig
☐ verandering stroomsnelheid	 niet van toepassing
☐ verandering overstromingsfrequentie	 niet van toepassing
☐ verandering dynamiek substraat	 gevoelig
Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren.	
☐ verstoring door geluid	... onbekend
☐ verstoring door licht	... onbekend
☐ verstoring door trilling	... onbekend
☐ verstoring door beweging	 gevoelig
☐ verstoring door mechanische effecten	 gevoelig
Het is verboden opzettelijk beschermde soorten te doden en vangen.	
☐ directe sterfte	 gevoelig

Mogelijke maatregelen bij negatieve effecten

Wanneer blijkt dat er schadelijke effecten te verwachten zijn op beschermde plant- en diersoorten, dan kan een activiteit soms zo aangepast worden dat schadelijke effecten kunnen worden voorkomen. Ook kunnen maatregelen deze effecten verminderen of herstellen. Zie de maatregelen hieronder. Meer informatie over mitigerende maatregelen voor deze soort is ook te vinden in de  Soortenstandaard. Overleg met uw gemeente welke maatregelen het beste passen bij de door u geplande activiteit.

Disclaimer

De effectenindicator geeft generieke informatie over mogelijke maatregelen om de effecten te verminderen. Voor het vaststellen van de werkelijk te nemen maatregelen heeft u meer locatie-specifieke informatie nodig.

- ☐ Inschakelen van een soortdeskundige
- ☐ Werkzaamheden buiten de kwetsbare periode
- ☐ Wiegvangen en verplaatsen van zandhagedissen
- ☐ Afsluiten werklocatie met scherm
- ☐ Kwaliteitsverbetering bestaand leefgebied
- ☐ Nieuw leefgebied aanleggen
- ☐ Werkzaamheden faseren in ruimte en tijd
- ☐ Opstellen en gebruik van een ecologisch werkprotocol

Vogels (2)

Mogelijke negatieve effecten

Hieronder ziet u de storende factoren die op kunnen treden bij de geselecteerde activiteit en de hierboven genoemde soort. Per storende factor kunt u een korte toelichting lezen. Er is ook een pdf met  geraadpleegde literatuur over de effecten per soortgroep.

Storende factoren per verbodsbepaling	Gevoeligheid
Het is verboden (opzettelijk) nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of vernielen.	
 verlies vaste voortplantings- rust- of verblijfplaatsen	 gevoelig
 verlies functioneel leefgebied	 gevoelig
 versnippering leefgebied	 gevoelig
 verzuring	 gevoelig
 vermesting	 gevoelig
 verzoeting	 gevoelig
 verzilting	 gevoelig
 verontreiniging	 gevoelig
 verdroging	 gevoelig
 vernatting	 gevoelig
 verandering stroomsnelheid	 gevoelig
 verandering overstromingsfrequentie	 gevoelig
 verandering dynamiek substraat	 gevoelig
Het is verboden opzettelijk beschermde soorten te doden en vangen.	
 directe sterfte	 gevoelig
Het is verboden vogels opzettelijk te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de soort.	
 verstoring door geluid	 gevoelig
 verstoring door licht	 gevoelig
 verstoring door trilling	 gevoelig
 verstoring door beweging	 gevoelig
 verstoring door mechanische effecten	 gevoelig

Zoogdieren (2)

Mogelijke negatieve effecten

Hieronder ziet u de storende factoren die op kunnen treden bij de geselecteerde activiteit en de hierboven genoemde soort. Per storende factor kunt u een korte toelichting lezen. Er is ook een pdf met  geraadpleegde literatuur over de effecten per soortgroep.

Storende factoren per verbodsbepaling	Gevoeligheid
Het is verboden (opzettelijk) nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of vernielen.	
 verlies vaste voortplantings- rust- of verblijfplaatsen	 gevoelig
 verlies functioneel leefgebied	 gevoelig
 versnippering leefgebied	 gevoelig
 verzuring	 gevoelig
 vermesting	 gevoelig
 verzoeting	 niet gevoelig
 verzilting	 gevoelig
 verontreiniging	 gevoelig
 verdroging	 gevoelig
 vernatting	 gevoelig
 verandering stroomsnelheid	 gevoelig
 verandering overstromingsfrequentie	 gevoelig
 verandering dynamiek substraat	 gevoelig
Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren.	
 verstoring door geluid	... onbekend
 verstoring door licht	... onbekend
 verstoring door trilling	 gevoelig
 verstoring door beweging	 gevoelig
 verstoring door mechanische effecten	 gevoelig
Het is verboden opzettelijk beschermde soorten te doden en vangen.	
 directe sterfte	 gevoelig

Amfibieën en reptielen (1)

Mogelijke negatieve effecten

Hieronder ziet u de storende factoren die op kunnen treden bij de geselecteerde activiteit en de hierboven genoemde soort. Per storende factor kunt u een korte toelichting lezen. Er is ook een pdf met  geraadpleegde literatuur over de effecten per soortgroep.

Storende factoren per verbodsbepaling	Gevoeligheid
Het is verboden (opzettelijk) nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of vernielen.	
☐ verlies vaste voortplantings- rust- of verblijfplaatsen	 gevoelig
☐ verlies functioneel leefgebied	 gevoelig
☐ versnippering leefgebied	 gevoelig
☐ verzuring	 gevoelig
☐ vermesting	 gevoelig
☐ verzoeting	 gevoelig
☐ verzilting	 gevoelig
☐ verontreiniging	 gevoelig
☐ verdroging	 gevoelig
☐ vernatting	 gevoelig
☐ verandering stroomsnelheid	 gevoelig
☐ verandering overstromingsfrequentie	 gevoelig
☐ verandering dynamiek substraat	 gevoelig
Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren.	
☐ verstoring door geluid	 gevoelig
☐ verstoring door licht	 gevoelig
☐ verstoring door trilling	 gevoelig
☐ verstoring door beweging	 gevoelig
☐ verstoring door mechanische effecten	 gevoelig
Het is verboden opzettelijk beschermde soorten te doden en vangen.	
☐ directe sterfte	 gevoelig

Plan projectlocatie

