

Quickscan ecologie

Kwadijk 139a Kwadijk

15 juni 2023



Samenvatting

Op de planlocatie Kwadijk 139a in Kwadijk worden plannen voorbereid om de huidige opstallen te slopen.

Onderzocht is of er effecten op beschermde soorten kan ontstaan. Op voorhand kan de aanwezigheid van vleermuizen, gierzwaluw en huismus worden uitgesloten. De opstallen zijn enkelwandig en hebben geen ruimte onder het dak voor deze soorten om zich er te vestigen. Boerenzwaluw kan verwacht worden in deze opstallen. De werkzaamheden dienen daarom aan te vangen buiten het broedseizoen van deze soort.

Inhoud

- 2 – Inleiding
- 3 – Beschrijving gebied
- 4 – Waarnemingen
- 7 – Analyse
- 9 – Advies & Bronnen

Colofon


Opdrachtgever	Bouwbuuro Rood-hart
Projectnummer	23.093
Datum	15 juni 2023
Auteur	F. A. Neuteboom
Gecontroleerd	P.J.H. van der Linden
Status	concept

Els & Linde B.V.
Spechtstraat 59
1223 NX Hilversum
mob 06 - 27564247
e-mail vanderlinden@elsenlinde.nl

Inleiding


Op de planlocatie Kwadijk 139a in Kwadijk worden plannen voorbereid om de huidige opstallen te slopen. Onderdeel van de procedure is een onderzoek naar de potentiële aanwezigheid van beschermde soorten en het maken van een analyse van de mogelijke effecten op die soorten, als gevolg van de werkzaamheden. Hiervoor is door bureau Els & Linde een oriënterend onderzoek uitgevoerd. Het voorliggende rapport geeft een beschrijving van het oriënterend onderzoek naar de effecten op natuurwaarden.

Om een goed oordeel te geven over de potentieel aanwezige beschermde planten en dieren, is op 5 juni 2023 door een ecooloog van bureau Els & Linde, een bezoek gebracht aan de planlocatie. Ter plekke is beoordeeld of er beschermde soorten aanwezig kunnen zijn, die schade kunnen ondervinden van de geplande ontwikkelingen. Daarbij is gezocht naar sporen van dieren en is op basis van de begroeiing en de opbouw van het landschap, geschat of er beschermde soorten aanwezig kunnen zijn. De effecten worden beoordeeld als gevolg van de veranderde omgeving en het veranderde gebruik. Verder wordt geanalyseerd of de werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de veranderingen te bereiken, een effect veroorzaken.




Ligging van de planlocatie

H02 Planomgeving: locatie, omgeving en beschermde natuurgebieden



Ligging van de Natura 2000-gebieden.



Ligging van het Natuurnetwerk Nederland.

De planlocatie bevindt zich op Kwadijk 139a binnen de bebouwde kom van Kwadijk. De planlocatie wordt omsloten door bebouwing en weilanden. De planlocatie ligt op omsloten door het Natura 2000-gebied 'Polder Zeevang' maar is er geen onderdeel van. Gebieden aangewezen als Natuurnetwerk Nederland liggen op 600 m.

De werkzaamheden zijn :
– Sloop van de huidige opstallen.

Natura 2000

Via de Natura 2000 zijn gebieden beschermd van internationaal belang. Voor deze gebieden zijn doelstellingen geformuleerd voor het behoud van habitats en planten en dieren. Deze Natura 2000-gebieden zijn ook beschermd tegen invloeden van buiten, zoals stikstofdepositie en grondwaterstromen. Voor de functie waardoor de depositie van stikstofverbindingen toeneemt, is een berekening noodzakelijk van de effecten.

Natuurnetwerk Nederland

Door nieuwe natuur te ontwikkelen, kunnen natuurgebieden met elkaar worden verbonden. Zo kunnen planten zich over verschillende natuurgebieden verspreiden en dieren van het ene naar het andere gebied gaan. Het totaal van al deze gebieden en de verbindingen ertussen vormt het natuurnetwerk Nederland.

Bijzonder Provinciaal Landschap

De gehele polder de Zeevang is aangewezen als Bijzonder Provinciaal Landschap, de bescherming is vooral cultuurhistorisch en weidevogels. Het BPL kent geen externe werking.

H03 Waarnemingen: veldgegevens en gegevens uit de literatuur



Werkwijze

Het onderzoek is uitgevoerd als een quick scan ecologie. Voor een dergelijk onderzoek wordt door een ecooloog beoordeeld of er een kans is op aanwezigheid van beschermde soorten. Daarbij wordt gelet op de structuur van de omgeving, aanwezige habitats en landschapselementen. Tevens wordt gezocht naar sporen van beschermde soorten. Een quick scan is tevens bedoeld als afbakening van een eventueel afdoend onderzoek.

De quick scan bestaat uit de volgende activiteiten:

- Een literatuur/bronnenonderzoek met betrekking tot de potentieel aanwezige beschermde soorten binnen de planlocatie.
- Een veldbezoek waarbij de locaties worden beoordeeld op habitatgeschiktheid voor beschermde soorten. Hierbij worden bijvoorbeeld de te kappen bomen beoordeeld op geschiktheid voor vleermuizen en jaarrond beschermde nesten.
- Voor de aangetroffen strikt beschermde soorten wordt, door een beschrijving van de ecologische functionaliteit van het gebied (foerageergebied, migratieroute, voortplantingsgebied of winterverblijf, enz.), aangegeven hoe het gebied door iedere soort wordt gebruikt.
- Een schatting van de impact van de werkzaamheden op de (potentieel) aanwezige beschermde soorten.
- Een effectbeoordeling gericht op (eventueel) nabij gelegen beschermde natuurgebieden (Natura 2000-gebieden, Natuurnetwerk en Weidevogelleefgebied).

Om een goed oordeel te kunnen geven is op 5 juni 2023 door een ecooloog een bezoek gebracht aan de planlocaties. Tijdens het veldbezoek is onderzocht of er in potentie beschermde planten en dieren aanwezig zijn binnen de planlocaties. Daarvoor is gezocht naar sporen en andere aanwijzingen van planten en dieren. Op basis van de aanwezige herkenbare begroeiing en habitats, is beoordeeld of er leefgebieden aanwezig zijn voor beschermde soorten. Aanvullend is een bureaustudie uitgevoerd naar de potentieel voorkomende planten en dieren in de directe omgeving van de planlocaties. Hierbij is een bronnenonderzoek uitgevoerd, waarbij de verschillende relevante en actuele informatiebronnen zijn geraadpleegd.

Bij de analyse van de effecten is gelet op de effecten veroorzaakt door de veranderde omgeving en het veranderde gebruik. Daarnaast zijn de effecten bepaald die veroorzaakt worden door de ruimtelijke ontwikkelingen. Daarbij is naast de planlocaties sec. gelet op de directe omgeving en de effecten op soorten in de omgeving. In de voorliggende notitie worden de resultaten van de quick scan ecologie besproken.

Waarnemingen

In onderstaande paragrafen worden de soortengroepen beschreven die binnen de planlocaties en de directe omgeving zijn aangetroffen of te verwachten. Tijdens het veldbezoek van 5 juni 2023 is onderzocht of er in potentie beschermde planten en dieren aanwezig zijn binnen de planlocaties.



Bronnenonderzoek

Voor het onderzoek naar potentieel aanwezige beschermde soorten zijn de beschikbare regionale en landelijke verspreidingsatlassen en enkele digitale bronnen geraadpleegd. Er zijn geen waarnemingen gedaan door derden.

Vegetatie en planten

Naast de planlocatie zijn meerdere bomen, struiken, kruid- en grasachtige begroeiing waargenomen. Geen van de waargenomen soorten is beschermd.

Zoogdieren

Juridisch zwaardere beschermde soorten

Vleermuizen zijn de belangrijkste groep strikt beschermde dieren die verwacht kunnen worden. Vleermuizen kunnen schade ondervinden van de ruimtelijke ontwikkelingen en kunnen hierdoor een belemmering zijn. De planlocaties en de directe omgeving zijn daarom nauwkeurig onderzocht op de aanwezigheid van potentieel geschikte verblijfplaatsen voor vleermuizen, evenals essentiële vliegroutes en foerageergebieden.

Verblijfplaatsen

Vleermuizen zijn in twee groepen te verdelen; enerzijds de soorten die in gebouwen een verblijfplaats hebben en anderzijds de soorten die in bomen een verblijfplaats hebben. De kraamkolonie van de laatvlieger (*Eptesicus serotinus*) en de gewone dwergvleermuis (*Pipistrellus pipistrellus*) komen – voor zover bekend - alleen in gebouwen voor. Ze wonen in de spouwmuur, achter betimmering, onder daklijsten en dakpannen. De vaste verblijfplaatsen van de ruige dwergvleermuis (*Pipistrellus nathusii*) en de watervleermuis (*Myotis daubentonii*) kunnen zowel in spleten en gaten in bomen, als in gebouwen voorkomen. Ze kiezen in de regel gebieden met een groot aanbod aan geschikte holten op een klein oppervlak.

De aanwezigheid van vleermuizen kan op voorhand worden uitgesloten. Er zijn wel openingen in de opstallen waargenomen waar deze dieren naar binnen kunnen, maar er is geen dekking in de opstallen waar deze soorten zich kunnen vestigen. Een afdoend onderzoek naar deze soorten is niet noodzakelijk.

Potentiële vliegroutes en foerageergebieden

Langs de opstallen en een klein slootje ten zuiden van de opstallen kunnen potentiële vliegroutes en foerageergebieden aanwezig zijn. Deze routes en gebieden ondervinden geen hinder aan de werkzaamheden. Mits er overdag gewerkt wordt en geen overmatig licht wordt gebruikt.

Laag beschermde zoogdieren

In de opstallen is de aanwezigheid van beschermde grondgebonden zoogdieren op voorhand uit te sluiten. De opstallen bevatten onvoldoende dekkings mogelijkheden voor deze soorten om zich er te vestigen. Kleine zoogdieren als muizen en egels kunnen aanwezig zijn. Voor deze soorten geldt de zorgplicht.



Vogels

Jaarrond beschermd nest

Tijdens het ecologisch onderzoek is gezocht naar aanwijzingen voor het voorkomen van vogels met een vaste verblijfplaats binnen het plangebied. Gekeken is naar potentieel geschikte nestplekken voor vogels met een jaarrond beschermd nest.

Op voorhand kan de aanwezigheid van gierzwaluw en huismus worden uitgesloten. Er zijn voldoende openingen waargenomen in de opstallen waar deze soorten naar binnen kunnen. Echter is er geen dekking in het pand aanwezig waar deze soorten zich kunnen vestigen. Een afdoend onderzoek naar deze soorten is niet noodzakelijk.

Algemene broedvogels

De opstallen bieden ruimte voor soorten zoals de boerenzwaluw. Werkzaamheden dienen te starten buiten het broedseizoen van deze soort. Overige broedvogels hebben onvoldoende dekking of nestplaats in de schuur en kunnen op voorhand worden uitgesloten.

Herpetofauna en vissen

Langs de planlocatie is een kleine sloot aanwezig met natuurlijke oevers. De aanwezigheid van de ringslang kan op voorhand niet uitgesloten worden. Echter zal deze soort geen hinder ondervinden aan de sloop van de opstallen. Voor deze soort geldt de zorgplicht.

Overige soorten

Er zijn, gezien de voorkomende biotopen, geen beschermde bijzondere insecten of overige soorten te verwachten binnen de planlocaties. Deze soorten stellen hoge eisen aan hun leefgebied; de planlocatie voldoet hier niet aan. De aanwezigheid van beschermde overige soorten worden daarom uitgesloten binnen de planlocaties.

H04 Analyse: beoordeling van de effecten op de natuurwaarden



Bij de analyse wordt gelet op de effecten als gevolg van het veranderde gebruik en de veranderde inrichting. Daarnaast wordt gelet op de effecten als gevolg van de werkzaamheden om de veranderingen te bereiken. Voor zover planlocaties binnen het Natuurnetwerk Nederland, het weidevogel leefgebied, Natura 2000 of andere beschermde natuurgebieden liggen, worden de effecten op deze beschermde natuurgebieden getoetst. Voor de Natura 2000-gebieden is de externe werking eveneens van belang; de belangrijkste externe effecten worden veroorzaakt door toename van depositie, geluid en licht. Daarnaast kunnen veranderde grondwaterstromen een effect veroorzaken.

Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming kent een afdeling voor soortbescherming en een afdeling voor gebiedsbescherming. Binnen de gebiedsbescherming zijn de Natura 2000-gebieden beschermd. De bescherming geldt ook voor externe factoren; zoals grondwaterstromen en stikstofdepositie.

De soortbescherming binnen de Wet natuurbescherming richt zich op de internationale afspraken, en geeft een uitbreiding van de beschermde soorten door aan de rode lijst (bedreigd en ernstig bedreigd) een beschermd status te koppelen. Binnen de bebouwde kom is de belangrijkste wijziging in de beschermde soorten het vervallen van de bescherming op muurplanten en orchideeën.

Beschermde soorten

Op de planlocatie kan de aanwezigheid van vleermuizen, gierzwaluw en huismus op voorhand worden uitgesloten. Er zijn voldoende openingen voor deze soorten om de opstallen binnen te komen. Echter zijn er onvoldoende nest gelengenheden en de opstallen bieden geen dekking voor deze soorten om zich er te vestigen. Een afdoend onderzoek naar deze soorten is niet noodzakelijk. Er is mogelijkheid voor soorten als de boerenzwaluw om zich te vestigen in de opstallen. Voor deze soort geldt dat de werkzaamheden dienen aan te vangen buiten het broedseizoen.

Zorgbeginsel

Binnen het gebied is een geringe kans op algemeen voorkomende soorten waarmee rekening moet worden gehouden. Aangetroffen dieren die niet uit zich zelf het werkgebied kunnen verlaten, dienen – onder begeleiding van een ecooloog - in veiligheid te worden gebracht en buiten het werkgebied te worden uitgezet. Schuilplekken zoals bladhopen, hout- en steenstapels e.d. dienen eerst te worden gecontroleerd op schuilende dieren. In zijn algemeenheid dienen geschikte schuil- en overwinteringsplekken voor dieren buiten het werkterrein intact te worden gelaten.

Eventueel noodzakelijk kap moet buiten de kwetsbare periode (winter) worden uitgevoerd en voorafgaand aan de kap (of het anderszins vrijstellen van een werkplek) is het verstandig een ecooloog te laten beoordelen of effecten zijn te verwachten en eventueel maatregelen te (laten) nemen om die effecten te verminderen.



Natura 2000

De planlocatie bevindt zich op Kwadijk 139a binnen de bebouwde kom van Kwadijk. De planlocatie wordt omsloten door bebouwing en weilanden. De planlocatie ligt op omsloten door het Natura 2000-gebied 'Polder Zeevang' maar is er geen onderdeel van. In de Polder Zeevang is geen stikstofgevoelig habitat aanwezig, het gebied is aangewezen via de Vogelrichtlijn. De afstand tot een Natura 2000-gebied het Wormer- en Jisperveld waarin wel stikstofgevoelig habitat aanwezig is komt op 6,8 km. Gelet op de omvang van het werk – slopen opstallen – is geen verhoogde depositie te verwachten.

Natuurnetwerk Nederland

De planlocatie ligt op ruime afstand van het Natuurnetwerk Nederland. Gelet op de aard en de omvang van de geplande werkzaamheden, wordt echter geen effect verwacht.

H05 Conclusie, advies en gebruikte bronnen

Op de planlocatie Kwadijk 139a in Kwadijk worden plannen voorbereid om de huidige opstallen te slopen.

Voorliggend rapport betreft een onderzoek naar effecten op natuurwaarden. Door een ecooloog van bureau Els & Linde B.V. is op 5 juni 2023 beoordeeld of er beschermde plant- en diersoorten aanwezig zijn binnen de planlocatie en of deze soorten schade ondervinden van de gewenste ontwikkelingen.

Beschermde soorten

Op de planlocatie Kan de aanwezigheid van vleermuizen, gierzwaluw en huismus op voorhand worden uitgesloten. Er zijn voldoende openingen voor deze soorten om de opstallen binnen te komen. Echter zijn er onvoldoende nest gelengenheden en de opstallen bieden geen dekking voor deze soorten om zich er te vestigen. Een afdoend onderzoek naar deze soorten is niet noodzakelijk. Er is mogelijkheid voor soorten als de boerenzwaluw om zich te vestigen in de opstallen. Voor deze soort geldt dat de werkzaamheden dienen aan te vangen buiten het broedseizoen.

Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland

De planlocatie bevindt zich op Kwadijk 139a binnen de bebouwde kom van Kwadijk. De planlocatie wordt omsloten door bebouwing en weilanden. De planlocatie ligt op omsloten door het Natura 2000-gebied 'Polder Zeevang' maar is er geen onderdeel van. De Zeevang is niet gevoelig van stikstofdepositie. De afstand tot gevoelig habitat is groter dan 6,8 km. Een verhoogde depositie is niet de verwachten.

- Anonymus (2017). Kennisdocument huismus, BIJ12
- Anonymus (2017). Kennisdocument gierzwaluw, BIJ12
- Anonymus (2017). Kennisdocument gewone dwergvleermuis, BIJ12
- Dietz, Chr., O. von Helversen & D. Nill (2012) Vleermuizen. Alle soorten van Europa en Noordwest-Afrika. Triton Natuur
- Hoogeboom, D.M., F. Visbeen, J. Wondergem, W. Ruitenbeek (2014) Atlas van de Noord-Hollandse zoogdieren. NOZOS, Landschap Noord-Holland.
- Kaag, K. (2012) Vlinders van Duin tot Dijk. De dagvlinders van Noord-Holland 2000-2009. Vlinderstichting, Landschap Noord-Holland.
- Kapteyn, K. (1995) Vleermuizen in het landschap. Schuyt & co, Haarlem.
- Riet, B. van, H. van der Goes, Th. Baas, C. van den Tempel, W. Menkveld & F. Visbeen (2014) Atlas van de Noord-Hollandse flora. Landschap Noord-Holland.
- Scharringa, C.J.G., W. Ruitenbeek & P.J. Zomerdijs (2010) Atlas van de Noord-Hollandse broedvogels 2005-2009. SVN, Landschap Noord-Holland.
- Simon, M., S. Hüttenbügel & J. Smit-Viergutz (2004) Ökologie und Schutz von Fledermäusen in Dörfern und Städten. Bundesamt für Naturschutz, Bonn.
- Synbiosis Alterra natura 2000
- edam-volendam.nl
- provincienoordholland.nl
- waarneming.nl