



# Nader onderzoek jaarrond beschermde nesten

Molenblik te Medemblik

projectnummer 0467982.100  
definitief  
12 mei 2021

# Nader onderzoek jaarrond beschermde nesten

## Molenblik te Medemblik

projectnummer 0467982.100

definitief  
12 mei 2021

### Auteurs

Mathilde van den Broek

### Opdrachtgever

Gemeente Medemblik  
Dick Ketlaan 21  
1687 CD Wognum

**Gecontroleerd:** J.M. Kooijman



datum  
12 mei 2021

beschrijving  
definitief

vrijgave



# Inhoudsopgave

Blz.

|          |                        |          |
|----------|------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Inleiding</b>       | <b>1</b> |
| <b>2</b> | <b>Methode</b>         | <b>3</b> |
| <b>3</b> | <b>Resultaten</b>      | <b>4</b> |
| 3.1      | Terreinbezoek 19 maart | 4        |
| 3.2      | Terreinbezoek 29 maart | 5        |
| 3.3      | Terreinbezoek 12 april | 5        |
| 3.4      | Terreinbezoek 21 april | 6        |
| <b>4</b> | <b>Conclusie</b>       | <b>7</b> |
| 4.1      | Conclusies nesten      | 7        |
| 4.2      | Effecten               | 7        |
| <b>5</b> | <b>Bronnen</b>         | <b>9</b> |

# 1 Inleiding

De gemeente Medemblik is in samenwerking met BPD en Zeeman Real Estate voornemens om ten zuidwesten van het centrum van Medemblik de nieuwe woonwijk Molenwijk te realiseren. In de nieuwe woonwijk worden circa 220 nieuwe woningen inclusief bijbehorende infrastructuur en groenvoorziening gerealiseerd.

In Figuur 1.1 is een schets van het plan weergegeven.



Figuur 1.1. Tekening planvoornemen. Bron: Vollmer & Partners, 2019.

Ten behoeve van het voornemen is in Maart 2021 een Natuurtoets uitgevoerd door Antea Group (2021). Uit de natuurtoets blijkt dat nesten van de buizerd en de ransuil in de directe omgeving van het plangebied niet uitgesloten kunnen worden. De locaties van deze nesten zijn te zien in Figuur 1.2.



*Figuur 1.2: een overzicht van de nesten die zijn aangetroffen tijdens het terreinbezoek t.b.v. de Natuurtoets (Antea Group, 2021).*

Het voornemen kan mogelijk een verstorend effect hebben op deze soorten, indien een jaarrond beschermd nest aanwezig is. Het verstoren van nestlocaties van vogelsoorten met een jaarrond beschermd nest is in strijd met Artikel 3.1 van de Wet Natuurbescherming. Als gevolg hiervan is er een nader onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van vogels met een jaarrond beschermd nest binnen de invloedssfeer van het plangebied.

<sup>1</sup> Voor het broedseizoen wordt in het kader van de wet geen standaardperiode gehanteerd. Het broedseizoen is afhankelijk van klimatologische omstandigheden; dit houdt in dat het seizoen eerder dan wel later van start kan gaan en eerder dan wel later kan eindigen. Van belang is of er broedgevallen aanwezig zijn.

## 2 Methode

Om vast te kunnen stellen of de aangetroffen nesten, bezette jaarrond beschermde nesten betreffen, zijn in de periode maart t/m april 2021 vier veldbezoeken uitgevoerd. Gedurende de veldbezoeken zijn de nesten voor twee uur geobserveerd. De veldbezoeken zijn op 19 en 29 maart, 12 en 21 april 2021 uitgevoerd. Tussen de veldbezoeken zat minimaal 10 dagen. Het nader onderzoek is uitgevoerd conform het BIJ12 kennisdocument "Buizerd", versie 1.0 d.d. juli 2017 en volgens de richtlijnen van BIJ12 rond het nader onderzoek ransuil.

Gedurende de veldbezoeken is gebruik gemaakt van een verrekijker. Tijdens de veldbezoeken is gelet op waarnemingen waaruit het gebruik van het nest blijkt en/of het nest een jaarrond beschermd nest betreft. Hierbij is gelet op nest indicerende waarnemingen door vogelgedrag te observeren, bijvoorbeeld broedgedrag, nestindicatief gedrag, nestbouw/aansleep van nestmateriaal, aanwezigheid op het nest of territoriaal gedrag. Daarnaast zijn indirecte waarnemingen, zoals prooiresten en verse takken (oplichtend breukvlak van nest) op het nest goede aanwijzingen om te bepalen of het nest bezet is. De terreinbezoeken zijn uitgevoerd bij goed weer, door een deskundig ecoloog van Antea Group. Tabel 2.1 geeft een overzicht van de veldbezoeken met de weersomstandigheden.

| Datum         | Tijd          | Weer                      |
|---------------|---------------|---------------------------|
| 19 maart 2021 | 09.32 – 11.43 | 5°C, windkracht 2 à 3 Bft |
| 29 maart 2021 | 10.30 – 12.33 | 11°C, windkracht 6 Bft    |
| 12 april 2021 | 10.10 – 12.15 | 4°C, windkracht 3 Bft     |
| 21 april 2021 | 14.10 -16.12  | 11°C, windkracht 4 Bft    |

<sup>1</sup> Voor het broedseizoen wordt in het kader van de wet geen standaardperiode gehanteerd. Het broedseizoen is afhankelijk van klimatologische omstandigheden; dit houdt in dat het seizoen eerder dan wel later van start kan gaan en eerder dan wel later kan eindigen. Van belang is of er broedgevallen aanwezig zijn.

## 3 Resultaten

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de uitgevoerde terreinbezoeken weergegeven en worden de relevante waarnemingen beschreven.

Er is één nieuw nest gevormd sinds het terreinbezoek voor de natuurtoets is uitgevoerd (zie Figuur 3.1 geel). Het nest op de locatie van de ster is niet meer aanwezig. Wel is hier huismus aangetroffen. De actuele nesten zijn weergegeven in Figuur 3.1.



Figuur 3.1: een weergave van de actuele nesten. Nest één is geel aangegeven, nest twee met blauw en nest drie roze.

### 3.1 Terreinbezoek 19 maart

Tijdens dit terreinbezoek is een paar eksters waargenomen rond het eerste nest (zie Figuur 3.2). Het gedrag van de eksters kan als nest indicierend worden beschouwd, omdat er af- en aangevlogen werd met takjes. Er is ook een aantal keer één van de eksters op het nest waargenomen. Ook werden zwarte kraaien die in de buurt van het nest kwamen verjaagd door de eksters.

<sup>1</sup> Voor het broedseizoen wordt in het kader van de wet geen standaardperiode gehanteerd. Het broedseizoen is afhankelijk van klimatologische omstandigheden; dit houdt in dat het seizoen eerder dan wel later van start kan gaan en eerder dan wel later kan eindigen. Van belang is of er broedgevallen aanwezig zijn.





*Figuur 3.2: Het eerste nest, bewoond door ekster.*

Het tweede nest (Figuur 3.3) aan de noordzijde van het plangebied lijkt onbewoond. Er zijn geen vogels waargenomen die binding tonen met het nest in de vorm van nest indicerend gedrag, territoriaal gedrag, paargedrag of broedgedrag. Wel zijn er enkele houtduiven in de bomen rond het nest waargenomen.



*Figuur 3.3: Het tweede nest.*

Rond het derde nest (roze) is een paar zwarte kraaien waargenomen. Deze tonen binding met de locatie door af- en aan te vliegen naar het nest, waarbij er kort op of vlak naast het nest werd gezeten. Ook werd er nest materiaal verzameld en naar het nest gebracht.

<sup>1</sup> Voor het broedseizoen wordt in het kader van de wet geen standaardperiode gehanteerd. Het broedseizoen is afhankelijk van klimatologische omstandigheden; dit houdt in dat het seizoen eerder dan wel later van start kan gaan en eerder dan wel later kan eindigen. Van belang is of er broedgevallen aanwezig zijn.





*Figuur 3.4: Het derde nest, in de rode cirkel.*

In het plangebied zelf is veel activiteit van water- en weidevogels. Er is canadese gans, grauwe gans, kokmeeuw, aalscholver, scholekster, grutto en blauwe reiger foeragerend waargenomen in het plangebied. Daarnaast zijn koolmees, houtduif, spreeuw, gaai, kauw, bergeend, brandgans, kuifeend en witte kwikstaart overvliegend of in de omgeving van het plangebied waargenomen.

### 3.2 Terreinbezoek 29 maart

Tijdens het tweede terreinbezoek zijn er geen nieuwe nesten aangetroffen. Gedurende het terreinbezoek waaide het hard (ca windkracht 6). Door de harde wind is er mogelijk minder activiteit rond de nesten. Rond het eerste nest is wederom nest indicerend gedrag waargenomen van eksters. De eksters vliegen rond het nest en gaan soms enkele momenten op het nest zitten.

Rond het tweede nest is kort nest indicerend gedrag van houtduif waargenomen. Een paartje houtduiven zat gedurende een half uur naast het nest in de boom en vloog af en toe richting het nest. Tijdens het tweede uur is er ook zwarte kraai waargenomen in de buurt van het nest, welke enkele malen af en aanvloog en zich in de bomen vlak rond het nest bevond.

Rond het derde nest is wederom zwarte kraai waargenomen, die eenzelfde soort gedrag vertoonden als tijdens het eerste terreinbezoek.

Tijdens het terreinbezoek is rond het woonhuis (Figuur 3.1 oranje sterretje) huismus waargenomen. Waarschijnlijk broeden huismussen onder de dakpannen van het woonhuis. Effecten op huismus als gevolg van het planvoornemen worden in paragraaf 4.2 behandeld.

Wederom is er in het plangebied een grote activiteit van met name water- en weidevogels. Met name canadese gans en grauwe gans foerageert in het plangebied. Ook is een paar grutto's foeragerend waargenomen. Kokmeeuw, houtduif, holenduif, meerkoet, aalscholver, fuut, kauw, scholekster, kuifeend, bergeend (Figuur 4.5) en kieviet is overvliegend of in de omgeving waargenomen.

<sup>1</sup> Voor het broedseizoen wordt in het kader van de wet geen standaardperiode gehanteerd. Het broedseizoen is afhankelijk van klimatologische omstandigheden; dit houdt in dat het seizoen eerder dan wel later van start kan gaan en eerder dan wel later kan eindigen. Van belang is of er broedgevallen aanwezig zijn.



*Figuur 3.5: Bergeenden op het land naast het plangebied.*

### 3.3 Terreinbezoek 12 april

Tijdens het derde terreinbezoek zijn er geen nieuwe nesten gevormd. Het eerste nest is duidelijk in gebruik door ekster, welke nog steeds duidelijk territoriaal en nest indicerend gedrag vertonen.

Rond het tweede nest is duidelijk een paar zwarte kraaien aanwezig. Deze lijken binding te tonen met het nest en tonen nest indicerend en territoriaal gedrag.

Op het derde nest is tijdens dit bezoek weinig activiteit waargenomen, slechts een enkele keer zijn de zwarte kraaien rond het nest neergestreken. Er zijn geen andere soorten waargenomen op of rond het nest.

Tijdens dit terreinbezoek is een buizerd gehoord, in de omgeving van het plangebied. De buizerd is niet waargenomen. Ook zijn er wederom huismussen aangetroffen op dezelfde locatie als tijdens het tweede bezoek. Deze toonden binding met de woning en vertoonden nest indicerend gedrag.

In het plangebied zijn enkele grauwe ganzen, meerkoeten, kokmeeuwen en scholeksters aanwezig. Holenduif en aalscholver zijn overvliegend waargenomen.

### 3.4 Terreinbezoek 21 april

Tijdens het vierde en laatste bezoek is de ekster broedend op het eerste nest waargenomen. De andere ekster vloog af en toe aan naar het nest maar vrijwel tijdens de gehele observatie zat de ekster op het nest.

Rond het tweede nest is wederom zwarte kraai waargenomen welke binding toonden met het nest. Er is ook één keer een ekster in de buurt van het nest waargenomen, dit leidde tot een territoriale reactie van de zwarte kraaien. Er is geen broedgedrag waargenomen op het tweede nest.

<sup>1</sup> Voor het broedseizoen wordt in het kader van de wet geen standaardperiode gehanteerd. Het broedseizoen is afhankelijk van klimatologische omstandigheden; dit houdt in dat het seizoen eerder dan wel later van start kan gaan en eerder dan wel later kan eindigen. Van belang is of er broedgevallen aanwezig zijn.

Bij het derde nest is wederom zwarte kraai waargenomen. Deze leken ook kort op het nest te zitten (nest indicerend gedrag).

Huismus is waargenomen bij de woning, waar de soorten binding toonden met waarschijnlijke nestplaatsen door af en aan te vliegen naar de woning.

In het plangebied is een paar grutto's (Figuur 3.6), grauwe ganzen en een haas foeragerend waargenomen. Meerkoet, fuut en wilde eend is in de sloot rond het plangebied waargenomen. In de omgeving van het plangebied of overvliegend zijn bergeend, boerenwaluw, aalscholver, kauw en blauwe reiger waargenomen.



*Figuur 3.6: Eén van de grutto's foeragerend in het plangebied.*

Mogelijke effecten op soorten worden in hoofdstuk 4 behandeld.

<sup>1</sup> Voor het broedseizoen wordt in het kader van de wet geen standaardperiode gehanteerd. Het broedseizoen is afhankelijk van klimatologische omstandigheden; dit houdt in dat het seizoen eerder dan wel later van start kan gaan en eerder dan wel later kan eindigen. Van belang is of er broedgevallen aanwezig zijn.

## 4 Effectenbeoordeling en conclusies

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de resultaten van het uitgevoerde nader onderzoek en worden de mogelijke effecten van het voornemen getoetst.

### 4.1 Effecten

#### Nest 1

Tijdens alle terreinbezoeken is ekster waargenomen rond en op het eerste nest. Er kan met zekerheid geconcludeerd worden dat het eerste nest geen jaarrond beschermd nest is. Het nest wordt gebruikt door de ekster, wat geen jaarrond beschermde soort is. Er zijn geen vervolgstappen aan de orde.

#### Nest 2

Tijdens het tweede, derde en laatste bezoek is zwarte kraai waargenomen op dit nest. Het tweede nest is geen jaarrond beschermd nest. Er kan met grote zekerheid worden gezegd dat het nest in gebruik is door zwarte kraai. Er zijn geen vervolgstappen aan de orde.

#### Nest 3

Tijdens alle terreinbezoeken is zwarte kraai waargenomen rond het derde nest. Er kan met zekerheid gezegd worden dat het derde nest geen jaarrond beschermd nest is. Het nest wordt gebruikt door zwarte kraai. Er zijn geen vervolgstappen aan de orde.

Tijdens het tweede, derde en vierde terreinbezoek is huismus waargenomen rond het huis grenzend aan het plangebied (oranje ster, Figuur 3.1). De soort toonde binding met de woning en broed vermoedelijk onder de dakpannen. De nesten bevinden zich vermoedelijk 15 à 20 meter van het plangebied. De huismus is een soort met een jaarrond beschermd nest. Echter, is de huismus relatief weinig gevoelig voor verstoring. Wanneer werkzaamheden die de meeste verstoring opleveren (zoals heien) worden uitgesteld tot na het broedseizoen, is er geen sprake van verstoring van huismus. Ook blijven er voldoende groenelementen zoals struiken en bomen bestaan in de tuinen van de omliggende percelen. Effecten op de soort zijn dan uitgesloten.

Tot slot zijn alle in gebruik zijnde nesten van vogelsoorten in Nederland beschermd onder de Wet natuurbescherming (artikel 3.1). Het plangebied is zeer geschikt voor weidevogels (zoals grutto) om tot broeden te komen. Met de meeste broedvogels kan echter in het algemeen relatief eenvoudig rekening worden gehouden door werkzaamheden niet uit te voeren in de broedtijd (circa maart tot en met juli<sup>1</sup>) indien concrete broedgevallen aanwezig zijn. Op deze wijze zijn geen belemmeringen vanuit de Wet Natuurbescherming aan de orde.

<sup>1</sup> Voor het broedseizoen wordt in het kader van de wet geen standaardperiode gehanteerd. Het broedseizoen is afhankelijk van klimatologische omstandigheden; dit houdt in dat het seizoen eerder dan wel later van start kan gaan en eerder dan wel later kan eindigen. Van belang is of er broedgevallen aanwezig zijn.

## 5 Bronnen

**Antea Group, 2021.** Natuurtoets Molenblik Medemblik .

**BIJ12, 2017.** Kennisdocument buizerd '*buteo buteo*'.

**BIJ12, z.d.** Doelsoorten, Ransuil. Gevonden op 22-04-2021, op:

<https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/subsidiestelsel-natuur-en-landschap/agrarisch-natuurbeheer-anlb/kennisbank/doelsoorten/ransuil/>

<sup>1</sup> Voor het broedseizoen wordt in het kader van de wet geen standaardperiode gehanteerd. Het broedseizoen is afhankelijk van klimatologische omstandigheden; dit houdt in dat het seizoen eerder dan wel later van start kan gaan en eerder dan wel later kan eindigen. Van belang is of er broedgevallen aanwezig zijn.

De informatie die in dit rapport is opgenomen is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie, door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is niet toegestaan. De informatie is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde, voor het doel waarvoor dit rapport is vervaardigd. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group en wordt u verzocht de gegevens te verwijderen en direct melding te maken bij [security@anteagroup.nl](mailto:security@anteagroup.nl). Derden, zij die niet geadresseerd zijn, kunnen geen rechten aan dit rapport ontleen, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group.

---

## Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1500 trotse ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij elke dag aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt bij ons de allerbeste vakspecialisten van Nederland, maar ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensing en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken. Maar ook aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke opgave brengen wij de juiste kennis aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de mindset om samen voor het beste resultaat te gaan. Op deze manier anticiperen wij op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen. Al bijna 70 jaar.

---

## Contactgegevens

Tolhuisweg 57  
8443 DV HEERENVEEN  
Postbus 24  
8440 AA HEERENVEEN  
T. +31 6 53978776  
E.  
[Mathilde.vandenBroek@AnteaGroup.com](mailto:Mathilde.vandenBroek@AnteaGroup.com)

**[www.anteagroup.nl](http://www.anteagroup.nl)**

### Copyright © 2021

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.