



Broedvogels van de Overveerpolder te Oegstgeest in 2010

Roy Slaterus



Broedvogels van de Overveerpolder te Oegstgeest in 2010

Roy Slaterus



SOVON-inventarisatierapport 2010/30
Dit rapport is samengesteld in opdracht van
de gemeente Oegstgeest

Colofon

© SOVON Vogelonderzoek Nederland 2009

Dit rapport is samengesteld in opdracht van de gemeente Oegstgeest

Samenstelling en tekst: Roy Slaterus

Lay-out: Peter Eekelder

Foto's: Roy Slaterus

SOVON Vogelonderzoek Nederland
Toernooiveld 1
6525 ED Nijmegen
Tel: 024 7 410 410
E-mail: info@sovon.nl
Internet: www.sovon.nl

Dit rapport is samengesteld in opdracht van Gemeente Oegstgeest door Roy Slaterus.

Gelieve als volgt te citeren: Slaterus R. 2010. Broedvogels van de Overveerpolder te Oegstgeest in 2010. SOVON-inventarisatierapport 2010/30. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SOVON en de opdrachtgever.

Inhoudsopgave

1. Inleiding	5
2. Kader en doelstelling	6
3. Gebiedsbeschrijving	7
4. Methode	8
5. Resultaten	9
6. Soortbespreking	10
7. Conclusies	13
Literatuurlijst	14

Bijlage: verspreidingskaarten soorten

1. Inleiding

Gemeente Oegstgeest heeft plannen om in de Overveerpolder een sportterrein aan te leggen om aan de toenemende vraag in de gemeente te voldoen. Uitvoering van dit plan kan effect hebben op de aanwezige natuurwaarden. De gemeente heeft daar in eerdere jaren reeds onderzoek naar laten uitvoeren (cf Huizer et al. 2008). In het kader van een eventuele ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet werd in opdracht van Gemeente Oegstgeest in het voorjaar van 2010 een broedvogelinventarisatie uitgevoerd van de Overveerpolder. Het primaire doel was het in kaart brengen van eventueel aanwezige jaar rond beschermde vogelnesten (cf Dienst Regelingen, 26 augustus 2009). Daarnaast werd ook de aanwezigheid van overige broedvogelsoorten onderzocht. In deze rapportage worden de resultaten van deze inventarisatie beschreven.

De inventarisatie werd uitgevoerd door Roy Slaterus, die eveneens dit rapport samenstelde. Een aantal gebruikers van het gebied verleende toestemming voor het betreden van hun terreinen tijdens het veldwerk. Dries Oomen (SOVON) was behulpzaam bij het maken van het kaartmateriaal. Zij worden hartelijk bedankt. Het basismateriaal behorend bij deze inventarisatie ligt opgeslagen in het kantoor van SOVON te Nijmegen.

2. Kader en doelstelling

Gemeente Oegstgeest heeft plannen om in de Overveerpolder een sportterrein aan te leggen om aan de toenemende vraag in de gemeente te voldoen. Uitvoering van dit plan kan effect hebben op de aanwezige natuurwaarden. De gemeente heeft daar in eerdere jaren reeds onderzoek naar laten uitvoeren (cf Huizer et al. 2008). Aanvullend hierop heeft de gemeente in 2010 een vlakdekkende broedvogelinventarisatie door SOVON laten uitvoeren. Deze richtte zich primair op vogelsoorten waarvan het nest jaarrond beschermd is (categorie 1-4, zie onder). Daarnaast werden ook alle overige broedvogelsoorten onderzocht.

Bescherming tijdens het broedseizoen

Tijdens werkzaamheden moet rekening worden gehouden met het broedseizoen van vogels. De Flora- en faunawet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Het gaat erom of er een broedgeval is. Verblijfplaatsen van vogels die deze het gehele jaar gebruiken, zijn jaarrond beschermd. Slechts een beperkt aantal soorten bewoont het nest permanent of keert elk jaar terug naar hetzelfde nest (zie hieronder). De meeste vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat om een nieuw nest te maken. Deze vogelnesten voor eenmalig gebruik vallen alleen tijdens het broedseizoen onder de bescherming van artikel 11 van de Flora- en faunawet. Voor deze soorten is geen ontheffing nodig voor werkzaamheden buiten het broedseizoen (cf Dienst Regelingen, 26 augustus 2009).

Nesten die het hele jaar door zijn beschermd

Op de volgende categorieën gelden de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Flora- en faunawet het gehele seizoen:

1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: Steenuil).
2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: Roek, Gierzwaluw en Huismus).

3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: Ooievaar, Kerkuil en Slechtvalk).
4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: Boomvalk, Buizerd en Ransuil).

Tabel 1. Lijst van jaarrond beschermde vogelnesten.

Soort	Categorie
Ooievaar	3
Zwarte Wouw	4
Wespendief	4
Sperwer	4
Havik	4
Buizerd	4
Boomvalk	4
Slechtvalk	3
Gierzwaluw	2
Kerkuil	3
Oehoe	3
Ransuil	4
Steenuil	1
Grote Gele Kwikstaart	3
Roek	2
Huisemus	2

3. Gebiedsbeschrijving

Het onderzoeksgebied is gelegen in de gemeente Oegstgeest in de provincie Zuid-Holland. Het is relatief klein van omvang en ligt in een overwegend stedelijke omgeving. Het heeft een maximale lengte van ca. 330 m en een maximale breedte van ca. 200 m. Het wordt aan de noordoostzijde begrensd door de Haarlemmertrekvaart. Het gebied ligt niet in of bij een Natura 2000-gebied of een beschermd of staatsnatuurmonument.

De meest opvallende landschapselementen in het onderzoeksgebied zijn extensief beheerd grasland

met smalle sloten en een erf met twee schuren en gehouden dieren in het noordelijke deel, een sportveld in het zuidwestelijke deel en een verenigingsterrein (scouting) in het zuidoosten. Langs de westgrens loopt een lange, smalle bomensingel en ook elders zijn singels en houtwallen aanwezig, met name in het zuidoosten. Woongebieden liggen in de directe omgeving, maar vallen buiten het onderzoeksgebied (zie figuur 1 voor de exacte ligging en de gebiedsbegrenzing).



Figuur 1. Ligging en begrenzing van het onderzoeksgebied.



Figuur 2. Zicht op het centrale deel van de Overveerpolder.



Figuur 3. Groot Hoefblad langs de zuidgrens van het onderzoeksgebied.

4. Methode

Alle in het onderzoeksgebied aanwezige broedvogelsoorten werden gekarteerd, inclusief de in het wild levende exoten (bijvoorbeeld Nijlgans en Fazant) en gedomesticeerde vormen (bijvoorbeeld Soepeend). Het veldwerk en de interpretatie zijn uitgevoerd volgens de richtlijnen van de zogenaamde BMP-methode, zoals beschreven in Van Dijk (2004). Dit houdt in dat tussen eind maart en begin juli vijf gebiedsdekkende bezoeken zijn volbracht. Deze vonden plaats tijdens de vroege ochtenduren, wanneer de trefkans op de meeste vogelsoorten het hoogst is. Daarnaast werd ook een gebiedsdekkende avond- en nachtronde uitgevoerd, speciaal voor nachttactieve soorten zoals uilen.

In totaal werden 545 minuten aan veldwerk besteed (zie tabel 2 voor exacte tijdsbesteding). Alle relevante waarnemingen werden ter plekke genoteerd op een veldkaart. De omzetting van

deze gegevens naar de zogenaamde 'soortkaarten' en de interpretatie daarvan gebeurden na afloop. Het veldwerk was gericht op het vaststellen van territoria. Daarnaast werd gericht gezocht naar nesten van soorten waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn. Speciale aandacht ging daarbij uit naar de gebouwen in het centrale deel van het onderzoeksgebied, waarin mogelijk Huismussen of uilen zouden kunnen broeden.

Het weer is van invloed op de activiteit van vogels en daardoor op de doelmatigheid van het inventariseren. Harde wind, neerslag en lage temperatuur zijn belemmerende factoren. Ook hoge temperaturen komen de activiteit – en dus de trefkans – van veel vogelsoorten niet ten goede. Het onderzoeksgebied is daarom uitsluitend onder gunstige weersomstandigheden bezocht: bij droog en kalm weer.

Tabel 2. Datums en tijden van veldwerk.

Datum	Tijden	Ronde
24 maart 2010	09:30-10:50	ochtend 1
20 april 2010	04:45-05:45	nacht
20 april 2010	05:45-07:30	ochtend 2
5 mei 2010	05:45-06:15	ochtend 3
26 mei 2010	06:00-07:30	ochtend 4
5 juni 2010	21:50-22:50	avond
23 juni 2010	06:30-07:30	ochtend 5

5. Resultaten

In totaal werden 73 territoria van 23 verschillende vogelsoorten vastgesteld (zie tabel 3). Daaronder bevonden zich geen zeldzame soorten, zoals soorten van de Rode Lijst (van Beusekom et al. 2005). Ook soorten met jaarrond beschermde nesten werden niet aangetroffen (zie tabel 1). Ooievaar werd eenmaal foeragerend aangetroffen maar deze soort broedde niet binnen de gebiedsgrenzen. Andere soorten waarvan werd vastgesteld dat ze gebruik maakten van het onderzoeksgebied maar er niet broedden zijn Bergeend, Scholekster, Tureluur, Halsbandparkiet en Kauw. Deze zullen wel in de directe omgeving van het onderzoeksgebied gebroed hebben. Voorts werden Braamsluiper en Zanglijster als doortrekker vastgesteld en was er een losse waarneming – niet territorium-indicerend – van Boomkruiper.

Het gehele onderzoeksgebied wordt door broedvogels benut, maar het merendeel van de territoria werd vastgesteld in de aanwezige bossages, met een clustering van territoria in het zuidoostelijke deel van het onderzoeksgebied. Aan typische weidevogels werd alleen Kievit vastgesteld in het meest open centrale deel. Andere soorten die ook afhankelijk zijn van het grasland en de sloten zijn Knobbelzwaan, Krakeend, Wilde Eend, Waterhoen en Meerkoet. Voorts was er een typische rietbewoner, namelijk Kleine Karekiet, in een kleine pluk riet in het uiterste noorden.

Tabel 3. Aantal territoria van broedvogels in de Overveerpolder te Oegstgeest in 2010.

Soort	Aantal territoria
Knobbelzwaan	1
Krakeend	1
Wilde Eend	6
Soepeend	3
Waterhoen	2
Meerkoet	5
Kievit	1
Houtduif	5
Turkse Tortel	1
Winterkoning	7
Heggenmus	4
Roodborst	4
Merel	5
Kleine Karekiet	1
Zwartkop	5
Tjiftjaf	5
Fitis	2
Staartmees	1
Pimpelmees	3
Koolmees	7
Ekster	2
Zwarte Kraai	1
Groenling	1

6. Soortbespreking

Hierna volgt een korte bespreken van alle soorten waarvan territoria werden aangetroffen. Daarin wordt ingegaan op de status van de soort in Nederland en op eventuele bijzonderheden met betrekking tot het voorkomen binnen het onderzoeksgebied. Het achter elke soortnaam vermelde aantal verwijst naar het aantal vastgestelde territoria in 2010. De vermelde aantalschattingen zijn afkomstig uit de meest recente broedvogelatlas (SOVON 2002).

KNOBBELZWAAN *Cygnus olor* (1)

Er vond één broedgeval plaats van Knobbelzwaan. Het nest bevond zich op een oever in het uiterste zuidoosten van het onderzoeksgebied. Knobbelzwaan is een wijdverspreide broedvogel in Nederland, die slechts ontbreekt in waterarme gebieden zoals de Veluwe en delen van Drenthe, Noord-Brabant en Limburg. In 1998-2000 werd het aantal broedparen geschat op 5.500-6.500.



Figuur 4. Knobbelzwaan op nest in de Overveerpolder.

KRAKEEND *Anas strepera* (1)

Er werd één territorium van Kraakeend vastgesteld. Een nest werd niet gevonden. In 1998-2000 werd het aantal broedparen geschat op 6.000-7.000. Zowel het aantal broedparen als overwinteraars in Nederland vertoont de laatste decennia een sterke stijging.

WILDE EEND *Anas platyrhynchos* (6)

Met in 1998-2000 naar schatting 350.000-500.000 broedparen in Nederland is Wilde Eend een van de talrijkste broedvogels. De soort nestelt in uiteenlopende habitats, doorgaans op korte afstand van water. De hoogste dichtheden worden bereikt in het westen en noorden van het land. Op de hogere zandgronden is de soort aanmerkelijk schaarser. In het onderzoeksgebied werden zes territoria vastgesteld. De soort foerageert vooral op grasland en in sloten. De nesten liggen soms op onverwachte plekken, zoals onder struiken of in knotwilgen.

SOEPEEND *Anas platyrhynchos forma domesticus* (3)
Soepeend is de gedomesticeerde tegenhanger van de Wilde Eend. Uiterlijk is hij vaak te herkennen aan afwijkend – vaak wit – getekende veerpartijen. De landelijke populatie is slecht bekend, maar schattingen in 1998-2000 kwamen uit op 35.000-60.000 broedparen. In het onderzoeksgebied werden drie territoria vastgesteld. De door gebruikers van het gebied gehouden eenden (en andere siervogels) werden niet geteld.

WATERHOEN *Gallinula chloropus* (2)

Waterhoen is een bewoner van weelderige oevers van stilstaand of langzaam stromend zoet water. De soort komt in het gehele land voor in waterrijke gebieden. In 1998-2000 werd het aantal broedparen geschat op 40.000-55.000. Zowel in het uiterste noorden als in het uiterste zuiden van het onderzoeksgebied werd een territorium vastgesteld. De vogels hielden zich hier vooral op langs slootkanten.

MEERKOET *Fulica atra* (5)

Een van de bekendste watervogels in Nederland is Meerkoet. Hij komt voor op allerlei plekken met zoet water en een rijke vegetatie, ook in stedelijk gebied. Het aantal broedparen in 1998-2000 werd geschat op 130.000-180.000. In het onderzoeksgebied werden vijf territoria vastgesteld, uitsluitend langs sloten.

KIEVIT *Vanellus vanellus* (1)

Eén paar Kieviten slaagde erin om ten minste één jong groot te brengen. Het territorium bevond zich in het meest open, centrale deel van het onderzoeksgebied. Andere Kieviten – evenals andere weidevogels zoals Bergeend, Tureluur en Scholekster – bezochten het gebied soms om te foerageren. Waarschijnlijk waren deze afkomstig uit de polders ten oosten van het onderzoeksgebied. Kieviten komen verspreid over Nederland voor in weide- en akkergebieden. In 1998-2002 werd het aantal broedparen geschat op 200.000-300.000.

HOUDUIF *Columba palumbus* (5)

Met in 1998-2000 naar schatting 400.000-500.000 broedparen is Houtduif een talrijke broedvogel. De soort komt in vrijwel het hele land voor, met uitzonderlijk van de meest boomarme landschappen. In het onderzoeksgebied werden vijf territoria aangetroffen. De soort broedt hoofdzakelijk in bomen en struiken maar foerageert veelvuldig op de grond.

TURKSE TORTEL *Streptopelia decaocto* (1)

In 1950 broedde Turkse Tortel voor het eerst in Nederland. Sindsdien is het aantal broedparen sterk gegroeid. In 1998-2000 werd het aantal

paren geschat op 50.000-100.000. In het onderzoeksgebied werd één territorium vastgesteld. In de aangrenzende woonwijken komen meer paren voor. Als cultuurvolger voelt deze soort zich thuis rondom menselijke activiteiten.

WINTERKONING *Troglodytes troglodytes* (7)

Met in 1998-2000 naar schatting 500.000-600.000 broedparen is Winterkoning een van de talrijkste broedvogels van Nederland. Door verhoogde sterfte tijdens strenge winters schommelt het aantal enigszins. Een rijke ondergroei van struiken en kruiden is een voorwaarde voor vestiging. In het onderzoeksgebied werden zeven territoria vastgesteld. Mogelijk is dit aantal zelfs nog hoger na een zachte winter; de winter van 2009/10 was immers vrij streng.

HEGGENMUS *Prunella modularis* (4)

Heggenmussen gedragen zich nogal onopvallend maar wie zijn zang kent zal hem in heel Nederland tegenkomen. In 1998-2000 werd het aantal broedparen geschat op 200.000-250.000. De soort voelt zich thuis op allerlei plekken met dicht struikgewas. In het onderzoeksgebied werden vier territoria vastgesteld.

ROODBORST *Erithacus rubecula* (4)

Met in 1998-2000 naar schatting 350.000-400.000 broedparen behoort Roodborst tot de algemene broedvogels van Nederland. De soort komt in het hele land voor, al worden open landschappen in het westen en noorden grotendeels gemeden. In de Overveerpolder voelt de soort zich thuis in struikgewas en bomen; de vier territoria in 2010 bevonden zich derhalve aan de randen van het onderzoeksgebied.

MEREL *Turdus merula* (5)

Merel is een van de talrijkste broedvogels van Nederland. De soort komt in het gehele land voor. In 1998-2000 werd het aantal broedparen geschat op 900.000-1.200.000. Het onderzoeksgebied was in 2010 goed voor vijf territoria. Van oorsprong is het een bosvogel, maar tegenwoordig voelt hij zich vrijwel overal thuis waar enige bomen en struiken groeien.

KLEINE KAREKIET *Acrocephalus scirpaceus* (1)

In een kleine rietkraag in het noorden van het onderzoeksgebied werd één territorium van Kleine Karekiet vastgesteld. Deze algemene soort broedt bijna uitsluitend in riet en komt voor in waterrijke gebieden verspreid over het land. In 1998-2000 werd het aantal broedparen geschat op 150.000-250.000.

ZWARTKOP *Sylvia atricapilla* (5)

Een goed ontwikkelde struiklaag is een voorwaarde voor de vestiging van Zwartkop. De hoogste

dichtheden worden bereikt in oudere loofbossen, maar ook in parklandschappen is het een bekende verschijning. In 1998-2000 werd het aantal broedparen geschat op 270.000-320.000. In het onderzoeksgebied werden vijf territoria vastgesteld, uitsluitend in struikgewas in het zuidoosten.

TJIFTJAF *Phylloscopus collybita* (5)

Tjiftjaf voelt zich thuis in allerlei bos- en parklandschappen met hoge bomen en een rijke ondergroei. Ook in de Overveerpolder is geschikt biotoop aanwezig. In 2010 werden hier vijf territoria vastgesteld. In 1998-2000 werd de landelijke populatie geschat op 550.000-600.000 broedparen.

FITIS *Phylloscopus trochilus* (2)

Net als Tjiftjaf is de qua uiterlijk gelijkende Fitis een wijdverspreide soort in Nederland. De hoogste dichtheden worden bereikt in jonge bossen. In 1998-2000 werd het aantal broedparen geschat op 450.000-550.000. In het onderzoeksgebied werden twee territoria vastgesteld in de struwelen langs de zuidoostgrens.

STAARTMEES *Aegithalos caudatus* (1)

In de bomen en struiken in het zuiden van het onderzoeksgebied bracht een paar Staartmezen meerdere jongen groot. Deze fraaie soort komt hoofdzakelijk voor in de bosrijke delen van Nederland. In open landschappen in het westen en noorden is hij tamelijk zeldzaam. De duinstreek is wel in trek. In 1998-2000 bedroeg het aantal broedparen naar schatting 30.000-40.000.

PIMPELMEES *Parus caeruleus* (3)

Pimpelmees komt overal in Nederland voor, maar de hoogste dichtheden worden behaald in rijke bossen. In 1998-2000 werd het aantal broedparen geschat op 275.000-325.000. Het ophangen van nestkasten draagt zeker bij aan de vestiging in minder ideale habitats. In het onderzoeksgebied werden drie territoria vastgesteld.

KOOLMEES *Parus major* (7)

Koolmees is de meest wijdverspreide mezensoort in Nederland. De aanwezigheid van geschikte nestholten is een voorwaarde voor vestiging. Nestkasten worden door Koolmezen veelvuldig gebruikt, vooral in stedelijke gebieden. In 1998-2000 werd het aantal broedparen geschat op 500.000-600.000. In het onderzoeksgebied werden zeven territoria aangetroffen.

EKSTER *Pica pica* (2)

Met in 1998-2000 naar schatting 40.000-60.000 broedparen is Ekster een bekende verschijning in Nederland. Hij bewoont bij voorkeur parkachtige landschappen met een afwisseling van open terrein en bossage. Hij bouwt grote takkennesten in bomen

en struiken. In het onderzoeksgebied werden twee bewoonde nesten aangetroffen, beide in de singel langs de westgrens.

ZWARTE KRAAI *Corvus corone* (1)

Hoog in een boom langs de zuidgrens van het onderzoeksgebied nestelde een paar Zwarte Kraaien. Deze soort is een gewone verschijning in heel Nederland. In 1998-2000 werd het aantal broedparen geschat op 70.000-100.000. Dat is aanmerkelijk meer dan de schatting voor 1973-77 die 30.000-40.000 paren bedroeg. Behalve door Zwarte Kraaien werd het onderzoeksgebied ook veelvuldig bezocht door Kauwen – een kleinere kraaiachtige. Deze soort broedde met meerdere paren in de directe omgeving.

GROENLING *Chloris chloris* (1)

Groenlingen broeden in halfopen landschappen, waarbij een combinatie van nestgelegenheid (coniferen, sparren, dichte struiken), voedselrijke plekken (ruderaalterreinen, vruchtdragendestruiken) en hoge zangposten van belang is. Verspreid over het hele land komt de soort voor. In 1998-2000 werd het aantal broedparen geschat op 50.000-100.000. In het gevarieerde zuidelijk-oostelijke deel van het onderzoeksgebied werd één territorium vastgesteld. Een nest werd niet gevonden.

7. Conclusies

De broedvogelinventarisatie van de Overveerpolder te Oegstgeest in 2010 resulteerde in 73 territoria van 23 verschillende vogelsoorten (zie tabel 2). Daaronder bevonden zich geen zeldzame soorten, zoals soorten van de Rode Lijst (van Beusekom et al. 2005). Ook vogelsoorten waarvan de nesten het gehele jaar door zijn beschermd (categorie 1 t/m 4) werden niet aangetroffen. Geconcludeerd mag worden dat er in 2010 in het onderzoeksgebied geen jaarrond beschermde vogelnesten aanwezig waren. De nesten van de 23 vastgestelde broedvogelsoorten zijn wettelijk alleen tijdens het broedseizoen beschermd, wanneer er sprake is van een broedgeval. Voor deze soorten is geen ontheffing nodig voor werkzaamheden buiten het broedseizoen.

Literatuurlijst

van Beusekom R., Huigen P., Hustings F., de Pater K. & Thissen J. (red.) 2005. Rode Lijst van de Nederlandse broedvogels. Tirion Uitgevers B.V., Baarn.

Dienst Regelingen, 26 augustus 2009. Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten. Ontheffing Flora- en faunawet ruimtelijke ingreep. Den Haag.

van Dijk A.J. 2004. Handleiding Broedvogel Monitoring Project (Broedvogelinventarisatie in proefvlakken). SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.


Huizer J., van der Kuil R. & van der Meulen A. 2008. Quicksan natuurwaarden Overveerpolder Oegstgeest. Stichting CREX, Voorhout.

SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. – Nederlandse Fauna 5. Nationaal Historisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.

Bijlage: verspreidingskaarten soorten

Overveerpolder 2010

Knobbelzwaan 1 territorium



● Geldig territorium
— Gebiedsgrens

© Topografische Dienst Kadaster / SOVON Vogelonderzoek 2006-2010




0 0.03 0.06 0.09 0.12 0.15 km



Overveerpolder 2010

Krakeend 1 territorium



© Topografische Dienst Kadaster / SOVON Vogelonderzoek 2006-2010




0 0.03 0.06 0.09 0.12 0.15 km



Overveerpolder 2010

Wilde Eend 6 territoria



● Geldig territorium
— Gebiedsgrens

© Topografische Dienst Kadaster / SOVON Vogelonderzoek 2006-2010




0 0.03 0.06 0.09 0.12 0.15 km




Overveerpolder 2010

Soepeend 3 territoria



Overveerpolder 2010

Waterhoen 2 territoria



Overveerpolder 2010

Meerkoet 5 territoria



● Geldig territorium
— Gebiedsgrens

© Topografische Dienst Kadaster / SOVON Vogelonderzoek 2006-2010




0 0.03 0.06 0.09 0.12 0.15 km




Overveerpolder 2010

Kievit 1 territorium




Overveerpolder 2010

Houtduif 5 territoria




Overveerpolder 2010

Turkse Tortel 1 territorium



© Topografische Dienst Kadaster / SOVON Vogelonderzoek 2006-2010




Overveerpolder 2010

Winterkoning 7 territoria




Overveerpolder 2010

Heggenmus 4 territoria



Overveerpolder 2010

Roodborst 4 territoria




Overveerpolder 2010

Merel 5 territoria




© Topografische Dienst Kadaster / SOVON Vogelonderzoek 2006-2010



Overveerpolder 2010

Kleine Karekiet 1 territorium



● Geldig territorium
- - - Gebiedsgrens

© Topografische Dienst Kadaster / SOVON Vogelonderzoek 2006-2010




0 0.03 0.06 0.09 0.12 0.15 km



Overveerpolder 2010

Zwartkop 5 territoria



● Geldig territorium
— Gebiedsgrens

© Topografische Dienst Kadaster / SOVON Vogelonderzoek 2006-2010




0 0.03 0.06 0.09 0.12 0.15 km



Overveerpolder 2010

Tjiftjaf 5 territoria



● Geldig territorium
— Gebiedsgrens

© Topografische Dienst Kadaster / SOVON Vogelonderzoek 2006-2010




0 0.03 0.06 0.09 0.12 0.15 km



Overveerpolder 2010


Fitis 2 territoria



© Topografische Dienst Kadaster / SOVON Vogelonderzoek 2006-2010


Overveerpolder 2010

Staartmees 1 territorium




Overveerpolder 2010

Pimpelmees 3 territoria



Overveerpolder 2010

Koolmees 7 territoria



© Topografische Dienst Kadaster / SOVON Vogelonderzoek 2006-2010




0 0.03 0.06 0.09 0.12 0.15 km




Overveerpolder 2010

Ekster 2 territoria




● Geldig territorium
/ Gebiedsgrens

© Topografische Dienst Kadaster / SOVON Vogelonderzoek 2006-2010




Overveerpolder 2010

Zwarte Kraai 1 territorium



Overveerpolder 2010

Groenling 1 territorium



● Geldig territorium
— Gebiedsgrens

© Topografische Dienst Kadaster / SOVON Vogelonderzoek 2006-2010



0 0.03 0.06 0.09 0.12 0.15 km



SOVON Vogelonderzoek Nederland

Natuurplaza (gebouw Mercator 3)
Toernooiveld 1

T (024) 7 410 410

E info@sovon.nl

I www.sovon.nl

Gemeente Oegstgeest heeft plannen om in de Overveerpolder een sportterrein aan te leggen om aan de toenemende vraag in de gemeente te voldoen. Uitvoering van dit plan kan effect hebben op de aanwezige natuurwaarden. De gemeente heeft daar in eerdere jaren reeds onderzoek naar laten uitvoeren.

In het kader van een eventuele ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet werd in opdracht van Gemeente Oegstgeest in het voorjaar van 2010 een broedvogelinventarisatie uitgevoerd van de Overveerpolder. Het primaire doel was het in kaart brengen van eventueel aanwezige jaarrond beschermde vogelnesten. Daarnaast werd ook de aanwezigheid van overige broedvogelsoorten onderzocht. In deze rapportage worden de resultaten van deze inventarisatie beschreven.