

Betreft: effecten bouw
Locatie: Hotel Woerden
Datum: 2 augustus 2021
Ecoloog: 06-27564247
Steller: Peter van der Linden, ecoloog

Vanuit de Omgevingsdienst regio Utrecht zijn enkele opmerkingen gemaakt m.b.t. de bouw van het Hotel Woerden nabij de A12. In voorliggend addendum wordt gereageerd op de opmerkingen. Het document is een aanvulling op de eerdere documenten. De ruimtelijke onderbouwing wordt – waar nodig – separaat aangevuld.

Vleermuizen

Binnen het perceel, waar het hotel Woerden wordt gebouwd, zijn op dit moment geen gebouwen aanwezig. Verder staan er nauwelijks bomen op het perceel. De bomen die er staan zijn gecontroleerd op holten die kunnen duiden op een verblijfplaats van vleermuizen. Dergelijke holten zijn niet aangetroffen. Binnen het plangebied zijn geen verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig.

Het gebied is zeer open en ligt tussen de Rijksweg en een bedrijventerrein. Er zijn geen lijnvormige elementen waarlangs een vliegroute van vleermuizen kan liggen.

Bekend is dat de rosse vleermuis boven moeras en boven weiland jaagt. Het is niet met absolute zekerheid uit te sluiten dat er – al dan niet incidenteel – rosse vleermuizen jagen boven het perceel. Wel is duidelijk dat er geen sprake is van een essentieel jachtgebied – een jachtgebied is essentieel als de kolonie ervan afhankelijk is, met andere woorden dat de kolonie ernstig wordt aangetast als er niet meer gejaagd kan worden op de locatie. De rosse vleermuis is weinig selectief in het jachtgedrag. Er zijn waarnemingen bekend boven moerassen en weilanden, maar ook boven bossen en gebouwen kan de soort worden waargenomen (o.a. eigen waarneming in Hilversum en de bossen ten oosten van Hilversum). De rosse vleermuis kan grote afstanden afleggen tussen de kolonieboom en de jachtgebieden. In de omgeving zijn zeer veel gebieden die geschikt zijn als jachtgebied voor de rosse vleermuis. Er zijn waarnemingen van de rosse vleermuis bekend ten noorden en ten oosten van Woerden, er zijn geen waarnemingen bekend binnen de invloedssfeer van het werk.

De kans dat de bouw van het hotel een effect veroorzaakt op vleermuizen kan met een zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden uitgesloten.

Buizerd

Het bosje waarin de buizerd is aangetroffen blijft behouden. Het gebied waar de vogel jaagt wordt door de geplande ontwikkeling beter geschikt als jachtgebied – er is meer dekking en daarmee zijn er meer prooidieren. In de Bloemendalerpolder te Weesp is een vergelijkbare situatie. Daar broedt de buizerd in een bosje, waarnaast woningen worden gebouwd. In eerste instantie werd er zeer terughoudend gelet op de effecten van de werkzaamheden op de buizerd. Gebleken is dat de buizerd zich weinig tot niets aantrekt van de werkzaamheden op

enkele tientallen meters van het nest. Opvallend is een grotere gevoeligheid buiten de broedtijd. Duidelijk is dat de buizerd snel activiteit accepteert in de omgeving van het nest. Zolang er niet direct in het bosjes wordt gewerkt en men de vogel met rust laat zal er vrij weinig gebeuren. Wel is het van belang dat het nest niet wordt verlicht tijdens het werk of vanuit het hotel. Van de buizerd zijn – bijvoorbeeld langs de A15 – nesten bekend in bomen die in de berm van de Rijksweg staan. Ook dat is een aanwijzing dat de buizerd zich niet snel laat weggagen.

De buizerd heeft in haar territorium verscheidene nesten die naast elkaar gebruikt worden, de vogels wisselen jaarlijks van het nest. De oude nesten worden door de vogels opgeknapt. De buizerd bouwt het liefst in kruinen van hoge bomen, vaak tegen de rand van het bos. Het nest bestaat uit takken en twijgen. Het nest is groot, ongeveer een meter in doorsnede en 60 cm diep. Binnen het territorium van de buizerd zijn nog verschillende bosjes aanwezig met geschikte plekken voor een nest. De buizerd bouw op een bestaand nest van bijvoorbeeld kraaien of op een oud nest van de buizerd zelf, maar ook nieuwe nesten worden regelmatig door de buizerd gebouwd. Volgens het kennisdocument gebruikt de buizerd afwisselend tot drie nesten in haar territorium. De buizerd is daarmee niet afhankelijk van één plek maar maakt gebruik van verschillende mogelijkheden binnen het territorium. De omvang van het territorium is een tot meer vierkante kilometer groot. Verhuizen naar buiten het territorium kan alleen lukken als de locatie niet is bezet door een buizerd. De kans op een leeg en geschikt territorium is echter klein.

Van groter belang is de aanwezigheid van voldoende prooidieren – gelet op de biogeografie en de trend van de populatie – is de aanwezigheid van prooidieren zeer waarschijnlijk limiterend. Door natuurontwikkeling rondom het hotel zal het aantal prooidieren toenemen ten opzichte van het weiland in de huidige situatie. Het habitat voor de buizerd verbeterd.

Rugstreeppad

De rugstreeppad is bekend van de oostzijde van Cattenbroek. Er is een theoretische kans op de rugstreeppad in de winter. Een effect kan eenvoudig voorkomen worden door het plaatsen van een faunascherm rondom de bouw. De sloten zijn ongeschikt (te diep, ook langs de oever) voor de rugstreeppad. Ook voor de zomerperiode geldt dat er een theoretische kans is op de rugstreeppad. Voorafgaand aan de bouw kan dat gecontroleerd worden om effecten te voorkomen.

Ringslang

Er zijn geen broeihopen aanwezig binnen het perceel of juist daarbuiten. Uit de biogeografie van de ringslang is bekend dat West-Nederland een zeer belangrijk gebied voor de ringslang is. De ringslang kan al dan niet frequent jagen binnen het gebied. Voortplanting is uiterst onwaarschijnlijk door het ontbreken van broeihopen of andere broeiplekken.

Platte schijfhoren

De ontheffing is niet geweigerd, omdat na de publicatie van het voornemen de aanvraag is ingetrokken. Naar aanleiding van het voornemen is het project nogmaals kritisch beoor-

deeld en aangepast zodat er geen effect meer zal optreden. De weigering betreft derhalve een ander project dan hetgeen voorligt. De oorzaak van de weigering (althans het voornemen tot) ligt volgens ons vooral op het gebied van de communicatie. Wij hebben een en ander niet voldoende duidelijk kunnen maken (iets wat wij ons natuurlijk aantrekken).

Conclusie

Vleermuizen, rugstreeppad, ringslang en platte schijfhoren worden niet of incidenteel aangetroffen binnen het perceel of binnen de invloedssfeer van het werk. De kans op een effect op de instandhouding van die soorten is marginaal.

De buizerd heeft binnen het territorium verschillende nesten die afwisselend worden gebruikt. De buizerd bouwt zelf een nest of breidt een nest van andere vogels uit tot de gewenste omvang. Binnen het territorium van de buizerd te Woerden zijn verschillende geschikte nestplekken. De kwaliteit van het territorium – het aantal prooidieren – zal door natuurontwikkeling rondom het hotel toenemen. De populatie van de buizerd heeft een positieve trend. De kans op een negatief effect op de populatie van de buizerd is daarmee afwezig.

P.J.H. van der Linden
Els & Linde b.v.

Bronnen

- Anonymus (2017) Kennisdocument Buizerd Buteo buteo. BIJ12
- Bijlsma R.G., 1993. Ecologische atlas van de Nederlandse Roofvogels. Schuyt & Co Haarlem
- <https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/buizerd>
- <https://stats.sovon.nl/stats/soort/2870>



Om een idee te geven over de omvang van het territorium is rondom het nest een cirkel getrokken – op oppervlakte hiervan is 1 km²