

QUICKSCAN SOORTENBESCHERMING

BUIZERDWEG 16-18 TE ASTEN

Colofon

Quicksan soortenbescherming

Projectnummer: EP.22.1072

Versie: 2

Datum: 18 januari 2023

Opdrachtnemer

Agrifirm NWE BV
Bedrijfsontwikkeling Exlan
Waalkade 33
5347 KR Oss

Postbus 300
5340 AH Oss

Locatie

Buizerdweg 16-18 Asten

Contactpersoon



Uitvoerders



Collegiale check



ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN VERVEELVOLDIGD DOOR MIDDEL VAN DRUK, FOTOKOPIE, MICROFILM, GELUIDSBAND, ELEKTRONISCH OF OP WELKE ANDERE WIJZE DAN OOK, EN EVENMIN IN EEN GEAUTOMATISEERD GEGEVENSBESTAND WORDEN OPGESLAGEN, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN AGRIFIRM EXLAN.

Inhoudsopgave

Quickscan soortenbescherming

INLEIDING	4
HOOFDSTUK 1 TOETSINGSKADER	6
HOOFDSTUK 2 ONDERZOEKSRESULTATEN	9
HOOFDSTUK 3 CONCLUSIE	23
LITERATUUR	24
WAARNEMINGEN	25
EFFECTEN INDICATOR SOORTEN	32

Inleiding

Planbeschrijving

Aanleiding

Het plangebied is gelegen aan de Buizerdweg 16-18 te Asten. De sheds staan al enkele jaren leeg en alleen het geraamte is nog aanwezig. De plannen omvatten de sloop van alle sheds en mestlo's. Het bedrijfsgebouw blijft behouden. In dit kader wordt door het bevoegde gezag een toets aan de soortenbescherming noodzakelijk geacht. Bij de uitvoering van de voorgenomen ingrepen moet rekening worden gehouden met het huidige voorkomen van de, op grond van de Wet natuurbescherming, beschermde soorten. Als de voorgenomen ingreep leidt tot het overtreden van verbodsbepalingen betreffende beschermde soorten, moet vrijstelling of ontheffing worden verkregen.

De voorliggende quickscan bevat een inventarisatie van de huidige aanwezigheid van beschermde soorten planten en dieren in en om het plangebied. Tevens worden de te verwachten effecten van de ingreep in het plangebied beoordeeld.

Plangebied

Het plangebied ligt in de plaats Asten in de gelijknamige gemeente Asten. Het plangebied bevindt zich buiten de verkeerskundige en stedenbouwkundige bebouwde kom van Asten.



- Afbeelding 1: luchtfoto plangebied (bron: streetsmart.cyclomedia.com/streetsmart, geraadpleegd op 16/08/2022)

Onderzoeksmethode

Om een goede indicatie van de natuurwaarden binnen het plangebied te krijgen, wordt het onderzoek in verschillende stappen uitgevoerd. Op basis van bronnenonderzoek is nagegaan of er wettelijk beschermde planten- of diersoorten in het gebied voor kunnen komen waaraan extra aandacht geschonken dient te worden tijdens het terreinbezoek.

Na het bronnenonderzoek is een verkennend terreinbezoek gebracht aan het plangebied. Hierbij is, op basis van de gegevens van het literatuuronderzoek, beoordeeld voor welke soorten het gebied daadwerkelijk een geschikte habitat biedt en daarmee welke soorten er daadwerkelijk voor kunnen komen. Vervolgens zijn de mogelijke effecten op de verwachte beschermde soorten beschreven.

Op basis van de doorlopen procedures zijn conclusies getrokken met betrekking tot de eventuele negatieve effecten en/of obstakels inzake de Wet natuurbescherming.

Op maandag 22 augustus 2022 is de locatie tussen 10:00 en 11:00 uur ter plaatse geïnventariseerd, om te onderzoeken of het plangebied een zodanig belangrijke status heeft dat een aanvullend veldonderzoek noodzakelijk is. Op het moment van inventarisatie was het 21 graden Celsius en bewolkt.

Op basis van terreinkenmerken is beoordeeld of het terrein geschikt is voor de, in de regio voorkomende, beschermde soorten.

Doelstelling

Om een indicatie te krijgen van de effecten die de sloopwerkzaamheden hebben op de natuurwaarden binnen het plangebied, dienen de volgende vragen te worden beantwoord:

1. Welke wettelijk beschermde soorten komen in het plangebied voor? Welke status hebben deze soorten?
2. Welke invloed heeft de geplande ingreep in het betreffende gebied op de beschermde soorten en komt daarmee de staat van instandhouding in gevaar?
3. Hoe dient omgegaan te worden met eventuele negatieve effecten van het plan op wettelijk beschermde planten- en diersoorten, en welke vervolgstappen zijn nodig?

1

Toetsingskader

Wet natuurbescherming

De bescherming van natuur is in Nederland vastgelegd in nationale wetgeving. De nationale wetgeving is een Nederlandse implementatie van de belangrijkste Europese wetgevingselementen. Per 1 januari 2017 zijn de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998 vervangen door de Wet natuurbescherming. De uitvoering van deze nieuwe wet is grotendeels in handen van de provincies gekomen.

1.1 Gebiedsbescherming

De Wet natuurbescherming noemt bekende maar ook enkele nieuwe soorten natuurgebieden die bescherming behoeven: de Natura 2000-gebieden, het Natuurnetwerk Nederland (NNN), bijzondere provinciale natuurgebieden en landschappen, bijzondere nationale natuurgebieden en de nationale parken. Bij ontwikkelingen met name in het buitengebied moet rekening worden gehouden met het al dan niet van toepassing zijn van de beschermingsregimes van deze natuurgebieden. Ieder gebied kent een eigen beschermingsregime dat afzonderlijk gewogen dient te worden in relatie tot plannen, projecten en andere handelingen met mogelijk nadelige effecten voor de beschermde natuurwaarden.

Natura 2000-gebieden

De bekendste natuurgebieden zijn de Natura 2000-gebieden, zij kennen tevens het meest strikte beschermingsregime. De basis voor Natura 2000 zijn de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. In Nederland zijn 164 gebieden als Natura 2000-gebied aangewezen. Voor ieder gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen bepaald die betrekking kunnen hebben op de bescherming van specifieke flora en fauna alsook leefgebieden van soorten. Alle projecten en handelingen binnen of buiten de gebiedsgrenzen mogen geen verstoring of verslechterend effect hebben op de instandhoudingsdoelstellingen. Voor de voorgenomen ontwikkeling is hier, voor zover van toepassing, separaat aan getoetst. In deze rapportage wordt hier verder niet op ingegaan.

Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS) is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. De provincies zijn belast met de taak een dergelijk netwerk tot stand te laten te komen en in stand te laten. De uitvoering hiervan is hoofdzakelijk gestuurd vanuit de ruimtelijke ordening (provinciale verordeningen). Binnen het Natuurnetwerk Nederland geldt een “nee, tenzij”- benadering.

Overige gebieden

Naast de bovengenoemde gebieden kunnen gebieden aangewezen worden als ‘bijzondere provinciale natuurgebieden’, ‘bijzondere provinciale landschappen’ of ‘nationaal park’. De bescherming van deze gebieden vindt net als bij het NNN plaats via het ruimtelijk spoor. Daarnaast kan een gebied aangewezen worden als ‘bijzonder nationaal gebied’, een soort voorloper van de aanwijzing als Natura 2000-gebied. De bescherming van deze gebieden stemt dan ook overeen met de bescherming van Natura 2000-gebieden.

1.2 Soortenbescherming

De Wet natuurbescherming deelt soorten in drie beschermingsregimes in. Daarnaast zijn er vrijgestelde soorten en jaarrond beschermde vogelnesten.

- 1) Beschermingsregime soorten vogelrichtlijn
- 2) Beschermingsregime soorten habitatrichtlijn
- 3) Beschermingsregime andere soorten
- 4) Vrijgestelde soorten
- 5) Jaarrond beschermde vogelnesten

Vogelrichtlijn

Onder de soorten van de Vogelrichtlijn vallen alle van nature in Nederland in het wild levende vogels. Het is verboden om:

- Opzettelijk vogels te doden of te vangen;
- Opzettelijk vogelnesten, -rustplaatsen en – eieren te vernielen of te beschadigen of vogelnesten weg te nemen;
- Eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben;
- Opzettelijk vogels te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

Habitatrichtlijn

Onder de soorten van de Habitatrichtlijn vallen soorten die genoemd zijn in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage I van het Verdrag van Bonn. In de Bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd.

Wat betreft deze soorten is het verboden om:

- Opzettelijk dieren te doden of te vangen;
- Opzettelijk dieren te verstoren;
- Opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen;
- Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
- Opzettelijk planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken, te verzamelen, af te snijden, te onttwortelen of te vernielen.

Ook is het verboden deze soorten te verkopen, te vervoeren voor verkoop, te verhandelen, te ruilen of te kopen, tenzij het gaat om gefokte of gekweekte dieren of planten.

Andere soorten

Onder het beschermingsregime andere soorten vallen soorten waarvan er geen Europese verplichting tot bescherming is. Dit zijn soorten die vanuit nationaal belang extra bescherming behoeven. Het beschermingsniveau van deze soorten kan per provincie verschillen.

Het is verboden om:

- 1) Opzettelijk dieren te doden of te vangen;
- 2) Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
- 3) Opzettelijk (vaat)planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken te verzamelen, af te snijden, te onttwortelen of te vernielen.

Provincies hebben de bevoegdheid om bij provinciale verordening vrijstelling te verlenen voor nationaal beschermde soorten.

Vrijgestelde soorten

De verboden zijn niet van toepassing op de bosmuis, de huisspitsmuis en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevinden. Ook vallen de zwarte rat, bruine rat, huismuis, de mol en exoten niet onder beschermingsregime van de Wet natuurbescherming en mogen opzettelijk gedood en gevangen worden. Daarnaast geldt, zoals hierboven reeds aangegeven, dat provincies de bevoegdheid hebben vrijstelling te verlenen voor bepaalde soorten.

Jaarrond beschermde vogelnesten

De opgestelde lijst met jaarrond beschermde nesten voor vogels is een beleidsdocument dat voortvloeit uit de voormalige Flora- en faunawet en meegenomen is onder de Wet natuurbescherming. De nesten zijn ingedeeld in categorieën (1 t/m 5) waarvan de categorie 1 t/m 4 jaarrond beschermd zijn. Nesten in categorie 5 zijn enkel beschermd bij afwezigheid van voldoende alternatieven.

- 1) Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats
- 2) Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
- 3) Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
- 4) Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen.
- 5) Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen.

1.3 Houtopstanden

De regels van de Boswet zijn grotendeels onveranderd opgenomen in de Wet natuurbescherming. Een houtopstand is een zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend, die een oppervlakte van 10 are of meer beslaat ofwel een rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat.

Buiten de bescherming vallen:

- houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom (voor deze wet);
- houtopstanden op erven of in tuinen
- fruitbomen en windschermen om boomgaarden;
- naaldbomen bedoeld als kerstbomen en niet ouder dan twintig jaar
- kweekgoed;
 - uit populieren of wilgen bestaande wegbeplantingen,
 - beplantingen langs waterwegen, en
 - eenrijige beplantingen langs landbouwgronden;
- Het dunnen van een houtopstand;
- uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die zijn bedoeld voor de productie van houtige biomassa indien zij:
 - ten minste eens per tien jaar worden geoogst;
 - bestaan uit minstens tienduizend per hectare per beplantingseenheid
 - bestaande uit een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee meter;
 - zijn aangelegd na 1 januari 2013.

2

Onderzoekresultaten

2.1 Bronnenonderzoek


Gegevens van websites als www.waarneming.nl zijn geraadpleegd voor achtergrondinformatie. Een groot aantal amateurs en professionals publiceert op deze bekende websites zijn natuurwaarnemingen, die worden gecontroleerd door een validatiecommissie. Zodoende zijn de waarnemingen uit deze bronnen redelijk betrouwbaar, maar moeilijk te verifiëren. De waarnemingen geven eventueel wel een indicatie van soorten waar tijdens het veldonderzoek extra aandacht aan besteed dient te worden.

Natuurnetwerk Nederland

Het natuurbeheerplan is een beleidskader om het Europese, rijks- en provinciale natuur- en landschapsbeleid te realiseren. Het gaat hier om bestaande natuurgebieden, gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt, landbouwgebieden worden ingericht en beheerd volgens agrarisch natuurbeheer en de Natura 2000-gebieden.

Het plangebied ligt nabij het Natuurnetwerk Nederland en buiten andere natuurgebieden zoals Natura 2000. Het meest dichtbijgelegen Natura 2000-gebied is het Natura 2000-gebied "Deurnsche Peel & Mariapeel".

Het Natuurnetwerk Brabant is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Het is een netwerk van deels bestaande en deels nieuwe natuurgebieden die door ecologische verbindingzones met elkaar verbonden zijn. Hierdoor kunnen dieren zich makkelijker verplaatsen tussen verschillende natuurgebieden. Zo wordt de biodiversiteit (het totaal aan planten en dieren) bevorderd. Ongeveer 90% van het Natuurnetwerk Brabant wordt gevormd door bestaande natuurgebieden zoals bijvoorbeeld de Biesbosch en de Maashorst. Maar het netwerk is nog niet compleet. Er ontbreken nog veel gebieden en verbindingen die belangrijk zijn voor dieren en planten. Vanwege de klimaatverandering veranderen hun leefomstandigheden en wordt dat nog urgenter. Zij moeten zich kunnen verplaatsen om genoeg voedsel te kunnen blijven vinden en zich voort te planten. Maar het Natuurnetwerk is er niet alleen voor planten en dieren, maar ook voor mensen. Mensen genieten, recreëren en ontspannen in de natuur en voelen zich gelukkiger. Natuur schept kansen voor ondernemers die natuur en hun bedrijf willen combineren en helpt tegen de gevolgen van klimaatverandering.



• Afbeelding 2: ligging Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000
(bron: atlasleefomgeving.nl/kaarten, geraadpleegd op 16/08/2022)

2.2 **Veldonderzoek**

Op verschillende punten in het plangebied zijn waarnemingen verricht. Tijdens het veldbezoek is het gebied beoordeeld op de aanwezigheid van beschermde soorten en de habitatgeschiktheid voor beschermde soorten. Er is extra aandacht besteed aan de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen en vogelnesten.

De ecologische factoren in de omgeving zijn met behulp van een digitale fotocamera vastgelegd. Om de flora en fauna te kunnen determineren, is gebruik gemaakt van eigen kennis en literatuur.

• Afbeelding 3: bedrijfsgebouw blijft behouden



• Afbeelding 4: te behouden bedrijfsgebouw



• Afbeelding 5: te verwijderen sheds



- Afbeelding 6: te verwijderen sheds



- Afbeelding 7: te behouden bedrijfsgebouw



• Afbeelding 8: te verwijderen sheds



• Afbeelding 9: beukenhaag



- Afbeelding 10: te slopen mestsilos



- Afbeelding 11: te slopen (pomp)gebouw (geheel gesloten)



- Afbeelding 12: te verwijderen sheds en beukenhaag



- Afbeelding 13: houtwal van de bedrijfswoning



- Afbeelding 14: aansluiting perceel bedrijfswoning sheds



- Afbeelding 15: vooraanzicht met het bedrijfsgebouw



- Afbeelding 16: houtwal voorzijde met beukenhaag, es, veldesdoorn, berk en zomereik



Flora algemeen

Bij de planlocatie zijn geen bijzondere beplantingen aangetroffen. Er is tevens gelet op de aanwezigheid van (beschermde) muurvegetatie. Het perceel is geheel omsloten met een beukenhaag van minstens 20 jaar oud. De houtwal aan de voorzijde bestaat uit es, veldesdoorn, berk en zomereik en is ook regelmatig opgesnoeid.

Grondgebonden zoogdieren

Specifiek wordt bekeken of binnen de betreffende inrichting verwacht kan worden of er streng beschermde zoogdieren; steenmarter, bunzing, hermelijn, wezel, eekhoorn, bever en das kunnen worden aangetroffen.

Steenmarter

De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor de steenmarter. Steenmarters gebruiken hooizolders, loze ruimtes onder het dak, schuurtjes en dergelijke, als verblijfplaats. Een steenmarter heeft binnen zijn territorium verscheidene verblijfplaatsen. Daarnaast laten steenmarters enorm veel sporen achter. Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen, zoals uitwerpselen of prooiresten aangetroffen die duiden op het gebruik van de onderzoekslocatie als vaste rust- of verblijfplaats door deze soort.

Kleine marterachtigen

De onderzoekslocatie biedt geen geschikte verblijflocaaties voor de hermelijn, wezel en bunzing. De soorten maken gebruik van oude hollen van onder andere mollen en muizen, maar ook houtwallen, steenhopen en ruimtes onder boomwortels. Desbetreffende soorten hebben binnen hun territorium verscheidene verblijfplaatsen. Tijdens het veldbezoek zijn er geen marters of sporen van marters aangetroffen op de onderzoekslocatie. Echter, dit betekent niet dat het gebied niet potentieel in gebruik is door de hermelijn, wezel en/of bunzing als migratieroute.

Eekhoorn

De onderzoekslocatie is vanwege de afwezigheid van voldoende bomen niet geschikt als habitat voor de eekhoorn. Er staan te weinig bomen rondom de projectlocatie. Tevens worden

er met de werkzaamheden geen bomen verwijderd. Een negatief effect als gevolg van de werkzaamheden is uitgesloten.

Bever

Voor de bever is op de onderzoekslocatie geen geschikt habitat aanwezig. Vaste rust- en verblijfplaatsen van de bever kunnen worden uitgesloten.

Das

Tijdens het veldbezoek zijn op de onderzoekslocatie en de directe omgeving geen loop- of eetsporen, latrines en/of wissels aangetroffen die duiden op de aanwezigheid en/of het gebruik van de onderzoekslocatie door de das. Dassen zullen eerder hun leefgebied hebben in de nabij gelegen natuurgebieden en de aansluitende weilanden. Verstoring ten aanzien van de das als gevolg van de voorgenomen ingreep is niet aan de orde.

Er zijn sporen van mollen en muizen waargenomen.

Vleermuizen

Het plangebied is zeer nauwkeurig beoordeeld op de mogelijke waarde voor vleermuizen. Hierbij is gelet op de geschiktheid van de aanwezige bebouwing als verblijfplaats voor deze dieren: aanwezigheid van spouwganen en andere openingen in muren en daken, vetstrepen, uitwerpselen en prooiresten bij gevelopeningen.

Verblijfsruimte voor vleermuizen hebben specifieke voorwaarden zoals een stabiele temperatuur en het tochtvrij zijn. Bij vleermuizen worden vier verblijfplaatsen onderscheiden; winterverblijven, zomerverblijven, kraamverblijven en paarverblijven. Aan de winterverblijven worden de hoogste eisen gesteld, daarna de kraamverblijven, dan de zomerverblijven en tenslotte de paarverblijven, waarbij de vleermuizen een zeer korte tijd op een bepaalde locatie kunnen verblijven.

Er zijn in en om de gebouwen geen sporen (vetstrepen, uitwerpselen, prooiresten) aangetroffen. Naast de onderzoekslocatie bevindt zich de bedrijfswoning. Eventuele verblijfsplaatsen hierin ondervinden door de afstand tot de slooplocatie en de aard van de ingreep geen hinder.

Foerageerhabitat

De onderzoekslocatie zal, gelet op de aanwezige habitat, gebruikt kunnen worden door in de omgeving verblijvende vleermuizen om te foerageren. De plannen zullen echter geen aantasting van belangrijk foerageerhabitat vormen. Door de voorgenomen ingreep zal het aanbod van foerageermogelijkheden niet in het geding komen. In de directe omgeving is meer geschikt foerageerhabitat voor vleermuizen aanwezig in de vorm van bomenrijen en bosranden.

Vliegroutes

Vleermuizen maken veelal gebruik van lijnvormige (donkere) landschapselementen zoals houtsingels, beken en lanen om zich te verplaatsen tussen verblijfsplaatsen en foerageergebieden. Doordat dergelijke lijnvormige elementen ontbreken op de onderzoekslocatie, worden er geen potentiële vliegroutes verstoord.

Vogels

Tijdens het bezoek is met name gelet op de aanwezigheid van nesten en rustplaatsen voor vogels.

Er zijn broedvogels waarvan de nesten ook beschermd zijn op het moment dat ze niet voor de voortplanting in gebruik zijn. Binnen het agrarische (buiten)gebied kunnen dit zijn: boomvalk, buizerd, havik, sperwer, wespandief, huismus, steenuil en de kerkuil.

Boomvalk

De boomvalk is een soort die geen eigen nest maakt, maar broedt in gebruikte kraaien- en/of eksternesten in verschillende typen bos(randen) of in solitaire bomen, populierensingels, of op erven. De soort komt vooral voor in open en halfopen landschappen zoals boerenland en dorpen, alsook in buitenwijken van steden. De bomen op- en nabij de projectlocatie zijn gecontroleerd op dergelijke nesten, deze zijn niet aangetroffen. Evenmin worden er met de beoogde werkzaamheden bomen verwijderd. Negatieve effecten op de boomvalk als gevolg van de werkzaamheden zijn derhalve niet aan de orde.

Buizerd en havik

De buizerd en havik broeden op grote nesten van ongeveer een meter in doorsnede en 60 centimeter diep. Dergelijke nesten zijn tijdens het veldbezoek niet waargenomen. Een broedgeval van de buizerd en havik is daarom uit te sluiten. Eveneens worden er met de beoogde werkzaamheden geen bomen gekapt, zodat het wegnemen van een jaarrond beschermd nest kan worden uitgesloten.

Wespendief en sperwer

De wespandief is doorgaans gebonden aan grotere bosgebieden van zowel loof- als naaldbomen. Bij voorkeur is er afwisseling binnen het bosgebied aanwezig in de vorm van open plekken. De sperwer broedt bij voorkeur meer verborgen in naaldbomen. Beide situaties zijn op de onderzoekslocatie niet aanwezig. Gezien de ligging van de onderzoekslocatie binnen agrarisch gebied en de afwezigheid van voldoende dekking is een nestplaats van de sperwer of wespandief niet te verwachten. Eveneens zijn er tijdens het veldbezoek geen nesten aangetroffen. Een broedgeval van zowel de wespandief als de sperwer zijn uitgesloten.

Steenuil en kerkuil

De kerkuil en steenuil hebben een voorkeur voor cultuurlandschappen met allerlei landschapselementen die voor afwisseling zorgen. Beide soorten broeden in gebouwen en gebruiken ook graag speciale nestkasten. Daarnaast worden door de steenuil ook wel boomholten gebruikt, mits er zich grote holten in bevinden. De gebouwen zijn in zijn geheel gecontroleerd op de aanwezigheid van steen- en kerkuilen en is vooral gelet op de aanwezigheid van sporen; braakballen, veren en uitwerpselen. Er zijn geen (sporen van) steen- en kerkuilen waargenomen. Er is geen sprake van een afname van belangrijk foerageergebied. Er blijft er voldoende foerageergebied aanwezig in de omgeving.

Huismus

Ook voor de huismus, die veel te vinden is in agrarisch gebied en vooral gebonden aan gebouwen is, is het nest jaarrond beschermd. Er is een kleine groep huismussen op het terrein waargenomen. Er zijn geen nesten van huismussen gevonden in de te slopen bebouwing. Huismussen broeden waarschijnlijk in de bedrijfswoning.

Overige broedvogels

De beplanting op de onderzoekslocatie kan nestgelegenheid bieden aan broedvogelsoorten zoals de merel en winterkoning. De nesten van deze soorten zijn alleen beschermd op het moment dat ze als zodanig in gebruik zijn. Er zijn voornamelijk in de beukenhaag enkele oude nesten van overige broedvogels aangetroffen.

Er zijn vogels gezien en gehoord, namelijk:

• Tabel 1: overzicht waargenomen vogels

Soort
Huismussen
Holenduif
Houtduiven

Reptielen, amfibieën en vissen

Er zijn tijdens het terreinbezoek geen reptielen, amfibieën en/of vissen waargenomen.

Voor de in Nederland voorkomende reptielsoorten zoals de hazelworm, de levendbarende hagedis en ringslang biedt de onderzoekslocatie geen geschikt habitat. Deze soorten worden vrijwel alleen aangetroffen in specifieke natuurgebieden.

Dit geldt ook voor de specifieke beschermende amfibieënsoorten die veel eisen stellen aan zijn habitat; alpenwatersalamander, heikikker, vinpootsalamander, poelkikker en rugstreeppad. Deze zijn allen uit te sluiten omdat de betreffende locatie geen goed habitat biedt voor deze soorten door het ontbreken van voldoende oppervlaktewater.

De onderzoekslocatie vormt wel een geschikt habitat voor algemene amfibieënsoorten als de bruine kikker en de gewone pad. Op de onderzoekslocatie kunnen deze soorten beschutting vinden tussen de begroeiing en onder de takken- of stenenhopen. Voor algemene amfibieënsoorten geldt in het kader van de Wet natuurbescherming een vrijstelling, zodat een ontheffing bij verstoring niet noodzakelijk is. Het is echter wel zaak om aandacht te schenken aan de zorgplicht.

Vissen

Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater op de onderzoekslocatie kan deze soortgroep buiten beschouwing worden gelaten.

Overige

Van de overige soortgroepen, zoals dagvlinders, insecten en libellen, kan worden aangenomen dat deze soorten gedurende het jaar in het plangebied aanwezig kunnen zijn of dit gebied in de migratieroute hebben liggen.

Afhankelijk van het seizoen zijn mogelijk algemene soorten te vinden op/of binnen de planlocatie. Specifieke beschermende soorten zijn voornamelijk afhankelijk van specifieke terreinkenmerken met specifieke biotopen. Binnen het plangebied is een dergelijk biotoop niet aanwezig.

2.3 Effecten van de ingreep

De effecten op beschermde soorten zijn onderzocht op basis van het voornemen binnen het plangebied.

Flora algemeen

Er is geen bijzondere flora aangetroffen binnen het plangebied, negatieve effecten zijn uitgesloten.

Grondgebonden zoogdieren

Verstoring van algemene zoogdieren vindt mogelijk plaats. De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor een aantal soorten grondgebonden zoogdieren. Het gaat daarbij om algemene soorten als de egel, konijn en diverse muissoorten. De verblijfplaatsen van deze soorten worden door de voorgenomen ingreep echter niet aangetast. Er wordt op een dusdanige manier gewerkt, zodat de dieren tijdelijk weg kunnen vluchten. De snelheid van de werkzaamheden wordt hierop aangepast, waardoor tijd om weg te vluchten ontstaat. Verblijfplaatsen van beschermde zoogdiersoorten zijn ter plaatse niet aangetroffen.

Vleermuizen

Er zijn geen sporen van vleermuizen aangetroffen waaruit blijkt dat de gebouwen als verblijfplaats worden gebruikt. Nader onderzoek in het kader van de soortenbescherming is niet noodzakelijk.

Vogels

Door de voorgenomen ingreep worden geen vogels en jaarrond beschermde nesten aangetast. De beukenhaag dient buiten het broedseizoen te worden gerooid.

Reptielen, amfibieën en vissen

Er zijn geen reptielen, amfibieën en/of vissen waargenomen. De instandhoudingsdoelstellingen komen niet in het gedrang.

Overige

Omdat er geen geschikt biotoop is waargenomen voor overige beschermde soorten, zijn negatieve effecten uitgesloten. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

3

Conclusie en aanbevelingen

Het natuuronderzoek is gebaseerd op inventarisatiegegevens van derden, literatuuronderzoek en een verkennend veldbezoek aan het plangebied. Het beeld dat uit het onderzoek naar voren is gekomen vormt voldoende basis om gefundeerd uitspraken te doen over de gevolgen van de voorgenomen werkzaamheden voor beschermde soorten en gebieden.

3.1 Conclusie

Voor de bepaling van de effecten en voor de beantwoording van de vraag of men in strijd komt met de Wet natuurbescherming, wordt de relatie gelegd tussen het initiatief met deze wet door waar mogelijk antwoord te geven op de volgende vragen:

1. *Welke wettelijk beschermde soorten komen in het plangebied voor? Welke status hebben deze soorten?*
2. *Welke invloed heeft de geplande ingreep in het betreffende gebied op de beschermde soorten en de staat van instandhouding?*
3. *Hoe dient omgegaan te worden met eventuele negatieve effecten van het plan op wettelijk beschermde planten- en diersoorten, en welke vervolgstappen zijn nodig?*

Het voornemen zoals opgenomen in de inleiding en de daarbij behorende werkzaamheden, zal naar verwachting geen negatief effect hebben op de staat van instandhouding van beschermde soorten. Binnen het plangebied zijn geen (verblijfplaatsen van) strikt beschermde soorten aangetroffen die door de werkzaamheden worden beïnvloed.

Uit de effectenbeschrijving blijkt dat er geen onevenredige directe of indirecte gevolgen zijn van de voorgenomen activiteiten op de voortplanting en instandhouding van beschermde dieren/of plantsoorten. Lokaal zullen mogelijk algemene soorten uit het plangebied trekken op zoek naar een vervangende biotoop.

De beukenhaag dient buiten het broedseizoen te worden gerooid.

Voor aanvang van de werkzaamheden dient derhalve geen aanvullend onderzoek plaats te vinden. Een ontheffing met betrekking tot aantasting van beschermde soorten is niet nodig. De werkzaamheden kunnen leiden tot een beschadiging of vernietiging van mogelijke verblijfplaatsen en/of verstoring van eventueel aanwezige algemene soorten. Een algehele vrijstelling is hierop van toepassing. De algemene zorgplicht blijft onverminderd van toepassing.



Literatuur

- Broekhuizen, S., Hoekstra, B., Laar, van, V., Smeenk, C. & Thissen, J.B.M., 1992
Atlas van de Nederlandse zoogdieren. Stichting uitgeverij van de KNNV, Utrecht.
- Europese Gemeenschappen,
Richtlijn no 92/409 inzake het behoud van de vogelstand. Brussel, 1979.
- Europese Gemeenschappen,
Richtlijn no 92/43 inzake instandhouding van de natuurlijke habitat en de wilde flora en fauna. Brussel, 1992.
- Provinciale Verordening (Wet) natuurbescherming
- Hollander, H., & Geest, van der, P., 1994.
Rode-Lijst van bedreigde zoogdieren in Nederland.
Red data book of threatened mammals in the Netherlands. Vereniging voor Zoogkunde en Zoogdierbescherming, Utrecht.
- Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Ministerie van Volkshuisvesting.
Ruimtelijke Ordening en milieu, 2004. Nota Ruimte.
- De Nederlandse libellen, Nederlandse Fauna, deel 4
Nationaal historisch museum, KNNV uitgeverij (2002)
- Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ)
- Vleermuizen en planologie, Zoogdierverseniging (2010)
- Wet natuurbescherming.
Vastgesteld d.d. 1 januari 2017.
- www.waarneming.nl
- www.synbiosys.alterra.nl
- www.atlasleefomgeving.nl
- www.ravon.nl
- www.sovon.nl
- www.google.nl
- www.ndff.nl
- www.floron.nl
- www.ruimtelijkeplannen.nl
- www.natura2000.nl
- www.ecologica.eu

1 Bijlage

Waarnemingen

Waarneming.nl NL Log in of registreer

Invoeren Ontdek Projecten Over ons Community

Asten - Buizerdweg e.o. Noord-Brabant

Details Waarnemingen Foto's Geluiden Soorten gezien Ranglijst waarnemers

Naam	Data	Aantal	Gebruiker	Waarnemingen
Asten - Buizerdweg e.o.				
Oppervlakte	6,2 km ²	statistiek worden geladen		statistiek worden geladen
Gemeente	Asten (gemeente)			
Provincie	Noord-Brabant			

Waarneming.nl NL Log in of registreer

Invoeren Ontdek Projecten Over ons Community

Asten - Buizerdweg e.o. Noord-Brabant

Details Waarnemingen Foto's Geluiden Soorten gezien Ranglijst waarnemers

2022-01-01 - 2022-08-16 selecteer een soort Alle soortgroepen Alle zeldzaamheden

Zoek Filter Wis filters Als kaart Toon geavanceerd

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2022-08-12 09:17	▲ Boerenzwaluw - <i>Hirundo rustica</i>	2	Buizerdweg e.o.	Rob	■
2022-08-12 09:17	▲ Herderstasje - <i>Capsella bursa-pastoris</i>	1	Buizerdweg e.o.	Rob	☑
2022-08-12 09:17	● Groot nimfkruid - <i>Najas marina</i>	1	Buizerdweg e.o.	Rob	☑ 📷
2022-07-31 13:48	▲ Rode klaver - <i>Trifolium pratense</i>	1	Buizerdweg e.o.	pros piron	☑ 📷
2022-07-30 10:33	■ Blauwe breedscheenjuffer - <i>Platynemis pennipes</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	pros piron	☑ 📷
2022-07-30 10:28	▲ Koninginnekruid - <i>Eupatorium cannabinum</i>	1	Buizerdweg e.o.	pros piron	☑ 📷
2022-07-29 15:29	▲ Koninginnekruid - <i>Eupatorium cannabinum</i>	1	Buizerdweg e.o.	Bart Bijlmakers	☑ 📷
2022-07-29 16:50	▲ Boerenwormkruid - <i>Tanacetum vulgare</i>	1	Buizerdweg e.o.	pros piron	☑ 📷
2022-07-29 15:34	■ Grote teunisbloem - <i>Oenothera glazioviana</i> 🗑	1	Orthodox klooster	Bart Bijlmakers	■ 📷
2022-07-29 15:35	■ Koningskaars - <i>Verbascum thapsus</i>	1	Orthodox klooster	Bart Bijlmakers	■ 📷
2022-07-27 17:18	■ Oranje zandoogje - <i>Pyronia tithonus</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Pascal	☑ 📷
2022-07-27 17:18	■ Oranje zandoogje - <i>Pyronia tithonus</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	petravh	☑ 📷
2022-07-25 11:51	▲ Rode klaver - <i>Trifolium pratense</i>	1	Buizerdweg e.o.	pros piron	☑ 📷
2022-07-19 10:32	🔴 Wormkruiddokermot - <i>Coleophora tanacetii</i>	1 zak/koker	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	■ 📷
2022-07-19 10:24	■ Oranje eikenbladroller - <i>Cydia amplana</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	■ 📷
2022-07-19 10:28	■ Behangersbij onbekend - <i>Megachile spec.</i>	1 ♀ imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	☑ 📷
2022-07-19 10:32	▲ Gewone wesp - <i>Vespa vulgaris</i>	1 ♀ imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	■ 📷
2022-07-16 13:10	■ Wespandief - <i>Pernis apivorus</i>	2 ♀♀ adult, overvliegend noordwest	Buizerdweg e.o.	Jan Biemans	■
2022-07-16 13:10	■ Wespandief - <i>Pernis apivorus</i>	2 adult, gezien	Buizerdweg e.o.	Boena van Noorden	■
2022-07-15 10:41	■ Gouden sprinkhaan - <i>Chrysocraon dispar</i>	1 ♂ imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	☑ 📷
2022-07-15 10:47	▲ Pluimvoetbij - <i>Dasypoda hirtipes</i>	1 ♂ imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	☑ 📷
2022-07-15 10:48	● <i>Euodynerus quadrfasciatus</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	■ 📷
2022-07-15 10:48	▲ <i>Dasytes spec.</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	■ 📷
2022-07-15 10:40	▲ Zwanenbloem - <i>Butomus umbellatus</i>	1 bloeiend	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	☑ 📷 🗑
2022-07-14 20:46	▲ Zwanenbloem - <i>Butomus umbellatus</i>	1 veldwaarneming	Buizerdweg e.o.	Oscar van Koutrik	☑ 📷

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2022-07-14 20:15	▲ Grof hoornblad - <i>Ceratophyllum demersum</i>	1 veldwaarneming	Buizerdweg e.o.	Oscar van Koutrik	✓ 📷
2022-07-14 20:21	▲ Aarvederkruid - <i>Myriophyllum spicatum</i>	1 veldwaarneming	Buizerdweg e.o.	Oscar van Koutrik	✓ 📷
2022-07-14 20:35	● Groot nimfkruid - <i>Najas marina</i>	1 veldwaarneming	Buizerdweg e.o.	Oscar van Koutrik	✓ 📷
2022-07-14 20:11	● Groot nimfkruid - <i>Najas marina</i>	1 veldwaarneming	Buizerdweg e.o.	Oscar van Koutrik	✓ 📷
2022-07-14 20:32	■ Duizendknoopfonteinikruid - <i>Potamogeton polygonifolius</i>	1 veldwaarneming	Buizerdweg e.o.	Oscar van Koutrik	✓ 📷
2022-07-08 16:45	▲ Witte kwikstaart - <i>Motacilla alba</i>	5 ♂ gezien	Buizerdweg e.o.	I.B. Zawada	✓ 📷
2022-07-07 05:59	● Groot nimfkruid - <i>Najas marina</i>	1 vegetatief	Buizerdweg e.o.	Niek Otten	📷
2022-07-07 05:54	● Groot nimfkruid - <i>Najas marina</i>	1 vegetatief	Buizerdweg e.o.	Niek Otten	📷
2022-07-05 12:28	▲ Chorthippus biguttulus-groep - <i>Chorthippus biguttulus-group</i>	1 ♂ larve/nimf	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	■ 📷
2022-07-05 12:25	▲ <i>Anomala dubia</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	■ 📷
2022-07-05 12:23	▲ Grauwe schildwants - <i>Rhaphigaster nebulosa</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	✓ 📷
2022-06-27 11:12	▲ Sluipvlieg onbekend - <i>Tachinidae</i> indet.	1 imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	■ 📷
2022-06-27 11:12	■ Eenhoornige snoerhalskever - <i>Notoxus monoceros</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	✓ 📷
2022-06-27 11:15	▲ Oogvleksteilkopje - <i>Cryptocephalus ocellatus</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	✓ 📷
2022-06-27 11:13	▲ Rode halsbandwants - <i>Deraeocoris ruber</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	📷
2022-06-27 11:19	▲ <i>Mystacides azurea</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	■ 📷
2022-06-27 12:01	■ Grote teunisbloem - <i>Oenothera glazioviana</i>	1	Buizerdweg e.o.	carla	■ 📷
2022-06-22 11:26	▲ Koevinkje - <i>Aphantopus hyperantus</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	✓ 📷
2022-06-22 10:56	■ Behangersbij onbekend - <i>Megachile spec.</i>	1 ♀ imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	■ 📷
2022-06-22 10:55	▲ Gewone prachtwapenvlieg - <i>Chloromyia formosa</i>	1 ♂ imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	📷
2022-06-22 11:01	▲ Zandblauwtje - <i>Jasione montana</i>	1 bloeiend	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	📷
2022-06-08 10:42	▲ Sluipwesp onbekend - <i>Ichneumonidae</i> indet.	1 ♀ imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	■ 📷
2022-06-08 10:42	▲ <i>Crossocerus spec.</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	■ 📷
2022-06-08 10:32	▲ Gewone bladjager - <i>Dioctria hyalipennis</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	■ 📷
2022-06-08 10:28	■ Stekelpootroefvlieg - <i>Machimus arthriticus</i>	1 ♂ imago	Astense Peel	Jan Slaats	✓ 📷 📷

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2022-06-08 10:35	▲ Weidevlekoog - <i>Eristalinus sepulchralis</i>	1 ♂ imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	📷
2022-06-08 10:37	■ Bleekgele weekschildkever - <i>Cantharis livida</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	✅ 📷
2022-06-08 10:43	■ Ingekeepte smalboktor - <i>Pseudovadonia livida</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	📷
2022-06-08 10:39	▲ <i>Crepidodera fulvicornis</i>	2 imago, in copula	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	📷
2022-06-08 10:35	■ Groene distelsnuitkever - <i>Chlorophanus viridis</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	📷
2022-06-08 10:44	■ Zwartscheenspringwants - <i>Orthocephalus coriaceus</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	📷
2022-06-07 07:19	▲ Gerande spanner - <i>Lomaspilis marginata</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Johnny Vereijken	✅ 📷
2022-06-04 13:03	▲ Geelgors - <i>Emberiza citrinella</i>	1 ♂ adult, slachtoffer verkeer	Astensche Peel	Jan Slaats	✅ 📷
2022-06-04 12:20	▲ Zilverstreep - <i>Deltote bankiana</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	✅ 📷
2022-06-04 12:15	▲ Gewone maskerbij - <i>Hylaeus communis</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	📷
2022-06-04 12:13	▲ Tuinbladsnijder - <i>Megachile centuncularis</i> ?	1 ♀ imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	📷
2022-06-04 12:04	▲ Hommelbijvlieg - <i>Eristalis intricaria</i>	1 ♂ imago	Astensche Peel	Jan Slaats	📷
2022-06-04 12:17	■ Korte smalboktor - <i>Pachytodes cerambyciformis</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	📷
2022-06-04 12:17	■ Tweekleurige smalboktor - <i>Stenurella melanura</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	📷
2022-06-04 11:51	▲ Rozenkever - <i>Phyllopertha horticola</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Kraanvogel	📷
2022-06-04 12:07	■ Bremschildwants - <i>Piezodorus lituratus</i>	1 larve/nimf	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	📷
2022-05-29 12:54	▲ Dagpauwoog - <i>Aglais io</i>	40 rups	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	📷
2022-05-29 12:56	▲ Bruine snuituil - <i>Hypena proboscidalis</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	✅ 📷
2022-05-29 12:40	▲ Reuzenbladroller - <i>Choristoneura hebenstreitella</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	📷
2022-05-29 12:56	▲ Hertshooibladroller - <i>Lathronympha strigana</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	📷
2022-05-29 12:56	▲ Woudbladroller - <i>Orthotaenia undulana</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	📷
2022-05-29 12:45	▲ Azuurwaterjuffer - <i>Coenagrion puella</i>	1 ♂ imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	📷
2022-05-29 13:05	🟡 Gaffelwaterjuffer - <i>Coenagrion scitulum</i>	1 ♂ imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	📷
2022-05-29 12:43	■ Blauwe breedscheenjuffer - <i>Platycnemis pennipes</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	📷
2022-05-29 12:52	▲ Aardhommelgroep - <i>Bombus terrestris/lucorum/magnus/cryptarum</i>	1 ♀ imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	✅ 📷

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2022-05-29 13:00	▲ <i>Tenthredo marginella/thompsoni</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	■ 📷
2022-05-29 13:08	■ <i>Tenthredopsis sordida</i> ?	1 imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	■ 📷
2022-05-29 12:57	▲ <i>Itopectis spec.</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	■ 📷
2022-05-29 12:41	▲ <i>Itopectis spec.</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	■ 📷
2022-05-29 13:11	■ <i>Argogorytes mystaceus</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	✓ 📷
2022-05-29 12:51	▲ Bleke zeefwesp - <i>Crabro scutellatus</i>	1 ♂ imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	■ 📷
2022-05-29 12:58	■ Muurwesp onbekend - <i>Ancistrocerus spec.</i>	1 ♂ imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	■ 📷
2022-05-29 13:12	■ Tijgerlangpootmug - <i>Nephrotoma appendiculata</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	■ 📷
2022-05-29 13:09	▲ Gewone bladjager - <i>Dioctria hyalipennis</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	■ 📷
2022-05-29 13:00	▲ <i>Hilara spec.</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	■ 📷
2022-05-29 12:59	■ <i>Coenosia tigrina</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	■ 📷
2022-05-29 12:46	▲ Gewoon goudlokje - <i>Chrysopilus cristatus</i>	1 ♀ imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	■ 📷
2022-05-29 12:48	▲ Grote fopwesp - <i>Chrysotoxum cautum</i>	1 ♀ imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	✓ 📷
2022-05-29 13:09	▲ Menuetzwefvlieg - <i>Syrirta pipiens</i>	1 ♀ imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	✓ 📷
2022-05-29 13:01	■ Bleekgele weekschildkever - <i>Cantharis livida</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	✓ 📷
2022-05-29 12:37	■ Bleekgele weekschildkever - <i>Cantharis livida</i>	1 imago	Astensche Peel	Jan Slaats	✓ 📷
2022-05-29 12:49	▲ Grote populierenhaan - <i>Chrysomela populi</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	■ 📷
2022-05-29 12:53	▲ Zevenstippelig lieveheersbeestje - <i>Coccinella septempunctata</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	■ 📷
2022-05-29 12:51	■ <i>Iassus lanius</i> ?	1 larve/nimf	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	■ 📷
2022-05-29 12:46	▲ Groene schildwants - <i>Palomena prasina</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	✓ 📷
2022-05-29 12:58	■ Plooi vleugel-waaiertje onbekend - <i>Pseudoxenos spec.</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	■ 📷
2022-05-22 11:19	▲ Rozenkever - <i>Phyllopertha horticola</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Gerrie Overdinkel	■ 📷
2022-05-19 12:09	■ Roodborsttapuit - <i>Saxicola rubicola</i>	1	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	✓ 📷
2022-05-19 12:06	▲ Azuurwaterjuffer - <i>Coenagrion puella</i>	1 ♂ imago, mengtandem (2 soorten)	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	✓ 📷
2022-05-19 12:06	▲ Watersnuffel - <i>Enallagma cyathigerum</i>	1 ♀ imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	✓ 📷

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2022-05-19 12:11	🟡 Bruine korenbout - <i>Libellula fulva</i>	25 imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	📷📷
2022-05-19 12:50	🟢 <i>Cantharis obscura/paradoxa</i>	1 imago	Astensche Peel	Jan Slaats	✅📷
2022-05-19 12:11	🟢 Klein vogelpootje - <i>Ornithopus perpusillus</i>	1 bloeiend	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	✅📷
2022-05-14 12:51	🟢 Holenduif - <i>Columba oenas</i>	2	Buizerdweg e.o.	Vincent Schieveen	📷
2022-05-14 14:34	🟢 Gele Kwikstaart - <i>Motacilla flava</i>	1 ♂ adult, foeragerend	Buizerdweg e.o.	Vincent Schieveen	📷
2022-05-11 08:05	🟢 Hooibeestje - <i>Coenonympha pamphilus</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Johnny Vereijken	✅📷
2022-05-11 08:45	🟢 <i>Tenthredo solitaria</i> 🟡	1	Buizerdweg e.o.	Jeroen Craenmehr	📷📷
2022-05-10	🟢 Gewone zakdrager - <i>Psyche casta</i>	1 zak/koker	Buizerdweg e.o.	Menno Slaats	📷🔒📷
2022-05-10 08:17	🟢 Weidebeekjuffer - <i>Calopteryx splendens</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Johnny Vereijken	📷📷
2022-05-10 13:01	🟢 Bruine winterjuffer - <i>Sympecma fusca</i>	1 ♂ imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	✅📷
2022-05-10	🟢 Schorsvlieg - <i>Mesembrina meridiana</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Menno Slaats	📷🔒📷
2022-05-10 12:54	🔴 Bronsprachtkever - <i>Chrysobothris affinis</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	📷📷
2022-05-10 13:03	🟢 Wilgenprachtkevertje - <i>Trachys minutus</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	✅📷
2022-05-10 12:57	🟢 Kleine wespenboktor - <i>Clytus arietis</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	✅📷
2022-05-10	🟢 Kleine wespenboktor - <i>Clytus arietis</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Menno Slaats	✅🔒📷
2022-05-10 12:56	🟢 Zuringrandwants - <i>Coreus marginatus</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	📷📷
2022-05-10	🟢 Gele viervlekswants - <i>Dryophilacorix flavoquadrimaculatus</i>	1 imago, handvangst en losgelaten	Buizerdweg e.o.	Menno Slaats	📷🔒📷
2022-05-10	🟢 Insect onbekend (overig) - <i>Insecta indet.</i> 🟡	1	Buizerdweg e.o.	Menno Slaats	📷🔒📷
2022-05-10 13:06	🟢 Mannetjesvaren - <i>Dryopteris Filix-mas</i>	1 afwijkend	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	✅📷🗨️
2022-05-04	🟢 Stippelmot onbekend - <i>Yponomeuta spec.</i>	1 rups, foeragerend	Buizerdweg e.o.	Menno Slaats	📷🔒📷
2022-05-04	🟢 Oosterse schone - <i>Eratophyes amasiella</i>	2 imago	Buizerdweg e.o.	Menno Slaats	✅🔒📷
2022-05-04	🟢 Lensgalwesp - <i>Neuroterus quercusbaccarum</i>	1 gal	Buizerdweg e.o.	Menno Slaats	✅🔒📷
2022-05-04	🟢 Hulstvlies - <i>Phytomyza ilicis</i>	1 mijn	Buizerdweg e.o.	Menno Slaats	📷🔒📷
2022-05-04	🟢 Zwartkopvuurkever - <i>Pyrochroa coccinea</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Menno Slaats	✅🔒📷
2022-05-04	🟡 Rouwende gouden tor - <i>Oxythyrea funesta</i>	2 imago	Buizerdweg e.o.	Menno Slaats	✅🔒📷

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2022-05-04	Witgerande tuinslak - <i>Cepaea hortensis</i>	2	Buizerdweg e.o.	Menno Slaats	🔒📷
2022-05-03 18:26	Gele kwikstaart - <i>Motacilla flava</i>	1 ♂ adult, foeragerend, gezien	Buizerdweg e.o.	Ernst Jansz	🔒📷
2022-05-03 09:14	Landkaartje - <i>Araschnia levana</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Jeroen Craenmehr	🔒📷
2022-05-03	Kleine wintervlinder - <i>Operophtera brumata</i>	2 rups, foeragerend	Buizerdweg e.o.	Menno Slaats	✅🔒📷
2022-05-03	Pruimenhoortjesmijt - <i>Phyllocoptes eupadi</i>	1 gal	Buizerdweg e.o.	Menno Slaats	🔒🔒📷
2022-05-03	Peterseliebraam - <i>Rubus laciniatus</i>	1	Buizerdweg e.o.	Menno Slaats	✅🔒📷
2022-04-14 10:18	Wulp - <i>Numenius arquata</i>	1 roepend, gezien en gehoord	Buizerdweg e.o.	Jeroen Craenmehr	🔒
2022-04-14 10:01	Oranje berkenspanner - <i>Archiearis parthenias</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Jeroen Craenmehr	✅📷
2022-04-12 09:41	Oeverzwaluw - <i>Riparia riparia</i>	6 nestindicerend gedrag	Buizerdweg e.o.	Jeroen Craenmehr	🔒📷
2022-04-11 12:28	Beflijster - <i>Turdus torquatus</i>	1 ♂	Buizerdweg e.o.	Peter Eekelder	🔒
2022-04-03 13:36	Konijn - <i>Oryctolagus cuniculus</i>	1	Buizerdweg e.o.	I.B. Zawada	✅📷
2022-03-28	Klein koolwitje - <i>Pieris rapae</i>	3	Buizerdweg e.o.	harrie verheijen	🔒
2022-03-28	Citroenvlinder - <i>Gonepteryx rhamni</i>	12	Buizerdweg e.o.	harrie verheijen	🔒
2022-03-28	Dagpauwoog - <i>Aglais io</i>	4	Buizerdweg e.o.	harrie verheijen	🔒
2022-03-26 12:24	Zwart-rosse zandbij - <i>Andrena clarkella</i> 🐝	1 ♂	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	🔒📷
2022-03-26 12:20	Grijze zandbij - <i>Andrena vaga</i>	1 ♂ imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	✅📷
2022-03-26 12:18	<i>Dolerus spec.</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	🔒📷
2022-03-26 12:18	Sluipwesp onbekend - <i>Ichneumonidae</i> indet.	1 imago	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	✅📷🗨️
2022-03-26 12:13	Wolfspin (Pardosa) onbekend - <i>Pardosa spec.</i>	1	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	🔒📷
2022-03-23 10:21	Kraanvogel - <i>Grus grus</i>	1 overvliegend west, gehoord	Buizerdweg e.o.	Jeroen Craenmehr	🔒🗨️
2022-03-23 10:45	Klein geaderd witje - <i>Pieris napi</i>	1	Buizerdweg e.o.	Jeroen Craenmehr	🔒
2022-03-23 09:41	Oranje/Lichte boogbladroller - <i>Acleris notana/ferrugana</i>	1 imago	Buizerdweg e.o.	Jeroen Craenmehr	✅📷🗨️
2022-03-23 12:43	Basterdwederik spec. - <i>Epilobium spec.</i>	1	Buizerdweg e.o.	Rick Verrijt	✅📷
2022-03-21 14:00	Citroenvlinder - <i>Gonepteryx rhamni</i>	8	Buizerdweg e.o.	harrie verheijen	🔒
2022-03-09 15:31	Blauwe Reiger - <i>Ardea cinerea</i>	1	Buizerdweg e.o.	I.B. Zawada	🔒📷

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2022-03-04 17:45	Kievit - <i>Vanellus vanellus</i>	20 adult winterkleed, gezien	Buizerdweg e.o.	Marten Salverda	🔒
2022-03-04 17:45	Wulp - <i>Numenius arquata</i>	1 gezien	Buizerdweg e.o.	Marten Salverda	🔒
2022-02-27 12:29	Grote Zilverreiger - <i>Ardea alba</i>	2	Buizerdweg e.o.	Hans van de Laarschot	🔒
2022-02-26 10:01	Grote Bonte Specht - <i>Dendrocopos major</i>	1	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	✅📷
2022-02-26 10:19	Koolmees - <i>Perus major</i>	1	Astensche Peel	Jan Slaats	✅📷
2022-02-23 10:19	Groenling - <i>Chloris chloris</i>	1	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	✅📷
2022-02-23 10:21	Putter - <i>Carduelis carduelis</i>	1	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	✅📷
2022-02-19 05:55	Das - <i>Meles meles</i>	1 adult, foeragerend, gezien	Buizerdweg e.o.	Boena van Noorden	🔒
2022-02-13	Phegeavlinder - <i>Amata phegea</i>	2 rups, gezien	Buizerdweg e.o.	M. Cuijpers	🔒📷
2022-02-13	Grauwe schildwants - <i>Rhaphigaster nebulosa</i>	1 imago, gezien	Buizerdweg e.o.	M. Cuijpers	🔒📷
2022-02-13	Berkenzwam - <i>Piptoporus betulinus</i>	1 vruchtlichaam, veldwaarneming	Buizerdweg e.o.	M. Cuijpers	✅📷
2022-02-13	Waaier - <i>Schizophyllum commune</i>	1 vruchtlichaam, veldwaarneming	Buizerdweg e.o.	M. Cuijpers	✅📷
2022-02-09 10:38	Toendrarietgans - <i>Anser serrirostris</i>	1	Buizerdweg e.o.	Willy Ramaekers	✅📷
2022-01-13 15:29	Waterhoen - <i>Gallinula chloropus</i>	1	Buizerdweg e.o.	Hans van de Laarschot	🔒
2022-01-13 15:27	Ijvogel - <i>Alcedo atthis</i>	1	Buizerdweg e.o.	Hans van de Laarschot	🔒🗨️
2022-01-13 14:52	Ijvogel - <i>Alcedo atthis</i>	1	Heitrag e.o.	Hans van de Laarschot	✅🗨️📷
2022-01-11 11:17	Kleine modderkruiper - <i>Cobitis taenia</i>	1	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	✅📷
2022-01-06 10:31	Groenling - <i>Chloris chloris</i>	1	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	✅📷
2022-01-06 10:33	Putter - <i>Carduelis carduelis</i>	1	Buizerdweg e.o.	Jan Slaats	✅📷

2

Bijlage

Effecten indicator soorten



Beschermde natuur in Nederland: soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Effectenindicator soorten

Maatregelenindicator soorten

Routeplanner beschermde natuur

Effectenindicator Natura2000-gebieden

Effectenindicator soorten

1 Locatie


2 Activiteiten

3 Indicatie

Zoek en selecteer een locatie op postcode, of zoom in op de kaart en teken de grenzen van het plangebied: zet punten en sluit af met een dubbel-klik.

Postcode

5721RV



1 Locatie

2 Activiteiten

3 Indicatie

Geef aan voor welke OLO-activiteit(en) u een indicatie van effecten wilt ontvangen.

Top-10 activiteiten

[Alle activiteiten](#)

- ☒ Slopen en/of asbest verwijderen
- ☐ Inrichting of mijnbouw oprichten of veranderen (Milieu)
- ☐ Bijbehorend bouwwerk bouwen
- ☐ Kappen
- ☐ Overig bouwwerk bouwen
- ☐ Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
- ☐ Dakkapel plaatsen
- ☐ Woning bouwen
- ☐ Nieuw kozijn plaatsen of bestaand kozijn of gevelpaneel veranderen
- ☐ Uitrit aanleggen of veranderen

Toon effecten

Locatie: 5,8377/51,3743 Oppervlakte: 79,47 ha

Disclaimer

- > De dekkingsgraad van waarnemingen uit de NDFF per locatie wisselt sterk. Als er geen waarnemingen uit de NDFF zijn, kunnen er dus wel beschermde soorten voorkomen. Een gebruiker is zelf verantwoordelijk om (eventueel met hulp van de gemeente) te achterhalen of er daadwerkelijk beschermde soorten in het plangebied voorkomen.
- > Beschermde soorten die naar verwachting geen schadelijke effecten ondervinden, worden niet in de uitvoer getoond.
- > De informatie uit de effectenindicator soorten is generiek. Om vast te stellen of een activiteit in de praktijk daadwerkelijk schadelijk is, is meer specifieke informatie nodig over de betreffende activiteit, de werklocatie en over het voorkomen van beschermde soorten in en rond het plangebied.

Activiteiten

☐ [Slopen en/of asbest verwijderen](#)

Overige Wettelijk beschermde soorten

In het door u opgegeven plangebied komen bovendien de volgende aantallen Wettelijk beschermde soorten per soortengroep voor volgens de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) die mogelijk schadelijke effecten ondervinden van de door u geselecteerde activiteit(en).

Soortgroepen

☐ **Zoogdieren (1)**

Mogelijke negatieve effecten

Hieronder ziet u de storende factoren die op kunnen treden bij de geselecteerde activiteit en de hierboven genoemde soort. Per storende factor kunt u een korte toelichting lezen. Er is ook een pdf met  geraadpleegde literatuur over de effecten per soortgroep.

Storende factoren per verbodsbepaling	Gevoeligheid
Het is verboden (opzettelijk) nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of vernielen.	
☐ verlies vaste voortplantings- rust- of verblijfplaatsen	 gevoelig
☐ verlies functioneel leefgebied	 gevoelig
Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren.	
☐ verstoring door geluid	... onbekend
☐ verstoring door trilling	 gevoelig
Het is verboden opzettelijk beschermde soorten te doden en vangen.	
☐ directe sterfte	 gevoelig
Het is verboden (opzettelijk) nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of vernielen.	
☐ verlies vaste voortplantings- rust- of verblijfplaatsen	 gevoelig
☐ verlies functioneel leefgebied	 gevoelig
Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren.	
☐ verstoring door geluid	... onbekend
☐ verstoring door trilling	 gevoelig
Het is verboden opzettelijk beschermde soorten te doden en vangen.	
☐ directe sterfte	 gevoelig