

Landschappelijke inrichting

Volkelseweg 41 te Boekel



Inhoudsopgave

Pagina

3. situatietekening

4. ontwerp


5. beplantingsplan



Situatietekening



Ontwerp



Beplantingsplan

code	Aantal	Nederlandse naam	Latijnse naam	Maat	Bijzonderheden
Nieuwe hoogstamfruitboomgaard (750 m²)					
	13 st.	Diverse soorten hoogstamfruitbomen (appel, peer, pruim)	<i>Prunus domestica</i> , <i>Pyrus communis</i> , <i>Malus domestica</i>	-	Beplantingswijze bomen: • Plantafstand: 12.5 meter Onderhoud en beheer: • Indien het appel of peer betreft wordt de boom tenminste éénmaal per 2 jaar gesnoeid. Andere soorten enkel vormsnoei indien nodig; • De grasvegetatie wordt jaarlijks gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd of de grasvegetatie wordt beweide; • Bemesten en bekalken van de boomgaard is toegestaan. Bij bemesten van de boomgaard worden de fruitbomen en wortels niet beschadigd; • Snoeiwerkzaamheden gedurende het gehele jaar.
bloemrijk grasland (1000m²)					
	-	Mengsel kruidenrijk/bloemrijk grasland bestaande uit: • duizendblad • biggenkruid • vertakte leeuwentand • margriet • rolklaver • boterbloem • hazenpootje • witte klaver	-	-	Aanleg: • Inzaaien (augustus-september) Onderhoud en beheer: • Verschralen door maaien en afvoeren (1 keer per jaar maaien en afvoeren)
Nieuwe bomen					
QR	6 st.	Wintereik	<i>Quercus x rosacea</i>	14-16	Beplantingswijze: • Plantafstand: circa 8 meter Onderhoud en beheer: • Periodiek snoeien (jonge bomen gemiddeld eenmaal per 5 jaar en oudere bomen gemiddeld eenmaal per 10 jaar); • Na het snoeien beslaat de blijvende kroon altijd minimaal tweederde deel van de totale lengte van de boom;
BP	8 st.	Ruwe berk	<i>Betula pendula</i>		
ST	8 st.	amendelwilg	<i>Salix triandra</i>		
FS	10 st.	beukhaag	<i>Fagus sylvatica</i>		

					• Snoeiwerkzaamheden in de periode tussen 15 juli en 15 maart.
	Nieuwe struweelhaag (600 m²)				
	460 st.	Veldesdoorn, hondsroos, meidoorn, sleedoorn, katjeswilg	<i>Acer campestre</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Salix caprea</i>	-	Breedte singel: 3 meter Beplantingswijze struikvormers (geen boomvormers): • 3 rijen • Plantverband: driehoeksverband 1,25 x 1,25 meter Onderhoud en beheer: • Periodiek dunnen en snoeien overhangende takken gedurende het gehele jaar; • Dunningswerkzaamheden en het eventueel terugzetten van beplanting verrichten in de periode tussen 1 oktober en 15 maart; • Langzame groeiers sparen en snoeien indien noodzakelijk; • Afzet deel van de singel elke 3 jaar (afwisselend).

	vakbeplanting (1200 m²)				
	1200 st.	Japanse sneeuwbal Rode kornoelje Amerikaanse krentenboompje Gele kornoelje Kornoelje Gewone hazelaar Ligusterhaag De Gelderse roos	<i>-Viburnum plicatum 'Watanabe'</i> <i>-Cornus sanguinea</i> <i>-Amelanchier lamarckii</i> <i>-Cornus mas</i> <i>-Cornus alba 'Siberica'</i> <i>-Corylus avellana</i> <i>-Ligustrum ovalifolium</i> <i>-Viburnum opulus</i>		Beplantingswijze struikvormers (geen boomvormers): • 3 rijen • Plantverband: driehoeksverband 1,25 x 1,25 meter Onderhoud en beheer: • Periodiek dunnen en snoeien overhangende takken gedurende het gehele jaar; • Dunningswerkzaamheden en het eventueel terugzetten van beplanting verrichten in de periode tussen 1 oktober en 15 maart; • Langzame groeiers sparen en snoeien indien noodzakelijk; Afzet deel van de singel elke 3 jaar (afwisselend).

