

QUICKSCAN SOORTENBESCHERMING

NIEUWSTRAAT 100 TE EERSEL

Colofon

Quicksan soortenbescherming

Projectnummer: EP.22.1075

Versie: 1

Datum: 8 september 2022

Opdrachtnemer

Agrifirm NWE BV
Bedrijfsontwikkeling Exlan
Waalkade 33
5347 KR Oss

Postbus 300
5340 AH Oss

Locatie

Nieuwstraat 100 Eersel

Contactpersoon

Anton van Zeeland
T: 088 – 488 2929
F: 088 – 488 2102
E: a.vanzeeland@agrifirm.com

Uitvoerders

Ing. A. van Zeeland
L.F.A. van Sleuwen LL.B.

Collegiale check

AvZ

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN VERVEELVOUDIGD DOOR MIDDEL VAN DRUK, FOTOKOPIE, MICROFILM, GELUIDSBAND, ELEKTRONISCH OF OP WELKE ANDERE WIJZE DAN OOK, EN EVENMIN IN EEN GEAUTOMATISEERD GEGEVENSBESTAND WORDEN OPGESLAGEN, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN AGRIFIRM EXLAN.

Inhoudsopgave

Quickscan soortenbescherming

INLEIDING	4
HOOFDSTUK 1	6
TOETSINGSKADER	6
HOOFDSTUK 2	9
ONDERZOEKSRESULTATEN	9
HOOFDSTUK 3	21
CONCLUSIE	21
LITERATUUR	22
WAARNEMINGEN	23
EFFECTEN INDICATOR SOORTEN	28
PLAN PROJECTLOCATIE	30

Inleiding

Planbeschrijving

Aanleiding

Het plangebied is gelegen aan de Nieuwstraat 100 te Eersel (bijlage 3). Het gebouw wordt op dit moment illegaal bewoond (krakers). De plannen omvatten de herontwikkeling van de locatie en de sloop van een bestaande villa tot een woonzorgcomplex met 20 woonzorgappartementen. In dit kader wordt door het bevoegde gezag een toets aan de soortenbescherming noodzakelijk geacht. Bij de uitvoering van de voorgenomen ingrepen moet rekening worden gehouden met het huidige voorkomen van de, op grond van de Wet natuurbescherming, beschermde soorten. Als de voorgenomen ingreep leidt tot het overtreden van verbodsbepalingen betreffende beschermde soorten, moet vrijstelling of ontheffing worden verkregen.

De voorliggende quickscan bevat een inventarisatie van de huidige aanwezigheid van beschermde soorten planten en dieren in en om het plangebied. Tevens worden de te verwachten effecten van de ingreep in het plangebied beoordeeld.

Plangebied

Het plangebied ligt in de plaats Eersel in de gemeente Eersel. Het plangebied bevindt zich binnen de verkeerskundige en stedenbouwkundige bebouwde kom.



• Afbeelding 1: luchtfoto plangebied (bron: streetsmart.cyclomedia.com/streetsmart, geraadpleegd op 26/08/2022)

Onderzoeksmethode

Om een goede indicatie van de natuurwaarden binnen het plangebied te krijgen, wordt het onderzoek in verschillende stappen uitgevoerd. Op basis van bronnenonderzoek is nagegaan of er wettelijk beschermde planten- of diersoorten in het gebied voor kunnen komen waaraan extra aandacht geschonken dient te worden tijdens het terreinbezoek.

Na het bronnenonderzoek is een verkennend terreinbezoek gebracht aan het plangebied. Hierbij is, op basis van de gegevens van het literatuuronderzoek, beoordeeld voor welke soorten het gebied daadwerkelijk een geschikte habitat biedt en daarmee welke soorten er daadwerkelijk voor kunnen komen. Vervolgens zijn de mogelijke effecten op de verwachte beschermde soorten beschreven.

Op basis van de doorlopen procedures zijn conclusies getrokken met betrekking tot de eventuele negatieve effecten en/of obstakels inzake de Wet natuurbescherming.

Op woensdag 31 augustus 2022 is de locatie tussen 20:00 en 22:00 uur ter plaatse geïnventariseerd, om te onderzoeken of het plangebied een zodanig belangrijke status heeft dat een aanvullend veldonderzoek noodzakelijk is. Op het moment van inventarisatie was het 25 graden Celsius en vrijwel onbewolkt.

Op basis van terreinkenmerken is beoordeeld of het terrein geschikt is voor de, in de regio voorkomende, beschermde soorten.

Doelstelling

Om een indicatie te krijgen van de effecten die de sloop- en bouwwerkzaamheden hebben op de natuurwaarden binnen het plangebied, dienen de volgende vragen te worden beantwoord:

1. Welke wettelijk beschermde soorten komen in het plangebied voor? Welke status hebben deze soorten?
2. Welke invloed heeft de geplande ingreep in het betreffende gebied op de beschermde soorten en komt daarmee de staat van instandhouding in gevaar?
3. Hoe dient omgegaan te worden met eventuele negatieve effecten van het plan op wettelijk beschermde planten- en diersoorten, en welke vervolgstappen zijn nodig?

1 Toetsingskader

Wet natuurbescherming

De bescherming van natuur is in Nederland vastgelegd in nationale wetgeving. De nationale wetgeving is een Nederlandse implementatie van de belangrijkste Europese wetgevingselementen. Per 1 januari 2017 zijn de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998 vervangen door de Wet natuurbescherming. De uitvoering van deze nieuwe wet is grotendeels in handen van de provincies gekomen.

1.1 Gebiedsbescherming

De Wet natuurbescherming noemt bekende maar ook enkele nieuwe soorten natuurgebieden die bescherming behoeven: de Natura 2000-gebieden, het Natuurnetwerk Nederland (NNN), bijzondere provinciale natuurgebieden en landschappen, bijzondere nationale natuurgebieden en de nationale parken. Bij ontwikkelingen met name in het buitengebied moet rekening worden gehouden met het al dan niet van toepassing zijn van de beschermingsregimes van deze natuurgebieden. Ieder gebied kent een eigen beschermingsregime dat afzonderlijk gewogen dient te worden in relatie tot plannen, projecten en andere handelingen met mogelijk nadelige effecten voor de beschermde natuurwaarden.

Natura 2000-gebieden

De bekendste natuurgebieden zijn de Natura 2000-gebieden, zij kennen tevens het meest strikte beschermingsregime. De basis voor Natura 2000 zijn de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. In Nederland zijn 164 gebieden als Natura 2000-gebied aangewezen. Voor ieder gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen bepaald die betrekking kunnen hebben op de bescherming van specifieke flora en fauna alsook leefgebieden van soorten. Alle projecten en handelingen binnen of buiten de gebiedsgrenzen mogen geen verstorend of verslechterend effect hebben op de instandhoudingsdoelstellingen. Voor de voorgenomen ontwikkeling is hier, voor zover van toepassing, separaat aan getoetst. In deze rapportage wordt hier verder niet op ingegaan.

Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS) is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. De provincies zijn belast met de taak een dergelijk netwerk tot stand te laten te komen en in stand te laten. De uitvoering hiervan is hoofdzakelijk gestuurd vanuit de ruimtelijke ordening (provinciale verordeningen). Binnen het Natuurnetwerk Nederland geldt een “nee, tenzij”- benadering.

Overige gebieden

Naast de bovengenoemde gebieden kunnen gebieden aangewezen worden als ‘bijzondere provinciale natuurgebieden’, ‘bijzondere provinciale landschappen’ of ‘nationaal park’. De bescherming van deze gebieden vindt net als bij het NNN plaats via het ruimtelijk spoor. Daarnaast kan een gebied aangewezen worden als ‘bijzonder nationaal gebied’, een soort voorloper van de aanwijzing als Natura 2000-gebied. De bescherming van deze gebieden stemt dan ook overeen met de bescherming van Natura 2000-gebieden.

1.2 Soortenbescherming

De Wet natuurbescherming deelt soorten in drie beschermingsregimes in. Daarnaast zijn er vrijgestelde soorten en jaarrond beschermde vogelnesten.

- 1) Beschermingsregime soorten vogelrichtlijn
- 2) Beschermingsregime soorten habitatrichtlijn
- 3) Beschermingsregime andere soorten
- 4) Vrijgestelde soorten
- 5) Jaarrond beschermde vogelnesten

Vogelrichtlijn

Onder de soorten van de Vogelrichtlijn vallen alle van nature in Nederland in het wild levende vogels. Het is verboden om:

- Opzettelijk vogels te doden of te vangen;
- Opzettelijk vogelnesten, -rustplaatsen en – eieren te vernielen of te beschadigen of vogelnesten weg te nemen;
- Eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben;
- Opzettelijk vogels te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

Habitatrichtlijn

Onder de soorten van de Habitatrichtlijn vallen soorten die genoemd zijn in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage I van het Verdrag van Bonn. In de Bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd.

Wat betreft deze soorten is het verboden om:

- Opzettelijk dieren te doden of te vangen;
- Opzettelijk dieren te verstoren;
- Opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen;
- Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
- Opzettelijk planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken, te verzamelen, af te snijden, te onttwortelen of te vernielen.

Ook is het verboden deze soorten te verkopen, te vervoeren voor verkoop, te verhandelen, te ruilen of te kopen, tenzij het gaat om gefokte of gekweekte dieren of planten.

Andere soorten

Onder het beschermingsregime andere soorten vallen soorten waarvan er geen Europese verplichting tot bescherming is. Dit zijn soorten die vanuit nationaal belang extra bescherming behoeven. Het beschermingsniveau van deze soorten kan per provincie verschillen.

Het is verboden om:

- 1) Opzettelijk dieren te doden of te vangen;
- 2) Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
- 3) Opzettelijk (vaat)planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken te verzamelen, af te snijden, te onttwortelen of te vernielen.

Provincies hebben de bevoegdheid om bij provinciale verordening vrijstelling te verlenen voor nationaal beschermde soorten.

Vrijgestelde soorten

De verboden zijn niet van toepassing op de bosmuis, de huisspitsmuis en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevinden. Ook vallen de zwarte rat, bruine rat, huismuis, de mol en exoten niet onder beschermingsregime van de Wet natuurbescherming en mogen opzettelijk gedood en gevangen worden. Daarnaast geldt, zoals hierboven reeds aangegeven, dat provincies de bevoegdheid hebben vrijstelling te verlenen voor bepaalde soorten.

Jaarrond beschermde vogelnesten

De opgestelde lijst met jaarrond beschermde nesten voor vogels is een beleidsdocument dat voortvloeit uit de voormalige Flora- en faunawet en meegenomen is onder de Wet natuurbescherming. De nesten zijn ingedeeld in categorieën (1 t/m 5) waarvan de categorie 1 t/m 4 jaarrond beschermd zijn. Nesten in categorie 5 zijn enkel beschermd bij afwezigheid van voldoende alternatieven.

- 1) Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats
- 2) Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
- 3) Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
- 4) Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen.
- 5) Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen.

1.3 Houtopstanden

De regels van de Boswet zijn grotendeels onveranderd opgenomen in de Wet natuurbescherming. Een houtopstand is een zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend, die een oppervlakte van 10 are of meer beslaat ofwel een rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat.

Buiten de bescherming vallen:

- houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom (voor deze wet);
- houtopstanden op erven of in tuinen
- fruitbomen en windschermen om boomgaarden;
- naaldbomen bedoeld als kerstbomen en niet ouder dan twintig jaar
- kweekgoed;
 - uit populieren of wilgen bestaande wegbeplantingen,
 - beplantingen langs waterwegen, en
 - eenrijige beplantingen langs landbouwgronden;
- Het dunnen van een houtopstand;
- uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die zijn bedoeld voor de productie van houtige biomassa indien zij:
 - ten minste eens per tien jaar worden geoogst;
 - bestaan uit minstens tienduizend per hectare per beplantingseenheid
 - bestaande uit een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee meter;
 - zijn aangelegd na 1 januari 2013.

2

Onderzoeksresultaten

2.1 Bronnenonderzoek

Gegevens van websites als www.waarneming.nl zijn geraadpleegd voor achtergrondinformatie. Een groot aantal amateurs en professionals publiceert op deze bekende websites zijn natuurwaarnemingen, die worden gecontroleerd door een validatiecommissie. Zodoende zijn de waarnemingen uit deze bronnen redelijk betrouwbaar, maar moeilijk te verifiëren. De waarnemingen geven eventueel wel een indicatie van soorten waar tijdens het veldonderzoek extra aandacht aan besteed dient te worden.

Natuurnetwerk Nederland

Het natuurbeheerplan is een beleidskader om het Europese, rijks- en provinciale natuur- en landschapsbeleid te realiseren. Het gaat hier om bestaande natuurgebieden, gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt, landbouwgebieden worden ingericht en beheerd volgens agrarisch natuurbeheer en de Natura 2000-gebieden.

Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland en buiten andere natuurgebieden zoals Natura 2000. Het meest dichtbijgelegen Natura 2000-gebied is het Natura 2000-gebied "Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux".

Het Natuurnetwerk Brabant is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Het is een netwerk van deels bestaande en deels nieuwe natuurgebieden die door ecologische verbindingzones met elkaar verbonden zijn. Hierdoor kunnen dieren zich makkelijker verplaatsen tussen verschillende natuurgebieden. Zo wordt de biodiversiteit (het totaal aan planten en dieren) bevorderd. Ongeveer 90% van het Natuurnetwerk Brabant wordt gevormd door bestaande natuurgebieden zoals bijvoorbeeld de Biesbosch en de Maashorst. Maar het netwerk is nog niet compleet. Er ontbreken nog veel gebieden en verbindingen die belangrijk zijn voor dieren en planten. Vanwege de klimaatverandering veranderen hun leefomstandigheden en wordt dat nog urgenter. Zij moeten zich kunnen verplaatsen om genoeg voedsel te kunnen blijven vinden en zich voort te planten. Maar het Natuurnetwerk is er niet alleen voor planten en dieren, maar ook voor mensen. Mensen genieten, recreëren en ontspannen in de natuur en voelen zich gelukkiger. Natuur schept kansen voor ondernemers die natuur en hun bedrijf willen combineren en helpt tegen de gevolgen van klimaatverandering.



• Afbeelding 2: ligging Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000
(bron: atlasleefomgeving.nl/kaarten, geraadpleegd op 26/08/2022)

2.2 **Veldonderzoek**

Op verschillende punten in het plangebied zijn waarnemingen verricht. Tijdens het veldbezoek is het gebied beoordeeld op de aanwezigheid van beschermde soorten en de habitatgeschiktheid voor beschermde soorten. Er is extra aandacht besteed aan de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen en vogelnesten.

De ecologische factoren in de omgeving zijn met behulp van een digitale fotocamera vastgelegd. Om de flora en fauna te kunnen determineren, is gebruik gemaakt van eigen kennis en literatuur.

• Afbeelding 3: voorzijde te slopen pand



• Afbeelding 4: lekkages



• Afbeelding 5: aansluiting dak volledig gesloten



• Afbeelding 6: aanzicht te slopen gebouw



• Afbeelding 7: voorzijde kap geheel gesloten



- Afbeelding 8: tuin met beplanting blijft behouden



- Afbeelding 9: achterzijde met beplanting



- Afbeelding 10: aanzicht op div. beplanting voorzijde beukenhaag



- Afbeelding 11: oude Amerikaanse eik blijft behouden



- Afbeelding 12: achterstalling in de vorm van klimop en opslag van Amerikaanse vogelkers



Flora algemeen

Bij de planlocatie zijn geen bijzondere beplantingen aangetroffen. Er is tevens gelet op de aanwezigheid van (beschermde) muurvegetatie. Binnen het plangebied is een grote tuin met veel oude beplanting met relatief veel uitheemse bomen aanwezig. De tuin is verwaarloosd. Bij de ingang staat een zomereik van circa 60 jaar oud. Deze blijft behouden. Daarnaast bestaat de tuin o.a. uit acacia, coniferen, berken, hulst en klimop. De klimop is voornamelijk tegen de voorzijde van de garage aangegroeid. Aan de voorzijde staat een beukenhaag. Het weiland in het midden is geheel verdroogd en voor een gedeelte gemaaid.

Grondgebonden zoogdieren

Specifiek wordt bekeken of binnen de betreffende inrichting verwacht kan worden of er streng beschermde zoogdieren; steenmarter, bunzing, hermelijn, wezel, eekhoorn, bever en das kunnen worden aangetroffen.

Steenmarter

De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor de steenmarter. Steenmarters gebruiken hooizolders, loze ruimtes onder het dak, schuurtjes en dergelijke, als verblijfplaats. Een steenmarter heeft binnen zijn territorium verscheidene verblijfplaatsen. Daarnaast laten steenmarters enorm veel sporen achter. Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen, zoals uitwerpselen of prooiresten aangetroffen die duiden op het gebruik van de onderzoekslocatie als vaste rust- of verblijfplaats door deze soort.

Kleine marterachtigen

De onderzoekslocatie biedt geen geschikte verblijflocaties voor de hermelijn, wezel en bunzing. De soorten maken gebruik van oude holen van onder andere mollen en muizen, maar ook houtwallen, steenhopen en ruimtes onder boomwortels. Desbetreffende soorten hebben binnen hun territorium verscheidene verblijfplaatsen. Tijdens het veldbezoek zijn er geen marters of sporen van marters aangetroffen op de onderzoekslocatie. Echter, dit betekent niet dat het gebied niet potentieel in gebruik is door de hermelijn, wezel en/of bunzing als migratieroute. Indien bij sloop/herinrichting van het gebied groenstructuren rond het perceel behouden blijven, is er geen sprake van een negatief effect op genoemde soorten. Daarnaast

loopt er een loslopende hond rond op het erf en wordt de locatie bezocht door katten uit de buurt.

Eekhoorn

Er worden met de werkzaamheden geen bomen verwijderd. Een negatief effect als gevolg van de werkzaamheden is uitgesloten. Er zijn in de tuin geen sporen van eekhoorns aangetroffen.

Bever

Voor de bever is op de onderzoekslocatie geen geschikt habitat aanwezig. Vaste rust- en verblijfplaatsen van de bever kunnen worden uitgesloten.

Das

Tijdens het veldbezoek zijn op de onderzoekslocatie en de directe omgeving geen loop- of eetsporen, latrines en/of wissels aangetroffen die duiden op de aanwezigheid en/of het gebruik van de onderzoekslocatie door de das. Dassen zullen eerder hun leefgebied hebben in de nabij gelegen natuurgebieden en de aansluitende weilanden. Verstoring ten aanzien van de das als gevolg van de voorgenomen ingreep is niet aan de orde.

Het voorkomen van overige grondgebonden zoogdieren waarvoor geen vrijstelling geldt, is tijdens het veldbezoek niet vastgesteld.

Vleermuizen

Het plangebied is zeer nauwkeurig beoordeeld op de mogelijke waarde voor vleermuizen. Hierbij is gelet op de geschiktheid van de aanwezige bebouwing als verblijfplaats voor deze dieren: aanwezigheid van spouwgangen en andere openingen in muren en daken, vetstrepen, uitwerpselen en prooiresten bij gevelopeningen. De locatie is bewust bezocht in de avond om te kijken of er vleermuizen uit de woning zouden komen. Daarnaast werd ook gebruik gemaakt van een Bat Detector, merk Patterson D-100. Er is gepost van 20:00 uur tot 22:00 uur op de meest voor de hand liggende locaties. Gebouwminnende vleermuizen stellen hoge eisen aan gebouwen. Daarnaast is een groot gedeelte van het gebouw moeilijk bereikbaar voor vleermuizen door de aanwezigheid van beplanting, dakgoten en balkonnen. Tijdens het bezoek is slechts 1 dwergvleermuis waargenomen die de tuin gebruikte om te foerageren. Deze kwam niet uit het betreffende gebouw maar waarschijnlijk uit de buurt.

Verblijfsruimte voor vleermuizen hebben specifieke voorwaarden zoals een stabiele temperatuur en het tochtvrij zijn. Bij vleermuizen worden vier verblijfplaatsen onderscheiden; winterverblijven, zomerverblijven, kraamverblijven en paarverblijven. Aan de winterverblijven worden de hoogste eisen gesteld, daarna de kraamverblijven, dan de zomerverblijven en tenslotte de paarverblijven, waarbij de vleermuizen een zeer korte tijd op een bepaalde locatie kunnen verblijven.

Er zijn in en om het gebouw geen sporen (vetstrepen, uitwerpselen, prooiresten) aangetroffen. Naast de onderzoekslocatie bevinden zich woonhuizen. Eventuele verblijfsplaatsen hierin ondervinden door de afstand tot de locatie en de aard van de ingreep geen hinder.

Foerageerhabitat

De onderzoekslocatie zal, gelet op de aanwezige habitat, gebruikt kunnen worden door in de omgeving verblijvende vleermuizen om te foerageren. De plannen zullen echter geen aantasting van belangrijk foerageerhabitat vormen. Door de voorgenomen ingreep zal het aanbod van foerageermogelijkheden niet in het geding komen. In de directe omgeving is meer geschikt foerageerhabitat voor vleermuizen aanwezig in de vorm van bomenrijen en bosranden.

Vliegroutes

Vleermuizen maken veelal gebruik van lijnvormige (donkere) landschapselementen zoals houtsingels, beken en lanen om zich te verplaatsen tussen verblijfsplaatsen en foerageergebieden. De aanwezige tuin blijft grotendeels behouden en daardoor blijven de

lijnvormige elementen behouden op de onderzoekslocatie, worden er geen potentiële vliegroutes verstoord.

Vogels

Tijdens het bezoek is met name gelet op de aanwezigheid van nesten en rustplaatsen voor vogels.

Er zijn broedvogels waarvan de nesten ook beschermd zijn op het moment dat ze niet voor de voortplanting in gebruik zijn. Binnen het gebied kunnen dit zijn: boomvalk, buizerd, havik, sperwer, wespendif, huismus, steenuil en de kerkuil.

Boomvalk

De boomvalk is een soort die geen eigen nest maakt, maar broedt in gebruikte kraaien- en/of eksternesten in verschillende typen bos(randen) of in solitaire bomen, populierensingels, of op erven. De soort komt vooral voor in open en halfopen landschappen zoals boerenland en dorpen, alsook in buitenwijken van steden. De bomen op- en nabij de projectlocatie zijn gecontroleerd op dergelijke nesten, deze zijn niet aangetroffen. Evenmin worden er met de beoogde werkzaamheden bomen verwijderd. Negatieve effecten op de boomvalk als gevolg van de werkzaamheden zijn derhalve niet aan de orde.

Buizerd en havik

De buizerd en havik broeden op grote nesten van ongeveer een meter in doorsnede en 60 centimeter diep. Dergelijke nesten zijn tijdens het veldbezoek niet waargenomen. Een broedgeval van de buizerd en havik is daarom uit te sluiten. Eveneens worden er met de beoogde werkzaamheden geen bomen gekapt, zodat het wegnemen van een jaarrond beschermd nest kan worden uitgesloten.

Wespendief en sperwer

De wespendif is doorgaans gebonden aan grotere bosgebieden van zowel loof- als naaldbomen. Bij voorkeur is er afwisseling binnen het bosgebied aanwezig in de vorm van open plekken. De sperwer broedt bij voorkeur meer verborgen in naaldbomen. Beide situaties zijn op de onderzoekslocatie niet aanwezig. Gezien de ligging van de onderzoekslocatie en de afwezigheid van voldoende dekking is een nestplaats van de sperwer of wespendif niet te verwachten. Eveneens zijn er tijdens het veldbezoek geen nesten aangetroffen. Een broedgeval van zowel de wespendif als de sperwer zijn uitgesloten.

Steenuil en kerkuil

De locatie is bewust bezocht in de avond om te kijken of er uilen uit de woning zouden komen. Er is gepost van 20:00 uur tot 22:00 uur op de meest voor de hand liggende locaties.

De kerkuil en steenuil hebben een voorkeur voor cultuurlandschappen met allerlei landschapselementen die voor afwisseling zorgen. Beide soorten broeden in gebouwen en gebruiken ook graag speciale nestkasten. Daarnaast worden door de steenuil ook wel boomholten gebruikt, mits er zich grote holten in bevinden. Het gebouw is in zijn geheel gecontroleerd op de aanwezigheid van steen- en kerkuilen en is vooral gelet op de aanwezigheid van sporen; braakballen, veren en uitwerpselen. Er zijn geen (sporen van) steen- en kerkuilen waargenomen. Er is geen sprake van een afname van belangrijk foerageergebied. Er blijft er voldoende foerageergebied aanwezig in de omgeving.

Huisumus

Ook voor de huismus, die vooral gebonden aan gebouwen is, is het nest jaarrond beschermd. Er zijn geen nesten van huismussen gevonden in de te slopen bebouwing.

Overige broedvogels

De beplanting op de onderzoekslocatie kan nestgelegenheid bieden aan broedvogelsoorten zoals bv de merel en winterkoning. De nesten van deze soorten zijn alleen beschermd op het

moment dat ze als zodanig in gebruik zijn. Er zijn geen nesten van overige broedvogels aangetroffen in de te slopen bebouwing.

Eind augustus laten weinig vogels zich zien of horen. De betreffende tuin is perfect biotoop voor vrijwel alle soorten die men in stedelijk gebied tegen kan komen. Specifiek gebouw minnende soorten zoals de huiszwaluw, gierzwaluw en de huismus komen er niet voor.

Er zijn vogels gezien en gehoord, namelijk:

• Tabel 1: overzicht waargenomen vogels

Soort
Koolmees
Roodborst

Reptielen, amfibieën en vissen

Er zijn tijdens het terreinbezoek geen reptielen, amfibieën en/of vissen waargenomen.

Voor de in Nederland voorkomende reptielsoorten zoals de hazelworm, de levendbarende hagedis en ringslang biedt de onderzoekslocatie geen geschikt habitat. Deze soorten worden vrijwel alleen aangetroffen in specifieke natuurgebieden.

Dit geldt ook voor de specifieke beschermende amfibieënsoorten die veel eisen stellen aan zijn habitat; alpenwatersalamander, heikikker, vinpootsalamander, poelkikker en rugstreeppad. Deze zijn allen uit te sluiten omdat de betreffende locatie geen goed habitat biedt voor deze soorten door het ontbreken van voldoende oppervlaktewater.

De onderzoekslocatie vormt wel een geschikt habitat voor algemene amfibieënsoorten als de bruine kikker en de gewone pad. Op de onderzoekslocatie kunnen deze soorten beschutting vinden tussen de begroeiing en onder de takken- of stenenhopen. Voor algemene amfibieënsoorten geldt in het kader van de Wet natuurbescherming een vrijstelling, zodat een ontheffing bij verstoring niet noodzakelijk is. Het is echter wel zaak om aandacht te schenken aan de zorgplicht.

Vissen

Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater op de onderzoekslocatie kan deze soortgroep buiten beschouwing worden gelaten.

Overige

Van de overige soortgroepen, zoals dagvlinders, insecten en libellen, kan worden aangenomen dat deze soorten gedurende het jaar in het plangebied aanwezig kunnen zijn of dit gebied in de migratieroute hebben liggen.

Afhankelijk van het seizoen zijn mogelijk algemene soorten te vinden op/of binnen de planlocatie. Specifieke beschermende soorten zijn voornamelijk afhankelijk van specifieke terreinkenmerken met specifieke biotopen. Binnen het plangebied is een dergelijk biotoop niet aanwezig.

2.3 Effecten van de ingreep

De effecten op beschermde soorten zijn onderzocht op basis van het voornemen binnen het plangebied.

Flora algemeen

Er is geen bijzondere flora aangetroffen binnen het plangebied, negatieve effecten zijn uitgesloten.

Grondgebonden zoogdieren

Verstoring van algemene zoogdieren vindt mogelijk plaats. De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor een aantal soorten grondgebonden zoogdieren. Het gaat daarbij om algemene soorten als de egel, konijn en diverse muissoorten. De verblijfsplaatsen van deze soorten worden door de voorgenomen ingreep echter niet aangetast. Verblijfplaatsen van beschermde zoogdiersoorten zijn ter plaatse niet aangetroffen.

Vleermuizen

Mede door het posten in de avond wat erg weinig activiteit van (dwerg)vleermuizen heeft opgeleverd, kan men stellen dat het gebouw niet door vleermuizen als zodanig wordt gebruikt.

Er zijn geen sporen van vleermuizen aangetroffen waaruit blijkt dat het gebouwen als verblijfplaats worden gebruikt. Nader onderzoek in het kader van de soortenbescherming is niet noodzakelijk.

Vogels

Door de voorgenomen ingreep worden geen vogels en jaarrond beschermde nesten aangetast.

Reptielen, amfibieën en vissen

Er zijn geen reptielen, amfibieën en/of vissen waargenomen. De instandhoudingsdoelstellingen komen niet in het gedrang.

Overige

Omdat er geen geschikt biotoop is waargenomen voor overige beschermde soorten, zijn negatieve effecten uitgesloten. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

3

Conclusie en aanbevelingen

Het natuuronderzoek is gebaseerd op inventarisatiegegevens van derden, literatuuronderzoek en een verkennend veldbezoek aan het plangebied. Het beeld dat uit het onderzoek naar voren is gekomen vormt voldoende basis om gefundeerd uitspraken te doen over de gevolgen van de voorgenomen werkzaamheden voor beschermde soorten en gebieden.

3.1 Conclusie

Voor de bepaling van de effecten en voor de beantwoording van de vraag of men in strijd komt met de Wet natuurbescherming, wordt de relatie gelegd tussen het initiatief met deze wet door waar mogelijk antwoord te geven op de volgende vragen:

1. *Welke wettelijk beschermde soorten komen in het plangebied voor? Welke status hebben deze soorten?*
2. *Welke invloed heeft de geplande ingreep in het betreffende gebied op de beschermde soorten en de staat van instandhouding?*
3. *Hoe dient omgegaan te worden met eventuele negatieve effecten van het plan op wettelijk beschermde planten- en diersoorten, en welke vervolgstappen zijn nodig?*

Het voornemen zoals opgenomen in de inleiding en de daarbij behorende werkzaamheden, zal naar verwachting geen negatief effect hebben op de staat van instandhouding van beschermde soorten. Binnen het plangebied zijn geen (verblijfplaatsen van) strikt beschermde soorten aangetroffen die door de werkzaamheden worden beïnvloed.

Uit de effectenbeschrijving blijkt dat er geen onevenredige directe of indirecte gevolgen zijn van de voorgenomen activiteiten op de voortplanting en instandhouding van beschermde dieren/of plantsoorten. Lokaal zullen mogelijk algemene soorten uit het plangebied trekken op zoek naar een vervangende biotoop. Bij voorkeur dient het gebouw na het broedseizoen gesloopt te worden.

Voor aanvang van de werkzaamheden dient derhalve geen aanvullend onderzoek plaats te vinden. Een ontheffing met betrekking tot aantasting van beschermde soorten is niet nodig. De werkzaamheden kunnen leiden tot een beschadiging of vernietiging van mogelijke verblijfplaatsen en/of verstoring van eventueel aanwezige algemene soorten. Een algehele vrijstelling is hierop van toepassing. De algemene zorgplicht blijft onverminderd van toepassing.



Literatuur

- Broekhuizen, S., Hoekstra, B., Laar, van, V., Smeenk, C. & Thissen, J.B.M., 1992
Atlas van de Nederlandse zoogdieren. Stichting uitgeverij van de KNNV, Utrecht.
- Europese Gemeenschappen,
Richtlijn no 92/409 inzake het behoud van de vogelstand. Brussel, 1979.
- Europese Gemeenschappen,
Richtlijn no 92/43 inzake instandhouding van de natuurlijke habitat en de wilde flora en fauna. Brussel, 1992.
- Provinciale Verordening (Wet) natuurbescherming
- Hollander, H., & Geest, van der, P., 1994.
Rode-Lijst van bedreigde zoogdieren in Nederland.
Red data book of threatened mammals in the Netherlands. Vereniging voor Zoogkunde en Zoogdierbescherming, Utrecht.
- Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Ministerie van Volkshuisvesting.
Ruimtelijke Ordening en milieu, 2004. Nota Ruimte.
- De Nederlandse libellen, Nederlandse Fauna, deel 4
Nationaal historisch museum, KNNV uitgeverij (2002)
- Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ)
- Vleermuizen en planologie, Zoogdierverseniging (2010)
- Wet natuurbescherming.
Vastgesteld d.d. 1 januari 2017.
- www.waarneming.nl
- www.synbiosys.alterra.nl
- www.atlasleefomgeving.nl
- www.ravon.nl
- www.sovon.nl
- www.google.nl
- www.ndff.nl
- www.floron.nl
- www.ruimtelijkeplannen.nl
- www.natura2000.nl
- www.ecologica.eu

1 Bijlage

Waarnemingen

Waarneming.nl NL Log in of registreer

Invoeren Ontdek Projecten Over ons Community

Eersel Noord-Brabant

Details Waarnemingen Foto's Geluiden Soorten gezien Ranglijst waarnemers Projectbezoeken

Naam	Eersel	Data	Aantal	Gebruiker	Waarnemingen
Oppervlakte	6,39 km ²	waarnemingen	3.408	SintExupery	400
Gemeente	Eersel (gemeente)	gebruikers	269	Paul Evers	393
Provincie	Noord-Brabant	foto's	1.338	Wouter Thijs	215
		geluiden	7	Jorg Prins	213
		soorten	625	gerard prinsen	205

Waarneming.nl NL Log in of registreer

Invoeren Ontdek Projecten Over ons Community

Eersel Noord-Brabant

Details Waarnemingen Foto's Geluiden Soorten gezien Ranglijst waarnemers Projectbezoeken

2022-07-07 - 2022-08-26 Selecteer een soort Alle soortgroepen Alle zeldzaamheden

Zoek **Filter** Wis filters **Als kaart** ☐ Toon geavanceerd

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2022-08-25	▲ Boerenwaluw - <i>Hirundo rustica</i>	1500	Eersel	SintExupery	■ 📷
2022-08-25 17:37	▲ Gewone hooiwagen - <i>Phalangium opilio</i>	1	Eersel	RonnieDaas	■ 📷
2022-08-21	▲ Huiswaluw - <i>Delichon urbicum</i>	1	Eersel	Wouter Thijs	■
2022-08-21	▲ Boomklever - <i>Sitta europaea</i>	2	Eersel	Wouter Thijs	🔍
2022-08-21 14:53	▲ Groot koolwitje - <i>Pieris brassicae</i>	1 imago	Eersel	Floor	🔍 📷
2022-08-21 14:51	▲ Klein koolwitje - <i>Pieris rapae</i>	1 imago	Eersel	Floor	🔍 📷
2022-08-21 14:38	▲ Klein koolwitje - <i>Pieris rapae</i>	1 imago	Eersel	Floor	🔍 📷
2022-08-21 14:31	▲ Klein koolwitje - <i>Pieris rapae</i>	1 imago	Eersel	Floor	🔍 📷
2022-08-21 14:30	▲ Klein koolwitje - <i>Pieris rapae</i>	1 imago	Eersel	Floor	🔍 📷
2022-08-21 11:39	▲ Atalanta - <i>Vanessa atalanta</i>	1 imago	Eersel	mooiste momo	🔍 📷
2022-08-21 14:24	▲ Bont zandoogje - <i>Pararge aegeria</i>	1 imago	Eersel	Floor	🔍 📷
2022-08-21 20:11	▲ Witte tijger - <i>Spilosoma lubricipeda</i>	1 rups	Eersel	bianca	■ 📷
2022-08-20 14:14	■ Bietensnuitkever - <i>Tanymericus palliatus</i>	1 imago	Eersel	SintExupery	■ 📷
2022-08-20 00:15	▲ Segrijnslak - <i>Cornu aspersum</i>	1	Eersel	RonnieDaas	■ 📷
2022-08-19 15:41	▲ West-Europese Egel - <i>Erinaceus europaeus</i>	1 slachtoffer verkeer	Eersel	Koen Maes	🔍
2022-08-18 20:04	■ Windepilstaart - <i>Agrius convolvuli</i>	1 ♀	Eersel	Dolly Dietz	■
2022-08-18 19:41	■ Windepilstaart - <i>Agrius convolvuli</i>	1	Eersel	Dolly Dietz	■ 📷
2022-08-18	■ Windepilstaart - <i>Agrius convolvuli</i>	1	Eersel	Dolly Dietz	■
2022-08-17 07:01	▲ Gewone wesp - <i>Vespula vulgaris</i> 🐝	1	Eersel	RonnieDaas	■ 📷
2022-08-16	▲ Gehakelde aurelia - <i>Polygonia c-album</i>	1 imago	Eersel	Mark Wijnen	🔍 📷
2022-08-16 20:36	▲ Kolibrievlinder - <i>Macroglossum stellatarum</i>	1 imago	Eersel	Floor	■ 📷
2022-08-16	▲ Kolibrievlinder - <i>Macroglossum stellatarum</i>	1 imago	Eersel	Mark Wijnen	🔍 📷
2022-08-16 16:19	■ Grote schaatsenrijder - <i>Aquarius paludum</i> 🐸	1	Eersel	mooiste momo	🔍 📷
2022-08-15 08:30	▲ Kneu - <i>Linaria cannabina</i>	50 foeragerend, gezien en gehoord	Eersel	gerard prinsen	■
2022-08-13 08:07	▲ Kolibrievlinder - <i>Macroglossum stellatarum</i>	1 imago	Eersel	Jos der Kinderen	🔍 📷

2022-08-12 10:02	▲ Vogel onbekend - <i>Aves indet.</i>	1 adult, slachtoffer verkeer	Eersel	Ewald Van Dyck	■
2022-08-11 18:07	▲ Chorthippus biguttulus-groep - <i>Chorthippus biguttulus-group</i>	1 ♂ imago	Eersel	mooiste momo	✓ 📷 🔄
2022-08-11 08:58	■ Wilde cichorei - <i>Cichorium intybus</i>	1	Eersel	*Juut*	🔍 📷
2022-08-10 08:35	■ Steenmarter - <i>Martes foina</i>	1	Eersel	Marco Bakermans	✓ 📷
2022-08-10 13:25	▲ Lantaarntje - <i>Ischnura elegans</i>	1 imago	Eersel	mooiste momo	🔍 📷
2022-08-10 09:59	▲ <i>Eratigena spec.</i> 🗑️	1	Eersel	Jos der Kinderen	■ 📷
2022-08-06 15:40	▲ Goudoogje - <i>Chrysoperla carnea s.l.</i>	1 imago	Eersel	Frederique Swinkels TV16-22	■ 📷
2022-08-06 09:03	▲ Riet - <i>Phragmites australis</i>	1	Grote Aardweg e.o.	Chris Everaard	✓ 📷 🔄
2022-08-04 14:14	■ Echte lavendel - <i>Lavandula angustifolia</i>	1	Eersel	Jos der Kinderen	■ 📷
2022-08-03 17:54	▲ Groene Kikker onbekend - <i>Pelophylax spec.</i>	1	Eersel	Steven Spanhaak	✓ 📷 🔄
2022-08-02 16:36	■ Kattendoorn s.s. - <i>Ononis spinosa subsp. spinosa</i> 🗑️	1	Eersel	mielschool	■ 📷
2022-07-31 14:33	■ Spaanse vlag - <i>Euplagia quadripunctaria</i>	1 imago	Eersel	ben.mangnus	■ 📷
2022-07-31 10:43	▲ Blinde bij - <i>Eristalis tenax</i>	1	Eersel	Miriam	🔍 📷
2022-07-30 19:58	■ Gewone kameleonspin - <i>Misumena vatia</i>	1	Eersel	Floor	🔍 📷
2022-07-29 14:10	▲ Gamma-uil - <i>Autographa gamma</i> 🗑️	1	Eersel	Floor	■ 📷
2022-07-29 17:47	▲ Akkerhommel - <i>Bombus pascuorum</i>	1 imago	Eersel	mooiste momo	■ 📷
2022-07-29 14:58	▲ Akkerhommel - <i>Bombus pascuorum</i> 🗑️	1	Eersel	mooiste momo	■ 📷
2022-07-29 15:33	■ Franse veldwesp - <i>Polistes dominula</i>	1 imago	Eersel	mooiste momo	■ 📷
2022-07-29 17:50	▲ Tweevleugelige (Vlieg) onbekend - <i>Diptera indet.</i>	1 imago	Eersel	mooiste momo	✓ 📷
2022-07-29 20:00	▲ Schorsmarpissa - <i>Marpissa muscosa</i>	1	Eersel	mooiste momo	🔍 📷
2022-07-28 18:53	▲ Heggenmus - <i>Prunella modularis</i>	1	Eersel	mooiste momo	🔍 📷
2022-07-28 18:17	▲ Herfsthangmatspin - <i>Linyphia triangularis</i>	1	Eersel	Jos der Kinderen	■ 📷
2022-07-28 18:49	▲ Paardenbloem - <i>Taraxacum officinale s.l. (incl. all sec.)</i>	1	Eersel	mooiste momo	✓ 📷 🔄
2022-07-28 18:49	■ Mos onbekend - <i>Bryophyta indet.</i>	1	Eersel	mooiste momo	✓ 📷
2022-07-27 17:21	▲ Merel - <i>Turdus merula</i>	1	Eersel	mooiste momo	🔍 📷

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2022-07-25 10:41	▲ Peper-en-zoutvlinder - <i>Biston betularia</i>	1 imago	Eersel	SintExupery	📷 📷
2022-07-25 19:07	■ Zomerlinde - <i>Tilia platyphyllos</i> ?	1	Eersel	mooiste momo	📷 📷
2022-07-24 08:01	▲ Blauwe Reiger - <i>Ardea cinerea</i>	2	Eersel	SintExupery	✅ 📷 📷
2022-07-24 18:28	▲ Heidelibel onbekend - <i>Sympetrum spec.</i>	1 imago	Eersel	Liselotte	✅ 📷 📷
2022-07-23	▲ Gierzwaluw - <i>Apus apus</i>	300	Eersel	SintExupery	📷 📷
2022-07-23 18:17	▲ Dambordvlieg onbekend - <i>Sarcophaga spec.</i> ?	1	Eersel	mooiste momo	📷 📷
2022-07-23 17:53	■ Hyacint - <i>Hyacinthus orientalis</i>	1	Eersel	Jos der Kinderen	📷 📷
2022-07-22 13:33	▲ Honingbij - <i>Apis mellifera</i>	1 imago	Eersel	Chris	📷 📷
2022-07-22 13:31	▲ Boomhommel - <i>Bombus hypnorum</i> ?	1	Eersel	Chris	📷 📷
2022-07-22 13:29	▲ Aardhommelgroep - <i>Bombus terrestris/luconum/magnus/cryptarum</i> ?	1	Eersel	Chris	📷 📷
2022-07-22 09:20	▲ Duitse wesp - <i>Vespula germanica</i>	1 imago	Eersel	RonnieDaas	📷 📷
2022-07-22 13:35	▲ Dambordvlieg onbekend - <i>Sarcophaga spec.</i> ?	1	Eersel	Chris	📷 📷
2022-07-22 13:32	▲ Blinde bij - <i>Eristalis tenax</i>	1 imago	Eersel	Chris	📷 📷
2022-07-22 20:03	■ Smalle rolklaver - <i>Lotus glaber</i> ?	1	Recreatiegebied E3 Strand	Huijbert Vroege	📷 📷
2022-07-22 20:04	▲ Geel walstro - <i>Galium verum</i>	1	Recreatiegebied E3 Strand	Huijbert Vroege	📷 📷
2022-07-22 20:02	▲ Geel walstro - <i>Galium verum</i>	1	Recreatiegebied E3 Strand	Huijbert Vroege	📷 📷
2022-07-20 07:01	▲ Gehoornde klaverzuring - <i>Oxalis corniculata</i>	1	Eersel	mooiste momo	📷 📷
2022-07-19 07:42	▲ Huismoeder - <i>Noctua pronuba</i>	1 imago	Eersel	Liselotte	📷 📷
2022-07-18 13:44	▲ Atalanta - <i>Vanessa atalanta</i>	1 imago	Eersel	mooiste momo	📷 📷
2022-07-16 18:54	▲ Bruine kikker - <i>Rana temporaria</i>	1	Eersel	Jos der Kinderen	✅ 📷
2022-07-16 17:21	■ Zwart weeskind - <i>Mormo maura</i>	1 imago	Eersel	lieke	✅ 📷
2022-07-16 12:42	■ Tuinhommel - <i>Bombus hortorum</i>	1 imago	Eersel	mooiste momo	📷 📷
2022-07-16 13:48	▲ Gewone wesp - <i>Vespula vulgaris</i> ?	1	Eersel	Marieke	📷 📷
2022-07-16 18:08	▲ Blauwe aspergekever - <i>Crioceris asparagi</i>	1 imago	Eersel	SintExupery	✅ 📷
2022-07-16 19:32	▲ <i>Scymninae</i> indet.	1 imago	Eersel	Danii	📷 📷

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2022-07-15 13:24	▲ Huismus - <i>Passer domesticus</i>	1	Eersel	mooiste momo	 
2022-07-15 13:18	▲ Groene vleesvlieg onbekend - <i>Lucilia spec.</i>	1 imago	Eersel	mooiste momo	 
2022-07-15 18:46	▲ Rozemarijngoudhaan - <i>Chrysolina americana</i>	1 imago	Eersel	SPrinsen	 
2022-07-14 17:24	▲ Citroenvlinder - <i>Gonepteryx rhamni</i>	1 imago	Eersel	mooiste momo	 
2022-07-14 15:16	▲ Huismoeder - <i>Noctua pronuba</i>	1 imago	Eersel	Liselotte	 
2022-07-13 01:05	▲ Wegmier - <i>Lasius niger</i> ?	1	Eersel	RonnieDaas	 
2022-07-12 07:11	▲ Dooiergele mestzwam - <i>Bolbitius bitubans</i>	1	Eersel	Marieke	 
2022-07-11 16:11	■ Gewone kameleonspin - <i>Misumena vatia</i>	1	Eersel	Jos der Kinderen	 
2022-07-10 15:26	▲ Citroenvlinder - <i>Gonepteryx rhamni</i>	1 imago	Ter Spiegelt e.o.	Ben Selten	 
2022-07-10 23:40	▲ Witte dominomot - <i>Oegoconia deauratella</i>	1 imago	Eersel	RonnieDaas	 
2022-07-10 15:28	▲ Zuidelijk spitskopje - <i>Conocephalus fuscus</i>	1 imago	Ter Spiegelt e.o.	Ben Selten	 
2022-07-10 15:23	■ Grote wolbij - <i>Anthidium manicatum</i>	1 imago	Ter Spiegelt e.o.	Ben Selten	 
2022-07-10 16:06	■ Franse veldwesp - <i>Polistes dominula</i> ?	1	Eersel	Chris	 
2022-07-10 19:17	▲ Bloemvlieg onbekend - <i>Anthomyiidae indet.</i>	1 imago	Eersel	mooiste momo	 
2022-07-10 16:10	▲ Gewone roofvlieg - <i>Toxomerus atricapillus</i>	1 imago	Eersel	Chris	 
2022-07-10 16:25	▲ Huisvlieg - <i>Musca domestica</i>	1 imago	Eersel	RonnieDaas	 
2022-07-10 15:35	▲ Dubbelgevlekte bastaardweekschildkever - <i>Anthrenus fasciatus</i> ?	1	Eersel	Ben Selten	 
2022-07-10 16:25	▲ Schorsmarpissa - <i>Marpissa muscosa</i>	1	Eersel	RonnieDaas	 
2022-07-10 23:51	■ Grote steatoda - <i>Steatoda grossa</i>	1	Eersel	RonnieDaas	 
2022-07-10 14:40	▲ Phacelia - <i>Phacelia tanacetifolia</i>	1	Eersel	B Gabriels	 
2022-07-10 16:22	▲ Kantige basterdwederik - <i>Epilobium tetragonum</i> ?	1 bloeiend	Eersel	Ben Selten	 
2022-07-09 11:29	▲ Caai - <i>Garrulus glandarius</i>	1	Eersel	Wouter Thijs	
2022-07-09 11:27	▲ Boerenwaluw - <i>Hirundo rustica</i>	2 overvliegend	Eersel	Wouter Thijs	
2022-07-09 11:26	▲ Huiswaluw - <i>Delichon urbicum</i>	2 foeragerend	Eersel	Wouter Thijs	
2022-07-09 11:29	▲ Vink - <i>Fringilla coelebs</i>	3	Eersel	Wouter Thijs	

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2022-07-09 18:20	▲ Dagpauwoog - <i>Aglais io</i>	1 imago	Eersel	mooiste momo	 
2022-07-09 13:11	▲ Dagpauwoog - <i>Aglais io</i>	1 imago	Eersel	Marieke	 
2022-07-09 18:22	▲ Gehakkelde aurelia - <i>Polygonia c-album</i>	1 imago	Eersel	mooiste momo	 
2022-07-09 17:21	▲ Ringspikkelspanner - <i>Hypomecis punctinalis</i> ?	1 imago	Eersel	Mark Wijnen	 
2022-07-09 11:36	▲ Duitse wesp - <i>Vespula germanica</i>	1 imago	Eersel	RonnieDaas	 
2022-07-09 18:52	▲ Zevenstippelig lieveheersbeestje - <i>Coccinella septempunctata</i>	1 imago	Eersel	mooiste momo	 
2022-07-09 18:48	▲ Zevenstippelig lieveheersbeestje - <i>Coccinella septempunctata</i>	1 imago	Eersel	mooiste momo	 
2022-07-09 11:00	■ Vuurwants - <i>Pyrrhocoris apterus</i>	1 imago	Eersel	mooiste momo	 
2022-07-09 18:35	▲ Groene schildwants - <i>Palomena prasina</i>	1 imago	Eersel	mooiste momo	  
2022-07-09 16:21	▲ Gewone oprolpissebed - <i>Armadillidium vulgare</i>	1	Eersel	mooiste momo	 

2

Bijlage

Effecten indicator soorten



Beschermde natuur in Nederland: soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Effectenindicator soorten

Maatregelenindicator soorten

Routeplanner beschermde natuur

Effectenindicator Natura2000-gebieden

Effectenindicator soorten

1 Locatie


2 Activiteiten

3 Indicatie

Zoek en selecteer een locatie op postcode, of zoom in op de kaart en teken de grenzen van het plangebied: zet punten en sluit af met een dubbel-klik.

Postcode

5521 CE



1 Locatie

2 Activiteiten

3 Indicatie

Geef aan voor welke [OLO-activiteit\(en\)](#) u een indicatie van effecten wilt ontvangen.

Top-10 activiteiten

[Alle activiteiten](#)

- ☒ Slopen en/of asbest verwijderen
- ☐ Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
- ☐ Bijbehorend bouwwerk bouwen
- ☐ Kappen
- ☐ Overig bouwwerk bouwen
- ☐ Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
- ☐ Dakkapel plaatsen
- ☒ Woning bouwen
- ☐ Nieuw kozijn plaatsen of bestaand kozijn of gevelpaneel veranderen
- ☐ Uitrit aanleggen of veranderen

Toon effecten

Locatie: 5,3178/51,3639 Oppervlakte: 2,21 ha

Disclaimer

- > De dekkingsgraad van waarnemingen uit de NDFF per locatie wisselt sterk. Als er geen waarnemingen uit de NDFF zijn, kunnen er dus wél beschermde soorten voorkomen. Een gebruiker is zelf verantwoordelijk om (eventueel met hulp van de gemeente) te achterhalen of er daadwerkelijk beschermde soorten in het plangebied voorkomen.
- > Beschermde soorten die naar verwachting geen schadelijke effecten ondervinden, worden niet in de uitvoer getoond.
- > De informatie uit de effectenindicator soorten is generiek. Om vast te stellen of een activiteit in de praktijk daadwerkelijk schadelijk is, is meer specifieke informatie nodig over de betreffende activiteit, de werklocatie en over het voorkomen van beschermde soorten in en rond het plangebied.

Activiteiten

☐ Slopen en/of asbest verwijderen

Een bouwwerk helemaal of voor een gedeelte slopen of van asbest ontdoen.

Deze activiteit kan leiden tot schadelijke effecten voor beschermde soorten door verlies van verblijfplaatsen in en rondom het te slopen gebouw. Denk hierbij met name aan vogels, zoals kerkuil en steenuil en vleermuizen.

☐ Woning bouwen

Het in zijn geheel nieuw plaatsen van een woning of een wijziging op een nog te bouwen nieuwe woning waarvoor al een vergunning is verleend.

Deze activiteit kan leiden tot schadelijke effecten als de bouwlocatie onderdeel is van het leefgebied van beschermde soorten.



In het door u geselecteerde gebied komen, in combinatie met de geselecteerde activiteit(en), geen Wettelijk beschermde soorten voor waarbij schadelijke effecten worden verwacht.



3

Bijlage

Plan projectlocatie



