

QUICKSCAN SOORTENBESCHERMING

OIRSCHOTSEDIJK 50 TE WINTELRE

Colofon

Quicksan soortenbescherming

Projectnummer: E.00006043

Versie: 1

Datum: 21 augustus 2024

Opdrachtnemer

Agrifirm NWE BV
Bedrijfsontwikkeling Exlan
Waalkade 33
5347 KR Oss

Postbus 300
5340 AH Oss

Locatie

Oirschotsedijk 50 Wintelre

Contactpersoon

AvZ
T: 088 – 488 2929
F: 088 – 488 2102
Email: exlanadvies@agrifirm.com

Uitvoerders

AvZ
KvL

Collegiale check

AvZ

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN VERVEELVOUDIGD DOOR MIDDEL VAN DRUK, FOTOKOPIE, MICROFILM, GELUIDSBAND, ELEKTRONISCH OF OP WELKE ANDERE WIJZE DAN OOK, EN EVENMIN IN EEN GEAUTOMATISEERD GEGEVENSBESTAND WORDEN OPGESLAGEN, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN AGRIFIRM EXLAN.

Inhoudsopgave

Quickscan soortenbescherming

INLEIDING	4
HOOFDSTUK 1	6
TOETSINGSKADER	6
HOOFDSTUK 2	10
ONDERZOEKSRESULTATEN	10
HOOFDSTUK 3	27
CONCLUSIE	27
LITERATUUR	28
WAARNEMINGEN	29
EFFECTEN INDICATOR SOORTEN	36
PLAN PROJECTLOCATIE	38
RAPPORT BESCHERMDE SOORTENINDICATOR (BESI)	39

Inleiding

Planbeschrijving

Aanleiding

Het plangebied is gelegen aan de Oirschotsedijk 50 te Wintelre. De plannen omvatten het beëindigen en slopen van een paardenhouderij/manege en het bouwen van een nieuwe woning. De bestaande bedrijfswoningen krijgen een burgerbestemming waarbij de woning op nummer 50 gesplitst wordt. In dit kader wordt door het bevoegde gezag een toets aan de soortenbescherming noodzakelijk geacht. Bij de uitvoering van de voorgenomen ingrepen moet rekening worden gehouden met het huidige voorkomen van de, op grond van de Omgevingswet, beschermde soorten. Als de voorgenomen ingreep leidt tot het overtreden van verbodsbepalingen betreffende beschermde soorten, moet vrijstelling of ontheffing worden verkregen.

De voorliggende quickscan bevat een inventarisatie van de huidige aanwezigheid van beschermde soorten planten en dieren in en om het plangebied. Tevens worden de te verwachten effecten van de ingreep in het plangebied beoordeeld.

Plangebied

Het plangebied ligt in de plaats Wintelre in de gemeente Eersel. Het plangebied bevindt zich buiten de verkeerskundige en stedenbouwkundige bebouwde kom van Wintelre.



■ Afbeelding 1: luchtfoto plangebied (bron: streetsmart.cyclomedia.com/streetsmart, geraadpleegd op 16/08/2024)



• Afbeelding 2: luchtfoto detail plangebied (bron: streetsmart.cyclomedia.com/streetsmart, geraadpleegd op 16/08/2024). In rood de te slopen bebouwing en in blauw de nieuw te bouwen woning bij benadering

Onderzoeksmethode

Om een goede indicatie van de natuurwaarden binnen het plangebied te krijgen, wordt het onderzoek in verschillende stappen uitgevoerd. Op basis van bronnenonderzoek is nagegaan of er wettelijk beschermde planten- of diersoorten in het gebied voor kunnen komen waaraan extra aandacht geschonken dient te worden tijdens het terreinbezoek.

Na het bronnenonderzoek is een verkennend terreinbezoek gebracht aan het plangebied. Hierbij is, op basis van de gegevens van het literatuuronderzoek, beoordeeld voor welke soorten het gebied daadwerkelijk een geschikte habitat biedt en daarmee welke soorten er daadwerkelijk voor kunnen komen. Vervolgens zijn de mogelijke effecten op de verwachte beschermde soorten beschreven.

Op basis van de doorlopen procedures zijn conclusies getrokken met betrekking tot de eventuele negatieve effecten en/of obstakels inzake de Omgevingswet.

Op donderdag 15 augustus 2024 is de locatie tussen 16:30 en 17:30 uur ter plaatse geïnventariseerd, om te onderzoeken of het plangebied een zodanig belangrijke status heeft dat een aanvullend veldonderzoek noodzakelijk is. Op het moment van inventarisatie was het 27 graden Celsius en licht bewolkt.

Op basis van terreinkenmerken is beoordeeld of het terrein geschikt is voor de, in de regio voorkomende, beschermde soorten.

Doelstelling

Om een indicatie te krijgen van de effecten die de sloop- en bouwwerkzaamheden hebben op de natuurwaarden binnen het plangebied, dienen de volgende vragen te worden beantwoord:

1. Welke wettelijk beschermde soorten komen in het plangebied voor? Welke status hebben deze soorten?
2. Welke invloed heeft de geplande ingreep in het betreffende gebied op de beschermde soorten en komt daarmee de staat van instandhouding in gevaar?
3. Hoe dient omgegaan te worden met eventuele negatieve effecten van het plan op wettelijk beschermde planten- en diersoorten, en welke vervolgstappen zijn nodig?

1 Toetsingskader

Omgevingswet

De bescherming van natuur is in Nederland vastgelegd in nationale wetgeving. De nationale wetgeving is een Nederlandse implementatie van de belangrijkste Europese wetgevingselementen. Per 1 januari 2017 zijn de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998 vervangen door de Wet natuurbescherming. En per 1 januari 2024 zijn deze allen opgenomen in de Omgevingswet. De uitvoering van deze nieuwe wet is grotendeels in handen Gedeputeerde Staten van de provincies.

1.1 Gebiedsbescherming

De Omgevingswet noemt bekende maar ook enkele nieuwe soorten natuurgebieden die bescherming behoeven: de Natura 2000-gebieden, het Natuurnetwerk Nederland (NNN), bijzondere provinciale natuurgebieden en landschappen, bijzondere nationale natuurgebieden en de nationale parken. Bij ontwikkelingen met name in het buitengebied moet rekening worden gehouden met het al dan niet van toepassing zijn van de beschermingsregimes van deze natuurgebieden. Ieder gebied kent een eigen beschermingsregime dat afzonderlijk gewogen dient te worden in relatie tot plannen, projecten en andere handelingen met mogelijk nadelige effecten voor de beschermde natuurwaarden.

Natura 2000-gebieden

De bekendste natuurgebieden zijn de Natura 2000-gebieden, zij kennen tevens het meest strikte beschermingsregime. De basis voor Natura 2000 zijn de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. In Nederland zijn 164 gebieden als Natura 2000-gebied aangewezen. Daarnaast kent Nederland ook 'bijzonder nationaal natuurgebied'. Voor ieder gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen bepaald die betrekking kunnen hebben op de bescherming van specifieke flora en fauna alsook leefgebieden van soorten. Alle projecten en handelingen binnen of buiten de gebiedsgrenzen mogen geen verstorend of verslechterend effect hebben op de instandhoudingsdoelstellingen. Voor de voorgenomen ontwikkeling is hier, voor zover van toepassing, separaat aan getoetst. In deze rapportage wordt hier verder niet op ingegaan.

Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS) is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. De provincies zijn belast met de taak een dergelijk netwerk tot stand te laten te komen en in stand te laten. De uitvoering hiervan is hoofdzakelijk gestuurd vanuit de ruimtelijke ordening (provinciale verordeningen). Binnen het Natuurnetwerk Nederland geldt een "ja-mits"- benadering.

Overige gebieden

Naast de bovengenoemde gebieden kunnen gebieden aangewezen worden als 'bijzondere provinciale natuurgebieden', 'bijzondere provinciale landschappen' of 'nationaal park'. De bescherming van deze gebieden vindt net als bij het NNN plaats via het ruimtelijk spoor. Daarnaast kan een gebied aangewezen worden als 'bijzonder nationaal gebied', een soort voorloper van de aanwijzing als Natura 2000-gebied. De bescherming van deze gebieden stemt dan ook overeen met de bescherming van Natura 2000-gebieden.

1.2 Soortenbescherming

De Omgevingswet verbiedt het om zonder omgevingsvergunning voor de activiteit flora en fauna, activiteiten te verrichten. In hoofdstuk 11 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) wordt het beschermingsregime geregeld van alle van nature in Nederland in het wild voorkomende dieren en planten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten beschermingsregimes:

- 1) Beschermingsregime soorten vogelrichtlijn (paragraaf 11.2.2)
- 2) Beschermingsregime soorten habitatrichtlijn (paragraaf 11.2.3)
- 3) Beschermingsregime andere soorten (paragraaf 11.2.4)

Daarnaast zijn er vrijgestelde soorten en jaarrond beschermde vogelnesten.

Vogelrichtlijn

Onder de soorten van de Vogelrichtlijn vallen alle van nature in Nederland in het wild levende vogels. Het is verboden om:

- Opzettelijk vogels te doden of te vangen;
- Opzettelijk vogelnesten, -rustplaatsen en – eieren te vernielen of te beschadigen of vogelnesten weg te nemen;
- Eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben;
- Opzettelijk vogels te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

Habitatrichtlijn

Onder de soorten van de Habitatrichtlijn vallen soorten die genoemd zijn in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, Bijlage I (planten) en II (diersoorten) van het Verdrag van Bern en Bijlage I van het Verdrag van Bonn. In de Bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd.

Wat betreft deze soorten is het verboden om:

- Opzettelijk dieren te doden of te vangen;
- Opzettelijk dieren te verstoren;
- Opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen;
- Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
- Opzettelijk planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken, te verzamelen, af te snijden, te onttwortelen of te vernielen.

Ook is het verboden deze soorten te verkopen, te vervoeren voor verkoop, te verhandelen, te ruilen of te koop of te ruil aan te bieden, tenzij het gaat om gefokte of gekweekte dieren of planten.

Andere soorten

Onder het beschermingsregime andere soorten vallen soorten waarvan er geen Europese verplichting tot bescherming is. Dit zijn soorten die vanuit nationaal belang extra bescherming behoeven. Het beschermingsniveau van deze soorten kan per provincie verschillen.

Het is verboden om:

- 1) Opzettelijk dieren te doden of te vangen;
- 2) Vaste voortplantingsplaatsen, rustplaatsen of eieren van dieren te beschadigen of te vernielen;
- 3) Opzettelijk (vaat)planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken te verzamelen, af te snijden, te onttwortelen of te vernielen.

Provincies hebben de bevoegdheid om bij provinciale verordening vrijstelling te verlenen voor nationaal beschermde soorten.

Vrijgestelde soorten

De verboden zijn niet van toepassing op de bosmuis, de huisspitsmuis en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevinden. Ook vallen de zwarte rat, bruine rat, huismuis, de mol en sommige exoten niet onder beschermingsregime van de Omgevingswet en mogen opzettelijk gedood en gevangen worden. Daarnaast geldt, zoals hierboven reeds aangegeven, dat provincies de bevoegdheid hebben vrijstelling te verlenen voor bepaalde soorten.

Jaarrond beschermde vogelnesten

De opgestelde lijst met jaarrond beschermde nesten voor vogels is een beleidsdocument dat voortvloeit uit artikel 11.42 van het Bal en is opgenomen in de provinciale omgevingsverordening. De nesten zijn ingedeeld in categorieën (1 t/m 5) waarvan de categorie 1 t/m 4 jaarrond beschermd zijn. Nesten in categorie 5 zijn enkel beschermd bij afwezigheid van voldoende alternatieven.

- 1) Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats
- 2) Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
- 3) Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
- 4) Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen.
- 5) Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen.

1.3 Houtopstanden

Afdeling 11.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) gaat over het vellen van houtopstanden en het herplanten van grond na het vellen van houtopstanden. Een houtopstand is een zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend.

Buiten de bescherming vallen:

- Houtopstanden binnen de 'bebouwingscontour houtkap'. Dit bebouwingscontour dient door de gemeenteraad vastgesteld te zijn in het omgevingsplan;
- houtopstanden op erven of in tuinen;
- bomen en struiken die specifiek voor het oogsten van fruit, noten of vruchten zijn geteeld;
- houtopstanden die windschermen om boomgaarden vormen naaldbomen die duidelijk bedoeld zijn als kerstbomen én niet ouder zijn dan 20 jaar;
- kweekgoed;
- populieren of wilgen van:
 - wegbeplantingen
 - beplantingen langs waterwegen, of
 - eenrijige beplantingen langs landbouwgronden
- het dunnen van een houtopstand om de groei van de overblijvende houtopstand te bevorderen. Bijvoorbeeld als onderdeel van het reguliere onderhoud van de houtopstand;
- beplantingen die bestaan uit populieren, wilgen, essen of elzen en duidelijk bedoeld zijn voor de productie van houtige biomassa onder de volgende voorwaarden:
 - Het oogsten vindt minstens 1 keer per 10 jaar plaats.
 - De beplantingen bestaan uit minstens 10.000 stoven per ha per beplantingseenheid.
 - Een beplantingseenheid moet bestaan uit aaneengesloten beplanting zonder doorsnijding door meer dan 2 m brede onbeplante stroken.
 - De beplantingen zijn aangelegd na 1 januari 2013.
- houtopstanden met een oppervlakte van minder dan 10 are. Het gaat hier om de oppervlakte van de totale houtopstand dus niet alleen van het te vellen deel;

- houtopstanden die bestaan uit een rijbeplanting van maximaal 20 bomen (gerekend over het totaal aantal rijen). Het gaat hier om het aantal bomen in rijbeplanting van de totale houtopstand dus niet alleen het aantal te vellen bomen.

Naast de Omgevingswet kan ook een gemeente beperkingen opleggen ten aanzien van het kappen van bomen. Er is dan een omgevingsvergunning nodig voor het kappen van bomen op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV).

Tenslotte kan ook in een provinciale verordening een kapverbod opgelegd worden. Indien hier sprake van is, moet er bij de provincie een ontheffing of vrijstelling worden aangevraagd.

Voor de voorgenomen ontwikkeling is hier, voor zover van toepassing, separaat aan getoetst. In deze rapportage wordt hier verder niet op ingegaan.

2

Onderzoeksresultaten


2.1 Bronnenonderzoek

Gegevens van websites als www.waarneming.nl en de verspreidingsatlas van NDFF zijn geraadpleegd voor achtergrondinformatie. Een groot aantal amateurs en professionals publiceert op deze bekende websites zijn natuurwaarnemingen, die worden gecontroleerd door een validatiecommissie. Zodoende zijn de waarnemingen uit deze bronnen redelijk betrouwbaar, maar moeilijk te verifiëren. De waarnemingen geven eventueel wel een indicatie van soorten waar tijdens het veldonderzoek extra aandacht aan besteed dient te worden.

Natuurnetwerk Nederland

Het natuurbeheerplan is een beleidskader om het Europese, rijks- en provinciale natuur- en landschapsbeleid te realiseren. Het gaat hier om bestaande natuurgebieden, gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt, landbouwgebieden worden ingericht en beheerd volgens agrarisch natuurbeheer en de Natura 2000-gebieden.

Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland en buiten andere natuurgebieden zoals Natura 2000. Het meest dichtbijgelegen Natura 2000-gebied is het Natura 2000-gebied "Kempenland-West". Het habitatrictlijngebied ligt op een afstand van 3 km ten zuiden van de projectlocatie en wordt omringd door een Natuurnetwerk-gebied. Het Natura2000-gebied betreft het Grootmeer en het Kleinmeer aan de Merenweg. Gelegen in het bosgebied tussen Wintelre en Vessem. Ten noorden van de projectlocatie ligt een bos- en heidegebied dat strekt tot aan de A58. Dit is niet aangewezen als Natuurnetwerk-gebied omdat dit militair oefenterrein is van de Landmacht. De gebieden die hier niet toe behoren zijn wel aangewezen als Natuurnetwerk-gebied.



Afbeelding 3: ligging Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000
(bron: atlasleefomgeving.nl/kaarten, geraadpleegd op 16/08/2024)

Het Natuurnetwerk Brabant is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Het is een netwerk van deels bestaande en deels nieuwe natuurgebieden die door ecologische verbindingzones met elkaar verbonden zijn. Hierdoor kunnen dieren zich makkelijker verplaatsen tussen verschillende natuurgebieden. Zo wordt de biodiversiteit (het totaal aan planten en dieren) bevorderd. Ongeveer 90% van het Natuurnetwerk Brabant wordt gevormd door bestaande natuurgebieden zoals bijvoorbeeld de Biesbosch en de Maashorst. Maar het netwerk is nog niet compleet. Er ontbreken nog veel gebieden en verbindingen die belangrijk zijn voor dieren en planten. Vanwege de klimaatverandering veranderen hun leefomstandigheden en wordt dat nog urgenter. Zij moeten zich kunnen verplaatsen om genoeg voedsel te kunnen blijven vinden en zich voort te planten. Maar het Natuurnetwerk is er niet alleen voor planten en dieren, maar ook voor mensen. Mensen genieten, recreëren en ontspannen in de natuur en voelen zich gelukkiger. Natuur schept kansen voor ondernemers die natuur en hun bedrijf willen combineren en helpt tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Binnen het Natuurnetwerk Nederland geldt een “ja, mits”- benadering. Het project is niet gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland en dus kan geconcludeerd worden dat het project geen gevolgen heeft voor het Natuurnetwerk.

2.2 Veldonderzoek

Op verschillende punten in het plangebied zijn waarnemingen verricht. Tijdens het veldbezoek is het gebied beoordeeld op de aanwezigheid van beschermde soorten en de habitatgeschiktheid voor beschermde soorten. Er is extra aandacht besteed aan de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen en vogelnesten.

De ecologische factoren in de omgeving zijn met behulp van een digitale fotocamera vastgelegd. Om de flora en fauna te kunnen determineren, is gebruik gemaakt van eigen kennis en literatuur



• Afbeelding 4: Te behouden bijgebouw



- Afbeelding 5: Bedrijfsgebouwen, linker deel wordt gesloopt, rechter deel blijft behouden



- Afbeelding 6: Binnenzijde te slopen bedrijfsgebouw



- Afbeelding 7: Binnenzijde te slopen bedrijfsgebouw



- Afbeelding 8: Bedrijfswoning Oirschotsedijk 50b wordt burgerwoning, stal rechts wordt gesloopt



• Afbeelding 9: Binnenzijde bedrijfsgebouw, wordt gesloopt



• Afbeelding 10: Binnenzijde bedrijfsgebouw, wordt gesloopt



- Afbeelding 11: Rijbakken achter bedrijf, worden omgezet naar agrarisch gebruik



- Afbeelding 12: Vaste mestopslag



- Afbeelding 13: rundveehouderij aan overzijde van de straat, hier zijn huismussen gehoord



- Afbeelding 14: Bedrijfswoning, wordt gesplitst en wordt burgerwoning



• Afbeelding 15: Binnenzijde bedrijfsgebouw



• Afbeelding 16: Rijhal met in pandige kantine



• Afbeelding 17: binnenzijde inpandige kantine



• Afbeelding 18: Zijgevel te slopen bedrijfsgebouw



• Afbeelding 19: Binnenzijde bedrijfsgebouw



• Afbeelding 20: Achtergevel te slopen bedrijfsgebouw



- Afbeelding 21: Zijgevel te slopen bedrijfsgebouw



- Afbeelding 22: rijbakken achter de bedrijfsgebouwen, worden omgezet naar agrarisch gebruik

Flora algemeen

Bij de planlocatie zijn geen bijzondere beplantingen aangetroffen. Er is tevens gelet op de aanwezigheid van (beschermde) muurvegetatie. Het erf rondom de te slopen bedrijfsgebouwen is grotendeels verhard of voorzien van paddocks. Rondom de bedrijfswoningen is het erf ingericht als tuin met enkele heggen, hagen en bomen.

Grondgebonden zoogdieren

Specifiek wordt bekeken of binnen de betreffende inrichting verwacht kan worden of er streng beschermde zoogdieren; steenmarter, bunzing, hermelijn, wezel, eekhoorn, bever en das kunnen worden aangetroffen. Op het erf lopen enkele katten vrij rond, hierdoor is dit geen interessante locatie voor grondgebonden zoogdieren.

Steenmarter

De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor de steenmarter. Steenmarters gebruiken hoozolders, loze ruimtes onder het dak, schuurtjes en dergelijke, als verblijfplaats. Een steenmarter heeft binnen zijn territorium verscheidene verblijfplaatsen. Daarnaast laten steenmarters enorm veel sporen achter. Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen, zoals uitwerpselen of prooi-resten aangetroffen die duiden op het gebruik van de onderzoekslocatie als vaste rust- of verblijfplaats door deze soort.

Kleine marterachtigen

De onderzoekslocatie biedt geen geschikte verblijfslocaties voor de hermelijn, wezel en bunzing. De soorten maken gebruik van oude holen van onder andere mollen en muizen, maar ook houtwallen, steenhopen en ruimtes onder boomwortels. Desbetreffende soorten hebben binnen hun territorium verscheidene verblijfplaatsen. Tijdens het veldbezoek zijn er geen marters of sporen van marters aangetroffen op de onderzoekslocatie. Echter, dit betekent niet dat het gebied niet potentieel in gebruik is door de hermelijn, wezel en/of bunzing als migratieroute. Het is best denkbaar dat er kleine marterachtigen verblijven in de houtwallen rondom de vijvers bij De Hut (naastgelegen perceel). Zij zullen van de beoogde plannen geen hinder ondervinden. Door de aanleg van hagen en bomenrijen (zie landschappelijk inpassingsplan) wordt het habitat voor kleine marterachtigen versterkt. Het toepassen van takkenrillen zou hier ook aan kunnen bijdragen.

Eekhoorn

De onderzoekslocatie is vanwege de afwezigheid van voldoende bomen niet geschikt als habitat voor de eekhoorn. Er staan te weinig bomen rondom de projectlocatie. De bomen rond de vijvers bij De Hut staan op een afstand van ruim 60 meter. Mochten hierin eekhoorns wonen, dan ondervinden deze, gezien de afstand, geen hinder van de beoogde plannen. Tevens worden er met de werkzaamheden geen bomen verwijderd. Een negatief effect als gevolg van de werkzaamheden is uitgesloten.

Bever

Er komen geen bevers voor in de omgeving van de projectlocatie. Voor de bever is op de onderzoekslocatie geen geschikt habitat aanwezig. De bever leeft in het water of de waterkant. Rondom de projectlocatie is geen (stromend) water aanwezig. Verstoring van vaste rust- en verblijfplaatsen van de bever kunnen worden uitgesloten.

Das

Dassen komen wel voor in het gebied rondom de projectlocatie. Zij maken hun burchten in de grens tussen bos(jes) en weilanden. Bij voorkeur in een talud, verstopt in de dekking. Deze zijn niet aangetroffen. De gronden rondom de te slopen bedrijfsgebouwen zijn in gebruik als rijbak. De afstand tot de dichtstbijzijnde houtwal bedraagt ruim 60 meter. Het verstoren van een vaste rust- en verblijfplaats is daarmee uit te sluiten.

Tijdens het veldbezoek zijn op de onderzoekslocatie en de directe omgeving geen loop- of eetsporen, latrines en/of wissels aangetroffen die duiden op de aanwezigheid en/of het gebruik van de onderzoekslocatie door de das. Deze zijn niet waargenomen. Daarmee is uit te sluiten dat de projectlocatie onderdeel uitmaakt van een essentieel foerageergebied van de das.

Verstoring ten aanzien van de das als gevolg van de voorgenomen ingreep is niet aan de orde.

Het voorkomen van overige grondgebonden zoogdieren waarvoor geen vrijstelling geldt, is tijdens het veldbezoek niet vastgesteld.

Vleermuizen

Het plangebied is zeer nauwkeurig beoordeeld op de mogelijke waarde voor vleermuizen. Hierbij is gelet op de geschiktheid van de aanwezige bebouwing als verblijfplaats voor deze dieren: aanwezigheid van spouwgangen en andere openingen in muren en daken, vetstrepen, uitwerpselen en prooiresten bij gevelopeningen.

Verblijfsruimte voor vleermuizen hebben specifieke voorwaarden zoals een stabiele temperatuur en het tochtvrij zijn. Bij vleermuizen worden vier verblijfplaatsen onderscheiden; winterverblijven, zomerverblijven, kraamverblijven en paarverblijven. Aan de winterverblijven worden de hoogste eisen gesteld, daarna de kraamverblijven, dan de zomerverblijven en tenslotte de paarverblijven, waarbij de vleermuizen een zeer korte tijd op een bepaalde locatie kunnen verblijven.

De bedrijfsgebouwen zijn voormalige rundveestallen. De gevels van het grootste bedrijfsgebouw bestaan uit spouwmuur zonder open stootvoegen of andere openingen die voor vleermuizen gebruikt kunnen worden als invliegopening. Het kleinere bedrijfsgebouw heeft gevels van prefab metselwerk met daarboven ongeïsoleerd damwand. De dakconstructie van de bedrijfsgebouwen bestaan uit daken met ongeïsoleerd damwandprofiel of golfplaten welke niet stabiel blijven qua temperatuur en gedurende de dag aan enorme temperatuurschommelingen onderhevig zijn. De dakconstructie is hierdoor geen geschikte verblijfsplaats voor vleermuizen. Tenslotte hangt er aan de gevels van de bedrijfsgebouwen veel verlichtingsarmaturen. Dit trekt insecten aan waarop vleermuizen zouden kunnen foerageren, maar dit belemmert het gebruik als verblijfplaats.

Er zijn in en om de stallen geen sporen (vetstrepen, uitwerpselen, prooiresten) aangetroffen. Naast de onderzoekslocatie bevinden zich de bedrijfswoningen. Eventuele verblijfsplaatsen hierin ondervinden door de afstand tot de slooplocatie en de aard van de ingreep geen hinder.

Foerageerhabitat

De onderzoekslocatie zal, gelet op de aanwezige habitat, gebruikt kunnen worden door in de omgeving verblijvende vleermuizen om te foerageren. De plannen zullen echter geen aantasting van belangrijk foerageerhabitat vormen. Door de voorgenomen ingreep zal het aanbod van foerageermogelijkheden niet in het geding komen. In de directe omgeving is meer geschikt foerageerhabitat voor vleermuizen aanwezig in de vorm van bomenrijen, vijvers en bosranden.

Vliegroutes

Vleermuizen maken veelal gebruik van lijnvormige (donkere) landschapselementen zoals houtsingels, beken en lanen om zich te verplaatsen tussen verblijfsplaatsen en foerageergebieden. Op de projectlocatie zelf staan geen bomenrijen. De bomenrijen langs de openbare weg en de erven van de naastgelegen bedrijven worden door de voorgenomen plannen niet gehinderd of beschadigd. Er worden geen potentiële vliegroutes verstoord.

Vogels

Tijdens het bezoek is met name gelet op de aanwezigheid van nesten en rustplaatsen voor vogels.

Er zijn broedvogels waarvan de nesten ook beschermd zijn op het moment dat ze niet voor de voortplanting in gebruik zijn. Binnen het agrarische (buiten)gebied kunnen dit zijn: boomvalk, buizerd, havik, sperwer, wespandief, huismus, steenuil, kerkuil, boerenzwaluw, huiszwaluw, bosuil, ransuil en torenvalk.

Boomvalk

De boomvalk is een soort die geen eigen nest maakt, maar broedt in gebruikte kraaien- en/of eksternesten in verschillende typen bos(randen) of in solitaire bomen, populierensingels, of op erven. De soort komt vooral voor in open en halfopen landschappen zoals boerenland en dorpen, alsook in buitenwijken van steden. De bomen op- en nabij de projectlocatie zijn gecontroleerd op dergelijke nesten, deze zijn niet aangetroffen. Evenmin worden er met de beoogde werkzaamheden bomen verwijderd. Negatieve effecten op de boomvalk als gevolg van de werkzaamheden zijn derhalve niet aan de orde.

Buizerd en havik

De buizerd en havik broeden op grote nesten van ongeveer een meter in doorsnede en 60 centimeter diep. Dergelijke nesten zijn tijdens het veldbezoek niet waargenomen. Een broedgeval van de buizerd en havik is daarom uit te sluiten. Eveneens worden er met de beoogde werkzaamheden geen bomen gekapt, zodat het wegnemen van een jaarrond beschermd nest kan worden uitgesloten.

Wespendief en sperwer

De wespendif is doorgaans gebonden aan grotere bosgebieden van zowel loof- als naaldbomen. Bij voorkeur is er afwisseling binnen het bosgebied aanwezig in de vorm van open plekken. De sperwer broedt bij voorkeur meer verborgen in naaldbomen. Beide situaties zijn op de onderzoekslocatie niet aanwezig. Gezien de ligging van de onderzoekslocatie binnen agrarisch gebied en de afwezigheid van voldoende dekking is een nestplaats van de sperwer of wespendif niet te verwachten. Eveneens zijn er tijdens het veldbezoek geen nesten aangetroffen. Een broedgeval van zowel de wespendif als de sperwer zijn uitgesloten.

Steenuil en kerkuil

De kerkuil en steenuil hebben een voorkeur voor cultuurlandschappen met allerlei landschapselementen die voor afwisseling zorgen. Beide soorten broeden in gebouwen en gebruiken ook graag speciale nestkasten. Daarnaast worden door de steenuil ook wel boomholten gebruikt, mits er zich grote holten in bevinden. De gebouwen zijn in zijn geheel gecontroleerd op de aanwezigheid van steen- en kerkuilen en is vooral gelet op de aanwezigheid van sporen; braakballen, veren en uitwerpselen. Er zijn geen (sporen van) steen- en kerkuilen waargenomen. Er is geen sprake van een afname van belangrijk foerageergebied. Er blijft er voldoende foerageergebied aanwezig in de omgeving.

Huismus

Ook voor de huismus, die veel te vinden is in agrarisch gebied en vooral gebonden aan gebouwen is, is het nest jaarrond beschermd. Het habitat van een huismus moet bestaan uit een combinatie van:

- plekken voor nestgelegenheid
- jaarrond beschikbaar zijn van voedsel (voor volwassen en jongen)
- dekking (stekelige struiken, groenblijvende struiken en klimplanten, coniferen, klimop)
- plekken voor stofbaden
- drinkwater

Ontbreekt een van de onderdelen of liggen ze te ver van elkaar verwijderd, dan is de habitat niet geschikt.

Er zijn geen nesten van huismussen gevonden in de te slopen bebouwing. Ook zijn er geen huismussen gezien of gehoord op de projectlocatie. Wel zijn er huismussen gehoord bij de rundveehouderijen verderop in de straat.

Boerenzwaluw en huiszwaluw

Zowel de boerenzwaluw als de huiszwaluw zijn te vinden rond boerenerven. Beide soorten maken een moddernest. Echter bouwt de boerenzwaluw zijn nest bij voorkeur in een schuur terwijl een huiszwaluw zijn nest aan de buitenkant van een gebouw maakt en helemaal dicht metselt. Ook zijn beide soorten heel sociaal. Huiszwaluwen broeden vaak in kolonies van grote aantallen nesten. Boerenzwaluwen zoeken hun soortgenoten ook op, maar wonen met enkele paren bij elkaar.

De te slopen bedrijfsgebouwen zijn in het verleden wel gebruikt door boerenzwaluwen. Dit jaar hebben er geen paartjes gebroed op het bedrijf.

Een huiszwaluw bouwt zijn nest vaak onder witte overstekken. De te slopen stallen zijn niet voorzien van een overstek. Daarnaast vallen deze nesten erg op. Er zijn geen zwaluwnesten aangetroffen tijdens het veldonderzoek.

Bosuil en ransuil

De bosuil is de meest voorkomende uilensoort in Europa. Maar omdat hij vooral 's nachts leeft, wordt hij niet altijd opgemerkt. Ze leven in veel verschillende biotopen: loof- en naaldbossen, stadsparken en groene woonwijken. Dat komt omdat ze flexibel in prooikeuze zijn. De bosuil broedt overwegend in boomholtes van (oude) bomen. Er moet het hele jaar voldoende voedsel beschikbaar en bereikbaar zijn. Daarnaast zijn voldoende roest- en broedplaatsen belangrijk. Ook de ransuil komt in veel verschillende leefgebieden voor en broedt in bomen. Echter gebruikt een ransuil vaak geen holtes, maar oude kraaien- of ekstemesten. Omdat een ransuil in open velden/plekken en langs wegbermen jaagt, komen ze niet veel voor in dicht beboste gebieden.

Er worden met de voorgenomen werkzaamheden geen bomen gekapt. Het beschadigen van nesten is dus uitgesloten. Aangezien het nieuwe bebouwde oppervlak vele malen kleiner is dan in de huidige situatie, zal het jaaggebied in areaal toenemen. Een negatief effect van het plan op de bosuil en ransuil is dus uit te sluiten.

Torenvalk

Een torenvalk bouwt zelf geen nest. Ze gebruiken oude kraaiennesten of speciale torenvalkkasten. Een torenvalk jaagt in open of halfopen landschappen. In een landschap met veel (kort) grasland, heide, hoogvenen, duinen en akkers is voor hen het voedsel goed te vinden. Al biddend in de lucht jaagt hij op prooiën op de grond. Op het menu staan vooral woelmuizen maar ook zangvogels en kuikens van weidevogels.

Er worden met de voorgenomen werkzaamheden geen bomen gekapt. Het beschadigen van nesten is dus uitgesloten. Aangezien het nieuwe bebouwde oppervlak vele malen kleiner is dan in de huidige situatie, zal het jaaggebied in areaal toenemen. Een negatief effect van het plan op de torenvalk is dus uit te sluiten.

Overige broedvogels

De beplanting op de onderzoekslocatie kan nestgelegenheid bieden aan broedvogelsoorten zoals de merel en winterkoning. De nesten van deze soorten zijn alleen beschermd op het moment dat ze als zodanig in gebruik zijn. Er zijn geen nesten van overige broedvogels aangetroffen in de te slopen bebouwing.

Er zijn vogels gezien en gehoord, namelijk:

• Tabel 1: overzicht waargenomen vogels

Soort
Huismussen rundvee houderij overkant
Houtduiven
Koolmees
Merel

• Tabel 2: overzicht waargenomen vogelnesten

Soort
Oude nesten Boerenwaluw (categorie indeling nestbescherming: 5)

Uitleg bij tabel:

Categorie 1:	Jaarrond gebruikte nesten (steenuil)
Categorie 2:	Zeer honkvaste koloniebroeders of afhankelijk bebouwing
Categorie 3:	Zeer honkvaste broeders of afhankelijk bebouwing (geen kolonie)
Categorie 4:	Vogels die ieder jaar terugkeren naar specifiek nest
Categorie 5:	Honkvaste broeders, maar voldoende flexibel

Reptielen, amfibieën en vissen

Er zijn tijdens het terreinbezoek geen reptielen, amfibieën en/of vissen waargenomen.

Voor de in Nederland voorkomende reptielsoorten zoals de hazelworm, de levendbarende hagedis en ringslang biedt de onderzoekslocatie geen geschikt habitat. Deze soorten worden vrijwel alleen aangetroffen in specifieke natuurgebieden zoals het heidegebied ten noorden van de projectlocatie. De projectlocatie zelf is veel te open voor reptielen. Hierdoor zijn deze soorten veel te kwetsbaar voor predatoren.

Dit geldt ook voor de specifieke beschermende amfibieënsoorten die veel eisen stellen aan zijn habitat; alpenwatersalamander, heikikker, vinpootsalamander, poelkikker en rugstreeppad. Deze zijn allen uit te sluiten omdat de betreffende locatie geen goed habitat biedt voor deze soorten door het ontbreken van voldoende oppervlaktewater.

De onderzoekslocatie vormt wel een geschikt habitat voor algemene amfibieënsoorten als de bruine kikker en de gewone pad. Op de onderzoekslocatie kunnen deze soorten beschutting vinden tussen de begroeiing en onder takken- of stenenhopen. Voor algemene amfibieënsoorten geldt in het kader van de Omgevingswet een vrijstelling, zodat een ontheffing bij verstoring niet noodzakelijk is. Het is echter wel zaak om aandacht te schenken aan de zorgplicht.

Vissen

Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater op de onderzoekslocatie kan deze soortgroep buiten beschouwing worden gelaten.

Overige

Van de overige soortgroepen, zoals dagvlinders, insecten en libellen, kan worden aangenomen dat deze soorten gedurende het jaar in het plangebied aanwezig kunnen zijn of dit gebied in de migratieroute hebben liggen.

Afhankelijk van het seizoen zijn mogelijk algemene soorten te vinden op/of binnen de planlocatie. Specifieke beschermende soorten zijn voornamelijk afhankelijk van specifieke terreinkenmerken met specifieke biotopen. Binnen het plangebied is een dergelijk biotoop niet aanwezig.

2.3 Effecten van de ingreep

De effecten op beschermde soorten zijn onderzocht op basis van het voornemen binnen het plangebied.

Flora algemeen

Er is geen bijzondere flora aangetroffen binnen het plangebied, negatieve effecten zijn uitgesloten.

Grondgebonden zoogdieren

Verstoring van algemene zoogdieren vindt mogelijk plaats. De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor een aantal soorten grondgebonden zoogdieren. Het gaat daarbij om algemene soorten als de egel, konijn en diverse muissoorten. De verblijfplaatsen van deze soorten worden door de voorgenomen ingreep echter niet aangetast. Verblijfplaatsen van beschermde zoogdiersoorten zijn ter plaatse niet aangetroffen.

Vleermuizen

Er zijn geen sporen van vleermuizen aangetroffen waaruit blijkt dat de gebouwen als verblijfplaats worden gebruikt. Nader onderzoek in het kader van de soortenbescherming is niet noodzakelijk.

Vogels

Door de voorgenomen ingreep worden geen vogels en jaarrond beschermde nesten aangetast.

Reptielen, amfibieën en vissen

Er zijn geen reptielen, amfibieën en/of vissen waargenomen. De instandhoudingsdoelstellingen komen niet in het gedrang.

Overige

Omdat er geen geschikt biotoop is waargenomen voor overige beschermde soorten, zijn negatieve effecten uitgesloten. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

3

Conclusie en aanbevelingen

Het natuuronderzoek is gebaseerd op inventarisatiegegevens van derden, literatuuronderzoek en een verkennend veldbezoek aan het plangebied. Het beeld dat uit het onderzoek naar voren is gekomen vormt voldoende basis om gefundeerd uitspraken te doen over de gevolgen van de voorgenomen werkzaamheden voor beschermde soorten en gebieden.

3.1 Conclusie

Voor de bepaling van de effecten en voor de beantwoording van de vraag of men in strijd komt met de Omgevingswet, wordt de relatie gelegd tussen het initiatief met deze wet door waar mogelijk antwoord te geven op de volgende vragen:

1. *Welke wettelijk beschermde soorten komen in het plangebied voor? Welke status hebben deze soorten?*
2. *Welke invloed heeft de geplande ingreep in het betreffende gebied op de beschermde soorten en de staat van instandhouding?*
3. *Hoe dient omgegaan te worden met eventuele negatieve effecten van het plan op wettelijk beschermde planten- en diersoorten, en welke vervolgstappen zijn nodig?*

Het voornemen zoals opgenomen in de inleiding en de daarbij behorende werkzaamheden, zal naar verwachting geen negatief effect hebben op de staat van instandhouding van beschermde soorten. Binnen het plangebied zijn geen (verblijfplaatsen van) strikt beschermde soorten aangetroffen die door de werkzaamheden worden beïnvloed.

Uit de effectenbeschrijving blijkt dat er geen onevenredige directe of indirecte gevolgen zijn van de voorgenomen activiteiten op de voortplanting en instandhouding van beschermde dieren/of plantsoorten. Lokaal zullen mogelijk algemene soorten uit het plangebied trekken op zoek naar een vervangende biotoop. Alle sloopwerkzaamheden dienen bij voorkeur verricht te worden buiten het broedseizoen (15 maart t/m 15 juli).


Voor aanvang van de werkzaamheden dient derhalve geen aanvullend onderzoek plaats te vinden. Een ontheffing met betrekking tot aantasting van beschermde soorten is niet nodig. De werkzaamheden kunnen leiden tot een beschadiging of vernietiging van mogelijke verblijfplaatsen en/of verstoring van eventueel aanwezige algemene soorten. Een algehele vrijstelling op basis van de Verordening natuurbescherming voor ruimtelijke ontwikkelingen is hierop van toepassing. De specifieke zorgplicht (artikel 11.27 Bal) blijft onverminderd van toepassing.



Literatuur

- Broekhuizen, S., Hoekstra, B., Laar, van, V., Smeenk, C. & Thissen, J.B.M., 1992
Atlas van de Nederlandse zoogdieren. Stichting uitgeverij van de KNNV, Utrecht.
- Europese Gemeenschappen,
Richtlijn no 92/409 inzake het behoud van de vogelstand. Brussel, 1979.
- Europese Gemeenschappen,
Richtlijn no 92/43 inzake instandhouding van de natuurlijke habitat en de wilde flora en fauna. Brussel, 1992.
- Provinciale Verordening (Wet) natuurbescherming
- Hollander, H., & Geest, van der, P., 1994.
Rode-Lijst van bedreigde zoogdieren in Nederland.
Red data book of threatened mammals in the Netherlands. Vereniging voor Zoogkunde en Zoogdierbescherming, Utrecht.
- Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Ministerie van Volkshuisvesting.
Ruimtelijke Ordening en milieu, 2004. Nota Ruimte.
- De Nederlandse libellen, Nederlandse Fauna, deel 4
Nationaal historisch museum, KNNV uitgeverij (2002)
- Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ)
- Vleermuizen en planologie, Zoogdierverseniging (2010)
- Omgevingswet

- www.waarneming.nl
- www.synbiosys.alterra.nl
- www.atlasleefomgeving.nl
- www.ravon.nl
- www.sovon.nl
- www.google.nl
- www.floron.nl
- www.ruimtelijkeplannen.nl
- www.natura2000.nl
- www.ecologica.eu



Wintelre e.o. Nederland

[Details](#)
[Waarnemingen](#)
[Foto's](#)
[Geluiden](#)
[Soorten gezien](#)
[Ranglijst waarnemers](#)
[Projecten](#)
[Projectbezoeken](#)

2023-08-17 - 2024-08-16

Zoek: ☐ Toon geavanceerd

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2024-08-15 15:30	▲ Kleine Plevier - <i>Charadrius dubius</i>	1	Wintelre e.o.	Robbert van Hiele	
2024-08-14 11:45	■ Aziatische Hoornaar - <i>Vespa velutina</i>	1	Wintelre e.o.	Nori van Dongen	
2024-08-13 13:34	● Tangpantserjuffer - <i>Lestes dryas</i>	1 ♀ imago, gezien	Wintelre e.o.	Wim Deebe	
2024-08-12 19:38	■ Aziatische Hoornaar - <i>Vespa velutina</i>	1 imago, dood	Wintelre e.o.	Externe bron	
2024-08-10 14:13	▲ Schorsmarpissa - <i>Marpissa muscosa</i>	1	Wintelre e.o.	Wilbert van Gerwen	
2024-08-09 16:22	■ Loos blaasjeskruid - <i>Utricularia australis</i>	1	Wintelre e.o.	gerdie	
2024-08-08 14:01	▲ Wapendrager - <i>Phalera bucephala</i>	1 rups	Wintelre e.o.	elleke59	
2024-08-03 15:32	▲ Bleekgele droogbloem - <i>Gnaphalium luteoalbum</i>	1	Wintelre e.o.	Johan de Gooijer	
2024-08-03 15:40	■ Liggend hertshooi - <i>Hypericum humifusum</i>	1	Wintelre e.o.	Johan de Gooijer	
2024-08-03 15:35	▲ Tijmereprijs - <i>Veronica serpyllifolia</i>	1	Wintelre e.o.	Johan de Gooijer	
2024-07-31 13:14	▲ Ooievaar - <i>Ciconia ciconia</i>	4 foeragerend, gezien	Wintelre e.o.	Jan Kolsters	
2024-07-31 13:05	▲ Watersnuffel - <i>Enallagma cyathigerum</i>	1 ♀ gezien	Oirschotse Heide	Jan Kolsters	
2024-07-31 13:04	▲ Wilde cichorei - <i>Cichorium intybus</i>	1	Wintelre e.o.	Jan Kolsters	
2024-07-29 18:43	■ Aziatische Hoornaar - <i>Vespa velutina</i>	1 imago, nest, handvangst en in collectie	Wintelre e.o.	Externe bron	
2024-07-26 17:31	▲ Blinde bij - <i>Eristalis tenax</i> 🐝	1 imago, gezien	Wintelre e.o.	Ron Schippers	
2024-07-26 11:56	▲ Gewone zandmuur - <i>Arenaria serpyllifolia</i>	1	Wintelre e.o.	Bart de Knecht	
2024-07-25 09:38	▲ Grauwe Gans - <i>Anser anser</i>	7 overvliegend, gezien	Wintelre e.o.	W. Smets	
2024-07-24 15:43	▲ Graphomya maculata	1 imago	Wintelre e.o.	Joachim	
2024-07-23 08:41	▲ Grauwe Gans - <i>Anser anser</i>	36 foeragerend, gezien	Wintelre e.o.	W. Smets	
2024-07-23 08:43	▲ Nijlgans - <i>Alopochen aegyptiaca</i>	6 foeragerend, gezien	Wintelre e.o.	W. Smets	
2024-07-21 15:23	▲ Gewone heispanner - <i>Ematurga atomaria</i>	1 imago	Wintelre e.o.	Ron Schippers	
2024-07-21 15:53	▲ Grasbij - <i>Andrena flavipes</i>	1 imago	Wintelre e.o.	Ron Schippers	
2024-07-21 16:01	▲ Wormkruidbij-complex - <i>Colletes daviesanus/fodiens/similis</i> 🐝	1	Wintelre e.o.	Ron Schippers	
2024-07-21 15:25	▲ Pluimvoetbij - <i>Dasypoda hirtipes</i>	1 imago	Wintelre e.o.	Ron Schippers	
2024-07-21 15:27	■ Grijze glasvleugelwants - <i>Stictopleurus punctatonevrosus</i>	1 imago	Wintelre e.o.	Ron Schippers	

2024-07-21 15:51	 Tweedoor-smallijf - <i>Stenodema calcarata</i>	1 imago	Wintelre e.o.	Ron Schippers	   
2024-07-20 16:50	 Wormkruiddij-complex - <i>Colletes daviesanus/fodiens/similis</i> 	1 imago, gezien	Wintelre e.o.	Ron Schippers	 
2024-07-20 15:58	 Vierbandgroefbij - <i>Halictus quadricinctus</i> 	1	Wintelre e.o.	Ron Schippers	 
2024-07-20 16:36	 Gewone slobkousbij - <i>Macropis europaea</i>	5 imago, gezien	Wintelre e.o.	Ron Schippers	 
2024-07-20 09:13	 Roodpootschildwants - <i>Pentatoma rufipes</i>	1 imago	Wintelre e.o.	Pauline	   
2024-07-18 15:56	 Hommelbijvlieg - <i>Eristalis intricaria</i>	1 imago	Wintelre e.o.	Mark Kapteijns	 
2024-07-18 19:19	 <i>Ectophasia crassipennis</i>	1 imago	Wintelre e.o.	Ron Schippers	 
2024-07-18 19:01	 Miersikkelwants - <i>Himacerus mirmicoides</i>	1 larve/nimf	Wintelre e.o.	Ron Schippers	   
2024-07-17 13:46	 <i>Aphrophora pectoralis</i>	1 imago	Wintelre e.o.	Brent Hoogervorst	 
2024-07-14 19:10	 Roodborsttapuit - <i>Saxicola rubicola</i>	1	Wintelre e.o.	Ineke	 
2024-07-14 19:11	 Witte kwikstaart - <i>Motacilla alba</i>	1	Wintelre e.o.	Ineke	  
2024-07-14 19:10	 Kneu - <i>Linaria cannabina</i>	1	Wintelre e.o.	Ineke	  
2024-07-14 11:44	 Gewoon jakobskruid - <i>Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris</i>	1	Wintelre e.o.	kaatje	   
2024-07-07 19:18	 Gewone roofvlieg - <i>Tolmerus atricapillus</i>	1 imago	Wintelre e.o.	Hein Vermin	 
2024-07-06 17:21	 Gierzwaluw - <i>Apus apus</i>	8 foeragerend	Wintelre e.o.	Rolf Veenhuizen	 
2024-07-06 17:20	 Gierzwaluw - <i>Apus apus</i>	1 foeragerend	Wintelre e.o.	Rolf Veenhuizen	 
2024-07-06 17:20	 Holenduif - <i>Columba oenas</i>	30 foeragerend	Wintelre e.o.	Rolf Veenhuizen	 
2024-07-06 17:20	 Houtduif - <i>Columba palumbus</i>	30 foeragerend	Wintelre e.o.	Rolf Veenhuizen	 
2024-07-06 10:58	 Houtduif - <i>Columba palumbus</i>	1 pleisterend	Wintelre e.o.	Rolf Veenhuizen	 
2024-07-06 10:51	 Houtduif - <i>Columba palumbus</i>	2 foeragerend	Wintelre e.o.	Rolf Veenhuizen	 
2024-07-06 10:57	 Kokmeeuw - <i>Chroicocephalus ridibundus</i>	40 foeragerend	Wintelre e.o.	Rolf Veenhuizen	 
2024-07-06 10:57	 Kleine Mantelmeeuw - <i>Larus fuscus</i>	2 overvliegend	Wintelre e.o.	Rolf Veenhuizen	 
2024-07-06 10:46	 Blauwe Reiger - <i>Ardea cinerea</i>	1 opvliegend	Wintelre e.o.	Rolf Veenhuizen	 
2024-07-06 17:20	 Zwarte Kraai - <i>Corvus corone</i>	4 foeragerend	Wintelre e.o.	Rolf Veenhuizen	 
2024-07-06 10:56	 Veldleeuwerik - <i>Alauda arvensis</i>	1 baltsend / zingend	Wintelre e.o.	Rolf Veenhuizen	 

2024-07-06 17:25	▲ Oeverwaluw - <i>Riparia riparia</i>	12 foeragerend	Wintelre e.o.	Rolf Veenhuizen	■	⋮
2024-07-06 10:54	▲ Boerenwaluw - <i>Hirundo rustica</i>	1 foeragerend	Wintelre e.o.	Rolf Veenhuizen	■	⋮
2024-07-06 17:21	▲ Huizwaluw - <i>Delichon urbicum</i>	1 foeragerend	Wintelre e.o.	Rolf Veenhuizen	■	⋮
2024-07-06 10:56	▲ Tjiftjaf - <i>Phylloscopus collybita</i>	1 baltsend / zingend	Wintelre e.o.	Rolf Veenhuizen	👤	⋮
2024-07-06 10:56	▲ Merel - <i>Turdus merula</i>	1 ♂ baltsend / zingend	Wintelre e.o.	Rolf Veenhuizen	👤	⋮
2024-07-06 17:23	▲ Gele Kwikstaart - <i>Motacilla flava</i>	2 roepend	Wintelre e.o.	Rolf Veenhuizen	■ 📷	⋮
2024-07-06 10:54	▲ Witte Kwikstaart - <i>Motacilla alba</i>	1 foeragerend	Wintelre e.o.	Rolf Veenhuizen	■	⋮
2024-07-06 10:56	▲ Vink - <i>Fringilla coelebs</i>	1 roepend	Wintelre e.o.	Rolf Veenhuizen	👤	⋮
2024-07-06 10:43	▲ Putter - <i>Carduelis carduelis</i>	2 baltsend / zingend	Wintelre e.o.	Rolf Veenhuizen	■	⋮
2024-07-06 17:20	▲ Geelgors - <i>Emberiza citrinella</i>	1 ♂ baltsend / zingend	Wintelre e.o.	Rolf Veenhuizen	👤	⋮
2024-07-06 10:51	▲ Geelgors - <i>Emberiza citrinella</i>	2 ♂ baltsend / zingend	Wintelre e.o.	Rolf Veenhuizen	👤	⋮
2024-07-06 10:48	▲ Geelgors - <i>Emberiza citrinella</i>	1 ♂ baltsend / zingend	Wintelre e.o.	Rolf Veenhuizen	👤	⋮
2024-07-06 10:48	■ Rugstreeppad - <i>Epidalea calamita</i>	2 subadult	Wintelre e.o.	Rolf Veenhuizen	✅ 📷 🗨	⋮
2024-07-06 10:44	▲ Degpauwoog - <i>Aglais io</i>	1 imago	Wintelre e.o.	Rolf Veenhuizen	👤	⋮
2024-07-06 10:44	▲ Hooibeestje - <i>Coenonympha pamphilus</i>	1 imago	Wintelre e.o.	Rolf Veenhuizen	👤	⋮
2024-07-06 01:16	▲ Grijze stipspanner - <i>Idaea aversata</i>	1 imago, op licht, lichtval	Wintelre e.o.	geert sanders	✅ 📷	⋮
2024-07-06 01:02	▲ Grijze stipspanner - <i>Idaea aversata</i>	1 imago, op licht, lichtval	Wintelre e.o.	geert sanders	✅ 📷	⋮
2024-07-06 00:56	▲ Dwergstipspanner - <i>Idaea fuscovenosa</i>	1 imago, op licht, lichtval	Wintelre e.o.	geert sanders	■ 📷	⋮
2024-07-06 01:13	▲ V-dwergspanner - <i>Chloroclystis v-ata</i>	1 imago, op licht, lichtval	Wintelre e.o.	geert sanders	👤 📷	⋮
2024-07-06 01:10	▲ V-dwergspanner - <i>Chloroclystis v-ata</i>	1 imago, op licht, lichtval	Wintelre e.o.	geert sanders	👤 📷	⋮
2024-07-06 00:55	▲ V-dwergspanner - <i>Chloroclystis v-ata</i>	1 imago, op licht, lichtval	Wintelre e.o.	geert sanders	👤 📷	⋮
2024-07-06 01:13	▲ Gerande spanner - <i>Lomasipis marginata</i>	1 imago, op licht, lichtval	Wintelre e.o.	geert sanders	👤 📷	⋮
2024-07-06 01:20	■ Gehakkelde spanner - <i>Ennomos erosaria</i>	1 imago, op licht, lichtval	Wintelre e.o.	geert sanders	■ 📷	⋮
2024-07-06 01:03	■ Gehakkelde spanner - <i>Ennomos erosaria</i>	1 imago, op licht, lichtval	Wintelre e.o.	geert sanders	■ 📷	⋮
2024-07-06 01:09	▲ Peper-en-zoutvlinder - <i>Biston betularia</i>	1 imago, op licht, lichtval	Wintelre e.o.	geert sanders	👤 📷	⋮

2024-07-06 00:58	▲ Gewone spikkelspanner - <i>Ectropis crepuscularia</i>	1 imago, op licht, lichtval	Wintelre e.o.	geert sanders	 	
2024-07-06 01:01	▲ Witte schaduwspanner - <i>Lomographa lemerata</i>	1 imago, op licht, lichtval	Wintelre e.o.	geert sanders	 	
2024-07-06 01:05	■ Wiltlijntandvlinder - <i>Drymonia querna</i>	1 imago, op licht, lichtval	Wintelre e.o.	geert sanders	 	
2024-07-06 01:03	■ Gepluimde snuituil - <i>Pechipogo plumigeralis</i>	1 imago, op licht, lichtval	Wintelre e.o.	geert sanders	 	
2024-07-06 01:10	▲ Gewone worteluil - <i>Agrotis exclamationis</i>	1 imago, op licht, lichtval	Wintelre e.o.	geert sanders	 	
2024-07-06 01:01	▲ Houtspaander - <i>Axyia putris</i>	1 imago, op licht, lichtval	Wintelre e.o.	geert sanders	 	
2024-07-06 01:09	▲ Haarbos - <i>Ochropleura plecta</i>	1 imago, op licht, lichtval	Wintelre e.o.	geert sanders	 	
2024-07-06 01:12	▲ Volgeling - <i>Noctua comes</i>	1 imago, op licht, lichtval	Wintelre e.o.	geert sanders	 	
2024-07-06 01:04	▲ Volgeling - <i>Noctua comes</i>	1 imago, op licht, lichtval	Wintelre e.o.	geert sanders	 	
2024-07-06 01:05	▲ Breedbandhuismoeder - <i>Noctua fimbriata</i>	1 imago, op licht, lichtval	Wintelre e.o.	geert sanders	 	
2024-07-06 00:55	■ Kleine huismoeder - <i>Noctua interjecta</i>	1 imago, op licht, lichtval	Wintelre e.o.	geert sanders	 	
2024-07-06 01:02	▲ Huismoeder - <i>Noctua pronuba</i>	1 imago, op licht, lichtval	Wintelre e.o.	geert sanders	 	
2024-07-06 00:55	▲ Huismoeder - <i>Noctua pronuba</i>	1 imago, op licht, lichtval	Wintelre e.o.	geert sanders	 	
2024-07-06 01:13	▲ Spurrie-uil - <i>Anarta trifolii</i>	1 imago, op licht, lichtval	Wintelre e.o.	geert sanders	 	
2024-07-06 01:11	■ Bleke grasworteluil - <i>Apamea lithoxyloea</i>	1 imago, op licht, lichtval	Wintelre e.o.	geert sanders	 	
2024-07-06 01:11	■ Bleke grasworteluil - <i>Apamea lithoxyloea</i>	1 imago	Wintelre e.o.	geert sanders	 	
2024-07-06 01:10	▲ Gewone stofuil - <i>Hoplodrina octogenaria</i>	1 imago, op licht, lichtval	Wintelre e.o.	geert sanders	 	
2024-07-06 01:01	▲ Gewone stofuil - <i>Hoplodrina octogenaria</i>	1 imago, op licht, lichtval	Wintelre e.o.	geert sanders	 	
2024-07-06 00:55	▲ Gewone stofuil - <i>Hoplodrina octogenaria</i>	1 imago, op licht, lichtval	Wintelre e.o.	geert sanders	 	
2024-07-06 01:10	▲ Gamma-uil - <i>Autographa gamma</i>	1 imago, op licht, lichtval	Wintelre e.o.	geert sanders	 	
2024-07-06 01:04	▲ Gamma-uil - <i>Autographa gamma</i>	1 imago, op licht, lichtval	Wintelre e.o.	geert sanders	 	
2024-07-06 01:21	▲ Halmrupsvlinder / Weidehalmuiltje - <i>Mesapamea secalis / secalella</i>	1 imago, op licht, lichtval	Wintelre e.o.	geert sanders	 	
2024-07-06 01:12	▲ Halmrupsvlinder / Weidehalmuiltje - <i>Mesapamea secalis / secalella</i>	1 imago, op licht, lichtval	Wintelre e.o.	geert sanders	 	
2024-07-06 01:03	▲ Vogelkersstippelmot - <i>Yponomeuta evonymella</i>	1 imago, op licht, lichtval	Wintelre e.o.	geert sanders	 	
2024-07-06 00:59	▲ Vogelkersstippelmot - <i>Yponomeuta evonymella</i>	1 imago, op licht, lichtval	Wintelre e.o.	geert sanders	 	

2024-07-06 01:01	▲ Bruine huismot - <i>Hofmannophila pseudospretella</i>	1 imago, op licht, lichtval	Wintelre e.o.	geert sanders	📷 📷	⋮
2024-07-06 00:58	▲ Grote zwartwitmot - <i>Ethmia bipunctella</i>	1 imago, op licht, lichtval	Wintelre e.o.	geert sanders	📷 📷	⋮
2024-07-06 01:15	▲ Distelknoopvlekje - <i>Eucosma cana</i>	1 imago, op licht, lichtval	Wintelre e.o.	geert sanders	📷 📷	⋮
2024-07-06 01:04	▲ Distelknoopvlekje - <i>Eucosma cana</i>	1 imago, op licht, lichtval	Wintelre e.o.	geert sanders	📷 📷	⋮
2024-07-06 01:07	■ Bonte fruitbladroller - <i>Eudemis profundana</i>	1 imago, op licht, lichtval	Wintelre e.o.	geert sanders	📷 📷	⋮
2024-07-06 01:06	■ Bonte fruitbladroller - <i>Eudemis profundana</i>	1 imago, op licht, lichtval	Wintelre e.o.	geert sanders	📷 📷	⋮
2024-07-06 01:02	■ Bonte fruitbladroller - <i>Eudemis profundana</i>	1 imago, op licht, lichtval	Wintelre e.o.	geert sanders	📷 📷	⋮
2024-07-06 01:09	■ Stipjesbladroller - <i>Lozotaeniodes formosana</i>	1 imago, op licht, lichtval	Wintelre e.o.	geert sanders	✅ 📷	⋮
2024-07-06 01:13	▲ Rode knopbladroller - <i>Spilonota ocellana</i>	1 imago, op licht, lichtval	Wintelre e.o.	geert sanders	📷 📷	⋮
2024-07-06 00:57	■ Eikentopspinselmot - <i>Acrobasis consociella</i>	1 imago, op licht, lichtval	Wintelre e.o.	geert sanders	📷 📷	⋮
2024-07-06 01:13	▲ Gewone grasmot - <i>Chrysoteuchia culmella</i>	1 imago, op licht, lichtval	Wintelre e.o.	geert sanders	📷 📷	⋮
2024-07-06 00:58	▲ Gewone grasmot - <i>Chrysoteuchia culmella</i>	1 imago, op licht, lichtval	Wintelre e.o.	geert sanders	📷 📷	⋮
2024-07-06 01:16	▲ Egale vlakjesmot - <i>Catoptria pinella</i>	1 imago, op licht, lichtval	Wintelre e.o.	geert sanders	📷 📷	⋮
2024-07-06 01:15	▲ Egale vlakjesmot - <i>Catoptria pinella</i>	1 imago, op licht, lichtval	Wintelre e.o.	geert sanders	📷 📷	⋮
2024-07-06 01:00	▲ Egale vlakjesmot - <i>Catoptria pinella</i>	1 imago, op licht, lichtval	Wintelre e.o.	geert sanders	📷 📷	⋮
2024-07-06 01:01	■ Salielichtmot - <i>Anania verbascalis</i>	1 imago, op licht, lichtval	Wintelre e.o.	geert sanders	📷 📷	⋮
2024-07-06 01:18	▲ Buxusmot - <i>Cydalima perspectalis</i>	1 imago, op licht, lichtval	Wintelre e.o.	geert sanders	📷 📷	⋮
2024-07-06 00:58	▲ Gewone pendelvlieg - <i>Helophilus pendulus</i>	1 imago, op licht, lichtval	Wintelre e.o.	geert sanders	📷 📷	⋮
2024-07-06 10:43	▲ Zandblauwtje - <i>Jasione montana</i>	1 bloeiend	Wintelre e.o.	Rolf Veenhuizen	📷	⋮
2024-07-06 10:43	■ Echt duizendguldenkruid - <i>Centaureum erythraea</i>	1 bloeiend	Wintelre e.o.	Rolf Veenhuizen	📷	⋮
2024-07-05 17:50	▲ Ree - <i>Capreolus capreolus</i>	1	Wintelre e.o.	Sjors de Kort	📷	⋮
2024-07-05 23:11	▲ Halmrupsvlinder / Weidehalmuiltje - <i>Mesapamea secalis / secalella</i>	1 imago	Wintelre e.o.	geert sanders	📷 📷	⋮
2024-07-05 23:10	▲ Tuinbladroller - <i>Clepsis consimilana</i>	1	Wintelre e.o.	geert sanders	📷 📷	⋮
2024-07-05 23:08	▲ Gewone grasmot - <i>Chrysoteuchia culmella</i>	1 imago	Wintelre e.o.	geert sanders	📷 📷	⋮
2024-07-05 23:21	● Neushoornkever - <i>Oryctes nasicornis</i>	1 ♀ imago, gezien	Wintelre e.o.	geert sanders	📷 📷	⋮

2024-07-04	▲ Groenling - <i>Chloris chloris</i>	1 baltsend / zingend	Wintelre e.o.	Johan Jordaans	■	⋮
2024-07-02 10:31	▲ Grauwe Gans - <i>Anser anser</i>	30 foeragerend, gezien	Wintelre e.o.	W. Smets	📷 🗨 📄	⋮
2024-06-27 08:55	▲ Kleine Plevier - <i>Charadrius dubius</i>	6 opvliegend, gezien	Wintelre e.o.	W. Smets	✅ 📷 🗨 📄	⋮
2024-06-26 14:01	▲ Zwarte mosterd - <i>Brassica nigra</i>	1	Wintelre e.o.	Rob	■	⋮
2024-06-25 11:24	▲ Sint-jansvlinder - <i>Zygaena filipendulae</i>	1 imago	Wintelre e.o.	Brent Hoogervorst	✅ 📷 🗨	⋮
2024-06-25 11:43	▲ Schaakbordlieveheersbeestje - <i>Propylea quatuordecimpunctata</i>	1 larve/nimf	Wintelre e.o.	Brent Hoogervorst	✅ 📷 🗨	⋮
2024-06-25 11:53	■ Behaarde schaduwwants - <i>Lygus rugulipennis</i>	1	Wintelre e.o.	Brent Hoogervorst	■ 📷	⋮
2024-06-24	■ Kwartel - <i>Coturnix coturnix</i>	1	Wintelre e.o.	Ineke	■ 🗨	⋮
2024-06-24 19:32	▲ Roodborst - <i>Erithacus rubecula</i>	1	Wintelre e.o.	Ineke	✅ 📷	⋮
2024-06-24 19:34	▲ Gele Kwikstaart - <i>Motacilla flava</i>	1	Wintelre e.o.	Ineke	✅ 📷	⋮
2024-06-24 19:47	▲ Witte Kwikstaart - <i>Motacilla alba</i>	1	Wintelre e.o.	Ineke	📷 📷	⋮
2024-06-24 19:20	▲ Vink - <i>Fringilla coelebs</i>	1	Wintelre e.o.	Ineke	📷 📷	⋮
2024-06-24 19:08	▲ Geelgors - <i>Emberiza citrinella</i>	1	Wintelre e.o.	Ineke	✅ 📷	⋮
2024-06-23 16:36	■ Rugstreeppad - <i>Epidalea calamita</i>	1	Wintelre e.o.	Els v.d Steen	■ 📷	
2024-06-23 16:41	● Hertshooilangsprietmot - <i>Adela violella</i>	1 imago	Wintelre e.o.	Els v.d Steen	■ 📷	
2024-06-23 16:44	▲ Kool-langpootmug - <i>Tipula oleracea</i> 🐛	1	Wintelre e.o.	Els v.d Steen	■ 📷	
2024-06-23 16:46	▲ Bloedcicade - <i>Cercopis vulnerata</i>	1 imago	Wintelre e.o.	Els v.d Steen	■ 📷	
2024-06-23 16:56	▲ Rode halsbandwants - <i>Derzeocoris ruber</i>	1 larve/nimf	Wintelre e.o.	Els v.d Steen	✅ 📷 🗨	
2024-06-23 16:36	▲ Gele kamille - <i>Anthemis tinctoria</i>	1	Wintelre e.o.	Jaap Bekker	■ 📷	⋮
2024-06-23 16:51	▲ Grijskruid - <i>Berteroa incana</i>	1	Wintelre e.o.	Els v.d Steen	📷 📷	
2024-06-23 16:45	▲ Zandblauwtje - <i>Jasione montana</i>	1	Wintelre e.o.	Jaap Bekker	📷 📷	⋮
2024-06-23 16:51	■ Gewone dophei - <i>Erica tetralix</i>	1	Wintelre e.o.	Jaap Bekker	📷 📷	⋮
2024-06-23 16:37	▲ Gewone rolklaver - <i>Lotus corniculatus</i>	1	Wintelre e.o.	Jaap Bekker	■ 📷	⋮
2024-06-23 16:33	▲ Basterdklaver - <i>Trifolium hybridum</i>	1	Wintelre e.o.	Jaap Bekker	■ 📷	⋮
2024-06-23 16:49	▲ Vogelwikke - <i>Vicia cracca</i>	1	Wintelre e.o.	Jaap Bekker	■ 📷	⋮

2

Bijlage

Effecten indicator soorten



Beschermde natuur in Nederland: soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Effectenindicator soorten

Maatregelenindicator soorten

Routeplanner beschermde natuur

Effectenindicator Natura2000-gebieden

Effectenindicator soorten

1 Locatie


2 Activiteiten

3 Indicatie

Zoek en selecteer een locatie op postcode, of zoom in op de kaart en teken de grenzen van het plangebied: zet punten en sluit af met een dubbel-klik.

Postcode

5513 NR



1 Locatie

2 Activiteiten

3 Indicatie

Geef aan voor welke [OLO-activiteit\(en\)](#) u een indicatie van effecten wilt ontvangen.

Top-10 activiteiten

[Alle activiteiten](#)

- ☒ Slopen en/of asbest verwijderen
- ☒ Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
- ☐ Bijbehorend bouwwerk bouwen
- ☐ Kappen
- ☐ Overig bouwwerk bouwen
- ☐ Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
- ☐ Dakkapel plaatsen
- ☒ Woning bouwen
- ☐ Nieuw kozijn plaatsen of bestaand kozijn of gevelpaneel veranderen
- ☐ Uitrut aanleggen of veranderen

Toon effecten

Locatie: 5.3355/51.463 Oppervlakte: 299.8 ha

Disclaimer

- > De dekkinggraad van waarnemingen uit de NDFF per locatie wisselt sterk. Als er geen waarnemingen uit de NDFF zijn, kunnen er dus wél beschermde soorten voorkomen. Een gebruiker is zelf verantwoordelijk om (eventueel met hulp van de gemeente) te achterhalen of er daadwerkelijk beschermde soorten in het plangebied voorkomen.
- > Beschermde soorten die naar verwachting geen schadelijke effecten ondervinden, worden niet in de uitvoer getoond.
- > De informatie uit de effectenindicator soorten is generiek. Om vast te stellen of een activiteit in de praktijk daadwerkelijk schadelijk is, is meer specifieke informatie nodig over de betreffende activiteit, de werklocatie en over het voorkomen van beschermde soorten in en rond het plangebied.

Activiteiten

- [+ Slopen en/of asbest verwijderen](#)
- [+ Woning bouwen](#)
- [+ Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen \(Milieu\)](#)

Top 30 Wettelijk beschermde soorten

In het door u opgegeven plangebied komen de volgende soorten voor die het meest in het geding zijn bij ruimtelijke ingrepen en mogelijk schadelijke effecten ondervinden van de door u geselecteerde activiteit(en).

Amfibieën

- [+ Bruine kikker](#)
- [+ Gewone pad](#)

Overige Wettelijk beschermde soorten

In het door u opgegeven plangebied komen bovendien de volgende aantallen Wettelijk beschermde soorten per soortengroep voor volgens de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) die mogelijk schadelijke effecten ondervinden van de door u geselecteerde activiteit(en).

Soortgroepen

- [+ Vogels \(8\)](#)
- [+ Zoogdieren \(3\)](#)
- [+ Amfibieën en reptielen \(1\)](#)
- [+ Libellen en vlinders \(2\)](#)

3

Bijlage

Plan projectlocatie



mogelijke invulling van gronden en nieuwe landschappelijke inpassing

4

Bijlage

Rapport
(BeSI)

Beschermde

SoortenIndicator

Aanvraagdatum : 16-08-2024

Rapportnummer : 120072

Rapport Beschermde SoortenIndicator (BeSI)

Op 16-08-2024 heeft u de Beschermde SoortenIndicator (BeSI) geraadpleegd. Dit rapport geeft u inzicht in mogelijk nadelige effecten van uw werkzaamheid op beschermde plant- en diersoorten op de door u aangegeven locatie.


Werkzaamheid

De werkzaamheid die u heeft aangegeven uit te willen voeren is:

Nieuw gebouw bouwen

Locatie

De locatie waar u deze werkzaamheid uit wilt voeren, heeft u als volgt aangegeven:



Locatie : 151,817.53 /385,799.03

Oppervlakte : 8830 m²

De beschermde plant- en diersoorten die mogelijk nadelige effecten ondervinden van de uit te voeren werkzaamheid op de door u aangegeven locatie worden hieronder beschreven, inclusief een advies over hoe u met de soort rekening kunt houden. Bij iedere soort wordt vermeld of het een 1) vogel, 2) een zoogdier, 3) een andere diersoort dan vogel of zoogdier of 4) een plant is. Het BeSI-rapport heeft een signalerende functie. Informatie over de mogelijke vergunningsplicht van uw werkzaamheid krijgt u door de [Vergunningcheck](#) te doen. Dit rapport kunt u daarbij gebruiken om de vragen over natuur te beantwoorden.

In de bijlage van het rapport worden de genoemde soorten uitgesplitst naar beschermingsregels.

Aanvraagdatum : 16-08-2024

Rapportnummer : 120072

Rapport Beschermde SoortenIndicator (BeSI)

Antwoorden op vragen uit de Vergunningcheck

Welke beschermde dieren en/of planten kunnen aanwezig zijn op de locatie van uw werkzaamheid?

Vogels	Ja
Zoogdieren	Ja
Andere diersoorten dan vogels of zoogdieren	Ja
Planten	Nee

Zie de volgende pagina's voor meer informatie over de leefgebieden van deze wettelijk beschermde dieren en planten en een advies over hoe u met deze soorten rekening kunt houden.

Vogels

Kunnen er op de locatie van uw werkzaamheid vogels aanwezig zijn waarvan het nest het hele jaar beschermd is?	Ja
Kunnen er op de locatie van uw werkzaamheid vogels aanwezig zijn waarvan het nest alleen tijdens het broedseizoen beschermd is?	Nee

Lees altijd de adviezen van de mogelijk aanwezige vogelsoorten. Sommige provincies hebben voor bepaalde soorten uitzonderingen.

Zoogdieren

Kies alle zoogdieren die aanwezig kunnen zijn op de locatie van uw werkzaamheid.

Vleermuizen	Ja
Eekhoorns	Nee
Steenmarters	Nee
Andere marterachtige dan steenmarters	Ja
Andere zoogdieren	Ja

Aanvraagdatum : 16-08-2024

Rapportnummer : 120072

Rapport Beschermde SoortenIndicator (BeSI)

Soorten en adviezen

Vogels

Huismus

Beschrijving leefgebied:

De huismus komt meestal voor in de buurt van mensen en leeft dan vooral in struiken, het liefst met stekels die het hele jaar groen blijven, loofbomen en klimplanten. De huismus broedt in gebouwen, bijvoorbeeld onder dakpannen, en soms in klimop.

Advies voor deze soort:

Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de huismus is dat van maart tot half augustus (soms tot eind september). De huismus is zeer honkvast en is het hele jaar rondom het nest aanwezig. Daarom zijn de nesten jaarrond beschermd. Haal nesten nooit weg. Houd daarnaast bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van de huismus. Bijvoorbeeld door struiken of klimplanten rondom de nesten te laten staan. Raadpleeg voor meer informatie het kennisdocument over deze soort op de website van BIJ12.

Zoogdieren

Boombewonende vleermuizen

Beschrijving leefgebied:

Boombewonende vleermuizen leven in bossen, bosranden, lanen en parken. Ze verblijven daar in boomholtes, in scheuren in bomen en ruimten achter bast. Voorbeelden zijn de rosse vleermuis en de watervleermuis.

Advies voor deze soort:

De holtes en spleten waar boombewonende vleermuizen in leven zijn beschermd. Laat daarom in het leefgebied van boombewonende vleermuizen bomen staan. Hetzelfde geldt voor bossen, bosranden, lanen en parken omdat ze dienen als vliegroute en jachtterrein. Voorkom daarnaast het verlichten van de bomen en het leefgebied. Raadpleeg voor meer informatie over de rosse vleermuis en de watervleermuis de kennisdocumenten op de website van BIJ12.

Aanvraagdatum : 16-08-2024

Rapportnummer : 120072

Rapport Beschermde SoortenIndicator (BeSI)

Bunzing

Beschrijving leefgebied:

De bunzing leeft vooral in natte gebieden en boomgroepen. Ze houden minder van dichte bebossing en naaldbomen. Ook in dorpen en buitenwijken van steden komt de bunzing voor. Bunzingen zijn vooral 's nachts actief.

Advies voor deze soort:

Vermijd werkzaamheden in de kwetsbare periode. Voor de bunzing is dit de voortplantingsperiode die loopt van begin maart tot eind september. Zorg voor voldoende voedsel en plekken om zich te kunnen verstoppen, bijvoorbeeld door muizen niet te bestrijden en hopen snoeimateriaal achter te laten. Voer werkzaamheden stap voor stap uit zodat altijd in een deel van het leefgebied rust is. In Utrecht (vervalt 1/9/24), Limburg en Zuid-Holland geldt voor de bunzing een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Raadpleeg voor meer informatie het kennisdocument over deze soort op de website van BIJ12.

Gebouwbewonende vleermuizen

Beschrijving leefgebied:

Gebouwbewonende vleermuizen leven in alle typen landschappen. Deze vleermuizen verblijven in gebouwen, onder andere achter betimmering en daklijsten, in spouwmuren, of onder dakpannen.

Advies voor deze soort:

Spleten en openingen in gebouwen waarin vleermuizen leven, zijn beschermd. Voorkom het dichtmaken van invliegopeningen en holle ruimtes in muren en daken. Behoud bomenrijen, bosjes en water omdat ze dienen als vliegroute en jachtterrein. Voorkom het verlichten van gevels waarin invliegopeningen zitten. Voor meer info over de gewone en de ruige dwergvleermuis of de gewone grootoorvleermuis: zie de kennisdocumenten op de website van BIJ12 en check natuurvriendelijkisoleren.nl. Voor sommige vleermuissoorten staat hieronder meer info. Dit sluit het voorkomen van andere vleermuissoorten niet uit.

Aanvraagdatum : 16-08-2024

Rapportnummer : 120072

Rapport Beschermde SoortenIndicator (BeSI)

Gewone dwergvleermuis

Soort Leefgebied: kraamverblijfplaats in gebouw

Beschrijving leefgebied:

De gewone dwergvleermuis komt in de zomer in tuinen, parken en bossen voor. Overdag verblijven ze in gebouwen, vaak achter betimmering en daklijsten, in spouwmuren of onder dakpannen.

Advies voor deze soort:

Dit gebouw kan door de gewone dwergvleermuis worden gebruikt als kraamverblijfplaats. Behoud open water, bomenrijen en bosschages en voorkom verlichting in het leefgebied. Raadpleeg voor meer informatie over de gewone dwergvleermuis het kennisdocument op de website van BIJ12. Let op! Het gebouw kan door de gewone dwergvleermuis ook als andere functie dan kraamverblijfplaats worden gebruikt. Bovendien is niet uitgesloten dat er ook andere vleermuissoorten voorkomen in dit gebouw.

Haas

Beschrijving leefgebied:

De haas leeft vooral in gebieden waar de gras- en landbouw een beperkte omvang heeft en in open veld zoals akkers en weilanden. Daarnaast komt de haas ook voor in open bos, heide en kwelders.

Advies voor deze soort:

In alle provincies geldt voor de haas het hele jaar een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling, behalve in Zeeland en Groningen. In Utrecht vervalt de vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling op 1/9/24. Niettemin geldt de zorgplicht. Houd daarom bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van de haas, bijvoorbeeld door het aanleggen van hagen en houtwallen en door te zorgen voor kruidenrijk grasland waardoor de haas afwisselend kan eten.

Ree

Beschrijving leefgebied:

Het ree leeft vooral in bosachtige gebieden met open plekken en aangrenzende velden, maar ook in rietvelden, duinen en akkerbouwgebieden. Voorwaarden zijn dat er in de omgeving voldoende voedsel, dekking en rust aanwezig is.

Advies voor deze soort:

In alle provincies geldt voor het ree het hele jaar een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Niettemin geldt de zorgplicht. Houd bij werkzaamheden rekening met het leefgebied van het ree, bijvoorbeeld door te proberen reeën niet te verstoren waardoor verkeersslachtoffers kunnen vallen.

Aanvraagdatum : 16-08-2024

Rapportnummer : 120072

Rapport Beschermde SoortenIndicator (BeSI)

Ruige dwergvleermuis

Soort Leefgebied: paarverblijfplaats in gebouw

Beschrijving leefgebied:

De ruige dwergvleermuis kan overal voorkomen. Overdag verblijft de ruige dwergvleermuis in gebouwen achter betimmeringen, achter daklijsten, onder dakbedekking en op zolders. Ook komen ze voor in spleten en gaten in bomen.

Advies voor deze soort:

Dit gebouw kan door de ruige dwergvleermuis worden gebruikt als paarverblijfplaats. Behoud openingen in gebouwen en voorkom verlichting van het leefgebied. Raadpleeg voor meer informatie over de ruige dwergvleermuis het kennisdocument op de website van BIJ12.

Let op! Het gebouw kan door de ruige dwergvleermuis ook als andere functie dan paarverblijfplaats worden gebruikt. Bovendien is niet uitgesloten dat er ook andere vleermuissoorten voorkomen in dit gebouw.

Andere diersoorten dan vogels of zoogdieren

Bruine kikker

Beschrijving leefgebied:

De bruine kikker is een amfibie en leeft o.a. in sloten, poelen, vennen en tuin- en stadsvijvers. De soort leeft zowel in het water maar vaker nog op het land. De bruine kikker heeft een voorkeur voor water waar weinig of geen vis zit.

Advies voor deze soort:

In alle provincies geldt het hele jaar een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Niettemin geldt de zorgplicht; zorg daarom voor kleine oppervlaktewateren met weinig of geen vis zodat de larven van de bruine kikker niet worden opgegeten. Een deel van de dieren verblijft ook na de voortplanting in of bij het water. Laat daarom, ook in het kader van de zorgplicht, bij baggeren verwijderde modder en planten 24 uur op de oevers liggen zodat de bruine kikkers eruit kunnen kruipen.

Gewone pad

Beschrijving leefgebied:

De gewone pad is een amfibie en plant zich voort in poelen, vijvers, vennen, sloten en wettingen en zwak stromende beken. De gewone pad leeft buiten de voortplantingstijd (maart) vooral op het land.

Advies voor deze soort:

In alle provincies geldt het hele jaar een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Niettemin geldt de zorgplicht; zorg daarom voor poelen, vijvers en sloten waarin de gewone pad zich kan voortplanten. Voorkom sterfte op wegen door in de paartijd, als de padden trekken, schermen te plaatsen en/of wegen tijdelijk af te sluiten.

Aanvraagdatum : 16-08-2024

Rapportnummer : 120072

Rapport Beschermde SoortenIndicator (BeSI)

Kamsalamander

Beschrijving leefgebied:

De kamsalamander is een amfibie en leeft in en rond poelen met een goede waterkwaliteit. Vaak zijn er veel oever- en waterplanten aanwezig. Overdag zie je de kamsalamander zelden, dan schuilen ze tussen de planten op de oever of in het water.

Advies voor deze soort:

Vermijd werkzaamheden in het water in de voortplantingsperiode en werkzaamheden op het land buiten deze periode. Voor de kamsalamander betekent dit dat werkzaamheden in het water waarschijnlijk het beste kunnen worden uitgevoerd in de periode tussen oktober en januari en werkzaamheden op het land het beste tussen april en juli. Raadpleeg voor meer informatie het kennisdocument over deze soort op de website van BIJ12.

Kleine watersalamander

Beschrijving leefgebied:

De kleine watersalamander is een amfibie en leeft in poelen, vennen, sloten, en tuin- en stadsvijvers. De kleine watersalamander overwintert in vorstvrije en ruimten zoals muizenholen, tussen boomwortels en in spleten in muren of hout.

Advies voor deze soort:

In alle provincies geldt het hele jaar een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Niettemin geldt de zorgplicht; zorg voor water en oevers met veel planten om te kunnen schuilen en stenen en houtstronken om onder te overwinteren. Kleine watersalamanders verblijven vanaf maart tot in de zomermaanden in het water. Laat daarom, ook in het kader van de zorgplicht, bij baggeren de verwijderde modder en planten 24 uur op de oevers liggen zodat de kleine salamanders eruit kunnen kruipen.

Aanvraagdatum : 16-08-2024

Rapportnummer : 120072

Rapport Beschermde SoortenIndicator (BeSI)

Knoflookpad

Beschrijving leefgebied:

De knoflookpad is een amfibie en leeft in zandige omgevingen zoals open rivierduinen. De knoflookpad plant zich voort in het water van beek- en rivierdalen. Knoflookpadden zijn vooral 's nachts actief. Overdag graven ze zich in het zand in.

Advies voor deze soort:

Vermijd werkzaamheden in de voortplantingsperiode. Voor de knoflookpad betekent dit dat werkzaamheden in het water het beste kunnen worden uitgevoerd in de periode van 1 augustus tot aan het begin van de winter. Houd bij werkzaamheden op het land rekening met het behoud van het leefgebied van de knoflookpad. Bijvoorbeeld door te zorgen voor schoon water waarin de knoflookpad zich kan voortplanten. In de buurt van het water moet open zand liggen. Dit heeft de knoflookpad nodig om zich in te kunnen graven.

Rugstreeppad

Beschrijving leefgebied:

De rugstreeppad is een amfibie en leeft o.a. in duingebieden, op braakliggend bouwterrein, in zandafgravingen en wateren met een tijdelijk karakter. Het is een pioniersoort, dat betekent dat de rugstreeppad zich vaak ergens als eerste vestigt.

Advies voor deze soort:

Vermijd werkzaamheden in de kwetsbare periode. Voor de rugstreeppad zijn dit de voortplantingsperiode en de winterrust. Dit betekent dat werkzaamheden het beste kunnen worden uitgevoerd in de periode van 1 augustus tot 15 oktober. Let er bij grondwerkzaamheden op dat de rugstreeppad niet wordt op- of ingegraven. Houd daarnaast bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied. Bijvoorbeeld door te zorgen voor tijdelijk water of door aanleg van puin, steen- en zandhopen. Raadpleeg voor meer informatie het kennisdocument over deze soort op de website van BIJ12.

Aanvraagdatum : 16-08-2024

Rapportnummer : 120072

Rapport Beschermde SoortenIndicator (BeSI)

Hoe BeSI is gerealiseerd wordt beschreven in de onderstaande twee documenten:

1. Kwaliteitsborging Beschermde SoortenIndicator
2. Toelichting kansenskaarten beschermde soorten

[Bekijk deze documenten.](#)

Disclaimer:

In de Omgevingswet is vastgelegd dat iedere Nederlander zorgdraagt voor levende dieren en planten en hun directe omgeving. Dit noemen we de zorgplicht voor natuur. De Beschermde SoortenIndicator (BeSI) helpt u om aan deze zorgplicht te voldoen.

In principe houdt BeSI rekening met alle Vogelrichtlijn-, Habitatrichtlijn- en andere wettelijk beschermde soorten. Ook wordt rekening gehouden met Rode-lijst soorten met een status 'Bedreigd' of 'Ernstig bedreigd'. De voorwaarde die hierbij altijd geldt, is dat het mogelijk moet zijn om te berekenen hoe groot de kans is dat een soort voorkomt (kansenskaart).

BeSI houdt alleen rekening met beschermde en bedreigde planten en dieren. Mogelijk gelden er ook andere natuurbeschermingsregels. Indien u daar meer informatie over wilt, kijk dan op

<https://iplo.nl/thema/natuur/>

Het BeSI-rapport heeft alleen een signalerende functie van de mogelijk nadelige effecten van uw werkzaamheid op beschermde en bedreigde planten en dieren op de door u aangegeven locatie. Het BeSI-rapport is dus geen bindend advies.

Het BeSI-rapport geeft geen informatie over een mogelijke vergunningsplicht van uw werkzaamheid. Het geeft ook geen enkel oordeel over de inhoud of status van een vergunningsplichtig voorgenomen werkzaamheid. Raadpleeg hiervoor de vergunningcheck uit het Omgevingsloket.

Het BeSI-rapport wordt gemaakt op basis van de huidige beschikbare informatie over beschermde en bedreigde planten en dieren. Als u later dan drie maanden na het maken van het BeSI-rapport start met uw werkzaamheid, dan wordt geadviseerd een nieuw actueel rapport te maken.

Bewaar het door u gemaakte BeSI-rapport goed. Het kan zijn dat ernaar wordt gevraagd, bijvoorbeeld door de gemeente waar u de werkzaamheid uitvoert.

Aanvraagdatum : 16-08-2024

Rapportnummer : 120072

Rapport Beschermde SoortenIndicator (BeSI)

Soorten uitgesplitst naar beschermingsregels

Vogelrichtlijn

Huismus

- Passer domesticus
- Kansenskaart versienummer 29-11-2022

Habitatrichtlijn

Boombewonende vleermuizen

- Boombewonende vleermuizen
- Kansenskaart versienummer 24-03-2023

Gebouwbewonende vleermuizen

- Gebouwbewonende vleermuizen
- Kansenskaart versienummer 24-03-2023

Gewone dwergvleermuis

- Pipistrellus pipistrellus
- Kansenskaart versienummer 08-08-2024

Kamsalamander

- Triturus cristatus
- Kansenskaart versienummer 01-12-2022

Knoflookpad

- Pelobates fuscus
- Kansenskaart versienummer 02-12-2022

Rugstreeppad

- Epidalea calamita
- Kansenskaart versienummer 30-11-2022

Ruige dwergvleermuis

- Pipistrellus nathusii
- Kansenskaart versienummer 08-08-2024

Overige wettelijk beschermde of rode lijst soorten

Bruine kikker

- Rana temporaria
- Kansenskaart versienummer 28-11-2022

Bunzing

- Mustela putorius
- Kansenskaart versienummer 29-11-2022

Gewone pad

- Bufo bufo
- Kansenskaart versienummer 28-11-2022

Aanvraagdatum : 16-08-2024

Rapportnummer : 120072

Rapport Beschermde SoortenIndicator (BeSI)

Haas

- Lepus europaeus
- Kansenkaart versienummer 28-11-2022

Kleine watersalamander

- Lissotriton vulgaris
- Kansenkaart versienummer 28-11-2022

Ree

- Capreolus capreolus
- Kansenkaart versienummer 28-11-2022

Aanvraagdatum : 16-08-2024

Rapportnummer : 120071

Rapport Beschermde SoortenIndicator (BeSI)

Op 16-08-2024 heeft u de Beschermde SoortenIndicator (BeSI) geraadpleegd. Dit rapport geeft u inzicht in mogelijk nadelige effecten van uw werkzaamheid op beschermde plant- en diersoorten op de door u aangegeven locatie.

Werkzaamheid

De werkzaamheid die u heeft aangegeven uit te willen voeren is:

Bouwwerk of deel van een bouwwerk slopen, of asbest verwijderen

Locatie

De locatie waar u deze werkzaamheid uit wil voeren, heeft u als volgt aangegeven:



Locatie : 151,817.53 /385,799.03

Oppervlakte : 8830 m2

De beschermde plant- en diersoorten die mogelijk nadelige effecten ondervinden van de uit te voeren werkzaamheid op de door u aangegeven locatie worden hieronder beschreven, inclusief een advies over hoe u met de soort rekening kunt houden. Bij iedere soort wordt vermeld of het een 1) vogel, 2) een zoogdier, 3) een andere diersoort dan vogel of zoogdier of 4) een plant is. Het BeSI-rapport heeft een signalerende functie. Informatie over de mogelijke vergunningsplicht van uw werkzaamheid krijgt u door de [Vergunningcheck](#) te doen. Dit rapport kunt u daarbij gebruiken om de vragen over natuur te beantwoorden.

In de bijlage van het rapport worden de genoemde soorten uitgesplitst naar beschermingsregels.

Aanvraagdatum : 16-08-2024

Rapportnummer : 120071

Rapport Beschermde SoortenIndicator (BeSI)

Antwoorden op vragen uit de Vergunningcheck

Welke beschermde dieren en/of planten kunnen aanwezig zijn op de locatie van uw werkzaamheid?

Vogels	Ja
Zoogdieren	Ja
Andere diersoorten dan vogels of zoogdieren	Ja
Planten	Nee

Zie de volgende pagina's voor meer informatie over de leefgebieden van deze wettelijk beschermde dieren en planten en een advies over hoe u met deze soorten rekening kunt houden.

Vogels

Kunnen er op de locatie van uw werkzaamheid vogels aanwezig zijn waarvan het nest het hele jaar beschermd is?	Ja
Kunnen er op de locatie van uw werkzaamheid vogels aanwezig zijn waarvan het nest alleen tijdens het broedseizoen beschermd is?	Ja

Lees altijd de adviezen van de mogelijk aanwezige vogelsoorten. Sommige provincies hebben voor bepaalde soorten uitzonderingen.

Zoogdieren

Kies alle zoogdieren die aanwezig kunnen zijn op de locatie van uw werkzaamheid.

Vleermuizen	Ja
Eekhoorns	Nee
Steenmarters	Ja
Andere marterachtige dan steenmarters	Nee
Andere zoogdieren	Nee

Aanvraagdatum : 16-08-2024

Rapportnummer : 120071

Rapport Beschermde SoortenIndicator (BeSI)

Soorten en adviezen

Vogels

Boerenwaluw

Beschrijving leefgebied:

De boerenwaluw leeft op het boerenland, vaak in de buurt van water en vangt zijn voedsel in de lucht. Het voedsel bestaat uit enorme hoeveelheden kleine vliegende insecten. De boerenwaluw broedt o.a. in boerenschuren, in loodsen en onder bruggen.

Advies voor deze soort:

Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de boerenwaluw is dat van begin april (soms eind maart) tot half september (soms eind september). In Flevoland, Limburg en Overijssel zijn nesten jaarrond beschermd. In andere provincies ook, maar mogelijk zijn er uitzonderingen. Kijk voor de regels over jaarrond beschermde nesten in de Omgevingsverordening van de provincie.

Huismus

Beschrijving leefgebied:

De huismus komt meestal voor in de buurt van mensen en leeft dan vooral in struiken, het liefst met stekels die het hele jaar groen blijven, loofbomen en klimplanten. De huismus broedt in gebouwen, bijvoorbeeld onder dakpannen, en soms in klimop.

Advies voor deze soort:

Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de huismus is dat van maart tot half augustus (soms tot eind september). De huismus is zeer honkvast en is het hele jaar rondom het nest aanwezig. Daarom zijn de nesten jaarrond beschermd. Haal nesten nooit weg. Houd daarnaast bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van de huismus. Bijvoorbeeld door struiken of klimplanten rondom de nesten te laten staan. Raadpleeg voor meer informatie het kennisdocument over deze soort op de website van BIJ12.

Kauw

Beschrijving leefgebied:

De kauw leeft vooral in een bebouwde omgeving. Ook in de kauw te vinden op akkers en kleinschalige weides en in kleinere bossen. Kauwen broeden vooral in gebouwen (schoorstenen), maar ook in holle bomen en zelfs in konijnenholen.

Advies voor deze soort:

Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de kauw is dat van half maart tot begin juli. Dan zijn nesten beschermd.

Aanvraagdatum : 16-08-2024

Rapportnummer : 120071

Rapport Beschermde SoortenIndicator (BeSI)

Spreeuw

Beschrijving leefgebied:

De spreeuw leeft in allerlei gebieden, meestal in de buurt van bebouwing en graslanden, soms in bossen en dan vooral aan de (bos)randen. De spreeuw broedt onder andere in holtes van bomen, in schoorstenen van gebouwen en in nestkasten.

Advies voor deze soort:

Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de spreeuw is dat van half maart tot begin juli (soms tweede helft juli). Nesten zijn jaarrond beschermd, maar mogelijk zijn er uitzonderingen. Kijk voor de regels over jaarrond beschermde nesten in de Omgevingsverordening van de provincie. In Limburg geldt een uitzondering, daar zijn nesten alleen in het broedseizoen beschermd.

Steenuil

Beschrijving leefgebied:

De steenuil komt vooral voor op erven van (voormalige) boerderijen en broedt daar meestal onder het dak of in een schuurtje. Sommige steenuilen broeden in de holten van knotwilgen.

Advies voor deze soort:

Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de steenuil is dat van april (soms eind maart) tot eind augustus. De steenuil gebruikt zijn nest het hele jaar ook als rustplek. Daarom zijn de nesten jaarrond beschermd. Haal nesten van de steenuil nooit weg. Raadpleeg voor meer informatie het kennisdocument over deze soort op de website van BIJ12.

Zoogdieren

Boombewonende vleermuizen

Beschrijving leefgebied:

Boombewonende vleermuizen leven in bossen, bosranden, lanen en parken. Ze verblijven daar in boomholtes, in scheuren in bomen en ruimten achter bast. Voorbeelden zijn de rosse vleermuis en de watervleermuis.

Advies voor deze soort:

De holtes en spleten waar boombewonende vleermuizen in leven zijn beschermd. Laat daarom in het leefgebied van boombewonende vleermuizen bomen staan. Hetzelfde geldt voor bossen, bosranden, lanen en parken omdat ze dienen als vliegroute en jachtterrein. Voorkom daarnaast het verlichten van de bomen en het leefgebied. Raadpleeg voor meer informatie over de rosse vleermuis en de watervleermuis de kennisdocumenten op de website van BIJ12.

Aanvraagdatum : 16-08-2024

Rapportnummer : 120071

Rapport Beschermde SoortenIndicator (BeSI)

Gebouwbewonende vleermuizen

Beschrijving leefgebied:

Gebouwbewonende vleermuizen leven in alle typen landschappen. Deze vleermuizen verblijven in gebouwen, onder andere achter betimmering en daklijsten, in spouwmuren, of onder dakpannen.

Advies voor deze soort:

Spleten en openingen in gebouwen waarin vleermuizen leven, zijn beschermd. Voorkom het dichtmaken van invliegopeningen en holle ruimtes in muren en daken. Behoud bomenrijen, bosjes en water omdat ze dienen als vliegroute en jachtterrein. Voorkom het verlichten van gevels waarin invliegopeningen zitten. Voor meer info over de gewone en de ruige dwergvleermuis of de gewone grootoorvleermuis: zie de kennisdocumenten op de website van BIJ12 en check natuurvriendelijkisoleren.nl. Voor sommige vleermuissoorten staat hieronder meer info. Dit sluit het voorkomen van andere vleermuissoorten niet uit.

Gewone dwergvleermuis

Soort Leefgebied: kraamverblijfplaats in gebouw

Beschrijving leefgebied:

De gewone dwergvleermuis komt in de zomer in tuinen, parken en bossen voor. Overdag verblijven ze in gebouwen, vaak achter betimmering en daklijsten, in spouwmuren of onder dakpannen.

Advies voor deze soort:

Dit gebouw kan door de gewone dwergvleermuis worden gebruikt als kraamverblijfplaats. Behoud open water, bomenrijen en bosschages en voorkom verlichting in het leefgebied. Raadpleeg voor meer informatie over de gewone dwergvleermuis het kennisdocument op de website van BIJ12. Let op! Het gebouw kan door de gewone dwergvleermuis ook als andere functie dan kraamverblijfplaats worden gebruikt. Bovendien is niet uitgesloten dat er ook andere vleermuissoorten voorkomen in dit gebouw.

Aanvraagdatum : 16-08-2024

Rapportnummer : 120071

Rapport Beschermde SoortenIndicator (BeSI)

Ruige dwergvleermuis

Soort Leefgebied: paarverblijfplaats in gebouw

Beschrijving leefgebied:

De ruige dwergvleermuis kan overal voorkomen. Overdag verblijft de ruige dwergvleermuis in gebouwen achter betimmeringen, achter daklijsten, onder dakbedekking en op zolders. Ook komen ze voor in spleten en gaten in bomen.

Advies voor deze soort:

Dit gebouw kan door de ruige dwergvleermuis worden gebruikt als paarverblijfplaats. Behoud openingen in gebouwen en voorkom verlichting van het leefgebied. Raadpleeg voor meer informatie over de ruige dwergvleermuis het kennisdocument op de website van BIJ12.

Let op! Het gebouw kan door de ruige dwergvleermuis ook als andere functie dan paarverblijfplaats worden gebruikt. Bovendien is niet uitgesloten dat er ook andere vleermuissoorten voorkomen in dit gebouw.

Steenmarter

Beschrijving leefgebied:

De steenmarter leeft in Nederland op verschillende soorten plekken, maar is vooral te vinden in de buurt van dorpen, boerderijen en (zelfs in) grote steden. De steenmarter is vooral 's nachts actief.

Advies voor deze soort:

Vermijd werkzaamheden in de kwetsbare periode. Voor de steenmarter is dit de periode dat de jongen worden geboren en bij de moeder blijven tot ze zelfstandig zijn. Deze periode loopt van maart tot en met juli. In Friesland geldt voor de steenmarter het hele jaar een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. In Limburg geldt deze vrijstelling van 15 augustus tot en met eind februari.

Andere diersoorten dan vogels of zoogdieren

Bastaardkikker

Beschrijving leefgebied:

De bastaardkikker is een amfibie en leeft in schoon oppervlaktewater, variërend van zeer grote wateren (meren) tot kanalen, sloten, poelen en tuinvijvers. Bij voorkeur staan er veel planten langs de oever en in het water.

Advies voor deze soort:

In alle provincies geldt het hele jaar een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Niettemin geldt de zorgplicht; zorg voor schoon oppervlaktewater met oevers met veel oeverplanten zodat de bastaardkikker kan schuilen. Van maart tot half oktober verblijft de bastaardkikker in of vlak bij het water. Laat daarom in deze periode, ook in het kader van de zorgplicht, bij baggeren de verwijderde modder en planten 24 uur op de oevers liggen zodat de bastaardkikkers eruit kunnen kruipen.

Aanvraagdatum : 16-08-2024

Rapportnummer : 120071

Rapport Beschermde SoortenIndicator (BeSI)**Bruine kikker**Beschrijving leefgebied:

De bruine kikker is een amfibie en leeft o.a. in sloten, poelen, vennen en tuin- en stadsvijvers. De soort leeft zowel in het water maar vaker nog op het land. De bruine kikker heeft een voorkeur voor water waar weinig of geen vis zit.

Advies voor deze soort:

In alle provincies geldt het hele jaar een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Niettemin geldt de zorgplicht; zorg daarom voor kleine oppervlaktewateren met weinig of geen vis zodat de larven van de bruine kikker niet worden opgegeten. Een deel van de dieren verblijft ook na de voortplanting in of bij het water. Laat daarom, ook in het kader van de zorgplicht, bij baggeren verwijderde modder en planten 24 uur op de oevers liggen zodat de bruine kikkers eruit kunnen kruipen.

Gewone padBeschrijving leefgebied:

De gewone pad is een amfibie en plant zich voort in poelen, vijvers, vennen, sloten en weteningen en zwak stromende beken. De gewone pad leeft buiten de voortplantingstijd (maart) vooral op het land.

Advies voor deze soort:

In alle provincies geldt het hele jaar een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Niettemin geldt de zorgplicht; zorg daarom voor poelen, vijvers en sloten waarin de gewone pad zich kan voortplanten. Voorkom sterfte op wegen door in de paartijd, als de padden trekken, schermen te plaatsen en/of wegen tijdelijk af te sluiten.

KamsalamanderBeschrijving leefgebied:

De kamsalamander is een amfibie en leeft in en rond poelen met een goede waterkwaliteit. Vaak zijn er veel oever- en waterplanten aanwezig. Overdag zie je de kamsalamander zelden, dan schuilen ze tussen de planten op de oever of in het water.

Advies voor deze soort:

Vermijd werkzaamheden in het water in de voortplantingsperiode en werkzaamheden op het land buiten deze periode. Voor de kamsalamander betekent dit dat werkzaamheden in het water waarschijnlijk het beste kunnen worden uitgevoerd in de periode tussen oktober en januari en werkzaamheden op het land het beste tussen april en juli. Raadpleeg voor meer informatie het kennisdocument over deze soort op de website van BIJ12.

Aanvraagdatum : 16-08-2024

Rapportnummer : 120071

Rapport Beschermde SoortenIndicator (BeSI)**Kleine watersalamander**Beschrijving leefgebied:

De kleine watersalamander is een amfibie en leeft in poelen, vennen, sloten, en tuin- en stadsvijvers. De kleine watersalamander overwintert in vorstvrije en ruimten zoals muizenholen, tussen boomwortels en in spleten in muren of hout.

Advies voor deze soort:

In alle provincies geldt het hele jaar een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Niettemin geldt de zorgplicht; zorg voor water en oevers met veel planten om te kunnen schuilen en stenen en houtstronken om onder te overwinteren. Kleine watersalamanders verblijven vanaf maart tot in de zomermaanden in het water. Laat daarom, ook in het kader van de zorgplicht, bij baggeren de verwijderde modder en planten 24 uur op de oevers liggen zodat de kleine salamanders eruit kunnen kruipen.

KnoflookpadBeschrijving leefgebied:

De knoflookpad is een amfibie en leeft in zandige omgevingen zoals open rivierduinen. De knoflookpad plant zich voort in het water van beek- en rivierdalen. Knoflookpadden zijn vooral 's nachts actief. Overdag graven ze zich in het zand in.

Advies voor deze soort:

Vermijd werkzaamheden in de voortplantingsperiode. Voor de knoflookpad betekent dit dat werkzaamheden in het water het beste kunnen worden uitgevoerd in de periode van 1 augustus tot aan het begin van de winter. Houd bij werkzaamheden op het land rekening met het behoud van het leefgebied van de knoflookpad. Bijvoorbeeld door te zorgen voor schoon water waarin de knoflookpad zich kan voortplanten. In de buurt van het water moet open zand liggen. Dit heeft de knoflookpad nodig om zich in te kunnen graven.

Aanvraagdatum : 16-08-2024

Rapportnummer : 120071

Rapport Beschermde SoortenIndicator (BeSI)

Poelkikker

Beschrijving leefgebied:

De poelkikker is een amfibie en leeft in voedselarm schoon water zoals poelen en vennen in laagveen en hoogveen. Voorwaarde is dat er voldoende dekking langs en op de oevers is. Poelkikkers komen eind maart uit hun winterslaap.

Advies voor deze soort:

Vermijd werkzaamheden in de voortplantingsperiode en tijdens de winterrust. Voor de poelkikker betekent dit dat werkzaamheden het beste kunnen worden uitgevoerd in de periode van 1 augustus tot en met 15 oktober. Houd daarnaast bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van de poelkikker. Bijvoorbeeld door te zorgen voor schoon, niet verontreinigd oppervlaktewater met veel water- en oeverplanten zodat de poelkikker kan schuilen. Raadpleeg voor meer informatie het kennisdocument over deze soort op de website van BIJ12.

Rugstreeppad

Beschrijving leefgebied:

De rugstreeppad is een amfibie en leeft o.a. in duingebieden, op braakliggend bouwterrein, in zandafgravingen en wateren met een tijdelijk karakter. Het is een pioniersoort, dat betekent dat de rugstreeppad zich vaak ergens als eerste vestigt.

Advies voor deze soort:

Vermijd werkzaamheden in de kwetsbare periode. Voor de rugstreeppad zijn dit de voortplantingsperiode en de winterrust. Dit betekent dat werkzaamheden het beste kunnen worden uitgevoerd in de periode van 1 augustus tot 15 oktober. Let er bij grondwerkzaamheden op dat de rugstreeppad niet wordt op- of ingegraven. Houd daarnaast bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied. Bijvoorbeeld door te zorgen voor tijdelijk water of door aanleg van puin, steen- en zandhopen. Raadpleeg voor meer informatie het kennisdocument over deze soort op de website van BIJ12.

Aanvraagdatum : 16-08-2024

Rapportnummer : 120071

Rapport Beschermde SoortenIndicator (BeSI)

Hoe BeSI is gerealiseerd wordt beschreven in de onderstaande twee documenten:

1. Kwaliteitsborging Beschermde SoortenIndicator
2. Toelichting kansenskaarten beschermde soorten

[Bekijk deze documenten.](#)

Disclaimer:

In de Omgevingswet is vastgelegd dat iedere Nederlander zorgdraagt voor levende dieren en planten en hun directe omgeving. Dit noemen we de zorgplicht voor natuur. De Beschermde SoortenIndicator (BeSI) helpt u om aan deze zorgplicht te voldoen.

In principe houdt BeSI rekening met alle Vogelrichtlijn-, Habitatrichtlijn- en andere wettelijk beschermde soorten. Ook wordt rekening gehouden met Rode-lijst soorten met een status 'Bedreigd' of 'Ernstig bedreigd'. De voorwaarde die hierbij altijd geldt, is dat het mogelijk moet zijn om te berekenen hoe groot de kans is dat een soort voorkomt (kansenskaart).

BeSI houdt alleen rekening met beschermde en bedreigde planten en dieren. Mogelijk gelden er ook andere natuurbeschermingsregels. Indien u daar meer informatie over wilt, kijk dan op

<https://iplo.nl/thema/natuur/>

Het BeSI-rapport heeft alleen een signalerende functie van de mogelijk nadelige effecten van uw werkzaamheid op beschermde en bedreigde planten en dieren op de door u aangegeven locatie. Het BeSI-rapport is dus geen bindend advies.

Het BeSI-rapport geeft geen informatie over een mogelijke vergunningsplicht van uw werkzaamheid. Het geeft ook geen enkel oordeel over de inhoud of status van een vergunningsplichtig voorgenomen werkzaamheid. Raadpleeg hiervoor de vergunningcheck uit het Omgevingsloket.

Het BeSI-rapport wordt gemaakt op basis van de huidige beschikbare informatie over beschermde en bedreigde planten en dieren. Als u later dan drie maanden na het maken van het BeSI-rapport start met uw werkzaamheid, dan wordt geadviseerd een nieuw actueel rapport te maken.

Bewaar het door u gemaakte BeSI-rapport goed. Het kan zijn dat ernaar wordt gevraagd, bijvoorbeeld door de gemeente waar u de werkzaamheid uitvoert.

Aanvraagdatum : 16-08-2024

Rapportnummer : 120071

Rapport Beschermde SoortenIndicator (BeSI)

Soorten uitgesplitst naar beschermingsregels

Vogelrichtlijn

Boerenwaluw

- Hirundo rustica
- Kansenskaart versienummer 30-11-2022

Huismus

- Passer domesticus
- Kansenskaart versienummer 29-11-2022

Kauw

- Corvus monedula
- Kansenskaart versienummer 29-11-2022

Spreeuw

- Sturnus vulgaris
- Kansenskaart versienummer 28-11-2022

Steenuil

- Athene vidalii
- Kansenskaart versienummer 02-12-2022

Habitatrichtlijn

Boombewonende vleermuizen

- Boombewonende vleermuizen
- Kansenskaart versienummer 24-03-2023

Gebouwbewonende vleermuizen

- Gebouwbewonende vleermuizen
- Kansenskaart versienummer 24-03-2023

Gewone dwergvleermuis

- Pipistrellus pipistrellus
- Kansenskaart versienummer 08-08-2024

Kamsalamander

- Triturus cristatus
- Kansenskaart versienummer 01-12-2022

Knoflookpad

- Pelobates fuscus
- Kansenskaart versienummer 02-12-2022

Aanvraagdatum : 16-08-2024

Rapportnummer : 120071

Rapport Beschermde SoortenIndicator (BeSI)

Poelkikker

- Pelophylax lessonae
- Kansenskaart versienummer 30-11-2022

Rugstreeppad

- Epidalea calamita
- Kansenskaart versienummer 30-11-2022

Ruige dwergvleermuis

- Pipistrellus nathusii
- Kansenskaart versienummer 08-08-2024

Overige wettelijk beschermde of rode lijst soorten

Bastaardkikker

- Pelophylax kl. esculentus
- Kansenskaart versienummer 28-11-2022

Bruine kikker

- Rana temporaria
- Kansenskaart versienummer 28-11-2022

Gewone pad

- Bufo bufo
- Kansenskaart versienummer 28-11-2022

Kleine watersalamander

- Lissotriton vulgaris
- Kansenskaart versienummer 28-11-2022

Steenmarter

- Martes foina
- Kansenskaart versienummer 30-11-2022