




**Bestaande bomen**, te handhaven, diverse soorten waaronder Juglans regia - Walnoot, Fraxinus excelsior - Gewone Es, Pyrus, Tilia cordata - Winterlide (leibomen) en diverse fruitbomen,




Nieuwe bomen, Nieuw te planten boom, solitair, inheemse soort;

B1*knot* Salix alba - Schietwilg, mt 12-142 st.

B2 Fraxinus excelsior- Gewone es, mt 16-185 st.


B3 Alnus glutinosa - Gewone els, mt 12-144 st.

**Nieuwe fruitbomen**, Nieuw te planten fruitboom, solitair, inheemse soort;

B4 Prunus 'Mirabelle de Nancy' - Pruim, mt 16-184 st.

**Nieuwe leibomen**, Nieuw te planten leibomen, solitair, inheemse soort;

L1 Tilia europaea 'Pallida' - Leilinde, mt 16-1812 st.

**Bloemrijk grasland**, Nieuw te zaaien

G1 Bloemrijk graslandmengsel voor lichtere gronden (Cruydhoeck)

**Gazon**, Nieuw in te zaaien

**Bestaande haag**

H1 Ilex aquifolium, met delen Carpinus betulus en Fagus sylvatica

H2 Ligustrum ovalifolium

H3 Ilex aquifolium met Carpinus betulus

H4 Ilex aquifolium met Carpinus betulus

H5 Crataegus monogyna

H6 Ilex aquifolium en Taxus baccata

**Nieuwe kniphaag laag**, bestaande uit; Carpinus betulus (Haagbeuk) (100%).
Leverantiemaat: 60-80 wortelgoed. Lengte: 334 m1, breedte tot ca. 0.50m
à 6 planten per m1, totaal; 2004 stuks

*= afgesteld op afmetingen leverbare soort- en leverancier.

Beheerinstructies:

Bomen: De bomen (die op locaties staan waar mensen komen) dienen eens in de 3 jaar gecontroleerd te worden op gevaarlijke- en/of zieke takken. Deze zieke takken dienen verwijderd te worden.

Knotbomen: Tussen half november en maart knotten. Frequentie is afhankelijk van gewenste takdikte. Aan te raden is ieder jaar tot 1x per 3 jaar.

Fruitbomen: De fruitbomen dienen jaarlijks gesnoeid te worden om nieuwe vruchtdracht te stimuleren, maar ook om zieke takken en jonge, misplaatste scheuten te verwijderen.

Bosplantsoen: dient minimaal eens in de 5 jaar teruggesnoeid te worden tot een hoogte van ca. 1.00m. Dit kan uitgevoerd worden in de wintermaanden. Verder dient de struweel onkruidvrij gehouden te worden door middel van een bosmaaier. Het struweel biedt vol-doende nest/voedervoorzieningen voor vogels.

Kniphaag: De kniphaag dient maximaal twee maal per jaar geschoren te worden, de eerste keer dient gedaan te zijn vóór de langste dag (21 juni) en de tweede knipbeurt vindt plaats rond augustus tot midden september.

**Wadi**
W1 Wadimengsel voor lichtere grond (Cruydhoeck)

1	21-02-2024		LBRI	RVHE	RVHE
0	07-12-2022		LBRI	PV	RVHE
Versie	Datum	Omschrijving	Opsteller	Par.	Validatie

BP Vlijmense Dijk 67, Vlijmen

Onderdeel

Beplantingsplan

Opdrachtgever

Woonveste

Fase

Formaat

Schaal

Projectnummer

Tekeningnummer

Behorende bij doc. nr.

VKL207

2022-2527

-

Roermond

Schoolstraat 8, 6049 BN Herten

Postbus 14, 6040 AA Roermond

's-Hertogenbosch

Hintham 152-E, 5246 AK Rosmalen

Postbus 2309, 5202 CH 's-Hertogenbosch

088 - 3366333

info@kragten.nl

www.kragten.nl

kragten