

# ECOLOGISCHE QUICKSCAN

*Onderzoek naar beschermde natuurwaarden  
ten behoeve van ruimtelijke ontwikkeling*



**Locatie:** Bernhardweg 33 Oijen

**Rapportnummer:** 2022-BE-0456

**In opdracht van:**

Plan W  
Kievitsham 62  
5333 GE Hoenzadriel



**Brabant Eco**  
Ecologische Dienstverlening

## Colofon

### Rapportage

Brabant Eco

### Rapportnummer

2022-BE-0456

### Opdrachtgever

Plan W.

### Contactpersoon

Mevrouw W. Zwanenberg

### Locatie

Bernhardweg 33  
Oijen

### Auteur

Frenk van de Wal

### Opleverdatum

22 november 2022



**Brabant Eco**  
Ecologische Dienstverlening

**De Lange Kant 27**  
**5061 PX Oisterwijk**  
**06-24218274**  
**[www.brabanteco.nl](http://www.brabanteco.nl)**

Overname, verveelvoudiging of openbaarmaking van dit rapport is niet toegestaan zonder vermelding van bron.

Dit rapport is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks aanvaardt Brabant Eco geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek door toepassing van adviezen.

# Inhoudsopgave

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>SAMENVATTING .....</b>                      | <b>3</b>  |
| <b>1. INLEIDING EN ONDERZOEK .....</b>         | <b>4</b>  |
| 1.1 Aanleiding.....                            | 4         |
| 1.2 Doelstelling .....                         | 4         |
| 1.3 Centrale vraagstelling .....               | 4         |
| 1.4 Criteria.....                              | 4         |
| <b>2. BELEIDSKADER .....</b>                   | <b>5</b>  |
| 2.1 Gebiedsbescherming.....                    | 5         |
| 2.2 Soortenbescherming.....                    | 5         |
| 2.3 Bescherming van houtopstanden .....        | 7         |
| 2.4 Zorgplicht .....                           | 7         |
| <b>3. PLANGEBIEDSBESCHRIJVING .....</b>        | <b>8</b>  |
| 3.1 Huidige situatie .....                     | 8         |
| 3.2 Voorgenomen ontwikkeling .....             | 9         |
| <b>4. PRAKTIJK ECOLOGISCHE QUICKSCAN .....</b> | <b>12</b> |
| 4.1 Bureauonderzoek .....                      | 12        |
| 4.2 Veldonderzoek.....                         | 13        |
| 4.3 Beschrijving plangebied .....              | 13        |
| <b>5. BESCHERMDE NATUURWAARDEN .....</b>       | <b>16</b> |
| 5.1 Gebiedsbescherming.....                    | 16        |
| 5.2 Soortenbescherming.....                    | 18        |
| <b>6. RESULTATEN EN ADVIES .....</b>           | <b>25</b> |
| 6.1 Resultaten .....                           | 25        |
| 6.2 Advies en aanbevelingen .....              | 25        |
| <b>7. BRONNEN .....</b>                        | <b>28</b> |

## SAMENVATTING

Initiatiefnemer heeft concrete plannen voor de planlocatie aan de Bernhardweg 33 te Oijen. Het voornemen is om de bestaande woning te verbouwen en de bestaande schuur uit te breiden. Bij deze werkzaamheden is de opdrachtgever gebonden aan de Wet natuurbescherming. Omdat overtreding van de Wet natuurbescherming op voorhand niet uitgesloten kan worden is aan Brabant Eco de opdracht gegeven voor het uitvoeren van een ecologische quickscan op de planlocatie in het kader van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling.

Dit voorliggend rapport geeft een beschrijving van het plangebied en het uitgevoerde onderzoek. Daarnaast geeft dit rapport inzicht in de mogelijke knelpunten in het kader van de natuurwetgeving en -beleid en de mogelijke effecten op beschermde flora en fauna en op beschermde natuurgebieden als gevolg van het project. Het rapport kan voor de opdrachtgever als bewijsstuk dienen voor het verrichtte natuuronderzoek.

Op basis van uitgevoerd onderzoek zijn geen effecten met werkzaamheden te verwachten die van negatieve invloed zijn op de gunstige staat van instandhouding van de waargenomen soorten of mogelijk aanwezige soorten en hun functioneel leefgebied. Natuurgebieden worden niet aangetast door de ontwikkeling in het plangebied.

Nader onderzoek of een ontheffingsaanvraag is dan ook niet nodig.

De zorgplicht is altijd van toepassing.

Natuurinclusief bouwen wordt aanbevolen. Het plangebied heeft een lage ecologische waarde die met onder andere een landschappelijke inpassing met vooral bes- en nootdragende struiken te verbeteren is.

Frenk van de Wal  
Brabant Eco  
November 2022



### 1.1 Aanleiding

Volgens opdrachtgever Plan W heeft initiatiefnemer plannen voor de locatie aan de Bernhardweg 33 te Oijen. Het plan is om de bestaande woning te verbouwen. Tevens zal de bestaande schuur aan de achterzijde worden uitgebreid.

Bij deze werkzaamheden is opdrachtgever gebonden aan de Wet natuurbescherming.

In opdracht heeft Brabant Eco een ecologische quickscan uitgevoerd voor de planlocatie in het kader van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling.

### 1.2 Doelstelling

Het doel van dit verkennend onderzoek is om vast te stellen of de geplande ontwikkeling mogelijk effect heeft op de beschermde flora en fauna en op beschermde natuurgebieden. Er wordt een eerste inzicht verkregen in de mogelijke effecten op deze beschermde natuurwaarden in en om het plangebied en de mogelijke vervolgstappen die moeten worden ondernomen met betrekking tot aanvullend veldonderzoek, nader effectonderzoek en nadere procedures. Het doel van dit onderzoek is het vaststellen of uitsluiten van aanwezigheid van beschermde soorten die zijn opgenomen in paragraaf 3.1, 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming.

Naast soorten die bijzondere bescherming genieten, geldt er een algemene zorgplicht om planten en dieren niet onnodig te verstoren. Daarom dienen flora en fauna en eventuele effecten in kaart gebracht te worden om deze te kunnen toetsen aan de natuurwetgeving.

Dit rapport geeft inzicht in de mogelijke knelpunten in het kader van natuurwetgeving en -beleid en de mogelijke effecten als gevolg van het project en kan voor de opdrachtgever als bewijsstuk dienen voor het verrichte natuuronderzoek.

### 1.3 Centrale vraagstelling

Is de voorgenomen ontwikkeling op basis van de gevonden resultaten in strijd met de natuurwetgeving en dienen eventuele vervolgstappen genomen te worden voordat met de uitvoering gestart kan worden?

### 1.4 Criteria

Op dit natuuronderzoek zijn de volgende criteria van toepassing:

- Het onderzoek is uitgevoerd door deskundige ecologen volgens de definitie van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (ecologisch deskundige/RVO.nl).
- Het onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. Brabant Eco en Frenk van de Wal verklaren hierbij geen enkel belang te hebben in de uitkomst van dit onderzoek.
- De resultaten zijn zo objectief en betrouwbaar mogelijk verkregen.
- Het onderzoek voldoet aan de interne proces- en kwaliteitseisen van Brabant Eco.



De Wet natuurbescherming is de Nederlandse wet die de bescherming van natuurgebieden en soorten regelt. Met deze wet worden de Europese natuurbeschermingsrichtlijnen (de vogel- en habitatrichtlijn) zo helder mogelijk geïmplementeerd. Bovendien sluit het instrumentarium van de Wet natuurbescherming aan op het huidige omgevingsrecht en de toekomstige Omgevingswet. Het eerste aanspreekpunt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning is de gemeente. De bevoegdheden om te toetsen aan de Wet natuurbescherming is bij de provincie gelegd. Het uitgangspunt van de wet is dat er geen schade mag worden toegebracht aan beschermde dieren of planten, tenzij dit nadrukkelijk is toegestaan.

### 2.1 Gebiedsbescherming

#### 2.1.1 Natura 2000

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Nederland worden deze gebieden aangewezen binnen de EU-vogelrichtlijn en de EU-habitatrichtlijn. In Natura 2000 gebieden worden bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden. In het opgestelde beheerplan wordt beschreven hoe de instandhoudingsdoelstellingen bereikt dienen te worden. Nederland heeft ruim 160 Natura 2000 gebieden.

#### 2.1.2 Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN), vroeger de Ecologische hoofdstructuur genoemd (EHS), is het Nederlandse netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het bestaat uit gebieden die samen een netwerk vormen door Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebieden hun waarde verliezen. In het NNN geldt het 'nee, tenzij' principe. Dit houdt in dat ruimtelijke ingrepen niet zijn toegestaan, tenzij er geen alternatieven zijn en er sprake is van een groot openbaar belang. De effecten van de ingreep moeten bovendien worden gecompenseerd. Naast ongeveer 20 Nationale parken, meren, rivieren en de kustzone van de Noordzee en de Waddenzee vallen alle Natura 2000 gebieden onder het NNN. De landbouwgebieden worden beheerd volgens agrarisch natuurbeheer.

### 2.2 Soortenbescherming

De Wet natuurbescherming beschermt de in Nederland voorkomende wilde planten- en diersoorten via een zogenaamde zorgplicht. Voor deze beschermde soorten is het uitgangspunt dat activiteiten moeten worden voorkomen die deze beschermde soorten aantasten. Wanneer dit niet mogelijk is, dan is het uitvoeren van een dergelijke activiteit alleen toegestaan met een ontheffing van de provincie.

#### 2.2.1 Beschermde planten en dieren

De Wet natuurbescherming kent drie algemene beschermingsregimes waarin de voorschriften van de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn en twee verdragen (Bern en Bonn) zijn geïmplementeerd en waarin aanvullende voorschriften zijn gesteld voor de dier- en plantensoorten die niet onder die specifieke voorschriften vallen, maar wel bescherming behoeven. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of ontheffing van de verboden. Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria zijn voldaan:

- Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende oplossing voor de handeling mogelijk is.

- Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals volksgezondheid of openbare veiligheid.
- Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.

Als aan deze drie vereisten voldaan is kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal handelingen zijn bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een gedragscode. Bij het besluit of een afwijking van het verbod kan worden toegestaan, wordt evenwel niet naar de gevolgen van deze afwijking voor het individuele plant of dier gekeken, maar naar de gevolgen voor de instandhouding van de betrokken soort. Wel zal rekening gehouden moeten worden met de zorgplicht en het dierenwelzijn.

### **2.2.2 EU-Vogelrichtlijn**

Het doel van de Vogelrichtlijn is het in stand houden van alle natuurlijke, in Europa in het wild levende, vogelsoorten. De Vogelrichtlijn vereist dat EU-lidstaten alle nodige maatregelen nemen om de populatie van alle vogelsoorten op een niveau te houden of te brengen, dat met name beantwoordt aan de ecologische, wetenschappelijke en culturele eisen. Daarnaast moeten de lidstaten alle nodige maatregelen nemen om voor deze vogels een 'voldoende gevarieerdheid van leefgebieden en een voldoende omvang ervan te beschermen, in stand te houden of te herstellen'. De richtlijn is dus van toepassing op vogels, hun eieren, hun nesten en ook hun leefgebieden. De EU-Vogelrichtlijn is in 1981 van kracht geworden.

De Wet natuurbescherming bevat een aantal verboden handelingen die van toepassing zijn op alle inheemse vogels. Deze verboden gelden in heel Nederland.

De wet verbiedt:

- Het opzettelijk doden of vangen van vogels (artikel 3.1 lid 1);
- Het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren van vogels, of het wegnemen van nesten (artikel 3.1 lid 2);
- Het rapen en onder zich hebben van eieren van vogels (artikel 3.1 lid 3);
- Het opzettelijk storen van vogels (artikel 3.1 lid 4);
- Het bezit, het vervoer en de handel in vogels, dood of levend, dan wel delen of producten daarvan (artikel 3.2).

Van de soorten die beschermd worden onder de Vogelrichtlijn is geen limitatieve lijst beschikbaar. Het gaat om ca. 700 soorten die van nature voorkomen op het grondgebied van de Europese Unie. In de praktijk betreft het alle soorten die in Nederland als broedvogel, standvogel, wintergast of doortrekker aanwezig kunnen zijn, met uitzondering van exoten. Op alle vogels is het beschermingsregime van paragraaf 3.1 van de Wet natuurbescherming van toepassing.

### **2.2.3 EU-Habitatrichtlijn**

Het doel van de Habitatrichtlijn is het waarborgen van de biologische diversiteit in de Europese Unie door de natuurlijke habitat en wilde dier- en plantensoorten die van Europees belang zijn in een gunstige staat van instandhouding te behouden of te herstellen. Dit zijn soorten die genoemd zijn in bijlage IV van de Habitatrichtlijn, bijlage II van het Verdrag van Bern en bijlage I van het Verdrag van Bonn, voor zover hun natuurlijke verspreidingsgebied zich in Nederland bevindt. Op deze soorten (zie bijlage 2) is het beschermingsregime van paragraaf 3.2 van de Wet natuurbescherming van toepassing. De EU-Habitatrichtlijn is in 1992 van kracht geworden.

### **2.2.4 Overig beschermde soorten**

Dit zijn soorten genoemd in bijlage A van de Wet natuurbescherming. Het gaat hier om de bescherming van zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten voorkomend in Nederland. Het betreft een limitatieve lijst (zie bijlage 3). De beschermde status van soorten kan per provincie verschillen. Provincies hebben de bevoegdheid om bij provinciale verordening vrijstelling te verlenen voor nationaal beschermde soorten. Er is dan geen ontheffing nodig voor werkzaamheden. Voor soorten die niet in de bijlagen van de Wet natuurbescherming worden genoemd, fungeert de zorgplichtbepaling (artikel 1.11 Wet natuurbescherming) als vangnet. Op grond van deze bepaling moeten schadelijke handelingen voor alle in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving in



beginsel achterwege worden gelaten, dan wel moeten maatregelen worden genomen om schadelijke gevolgen (zoveel mogelijk) te voorkomen.

| Beschermingsregime soorten<br>Vogelrichtlijn § 3.1 Wn                                                                                                                                    | Beschermingsregime soorten<br>Habitatrichtlijn § 3.2 Wn                                                                                                                      | Beschermingsregime andere<br>soorten § 3.3 Wn                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art 3.1 lid 1<br>Het is verboden in het wild levende vogels opzettelijk te doden of te vangen.                                                                                           | Art 3.5 lid 1<br>Het is verboden soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen                                                            | Art 3.10 lid 1a<br>Het is verboden soorten opzettelijk te doden of te vangen                                                                                                   |
| Art 3.1 lid 2<br>Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen                                 | Art 3.5 lid 4<br>Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen                                                         | Art 3.10 lid 1b<br>Het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren opzettelijk te beschadigen of te vernielen                                       |
| Art 3.1 lid 3<br>Het is verboden eieren te rapen en deze onder zich te hebben                                                                                                            | Art 3.5 lid 3<br>Het is verboden eieren van dieren in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen                                                                         | Niet van toepassing                                                                                                                                                            |
| Art 3.1 lid 4 en lid 5<br>Het is verboden vogels opzettelijk te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort | Art 3.5 lid 2<br>Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren                                                                                                             | Niet van toepassing                                                                                                                                                            |
| Niet van toepassing                                                                                                                                                                      | Art 3.5 lid 5<br>Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te onwortelen of te vernielen | Art 3.10 lid 1c<br>Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te onwortelen of te vernielen |

Tabel: Beschermingsregime van de Wet natuurbescherming

## 2.3 Bescherming van houtopstanden

De belangrijkste elementen m.b.t. de bescherming van houtopstanden zijn de meldingsplicht, de herplantplicht en het kapverbod. De provincies bepalen welke gegevens bij een melding moeten worden aangeleverd. Als het gaat om beplantingen van bomen groter dan 10 are of als het een rijbeplanting betreft die uit meer dan 20 bomen bestaat, dan valt bos, mits het buiten de bebouwde kom ligt, onder de Wet natuurbescherming. De gemeente kan voor de Wet natuurbescherming een andere 'bebouwde kom Wet natuurbescherming' vaststellen dan de bebouwde kom volgens de Wegenverkeerswet.

## 2.4 Zorgplicht

Voor alle in het wild levende planten en dieren, ook niet wettelijk beschermde soorten, kent de Wet natuurbescherming een zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat eenieder voldoende zorg in acht moet nemen voor het in het wild levende planten en dieren, alsmede voor hun leefomgeving. Dit betekent dat handelingen (of het nalaten hiervan) waarvan men weet, of redelijkerwijs kan vermoeden, dat ze nadelig zijn voor planten en/of dieren, niet mogen worden uitgevoerd.





### 3.1 Huidige situatie

De planlocatie is gelegen aan de Bernhardweg 33, zuidelijk van de kern van Oijen, gemeente Oss, Oss is een gemeente in de provincie Noord-Brabant en heeft een totale oppervlakte van 170,93 km<sup>2</sup>. De gemeente telt 93.401 inwoners (31 januari 2022) en bestaat uit de plaatsen Berghem, Demen, Deursen-Dennenburg, Dieden, Haren, Herpen, Huisseling, Keent, Lith, Lithoijen, Macharen, Maren-Kessel, Megen, Neerlangel, Neerloon, Oijen, Oss, Overlangel, Ravenstein en Teeffelen.

Oijen grenst aan de provincie Gelderland, aan de noord- en oostzijde stroomt rivier de Maas.

Het plangebied is gelegen aan de rand van Oijen.

De directe omgeving van het plangebied bestaat voornamelijk uit agrarische percelen en bedrijfsbestemmingen. Ten noorden van de planlocatie bevindt zich de kern van Oijen.

De ligging van het plangebied in de ruimere omgeving is weergegeven in onderstaande afbeelding.



Satellietfoto omgeving plangebied, planlocatie is rood omcirkeld. Bron: Google Earth.


Het plangebied bestaat uit bebouwing, grasvelden en verharding. Op onderstaande afbeelding wordt het plangebied globaal aangegeven.



Globaal omliggende planlocatie in blauw. Bron: Google Earth.

### 3.2 Voorgenomen ontwikkeling


Initiatiefnemer heeft het plan om de bestaande woning aan de Bernhardweg 33 te Oijen te verbouwen. Bij de woning wordt het dak verwijderd en de muren gedeeltelijk gesloopt. Tevens zal de bestaande schuur aan de achterzijde worden uitgebreid. Het bouwvlak wordt hierdoor uitgebreid.



Bestaande situatie. Bron: Coenen architectuur



Bestektekening, Bron: Coenen architectuur



Bestektekening schuur bestaand en beoogd. Bron: Coenen architectuur





Nieuwe situatie bouwvlak. Bron: Plan W



Uitbreiding bouwvlak. Bron: Plan W.



Een ecologische quickscan is de eerste stap van ecologisch onderzoek dat uitgevoerd wordt in het kader van een ruimtelijke ingreep. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt getoetst aan de Wet natuurbescherming. In het kader van deze wet is het noodzakelijk te weten welke flora- en faunasoorten potentieel voorkomen in het plangebied. Naast het effect op beschermde soorten kan het nodig zijn om onderzoek te verrichten naar eventuele negatieve effecten van de ingreep op de kwaliteit van beschermde gebieden in de omgeving. Bij een ecologische quickscan worden de ecologische waarden van een omgeving in kaart gebracht middels een bureaustudie en veldonderzoek. De ingreep wordt goed en duidelijk omschreven. Er worden eventueel mitigerende en compenserende maatregelen aanbevolen waarmee de overtreding van de Wet natuurbescherming voorkomen wordt.

De ecologische quickscan, ook wel quickscan flora en fauna genoemd, geeft de mogelijke effecten van een ruimtelijke ingreep weer op beschermde planten en dieren. Door middel van een quickscan worden de volgende vragen beantwoord:

- Welke beschermde soorten (flora en fauna) zijn in het plangebied aanwezig?
- Wat zijn de effecten van de voorgenomen plannen op deze aanwezige soorten?
- Wordt de Wet natuurbescherming overtreden?
- Welke mogelijkheden zijn er om negatieve effecten op de beschermde soorten te minimaliseren of te voorkomen?
- Is er een aanvullend onderzoek nodig naar soorten of functies?
- Is het noodzakelijk om voor de voorgenomen plannen een ontheffing van de Wet natuurbescherming aan te vragen bij de provincie Noord-Brabant


De quickscan flora en fauna is een toets van de ecologische potenties van het plangebied en de directe omgeving en betreft geen volwaardig specifiek soortenonderzoek. Er zijn in dit onderzoek geen inventarisaties uitgevoerd van soorten en soortgroepen. Een ecologische inventarisatie bestaat uit meerdere veldbezoeken gedurende de voor de soortgroep meest gunstige periode van het jaar.

### 4.1 Bureauonderzoek

Het bureauonderzoek heeft zich gericht op bekende ruimtelijke plannen, zowel lokaal, provinciaal, nationaal als Europees. Door middel van literatuuronderzoek is onderzocht of zich in de nabijheid van de planlocatie gebieden bevinden die beschermd zijn in het kader van de natuurwetgeving en is er een inschatting gemaakt op het voorkomen van beschermde soorten. Hierbij is gebruik gemaakt van de database quickscanhulp.nl, zie bijlage 1, aangevuld met gegevens uit relevante recente verspreidingsatlassen en actuele websites, onder andere RAVON, Sovon, FLORON en Waarneming.nl. NDFF Verspreidingsatlas is een naslagwerk met afbeeldingen en informatie over duizenden soorten die in de Nederlandse natuur voorkomen. De verspreidingskaarten worden gemaakt met gevalideerde gegevens uit de Nationale Databank Flora en Fauna. De inhoud van de atlas wordt mede verzorgd door zes verenigingen en stichtingen: de Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV), FLORON, het Landelijk Informatiecentrum Kranswieren (LIK) en stichting ANEMOON, stichting RAVON en de Zoogdierverseniging. Voor de gebiedsgerichte bescherming is onderzoek uitgevoerd naar aanwezigheid van relevante natuurterreinen in de omgeving, het betreft de Natura 2000 gebieden en het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Daarvoor is o.a. gebruik gemaakt van de website van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en die van de provincie Noord-Brabant.

#### 4.1.1 Waarnemingen flora en fauna

Volgens waarneming.nl zijn er van 1 tot 11 november 2022 67 waarnemingen van flora en fauna soorten in een straal van vijf kilometer rond het plangebied. Dit betreft waarnemingen van algemene soorten. Binnen een kilometer rond het plangebied is er 1 waarneming, namelijk de kerkuil.



Recente waarnemingen van flora en fauna soorten. Bron: waarneming.nl, d.d. 11-11-2022

## 4.2 Veldonderzoek

Op vrijdag 10 november 2020 in de middag heeft ecooloog Frenk van de Wal in het kader van het natuurwaardenonderzoek het veldonderzoek uitgevoerd aan het plangebied en de directe omgeving. De weersomstandigheden waren bewolkt met een zuidwestenwind met windkracht 3 en droog. De gemiddelde temperatuur lag rond de 12 graden Celsius.

Tijdens het veldonderzoek werd de ecologische potentie van de locatie en de directe omgeving in relatie met het mogelijk voorkomen van beschermde soorten onderzocht. Op de locatie werden alle aanwezige habitats opgenomen. De aanwezige habitats tijdens het veldbezoek en de waarnemingen uit het NDFF werden vergeleken met de habitatvereisten van beschermde planten- en diersoorten. Hierdoor werd ingeschat welke soorten potentieel voorkomen. Daarbij zijn de in het plangebied aanwezige ruimtelijke structuren en ecotopen geïnventariseerd. Naast de biotopen zijn directe en indirecte aanwijzingen opgenomen die kunnen duiden op het voorkomen van beschermde soorten. Behalve het fysiek aantreffen van exemplaren van soorten is er ook gelet op bijv. hollen, uitwerpselen, prooiresten, braakballen vraat-, loop- en veegsporen. Deze waarnemingen zijn bij de beoordeling betrokken. Op basis van deze vergelijking en expert judgement is beoordeeld welke van deze soorten in het plangebied kunnen voorkomen. De bebouwing is zowel aan de binnenzijde als buitenzijde uitgebreid visueel onderzocht.

## 4.3 Beschrijving plangebied

Het plangebied is gelegen aan de zuidkant van de kern van Oijen in de bebouwde kom en is omgeven door agrarische percelen met vooral weilanden en bedrijven. Aan de oostkant van het plangebied ligt de Bernhardweg met berm, fietspad en sloot welke behouden zal blijven. De inrit van plangebied naar en naast de woning en schuur is verhard met betonklinkers en gegoten beton. De bebouwing bestaat uit een woning met aangebouwde schuur met aanbouw en een naast de woning gelegen sleuvsilo. De gronden om de bebouwing heen bestaat uit grasland van vooral Engels raaigras met enkele normaal voorkomende kruiden.



Op een vijftal struiken na in de voortuin is er geen vegetatie in de vorm van bomen of struiken op het perceel.

De woning en schuur zijn gebouwd met betonstenen en hebben allebei een dak van golfplaten. De voorgevel van de schuur is voorzien van drie grote schuifdeuren en vanaf een hoogte van ongeveer 2,8 meter bestaat de wand uit golfplaten. Aan de voorzijde is een afdak gebouwd en achter de schuur is een loods gebouwd met een open zijde waarbij het dak in lessenaarsvorm doorloopt. De wanden van de loods zijn van damwandprofielen. De schuur wordt deels gebruikt voor de stalling van vee en deels voor landbouwvoertuigen. De aangebouwde loods wordt gebruikt voor stalling van landbouwmachines. Achter de loods bevindt zich een stalen container met paardenboxen. De schuur en loods zijn aan de wanden of dak niet geïsoleerd of onderschoten.

De woning bestaat uit spouwmuren van betonstenen aan de buitenzijde en besmeerde muren aan de binnenzijde. Het dak, in lessenaarsvorm is van golfplaten welke aan de onderzijde onderschoten zijn. De golven van het dak zijn dichtgemaakt met betimmering als vogelschroot. Aan de zijwanden bevinden zich getimmerde boeiboorden om de overgang van muur en dak af te sluiten.

Naast de woning en voor de schuur is een sleufsilo met een betonnen ondergrond en opgaande halfsteense muurtjes van ongeveer 0,8 meter hoog.

Initiatiefnemer wenst de schuur te vergroten en de woning te verbouwen waarbij deze voorzien zal worden van een nieuw dak.



*Overzicht voorzijde plangebied*



*Sloot langs fietspad en berm Bernhardweg*



*Voorzijde woonhuis*



*Voorzijde schuur*





*Achterzijde bebouwing*



*Achterzijde loods en stal met container*



*Zijgevel woning*



*Container*



*Binnenzijde schuur*



*Binnenzijde loods*



## 5. BESCHERMDE NATUURWAARDEN


Het volledig overzicht van de output van beschermde soorten van tabel 2 en 3 en vogels met mogelijk jaarrond beschermde nesten is door middel van quickscanhulp.nl opgenomen in bijlage 1. Bijlage 2 is een opsomming van beschermde soorten onder paragraaf 3.2 van de wet natuurbescherming. Bijlage 3 geeft een opsomming van de beschermde soorten onder paragraaf 3.3. Bij het veldonderzoek is het plangebied onderzocht op het voorkomen van beschermde soorten of resten hiervan. Er is met name geïnspecteerd op potentiële groei-, rust-, nest-, en verblijfplaatsen voor beschermde soorten.

Per soortgroep wordt in onderstaande beschreven welke soorten er zijn waargenomen tijdens veldbezoek, welke soorten voorkomen in de omgeving, welke soorten worden verwacht in het plangebied, en welke effecten (mogelijk) aan de orde zijn.

### 5.1 Gebiedsbescherming

#### 5.1.1 Natura 2000

Het plangebied ligt op minimaal 6 kilometer afstand van noordwestelijk gelegen gronden behorend tot Natura 2000 gebied Rijntakken. Op ongeveer 20 kilometer afstand naar het zuidwesten ligt Natura 2000 gebied Vlijmens ven, Moerputten & Bossche Broek en zuidoostelijk op 29 kilometer Natura 2000 gebied Sints Jansberg. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van Natura 2000 gebieden in de omgeving van het plangebied weergegeven. De ligging van het plangebied wordt met een rode cirkel aangegeven. Natura 2000 gebieden zijn in rood en blauw aangegeven.



Natura 2000 gebieden. De afstand tussen het plangebied en Natura 2000 is met een pijl aangegeven. Bron: [natura2000.eea.europa.eu](http://natura2000.eea.europa.eu)

Doordat het plangebied buiten het Natura 2000 gebied ligt kunnen alleen effecten optreden als gevolg van externe werking. Ten aanzien van Natura 2000 gebieden dient er o.a. zekerheid geboden te worden betreffende het niet optreden van een verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten. Gezien de aard en omvang van het voornemen, de locatie, de effectafstand tot Natura 2000 gebieden en het effectbereik, zijn externe effecten op voorhand uit te sluiten. Een Aeries berekening kan dit staven.

### 5.1.2 Natuurnetwerk Nederland

Het plangebied ligt op minimaal 570 meter afstand van gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland behoren. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied weergegeven. De ligging van het plangebied wordt met een rode cirkel aangegeven. De NNN-gebieden in groen.



Natuur Netwerk Nederland gebieden. De afstand tussen het plangebied en NNN is met een pijl aangegeven. Bron: Atlasleefomgeving

In of in de directe nabijheid van een NNN-gebied zijn geen ontwikkelingen toegestaan die de 'wezenlijke kenmerken of waarden' aantasten. Het plangebied ligt niet in, of direct aangrenzend aan het NNN-gebied. De significante aanpassing van en negatieve effecten door externe werking op de wezenlijke kenmerken en waarden van de NNN zijn, gezien de omvang, de aard, het effectbereik en de locatie van het voornemen, op voorhand uit te sluiten.

### 5.1.3 Conclusie

Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000 gebied. Vanwege de ligging buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties. Het is niet aannemelijk dat de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op instandhoudingsdoelen van Natura 2000 gebied. Een toets met compensatieplicht is daarmee niet aan de orde.



## 5.2 Soortenbescherming

### 5.2.1 Flora

Volgens de NDFF zijn er bij project Bernhardweg met nummer BE-0456 d.d. 11 november 2022 (bijlage 1) de laatste vijf jaar geen waarnemingen van beschermde plantensoorten binnen een straal van twee kilometer rond het plangebied.

Het plangebied bestaat uit naast bebouwing en verharding vooral uit grasland en biedt vanwege de inrichting, het beheer en gebruik geen geschikt habitat voor beschermde plantensoorten.

### Conclusie

Binnen het plangebied ontbreken houtopstanden die voldoen aan de criteria die Wet natuurbescherming stelt om als beschermde houtopstand aangemerkt te worden. De weinige struiken op het perceel kunnen als tuinbeplanting aangemerkt worden en vallen daardoor buiten de bescherming van de Wet natuurbescherming. Overtreding van Wet natuurbescherming op dit punt kan uitgesloten worden.

### 5.2.2 Zoogdieren

Volgens de NDFF zijn er de laatste vijf jaar 21 zoogdiersoorten aangetroffen binnen een straal van twee kilometer rond het plangebied. Hiertoe behoren 7 vleermuissoorten, 3 marterachtigen en 11 overige soorten.

### Vleermuizen

Alle soorten vleermuizen vallen onder de groep strikt beschermde soorten. Dit betekent dat ze beschermd zijn tegen verstoring van vaste rust- en verblijfplaatsen. Onder deze vaste rust- en verblijfplaatsen wordt verstaan: 'het gehele systeem waarvan een populatie gebruik maakt tijdens de jaarcyclus van de soort'. Dit houdt in dat niet alleen verblijfplaatsen, maar ook belangrijke verbindingen hiertussen (vlieg- en foerageerroutes) beschermd zijn. Voor alle vleermuissoorten geldt geen vrijstelling of ontheffingsverlening indien het puur gaat om een ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. De checklist vleermuisprotocol 2021 geeft voor gebouwen de volgende drie aandachtspunten: Zijn er potentieel aanwezige ruimtes voor winter-, kraam-, zomer- en paarverblijfplaatsen, zijn er sporen van aanwezigheid en is er sprake van een foerageergebied? De vleermuissoorten die volgens het NDFF de laatste vijf jaar zijn waargenomen binnen een straal van twee kilometer rond het plangebied zijn te vinden in de onderstaande tabel.

| Vleermuis soort                 | Afstand plangebied | Habitat en bescherming                         |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| <b>Gewone dwergvleermuis</b>    | 2 km               | Vooraf bebouwing, strikt beschermd             |
| <b>Kleine dwergvleermuis</b>    | 2 km               | Vooraf bebouwing, soms bomen, strikt beschermd |
| <b>Grijze grootoorvleermuis</b> | 2 km               | Vooraf bebouwing, strikt beschermd             |
| <b>Gewone grootoorvleermuis</b> | 2 km               | Soms bebouwing, soms bomen, strikt beschermd   |
| <b>Laatvlieger</b>              | 2 km               | Vaak bebouwing, strikt beschermd               |
| <b>Meervleermuis</b>            | 2 km               | Vooraf bebouwing, strikt beschermd             |
| <b>Ruige dwergvleermuis</b>     | 2 km               | Vooraf bomen, strikt beschermd                 |

Het plangebied is beoordeeld op de geschiktheid als vleermuishabitat. Er zijn vleermuizen die in bomen hun verblijfplaatsen onderhouden en soorten die in gebouwen verblijven.

In het plangebied zijn geen bomen aanwezig waarin vleermuizen mogelijk verblijfplaatsen kunnen hebben. Vleermuisverblijfplaatsen in bebouwing kunnen aangetroffen worden onder dakpannen, tussen dakbeschoot, boeiboorden, onder gevelbekleding, in spleten en kieren in muren of in de spouw door open stootvoegen.



In de te verbouwen gebouwen zijn geen potenties voor vleermuisverblijfplaatsen waargenomen tijdens het veldbezoek. De woning en schuur zijn opgetrokken uit geheel dichte stenen muren zonder stootvoegen. De muren van de schuur zijn als steense muren ook geheel gesloten en de wanden van de aangebouwde loods zijn van damwand.

Boven op de gemetselde muur van de schuur ligt een muurplaat waartegen de daarboven bevestigde golfplaten vastgemaakt zijn. Het dak van zowel de loods als ook de schuur is niet geïsoleerd waardoor er voor vleermuizen geen mogelijkheden voor verblijfplaatsen aanwezig zijn.

De woning in het plangebied beschikt over een holle spouw, maar er zijn geen potentiële invliegopeningen, zoals stootvoegen, in de buitengevels van de woning waargenomen. Ook zijn de overstekbetimmeringen strak tegen de buitengevels geplaatst, waardoor geen gaten en kieren ontstaan die vleermuizen de kans bieden de spouw te betreden. Ook zijn er geen andere potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen, zoals een holle ruimte achter een vensterluik, dakpan of loodslab in het plangebied waargenomen.

Vleermuizen oriënteren zich op lijnvormige elementen in het landschap zoals bomenlanen, kanalen of houtwallen, om zich te verplaatsen van verblijfplaats naar foerageergebieden. In het plangebied zelf zijn geen lijnvormige elementen aanwezig die kunnen dienen als vliegroute voor vleermuizen. Foeragerende vleermuizen in (de omgeving van) het projectgebied zouden voor kunnen komen. Door een landschappelijke inpassing van het plangebied en natuurinclusief te bouwen zal het leefgebied van vleermuizen verbeteren. Alle structuren waren goed toegankelijk en visueel goed te onderzoeken.




Binnenzijde schuur



Binnenzijde schuur



gesloten muur woning met boeiboord



Aansluitende boeiboord

### **Marterachtigen**

Marterachtigen hebben voor hun overleving drie zaken nodig: dekking, verbinding en rustplaatsen. Deze dieren zijn vooral 's nachts actief waardoor het fysiek aantreffen van individuen tijdens een veldbezoek zeer onwaarschijnlijk is. Bij onderzoek naar marters wordt daarom vooral gekeken naar sporen van de aanwezigheid van marters. De aanwezigheid van de marterachtigen verraad zich vaak door uitwerpselen,

prooiresten en stank. De marterachtigen die volgens het NDFF de laatste vijf jaar zijn waargenomen binnen een straal van twee kilometer rond het plangebied zijn te vinden in de onderstaande tabel.

| Marter soort       | Afstand plangebied | Bescherming |
|--------------------|--------------------|-------------|
| <b>Das</b>         | 2 km               | Beschermd   |
| <b>Steenmarter</b> | 2 km               | Beschermd   |
| <b>Wezel</b>       | 2 km               | Beschermd   |

### Das

De das leeft in allerlei soorten biotopen, met een voorkeur voor kleinschalig akker- en weidelandschap met verspreide bosjes, heggen en houtwallen. Maar ook open terreinen, zoals vochtige heiden en rivierdalen zijn geschikte leefgebieden. Het leefgebied van de das moet voldoen aan voldoende dekking, weinig verstoring, een groot voedselaanbod en een bodem waarin ze goed een burcht kunnen graven, met een grondwaterstand van tenminste 1,5 m onder het maaiveld. Dassen foerageren in kort gras, omdat hier het voedsel het gemakkelijkst te vinden is.

### Steenmarter

De steenmarter is een soort van steenachtige biotopen en schuilplaatsen. De soort komt met name voor aan de rand van dorpen en steden, maar is ook te vinden nabij boerderijen en kleinschalige cultuurlandschappen. De steenmarter vindt vaste verblijfplaatsen in oude schuurtjes met weinig menselijke activiteit of woningen met toegankelijke zolder-, en of kruipruimten.

### Wezel

De wezel zoekt graag dekking op, bijvoorbeeld bij bosschages, houtstapels of heggen. Ook bewonen ze vaak oude holen van muizen, ratten en konijnen die bekleed wordt met veren of haren van prooidieren. Goede schuilmogelijkheden en de aanwezigheid van voldoende geschikt voedsel zijn de enige eisen die de wezel aan zijn omgeving stelt.

Landschapselementen die het plangebied tot een geschikt leefgebied maken voor marterachtigen ontbreken geheel. Het plangebied is te opgeruimd en de schuur en loods worden bezemschoon gehouden. Daardoor zijn er voor marterachtigen geen ruigtehoekjes aanwezig om te schuilen.

De aanwezigheid van marterachtigen verraad zich vaak door uitwerpselen, prooiresten en stank. Tijdens het veldbezoek is gelet op sporen van aanwezigheid van voornoemde marterachtigen. Er zijn geen aanwijzingen gevonden die duiden op aanwezigheid van deze.

Zodoende is het uitgesloten dat het plangebied een belangrijk onderdeel vormt van het leefgebied van marterachtigen.

### Overige beschermde soorten

De overige beschermde soorten omvatten vooral knaagdieren en algemeen voorkomende soorten. Sommige van deze soorten zijn beschermd, maar een aantal van deze soorten vallen er in de provincie Noord-Brabant tot de vrijgestelde soorten. Voor soorten uit deze categorie betekent dat bij ruimtelijke ontwikkeling er geen ontheffing hoeft te worden gevraagd en dat rust- of verblijfplaatsen verwijderd mogen worden, wanneer geen andere bevredigende oplossing bestaat. Het is echter wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezige individuen en al het redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om het doden van individuen te voorkomen. In de onderstaande tabel zijn de overige beschermde zoogdiersoorten te vinden die volgens het NDFF de laatste vijf jaar zijn waargenomen binnen een straal van twee kilometer rond het plangebied.

| Overige soort   | Afstand plangebied | Bescherming |
|-----------------|--------------------|-------------|
| <b>Bever</b>    | 2 km               | Beschermd   |
| <b>Bosmuis</b>  | 2 km               | Vrijgesteld |
| <b>Eekhoorn</b> | 2 km               | Beschermd   |

|                      |      |                                     |
|----------------------|------|-------------------------------------|
| <b>Egel</b>          | 2 km | Vrijgesteld                         |
| <b>Haas</b>          | 2 km | Vrijgesteld                         |
| <b>Konijn</b>        | 2 km | Vrijgesteld                         |
| <b>Huisspitsmuis</b> | 2 km | Vrijgesteld                         |
| <b>Vos</b>           | 2 km | Beschermd                           |
| <b>Ree</b>           | 2 km | Beschermd, alleen in natuurgebieden |
| <b>Wolf</b>          | 2 km | Beschermd                           |

Het plangebied is door de ligging en inrichting geen essentieel onderdeel van het leefgebied voor de bever, eekhoorn, vos, ree of wolf. Het is aannemelijk dat er een enkel individu van een beschermde soort in de planlocatie kan worden aangetroffen, zoals egel, mol, veldmuis en bepaalde spitsmuizen. Deze soorten zijn weliswaar beschermd, maar behoren in de provincie Noord-Brabant tot de vrijgestelde soorten.

### **Conclusie**

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord, verwond of gedood en wordt er geen rust- of verblijfplaats beschadigd of vernield. Er is dus geen ontheffing nodig voor deze soortgroep.

In de omgeving van het plangebied is en blijft voldoende geschikt foerageergebied aanwezig voor vleermuizen. De werkzaamheden hebben geen significant negatief effecten op foerageergebieden van vleermuizen.

In het plangebied komen geen marterachtigen voor. Het is mogelijk dat er een enkele individu van een vrijgestelde soort aanwezig is in het plangebied. De zorgplicht is altijd van kracht. Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde zoogdieren waargenomen.

### **5.2.3 Vogels**

In de Wet natuurbescherming worden alle broedende vogels strikt beschermd op grond van de Vogelrichtlijn waardoor alle bewoonde nesten in het broedseizoen vallen onder de bescherming van deze wet.

De Wet natuurbescherming hanteert geen standaardperiode voor het broedseizoen, maar voor de volledigheid wordt vaak gesproken van half maart tot half juli. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Men dient daarom gedurende kap- en sloopwerkzaamheden rekening te houden met het broedseizoen van vogels. Overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van vogels wordt voorkomen door bepaalde werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. Van een aantal vogelsoorten worden de nesten ook buiten het broedseizoen beschermd. De zogenaamde 'Jaarrond beschermde verblijfplaatsen'. Als deze nesten door een ruimtelijke ontwikkeling verdwijnen, kan afhankelijk van de soort die het nest gebruikt, een ontheffingsaanvraag noodzakelijk zijn. De bescherming van vogels kan worden opgedeeld in 5 categorieën.

#### **Categorie 1-4**

De eerste 4 categorieën betreffen vogels welke zeer honkvast broeden en (1-4) of welke zelf niet of nauwelijks in staat zijn om een eigen nest te bouwen (4). De vogelsoorten die volgens het NDFF de laatste vijf jaar zijn waargenomen in een straal van twee kilometer rond het plangebied zijn te vinden in de onderstaande tabel.

| <b>Soort</b>                 | <b>Afstand plangebied</b> | <b>Bescherming categorie* en habitat</b> |
|------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| <b>Boomvalk</b>              | 2 km                      | 4, boom bewonend                         |
| <b>Buizerd</b>               | 2 km                      | 4, boom bewonend                         |
| <b>Gierzwaluw</b>            | 2 km                      | 2, gebouw bewonend                       |
| <b>Grote gele kwikstaart</b> | 2 km                      | 3, boom of gebouw bewonend               |
| <b>Havik</b>                 | 2 km                      | 4, boom bewonend                         |
| <b>Huismus</b>               | 2 km                      | 2, gebouw bewonend                       |
| <b>Kerkuil</b>               | 2 km                      | 3, gebouw bewonend                       |
| <b>Ooievaar</b>              | 2 km                      | 3, boom of gebouw bewonend               |

|                    |      |                    |
|--------------------|------|--------------------|
| <b>Ransuil</b>     | 2 km | 4, boom bewonend   |
| <b>Roek</b>        | 2 km | 2, boom bewonend   |
| <b>Slechtvalk</b>  | 2 km | 3, gebouw bewonend |
| <b>Sperwer</b>     | 2 km | 4, boom bewonend   |
| <b>Steenuil</b>    | 2 km | 1, gebouw bewonend |
| <b>Wespendief</b>  | 2 km | 4, boom bewonend   |
| <b>Zwarte wouw</b> | 2 km | 4, boom bewonend   |

\* Op de volgende categorieën gelden de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming het gehele seizoen:

1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats.
2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen.

### Gierzwaluw

De gierzwaluw is voor zijn voortplanting bijna uitsluitend gebonden aan menselijke bewoning en daarom komt hij in de zomer veelal in grotere dorpen en steden voor. Op de planlocatie zijn geen mogelijkheden voor gierzwaluwen om te nestelen. Bovendien staan de gebouwen in een minder bebouwde omgeving.

### Uilen

Steenuil en kerkuil schuwen de menselijke omgeving niet en broeden ook onder daken en op zolders van huizen, loodsen en schuren, maar waarbij de aanwezigheid van geschikt foerageergebied in de directe omgeving noodzakelijk is. Nest- en rustplaatsen van steenuil en kerkuil zijn jaarrond beschermd. Onlangs is er in de nabijheid van het plangebied een kerkuil waargenomen.

Tijdens het veldbezoek is de bebouwing intensief onderzocht op sporen van aanwezigheid van kerkuil en steenuil zoals braakballen, krijtsporen tegen muren of rui veren. Er zijn geen sporen van aanwezigheid van uilen aangetroffen.

### Huismus

Vanwege de beperkte actieradius (enkele honderden meters) van Huismus (Baijens et al. 2005) zijn drie essentiële onderdelen van het leefgebied van belang voor de Huismus: nestlocatie, habitat met voedselaanbod en beschutting. Alle voorzieningen dienen dichtbij elkaar te liggen. Bij voorkeur binnen een straal van enkele honderden meters van het plangebied.

Er zijn tijdens het veldbezoek geen huismussen gezien. Er zijn voor huismussen geen schuilmogelijkheden op de planlocatie en daarnaast is het dak van de woning onder andere wegens het aanwezige vogelschroot ontoegankelijk voor huismussen om er te nestelen.

### Ooievaar, roek en grote gele kwikstaart

Als carnivoor eet de ooievaar een breed scala aan dierlijke prooien, inclusief insecten, vissen, amfibieën, reptielen, kleine zoogdieren en kleine vogels. Hij pakt het meeste voedsel van de grond, tussen lage vegetatie en uit ondiep water. Het is een monogame broeder, maar vormt geen paar voor het leven. Het paar bouwt een nest bestaande uit grote takken, dat soms jaren wordt gebruikt.

Het leefgebied van de roek is open akker- en weideland, afgewisseld met bomen, bosjes, bomenrijen en heggen. De vogel gedijt goed in menselijk cultuurland als hij niet wordt bejaagd. Vooral de aanwezigheid van akkers is gunstig. Roeken hebben voorkeur voor hoge bomen, bij voorkeur niet in een bos maar een losse opstand. Het boomtype maakt niet zoveel uit. Als in het voorjaar de boomkruinen nog kaal zijn, zijn alle nesten van een roekenkolonie goed zichtbaar.

In het voorjaar en 's zomers is de grote gele kwikstaart te vinden in de buurt van waterstroompjes, vooral in de bergen en heuvels. De vogel nestelt in holten in de buurt van water. 's Winters bevinden ze zich bij lageregelegen water en aan de kust. Geen van de biotopen van genoemde vogelsoorten komt echter voor in het plangebied waardoor het voorkomen van deze drie uitgesloten kan worden.

### Roofvogels

De habitat van roofvogels bestaat, afhankelijk van de soort, uit een bos of een grote (half)open vlakte waar de vogels kunnen jagen. Daarnaast hebben ze in hun leefgebied een geschikte boom nodig waarin een nest



gebouwd kan worden. Rondom het plangebied is open vlakte aanwezig maar er zijn geen bomen in het plangebied. Het is dus uit te sluiten dat het plangebied onderdeel is van de habitat van een boom bewonende roofvogelsoort. De slechtvalk broedt bij voorkeur in hoge gebouwen (>4 verdiepingen). Er is voor de slechtvalk geen geschikte habitat aanwezig in het plangebied.

### **Categorie 5**

Categorie 5- soorten zijn alleen jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. In het algemeen geldt niet zozeer de bescherming van de nestplek zelf, maar meer de schaarste van dit type nestgelegenheid. Het betreft voornamelijk hollenbroeders of vogels die een groot nest bouwen als zwarte kraai of ekster, waarvan enkele andere soorten vogels gebruik maken die niet in staat zijn om zelfstandig een nest te bouwen. (bijv. ransuil, torenvalk en boomvalk). Tijdens het veldbezoek zijn uit deze categorie geen nesten in bomen in het plangebied aangetroffen. Ook zijn geen bomen met geschikte holtes aanwezig.

### **Boerenzwaluw**

De boerenzwaluw staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en de nestplaatsen ervan zijn jaarrond beschermd. Broedvogels keren jaarlijks terug naar dezelfde kolonie, al zijn vooral de vrouwtjes minder plaats trouw. Jonge vogels zoeken een geschikte nestplek in de omgeving van hun ouderlijk nest. Er is in de open loods gezocht naar nesten van boerenzwaluwen, maar er zijn geen nesten aangetroffen.

### **Overige Vogelrichtlijnsoorten**

In het plangebied zijn zeer beperkt mogelijkheden voor nestgelegenheid voor overige vogelrichtlijnsoorten waarvan de nesten alleen gedurende het broedseizoen beschermd zijn. Er is in het plangebied geen geschikt opgaand groen aanwezig waarin algemene vogelrichtlijnsoorten broedgelegenheid vinden. Met de beoogde herontwikkeling en de bijbehorende robuuste landschappelijke inpassing met streekeigen groen zullen nest- en foerageergelegenheid voor overige tuin-, - en struweelvogels toenemen.

### **Conclusie**

Er zijn tijdens het veldbezoek geen bomen waargenomen waarvan beschermde soorten gebruik kunnen maken. Het plangebied biedt zeer beperkt schuil- en foerageer mogelijkheden voor kleine vogelsoorten. Er zullen geen vaste rust- en verblijfplaatsen van huismussen, gierzwaluwen, uilen of roofvogels verloren gaan en er worden geen verbodsbepalingen uit de Wet Natuurbescherming overtreden. Een ontheffingsaanvraag is niet noodzakelijk. De planlocatie was visueel goed te onderzoeken.

## **5.2.4 Amfibieën, reptielen, vissen, vlinders en libellen**

### **Amfibieën, vissen en reptielen**

Amfibieën, reptielen en vissen zijn gedurende een groot deel van hun leven afhankelijk van waterstructuren. Vooral tijdens het voortplantingsseizoen is het erg belangrijk om waterstructuren in plangebieden te onderzoeken op de aanwezigheid reptielen en amfibieën die de waterstructuren als voortplantingslocatie gebruiken. Hierbij gaat het bij amfibieën en reptielen om een waterstructuur van maximaal 1,5 meter diep. De soorten die volgens het NDFF de laatste vijf jaar zijn waargenomen in een straal van twee kilometer rond het plangebied zijn te vinden in de onderstaande tabel.

| Soort                         | Afstand plangebied | Soortgroep en bescherming |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>Bastaardkikker</b>         | 2 km               | Amfibieën, beschermd      |
| <b>Gewone pad</b>             | 2 km               | Amfibieën, beschermd      |
| <b>Groene kikker</b>          | 2 km               | Amfibieën, beschermd      |
| <b>Grote modderkruiper</b>    | 2 km               | Vissen, beschermd         |
| <b>Kleine watersalamander</b> | 2 km               | Amfibieën, beschermd      |
| <b>Poelkikker</b>             | 2 km               | Amfibieën, beschermd      |

De aanwezigheid van deze beschermde soorten is uit te sluiten. Beschermde amfibie- of vissoorten zullen geen gebruik maken van het plangebied als voortplantingsgebied, de ontwikkeling is land gebonden en er zullen geen waterstructuren worden aangetast. De aanwezige waterloop aan de zijde van de Bernhardweg blijft behouden zoals deze is.

Het is echter altijd noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezige individuen en al het redelijkerwijs mogelijke dient te worden gedaan om het doden van individuen te voorkomen. De ingreep leidt niet tot een overtreding van de Wet natuurbescherming voor deze soortengroepen. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

### **Vlinders en libellen**

Volgens de NDFF zijn er de laatste vijf jaar geen waarnemingen van dagvlindersoorten binnen een straal van twee kilometer rond het plangebied. Er zijn waarnemingen van 1 libellensoort en 1 nachtvlindersoort. Deze soorten zijn te vinden in de onderstaande tabel.

In het plangebied ontbreken specifieke biotopen en waardplanten voor beschermde libellen en dagvlinders. Er zouden wel algemene vlindersoorten in het plangebied voor kunnen komen zoals klein koolwitje, boomblauwtje en citroenvlinder.

| Soort                        | Afstand plangebied | Soortgroep en habitat                                                                                             |
|------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teunisbloempijlstaart</b> | 2 km               | Nachtvlinder, vochtige bossen en bosranden, waardplant: teunisbloem, wilgenroosje, basterdwederik en kattenstaart |
| <b>Rivierrombout</b>         | 2 km               | Libellen, rivieren en grote beken, vooral op plaatsen waar zand of slib is afgezet                                |

### **Overige soorten**

Er zijn de laatste vijf jaar in een straal van twee kilometer rond het plangebied geen waarnemingen van beschermde soorten.

Overige beschermde soorten insecten zijn afhankelijk van bijzondere habitattypen als oude (eiken)bossen met boomholtes en rottend hout, of onvervuilde, voedselarme wateren met specifieke vegetaties. Deze biotopen zijn niet aanwezig in het plangebied en de directe omgeving.

### **Conclusie**

In het plangebied is geen geschikt leefgebied voor beschermde dagvlinders en libellen en deze zijn tijdens het veldbezoek ook niet waargenomen. Het voorkomen van beschermde dagvlinders en libellen kan uitgesloten worden. Ook voor overige soorten ongewervelden zoals beschermde kevers, kreeften of slakken vormt het plangebied geen geschikt habitat. Het plangebied biedt uitsluitend leefgebied voor algemene vlinder- en (zwervende) libellensoorten en overige algemene soorten ongewervelden. Door het ontbreken aan oppervlaktewater in het plangebied is het voorkomen van beschermde vissoorten uit te sluiten.



Zoals beschreven betreft de onderhavige ecologische quickscan een momentopname van de actuele situatie.

### 6.1 Resultaten

Het plangebied heeft geen hoge ecologische waarde door het afwezig zijn van enige vegetatie. De omgeving van het plangebied bestaat vooral uit grasland dat intensief wordt bewerkt en bemest.

Op basis van de uitgevoerde quickscan wordt geconcludeerd dat er geen beschermde flora en fauna in het plangebied voorkomen. Met de verbouw van de woning en uitbreiding van de schuur zijn geen overtredingen te verwachten ten aanzien van de Wet natuurbescherming.

Door de locatie na de bouw geheel planologische in te passen en natuurinclusief te bouwen zal het leefgebied van genoemde soorten worden verbeterd.

### 6.2 Advies en aanbevelingen

#### Nader onderzoek

Op basis van het veldonderzoek en de analyse van de bestaande situatie kan het voorkomen van beschermde flora en fauna worden uitgesloten. Hierdoor wordt dan ook niet aanbevolen om een nadere inventarisatie door middel van extra veldonderzoek uit te voeren.

#### Wet natuurbescherming

- De ingreep zal naar verwachting niet leiden tot verlies van leefgebied van beschermde soorten. De ingreep heeft geen invloed op de gunstige staat van instandhouding. Een ontheffing Wet natuurbescherming is daarom niet noodzakelijk.
- Voor alle beschermde, inheemse (ook de algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt vanuit de Wet natuurbescherming een verbod op handelingen die nesten, vaste rust-of verblijfplaatsen of eieren beschadigen of verstoren. In de praktijk betekent dit dat versturende werkzaamheden alleen buiten het broedseizoen uitgevoerd mogen worden (15 maart - 15 juli). Van belang is of een broedgeval verstoord wordt, ongeacht de datum. Werkzaamheden binnen het broedseizoen zijn mogelijk indien is vastgesteld dat er met de werkzaamheden geen nesten van broedvogels worden verstoord.
- In de nabije omgeving van het plangebied komen geen Natura 2000 gebieden voor. Het is met de voorgenomen werkzaamheden echter niet uit te sluiten dat deze leiden tot een verhoging van stikstofdepositie op een Natura 2.000 gebied. Voor de ingreep dient daarom een Aeries berekening te worden uitgevoerd.
- In het kader van de zorgplicht dient men tijdens de uitvoering van werkzaamheden alert te zijn op aanwezige fauna en daarbij, indien noodzakelijk, mitigerende maatregelen te treffen.
- Bij onvoorziene omstandigheden dient er direct contact opgenomen te worden met een ter zake deskundige.

#### Aanbevelingen

Bij onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld indien een soort die niet in de quickscan wordt genoemd in het terrein wordt geconstateerd bij aanvang van de werkzaamheden, dient hier passend op te worden gereageerd. Het is hierbij nodig om contact op te nemen met een ter zake kundige en een maatregel toe te passen, zodat de wet niet wordt overtreden.

Door de voorgenomen werkzaamheden bestaat de kans dat holen van algemene soorten als konijn, egel en diverse muizensoorten worden vergraven. De volgende maatregelen zijn nodig om rekening te houden met deze soorten:

- Indien er verstoring plaatsvindt, dient er een passende vluchtroute beschikbaar te zijn. Dit geldt in het bijzonder voor vogels en grondgebonden zoogdieren (zoals muizen en egels).
- Werk vanaf één zijde en bij voorkeur van een drukke naar een rustige locatie toe, zoals een open veld of ruigte. Werk ook op een aangepast tempo, zodat dieren kunnen vluchten.
- Kunstmatige verlichting werkt verstrend op zoogdieren en andere fauna. Werk daarom niet tussen zonsondergang en zonsopkomst.
- Voorkom of beperk daarnaast de toepassing van kunstlicht en de verstrooiing van licht buiten de projectlocatie. Voorkom ook het direct schijnen op wateroppervlakken of groenelementen, zoals bosschages en ruigtes (met name voor vleermuizen).

Gelet op de algemene zorgplicht dienen voorafgaand aan de werkzaamheden alle maatregelen te worden getroffen om nadelige gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk te voorkomen, beperken of ongedaan te maken. Dit geldt altijd en voor alle planten- en diersoorten.

### **Natuurinclusief bouwen**

Diverse fauna soorten staan onder druk door steeds verder afnemende broed- en nestgelegenheid. Natuurinclusief bouwen is een verzamelterm voor tal van maatregelen en manieren om natuur te integreren bij de bouw van woningen, kantoren en andere gebouwen. Natuurinclusief bouwen bevordert de biodiversiteit en ons leefklimaat.

Vogelbescherming Nederland heeft een checklist ontwikkeld, waarmee iedere bouwonderneming zijn projecten en de directe omgeving natuurvriendelijker kan maken. ([www.checklistgroenbouwen.nl](http://www.checklistgroenbouwen.nl)).

Daarnaast zijn er op de website [www.bouwnatuurinclusief.nl](http://www.bouwnatuurinclusief.nl) veel tips om natuurinclusief te bouwen.

Voor de ontwikkeling van het plangebied Bernhardweg 33 raden wij de volgende natuur inclusieve maatregelen aan:

- Veel vleermuissoorten zijn afhankelijk van bebouwing als nestgelegenheid, maar onze huizen en verdere bebouwing worden steeds dichter. Vleermuizen kunnen zelf geen nest bouwen, maar maken gebruik van al bestaande holtes, zoals spleten en spouwen. Ze verblijven op verschillende plekken, afhankelijk van de periode van het jaar en de functie (zoals winter- of kraamverblijfplaats). Door het plaatsen van inmetstelstenen worden vleermuizen enorm geholpen bij het bieden van een verblijfplaats. Naast het plaatsen van vleermuisvoorzieningen kunt u ook ruimtes in het gebouw vrijlaten voor vleermuizen. Denk hierbij aan open stootvoegen om de spouw toegankelijk te maken, ruimte achter de gevelbetimmering te laten of ruimte maken in (dubbele) daklijsten.
- Bij de aanleg van groenstructuren in het plangebied worden bij voorkeur inheems (streekeigen) groen aangeplant. Groei en bloei van deze planten en de momenten waarop rupsen, bijen of vogels sterk van hun blad, nectar en stuifmeel afhankelijk zijn, zijn op elkaar afgestemd. Dit is een belangrijk verschil met uitheemse soorten, die vaak eerder en te vroeg uitlopen/bloeien. De voorkeur gaat uit naar en bes- en nootdragende struiken zoals sporkehout (vuilboom), Gelderse roos, wilde kardinaalsmuts, lijsterbes, hondsroos, sleedoorn of hazelaar. Deze zijn ten gunste van foerageerfuncties voor vogels, maar ook kleine knaagdieren, insecten en insectenetters zoals vleermuizen zullen hiervan profiteren. Huismussen zullen schuilgelegenheid vinden in stekelige struiken zoals bijv. (groenblijvende) hulst of meidoorn. Lindebomen trekken tijdens hun relatief lange bloeitijd grote aantallen insecten aan, en dus ook eerdergenoemde insectenetters.
- Op plaatsen waar wegen niet intensief gebruikt wordt, zoals parkeerplaatsen kan er halfbestrating worden gebruikt. De openingen tussen de stenen biedt ruimte aan planten die tolerant zijn voor betreding. De vegetatie ontwikkelt zich vanzelf, maar kan met inzaaien worden bevorderd. De planten zorgen voor zaden en insecten die weer dienen als voedsel voor vogels.
- Om de biodiversiteit van het begin van de kringloop te verhogen is het plaatsen van een insectenhotel aan te bevelen. Daarnaast is het wenselijk om een (kleine) bloementuin aan te leggen met speciale bijen/vlindermengsels of met planten die van nature in een berm kunnen voorkomen, zoals margriet, rode klaver, kleine pimpernel, wilde peen, duizendblad en gewoon knooppkruid.





*Vogelvide; bron: Vogelbescherming*



### **Websites**

[www.atlasleefomgeving.nl](http://www.atlasleefomgeving.nl)  
[www.brabant.nl](http://www.brabant.nl)  
[www.floron.nl](http://www.floron.nl)  
[www.ivn.nl](http://www.ivn.nl)  
[www.natuurmonumenten.nl](http://www.natuurmonumenten.nl)  
[www.natura2000.nl](http://www.natura2000.nl)  
[www.natura2000.eea.europa.eu](http://www.natura2000.eea.europa.eu)  
[www.NDFF.nl](http://www.NDFF.nl)  
[www.ravon.nl](http://www.ravon.nl)  
[www.rijksoverheid.nl](http://www.rijksoverheid.nl)  
[www.sovon.nl](http://www.sovon.nl)  
[www.verspreidingsatlas.nl](http://www.verspreidingsatlas.nl)  
[www.vivarapro.nl](http://www.vivarapro.nl)  
[www.vogelbescherming.nl](http://www.vogelbescherming.nl)  
[www.wetnatuurbescherming.nl](http://www.wetnatuurbescherming.nl)  
[www.wikipedia.nl](http://www.wikipedia.nl)

### **Andere bronnen**

Checklist vleermuisprotocol  
Limpens et al., 2014, 2017  
Baijens et al., 2005  
Netwerk groene bureaus

### **Bijlagen**

Bijlage 1: de verspreidingslijst van NDFF  
Bijlage 2: de beschermde soortenlijst par 3.2 Wet natuurbescherming  
Bijlage 3: de beschermde soortenlijst par 3.3 Wet natuurbescherming



**Bernhardweg**

BE-0456



13468 records

- Middelpunt < 1km<sup>2</sup>
- Middelpunt 1km<sup>2</sup> - 5km<sup>2</sup>

- Middelpunt > 5km<sup>2</sup>
- Vlak



schaal 1 : 1000

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

## Bernhardweg

BE-0456

### Zoekvraag

| Soort | Soortgroep | Wet en Beleid                                                                                                                     | Periode                           | Bronhouder | Zoekgebied                            |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Alle  | Alle       | Wnb - andere soorten<br>Wnb - andere soorten (NB)<br>Jaarrond beschermde nesten<br>Wnb - Vogelrichtlijn<br>Wnb - Habitatrichtlijn | 1 januari 2017 tot 1 januari 2023 | Alle       | Alles rakend aan of binnen zoekgebied |

### Samenvatting

(unieke soorten) / totaal aantal waarnemingen



**Bernhardweg**

**BE-0456**

| Beleid                            |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>Jaarrond beschermde nesten</b> | <b>(39) 9073</b> |
| Blauwe reiger                     | 1084             |
| Boerenwaluw                       | 395              |
| Boomklever                        | 7                |
| Boomkruiper                       | 40               |
| Boomvalk                          | 104              |
| Bosuil                            | 5                |
| Brilduiker                        | 65               |
| Buizerd                           | 889              |
| Ekster                            | 283              |
| Gekraagde roodstaart              | 6                |
| Gierzwaluw                        | 240              |
| Gauwe vliegenvanger               | 20               |
| Groene specht                     | 308              |
| Grote bonte specht                | 132              |
| Grote gele kwikstaart             | 9                |
| Havik                             | 42               |
| Huismus                           | 127              |
| Huiszwaluw                        | 131              |
| IJsvogel                          | 479              |
| Kerkuil                           | 29               |
| Kleine bonte specht               | 9                |
| Koolmees                          | 215              |
| Oeverzwaluw                       | 270              |
| Ooievaar                          | 1319             |
| Pimpelmees                        | 142              |
| Ransuil                           | 98               |
| Roek                              | 138              |
| Slechtvalk                        | 42               |
| Sperwer                           | 177              |
| Spreeuw                           | 472              |
| Steenuil                          | 103              |
| Tapuit                            | 80               |
| Torenvalk                         | 942              |
| Wespendief                        | 2                |
| Zeearend                          | 14               |
| Zwarte kraai                      | 640              |
| Zwarte mees                       | 2                |
| Zwarte roodstaart                 | 8                |
| Zwarte wouw                       | 5                |

**Bernhardweg**

BE-0456

| Beleid                                 |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| <b>Jaarrond beschermde nesten (FL)</b> | <b>(28) 7645</b> |
| Blauwe reiger                          | 1084             |
| Boerenwaluw                            | 395              |
| Boomvalk                               | 104              |
| Bosuil                                 | 5                |
| Buizerd                                | 889              |
| Gierzwaluw                             | 240              |
| Groene specht                          | 308              |
| Grote bonte specht                     | 132              |
| Grote gele kwikstaart                  | 9                |
| Havik                                  | 42               |
| Huismus                                | 127              |
| Huiszwaluw                             | 131              |
| Ijsvogel                               | 479              |
| Kerkuil                                | 29               |
| Kleine bonte specht                    | 9                |
| Oeverzwaluw                            | 270              |
| Ooievaar                               | 1319             |
| Ransuil                                | 98               |
| Roek                                   | 138              |
| Slechtvalk                             | 42               |
| Sperwer                                | 177              |
| Spreeuw                                | 472              |
| Steenuil                               | 103              |
| Tapuit                                 | 80               |
| Torenvalk                              | 942              |
| Wespendief                             | 2                |
| Zeearend                               | 14               |
| Zwarte wouw                            | 5                |

**Bernhardweg**

BE-0456

| Beleid                                 |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| <b>Jaarrond beschermde nesten (FR)</b> | <b>(29) 6501</b> |
| Bergeend                               | 66               |
| Blauwe reiger                          | 1084             |
| Boerenwaluw                            | 395              |
| Boomvalk                               | 104              |
| Bosuil                                 | 5                |
| Buizerd                                | 889              |
| Gierzwaluw                             | 240              |
| Grote gele kwikstaart                  | 9                |
| Grote zilverreiger                     | 9                |
| Havik                                  | 42               |
| Huismus                                | 127              |
| Huiswaluw                              | 131              |
| IJsvogel                               | 479              |
| Kerkuil                                | 29               |
| Kokmeeuw                               | 2                |
| Lepelaar                               | 1                |
| Ooievaar                               | 1319             |
| Ransuil                                | 98               |
| Ringmus                                | 5                |
| Roek                                   | 138              |
| Scholekster                            | 34               |
| Slechtvalk                             | 42               |
| Sperwer                                | 177              |
| Steenuil                               | 103              |
| Torenvalk                              | 942              |
| Visdief                                | 10               |
| Wespendief                             | 2                |
| Zeearend                               | 14               |
| Zwarte wouw                            | 5                |

**Bernhardweg**

**BE-0456**

| Beleid                                 |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| <b>Jaarrond beschermde nesten (LI)</b> | <b>(27) 6693</b> |
| Blauwe reiger                          | 1084             |
| Boerenwaluw                            | 395              |
| Boomvalk                               | 104              |
| Bosuil                                 | 5                |
| Buizerd                                | 889              |
| Gierzwaluw                             | 240              |
| Grote gele kwikstaart                  | 9                |
| Grutto                                 | 10               |
| Havik                                  | 42               |
| Huismus                                | 127              |
| Huiszwaluw                             | 131              |
| IJsvogel                               | 479              |
| Kerkuil                                | 29               |
| Oeverzwaluw                            | 270              |
| Ooievaar                               | 1319             |
| Ransuil                                | 98               |
| Ringmus                                | 5                |
| Roek                                   | 138              |
| Slechtvalk                             | 42               |
| Sperwer                                | 177              |
| Spotvogel                              | 20               |
| Steenuil                               | 103              |
| Torenavalk                             | 942              |
| Visdief                                | 10               |
| Wespendief                             | 2                |
| Wulp                                   | 18               |
| Zwarte wouw                            | 5                |



**Bernhardweg**

BE-0456

| Beleid                                 |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| <b>Jaarrond beschermde nesten (OV)</b> | <b>(28) 5519</b> |
| Boerenwaluw                            | 395              |
| Boomvalk                               | 104              |
| Bosuil                                 | 5                |
| Buizerd                                | 889              |
| Gierzwaluw                             | 240              |
| Grote gele kwikstaart                  | 9                |
| Havik                                  | 42               |
| Huismus                                | 127              |
| Huiszwaluw                             | 131              |
| IJsvogel                               | 479              |
| Kerkuil                                | 29               |
| Ooievaar                               | 1319             |
| Ransuil                                | 98               |
| Ringmus                                | 5                |
| Roek                                   | 138              |
| Slechtvalk                             | 42               |
| Sperwer                                | 177              |
| Steenuil                               | 103              |
| Tapuit                                 | 80               |
| Torenvalk                              | 942              |
| Tureluur                               | 14               |
| Veldleeuwerik                          | 102              |
| Wespendief                             | 2                |
| Wulp                                   | 18               |
| Zeearend                               | 14               |
| Zwarte mees                            | 2                |
| Zwarte roodstaart                      | 8                |
| Zwarte wouw                            | 5                |
| <b>RL: Bedreigd</b>                    | <b>(3) 86</b>    |
| Pijlstaart                             | 2                |
| Tapuit                                 | 80               |
| Zomertaling                            | 4                |

**Bernhardweg**

BE-0456

Beleid

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>RL: Gevoelig</b>  | <b>(22) 1271</b> |
| Boerenwaluw          | 395              |
| Brilduiker           | 65               |
| Gele kwikstaart      | 61               |
| Graspieper           | 12               |
| Grauwe vliegenvanger | 20               |
| Grutto               | 10               |
| Haas                 | 171              |
| Huismus              | 127              |
| Huiswaluw            | 131              |
| Kleine zilverreiger  | 8                |
| Kneu                 | 78               |
| Konijn               | 20               |
| Oeverloper           | 2                |
| Ringmus              | 5                |
| Smient               | 1                |
| Spotvogel            | 20               |
| Tureluur             | 14               |
| Veldleeuwerik        | 102              |
| Visdief              | 10               |
| Wezel                | 3                |
| Zeearend             | 14               |
| Zwarte mees          | 2                |
| <b>RL: Kwetsbaar</b> | <b>(14) 1386</b> |
| Boomvalk             | 104              |
| Grote lijster        | 3                |
| Grote modderkruiper  | 4                |
| Koekoek              | 50               |
| Laatvlieger          | 1                |
| Nachtegaal           | 2                |
| Patrijs              | 34               |
| Porseleinhoen        | 2                |
| Ransuil              | 98               |
| Slobeend             | 16               |
| Steenuil             | 103              |
| Torenvalk            | 942              |
| Wintertaling         | 9                |
| Wulp                 | 18               |

**Bernhardweg**

BE-0456

| Beleid               |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>SNL soorten</b>   | <b>(47) 2248</b> |
| Bergeend             | 66               |
| Blauwborst           | 88               |
| Boomklever           | 7                |
| Boomkruiper          | 40               |
| Bosrietzanger        | 105              |
| Braamsluiper         | 19               |
| Bruine kiekendief    | 4                |
| Cetti's Zanger       | 8                |
| Dodaars              | 30               |
| Gekraagde roodstaart | 6                |
| Gele kwikstaart      | 61               |
| Grasmus              | 263              |
| Graspieper           | 12               |
| Grauwe vliegenvanger | 20               |
| Groene specht        | 308              |
| Groenling            | 51               |
| Grote bonte specht   | 132              |
| Grote zilverreiger   | 9                |
| Grutto               | 10               |
| Havik                | 42               |
| Kleine bonte specht  | 9                |
| Kleine plevier       | 26               |
| Kluut                | 118              |
| Kneu                 | 78               |
| Krakeend             | 81               |
| Kuifeend             | 116              |
| Kwartel              | 7                |
| Lepelaar             | 1                |
| Nachtegaal           | 2                |
| Patrijs              | 34               |
| Porseleinhoen        | 2                |
| Putter               | 31               |
| Rietzanger           | 31               |
| Roodborsttapuit      | 31               |
| Scholekster          | 34               |
| Slechtvalk           | 42               |
| Slobeend             | 16               |
| Spotvogel            | 20               |
| Tapuit               | 80               |
| Tureluur             | 14               |
| Veldleeuwerik        | 102              |
| Visdief              | 10               |
| Wespendief           | 2                |

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

## Bernhardweg

BE-0456

| Beleid                           |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Wintertaling                     | 9               |
| Wulp                             | 18              |
| Zanglijster                      | 49              |
| Zomertaling                      | 4               |
| <b>Wnb - andere soorten</b>      | <b>(17) 409</b> |
| Bastaardkikker                   | 12              |
| Bosmuis                          | 11              |
| Das                              | 20              |
| Eekhoorn                         | 2               |
| Egel                             | 70              |
| Gewone pad                       | 9               |
| Groene kikker (Onb.)             | 55              |
| Grote modderkruiper              | 4               |
| Haas                             | 171             |
| Huisspitsmuis                    | 1               |
| Kleine watersalamander           | 6               |
| Konijn                           | 20              |
| Ree                              | 10              |
| Steenmarter                      | 4               |
| Vos                              | 5               |
| Wezel                            | 3               |
| Woelrat                          | 6               |
| <b>Wnb - andere soorten (DR)</b> | <b>(4) 30</b>   |
| Das                              | 20              |
| Eekhoorn                         | 2               |
| Grote modderkruiper              | 4               |
| Steenmarter                      | 4               |
| <b>Wnb - andere soorten (EZ)</b> | <b>(4) 30</b>   |
| Das                              | 20              |
| Eekhoorn                         | 2               |
| Grote modderkruiper              | 4               |
| Steenmarter                      | 4               |
| <b>Wnb - andere soorten (FL)</b> | <b>(5) 33</b>   |
| Das                              | 20              |
| Eekhoorn                         | 2               |
| Grote modderkruiper              | 4               |
| Steenmarter                      | 4               |
| Wezel                            | 3               |



**Bernhardweg**

BE-0456

| Beleid                           |                |
|----------------------------------|----------------|
| <b>Wnb - andere soorten (FR)</b> | <b>(3) 26</b>  |
| Das                              | 20             |
| Eekhoorn                         | 2              |
| Grote modderkruiper              | 4              |
| <b>Wnb - andere soorten (GL)</b> | <b>(5) 33</b>  |
| Das                              | 20             |
| Eekhoorn                         | 2              |
| Grote modderkruiper              | 4              |
| Steenmarter                      | 4              |
| Wezel                            | 3              |
| <b>Wnb - andere soorten (GR)</b> | <b>(5) 201</b> |
| Das                              | 20             |
| Eekhoorn                         | 2              |
| Grote modderkruiper              | 4              |
| Haas                             | 171            |
| Steenmarter                      | 4              |
| <b>Wnb - andere soorten (LB)</b> | <b>(4) 30</b>  |
| Das                              | 20             |
| Eekhoorn                         | 2              |
| Grote modderkruiper              | 4              |
| Steenmarter                      | 4              |
| <b>Wnb - andere soorten (NB)</b> | <b>(5) 33</b>  |
| Das                              | 20             |
| Eekhoorn                         | 2              |
| Grote modderkruiper              | 4              |
| Steenmarter                      | 4              |
| Wezel                            | 3              |
| <b>Wnb - andere soorten (NH)</b> | <b>(5) 33</b>  |
| Das                              | 20             |
| Eekhoorn                         | 2              |
| Grote modderkruiper              | 4              |
| Steenmarter                      | 4              |
| Wezel                            | 3              |

**Bernhardweg**

BE-0456

| Beleid                             |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>Wnb - andere soorten (OV)</b>   | <b>(6) 103</b>  |
| Das                                | 20              |
| Eekhoorn                           | 2               |
| Egel                               | 70              |
| Grote modderkruiper                | 4               |
| Steenmarter                        | 4               |
| Wezel                              | 3               |
| <b>Wnb - andere soorten (UT)</b>   | <b>(4) 30</b>   |
| Das                                | 20              |
| Eekhoorn                           | 2               |
| Grote modderkruiper                | 4               |
| Steenmarter                        | 4               |
| <b>Wnb - andere soorten (ZH)</b>   | <b>(4) 30</b>   |
| Das                                | 20              |
| Eekhoorn                           | 2               |
| Grote modderkruiper                | 4               |
| Steenmarter                        | 4               |
| <b>Wnb - andere soorten (ZL)</b>   | <b>(7) 224</b>  |
| Das                                | 20              |
| Eekhoorn                           | 2               |
| Grote modderkruiper                | 4               |
| Haas                               | 171             |
| Konijn                             | 20              |
| Steenmarter                        | 4               |
| Wezel                              | 3               |
| <b>Wnb - Habitatrichtlijn</b>      | <b>(12) 382</b> |
| Bever                              | 286             |
| Gewone dwergvleermuis              | 76              |
| Gewone grootoorvleermuis           | 2               |
| Gewone/Grijze grootoorvleermuis    | 3               |
| Gewone/Kleine/Ruige dwergvleermuis | 1               |
| Laatvlieger                        | 1               |
| Meervleermuis                      | 1               |
| Poelkikker                         | 2               |
| Rivierrombout                      | 1               |
| Ruige dwergvleermuis               | 3               |
| Teunisbloempijlstaart              | 4               |
| Wolf                               | 2               |

**Bernhardweg**

BE-0456

| Beleid                      |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Wnb - Vogelrichtlijn</b> | <b>(104) 4161</b> |
| Bergeend                    | 66                |
| Blauwborst                  | 88                |
| Blauwe reiger               | 26                |
| Boerenwaluw                 | 1                 |
| Boomklever                  | 1                 |
| Boomkruiper                 | 2                 |
| Boomvalk                    | 5                 |
| Bosrietzanger               | 105               |
| Bosuil                      | 1                 |
| Braamsluiper                | 19                |
| Brandgans                   | 10                |
| Bruine kiekendief           | 4                 |
| Buizerd                     | 10                |
| Casarca                     | 1                 |
| Cetti's Zanger              | 8                 |
| Dodaars                     | 30                |
| Ekster                      | 18                |
| Fazant                      | 9                 |
| Fitis                       | 55                |
| Fuut                        | 65                |
| Gaaï                        | 2                 |
| Gekraagde roodstaart        | 2                 |
| Gele kwikstaart             | 61                |
| Gierzwaluw                  | 2                 |
| Grasmus                     | 263               |
| Graspieper                  | 12                |
| Grauwe gans                 | 283               |
| Grauwe vliegenvanger        | 4                 |
| Groene specht               | 32                |
| Groenling                   | 51                |
| Grote Canadese gans         | 90                |
| Grote bonte specht          | 6                 |
| Grote lijster               | 3                 |
| Grote zaagbek               | 1                 |
| Grote zilverreiger          | 9                 |
| Grutto                      | 10                |
| Havik                       | 1                 |
| Heggenmus                   | 43                |
| Holenduif                   | 8                 |
| Houtduif                    | 48                |
| Huismus                     | 12                |
| Huiswaluw                   | 18                |
| IJsvogel                    | 11                |

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

**Bernhardweg**

BE-0456

| Beleid              |     |
|---------------------|-----|
| Kauw                | 3   |
| Kerkuil             | 3   |
| Kievit              | 46  |
| Kleine karekiet     | 240 |
| Kleine plevier      | 26  |
| Kleine zilverreiger | 8   |
| Kluut               | 118 |
| Kneu                | 78  |
| Knobbelzwaan        | 58  |
| Koekoek             | 50  |
| Kokmeeuw            | 2   |
| Koolmees            | 46  |
| Koperwiek           | 1   |
| Krakeend            | 81  |
| Kuifeend            | 116 |
| Kwartel             | 7   |
| Lepelaar            | 1   |
| Meerkoet            | 124 |
| Merel               | 78  |
| Nachtegaal          | 2   |
| Oeverloper          | 2   |
| Oeverwaluw          | 9   |
| Ooievaar            | 237 |
| Patrijs             | 34  |
| Pijlstaart          | 2   |
| Pimpelmees          | 9   |
| Porseleinhoen       | 2   |
| Putter              | 31  |
| Ransuil             | 13  |
| Rietgors            | 131 |
| Rietzanger          | 31  |
| Ringmus             | 5   |
| Roek                | 14  |
| Roodborst           | 16  |
| Roodborsttapuit     | 31  |
| Scholekster         | 34  |
| Slobeend            | 16  |
| Smient              | 1   |
| Spotvogel           | 20  |
| Spreeuw             | 14  |
| Staartmees          | 2   |
| Stenuil             | 21  |
| Tijftjaf            | 158 |
| Torenvalk           | 5   |

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

**Bernhardweg**

BE-0456

| Beleid                             |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Tuinfluitier                       | 37              |
| Tureluur                           | 14              |
| Turkse tortel                      | 17              |
| Veldleeuwerik                      | 102             |
| Vink                               | 121             |
| Visdief                            | 10              |
| Waterhoen                          | 7               |
| Wilde eend                         | 60              |
| Winterkoning                       | 99              |
| Wintertaling                       | 9               |
| Witte kwikstaart                   | 10              |
| Wulp                               | 18              |
| Zanglijster                        | 49              |
| Zomertaling                        | 4               |
| Zwarte kraai                       | 31              |
| Zwarte roodstaart                  | 3               |
| Zwartkop                           | 148             |
| Soortgroepen                       |                 |
| <b>Vleermuizen</b>                 | <b>(7) 87</b>   |
| Gewone dwergvleermuis              | 76              |
| Gewone grootoorvleermuis           | 2               |
| Gewone/Grijze grootoorvleermuis    | 3               |
| Gewone/Kleine/Ruige dwergvleermuis | 1               |
| Laatvlieger                        | 1               |
| Meervleermuis                      | 1               |
| Ruige dwergvleermuis               | 3               |
| <b>Overige zoogdieren</b>          | <b>(14) 611</b> |
| Bever                              | 286             |
| Bosmuis                            | 11              |
| Das                                | 20              |
| Eekhoorn                           | 2               |
| Egel                               | 70              |
| Haas                               | 171             |
| Huisspitsmuis                      | 1               |
| Konijn                             | 20              |
| Ree                                | 10              |
| Steenmarter                        | 4               |
| Vos                                | 5               |
| Wezel                              | 3               |
| Woelrat                            | 6               |
| Wolf                               | 2               |

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.



**Bernhardweg**

BE-0456

| Soortgroepen          |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Vogels</b>         | <b>(114) 12677</b> |
| Bergeend              | 66                 |
| Blauwborst            | 88                 |
| Blauwe reiger         | 1084               |
| Boerenwaluw           | 395                |
| Boomklever            | 7                  |
| Boomkruiper           | 40                 |
| Boomvalk              | 104                |
| Bosrietzanger         | 105                |
| Bosuil                | 5                  |
| Braamsluiper          | 19                 |
| Brandgans             | 10                 |
| Brilduiker            | 65                 |
| Bruine kiekendief     | 4                  |
| Buizerd               | 889                |
| Casarca               | 1                  |
| Cetti's Zanger        | 8                  |
| Dodaars               | 30                 |
| Ekster                | 283                |
| Fazant                | 9                  |
| Fitis                 | 55                 |
| Fuut                  | 65                 |
| Gai                   | 2                  |
| Gekraagde roodstaart  | 6                  |
| Gele kwikstaart       | 61                 |
| Gierzwaluw            | 240                |
| Grasmus               | 263                |
| Graspieper            | 12                 |
| Grauwe gans           | 283                |
| Grauwe vliegenvanger  | 20                 |
| Groene specht         | 308                |
| Groenling             | 51                 |
| Grote Canadese gans   | 90                 |
| Grote bonte specht    | 132                |
| Grote gele kwikstaart | 9                  |
| Grote lijster         | 3                  |
| Grote zaagbek         | 1                  |
| Grote zilverreiger    | 9                  |
| Grutto                | 10                 |
| Havik                 | 42                 |
| Heggenmus             | 43                 |
| Holenduif             | 8                  |
| Houtduif              | 48                 |
| Huismus               | 127                |

De NDF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

**Bernhardweg**

BE-0456

| Soortgroepen        |      |
|---------------------|------|
| Huiszwaluw          | 131  |
| IJsvogel            | 479  |
| Kauw                | 3    |
| Kerkuil             | 29   |
| Kievit              | 46   |
| Kleine bonte specht | 9    |
| Kleine karekiet     | 240  |
| Kleine plevier      | 26   |
| Kleine zilverreiger | 8    |
| Kluut               | 118  |
| Kneu                | 78   |
| Knobbelzwaan        | 58   |
| Koekoek             | 50   |
| Kokmeeuw            | 2    |
| Koolmees            | 215  |
| Koperwiek           | 1    |
| Krakeend            | 81   |
| Kuifeend            | 116  |
| Kwartel             | 7    |
| Lepelaar            | 1    |
| Meerkoet            | 124  |
| Merel               | 78   |
| Nachtegaal          | 2    |
| Oeverloper          | 2    |
| Oeverzwaluw         | 270  |
| Ooievaar            | 1319 |
| Patrijs             | 34   |
| Pijlstaart          | 2    |
| Pimpelmees          | 142  |
| Porseleinhoen       | 2    |
| Putter              | 31   |
| Ransuil             | 98   |
| Rietgors            | 131  |
| Rietzanger          | 31   |
| Ringmus             | 5    |
| Roek                | 138  |
| Roodborst           | 16   |
| Roodborsttapuit     | 31   |
| Scholekster         | 34   |
| Slechtvalk          | 42   |
| Slobeend            | 16   |
| Smient              | 1    |
| Sperwer             | 177  |
| Spotvogel           | 20   |

De NDF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

**Bernhardweg**

BE-0456

| Soortgroepen           |               |
|------------------------|---------------|
| Spreeuw                | 472           |
| Staartmees             | 2             |
| Steenuil               | 103           |
| Tapuit                 | 80            |
| Tjiftjaf               | 158           |
| Torenvalk              | 942           |
| Tuinfluit              | 37            |
| Tureluur               | 14            |
| Turkse tortel          | 17            |
| Veldleeuwerik          | 102           |
| Vink                   | 121           |
| Visdief                | 10            |
| Waterhoen              | 7             |
| Wespendief             | 2             |
| Wilde eend             | 60            |
| Winterkoning           | 99            |
| Wintertaling           | 9             |
| Witte kwikstaart       | 10            |
| Wulp                   | 18            |
| Zanglijster            | 49            |
| Zeearend               | 14            |
| Zomertaling            | 4             |
| Zwarte kraai           | 640           |
| Zwarte mees            | 2             |
| Zwarte roodstaart      | 8             |
| Zwarte wouw            | 5             |
| Zwartkop               | 148           |
| <b>Amfibieën</b>       | <b>(5) 84</b> |
| Bastaardkikker         | 12            |
| Gewone pad             | 9             |
| Groene kikker (Onb.)   | 55            |
| Kleine watersalamander | 6             |
| Poelkikker             | 2             |
| <b>Vissen</b>          | <b>(1) 4</b>  |
| Grote modderkruiper    | 4             |
| <b>Nachtvlinders</b>   | <b>(1) 4</b>  |
| Teunisbloempijlstaart  | 4             |
| <b>Libellen</b>        | <b>(1) 1</b>  |
| Rivierrombout          | 1             |



**Soorten beschermd onder paragraaf 3.2 van de  
Wet natuurbescherming (artikel 3.5 en 3.8)**

Nederlandse naam Latijnse naam

**Planten (4)**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Drijvende water-<br>weegbree | Luronium natans       |
| Groenknolorchis              | Liparis loeselii      |
| Kruipend<br>moerasscherm     | Apium repens          |
| Zomerschroeforchis           | Spiranthes aestivalis |

**Zoogdieren terrestrisch (8)**

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Bever              | Castor fiber             |
| Hamster            | Cricetus cricetus        |
| Hazelmuis          | Muscardinus avellanarius |
| Euraziatische lynx | Lynx lynx                |
| Noordse woelmuis   | Microtus oeconomus       |
| Otter              | Lutra lutra              |
| Wilde kat          | Felis silvestris         |
| Wolf *)            | Canis lupus              |

**Vleermuizen (22)**

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Bechsteins vleermuis          | Myotis bechsteinii                   |
| Bosvleermuis                  | Nyctalus leisleri                    |
| Brandts vleermuis             | Myotis brandtii                      |
| Franjestaart                  | Myotis nattereri                     |
| Gewone<br>baardvleermuis      | Myotis mystacinus ssp.<br>mystacinus |
| Gewone dwerg-<br>vleermuis    | Pipistrellus pipistrellus            |
| Gewone grootoor-<br>vleermuis | Plecotus auritus                     |
| Grijze grootoor-<br>vleermuis | Plecotus austriacus                  |
| Grote hoefijzerneus           | Rhinolophus ferrum-<br>equinum       |
| Grote rosse vleermuis         | Nyctalus lasiopterus                 |
| Ingekorven vleermuis          | Myotis emarginatus                   |
| Kleine dwerg-<br>vleermuis    | Pipistrellus pygmaeus                |
| Kleine hoefijzerneus          | Rhinolophus hipposideros             |
| Laatvlieger                   | Eptesicus serotinus                  |
| Meervleermuis                 | Myotis dasycneme                     |
| Mopsvleermuis                 | Barbastella barbastellus             |
| Noordse vleermuis             | Eptesicus nilssonii                  |
| Rosse vleermuis               | Nyctalus noctula                     |
| Ruige dwerg-<br>vleermuis     | Pipistrellus nathusii                |
| Tweekleurige<br>vleermuis     | Vespertilio murinus                  |
| Vale vleermuis                | Myotis myotis                        |
| Watervleermuis                | Myotis daubentonii                   |

**Zoogdieren marien (5)**

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Bruinvis        | Phocoena phocoena             |
| Gewone dolfin   | Delphinus delphis             |
| Tuimelaar       | Tursiops truncatus            |
| Witflankdolfijn | Lagenorhynchus acutus         |
| Witsnuitdolfijn | Lagenorhynchus<br>albirostris |

**Vissen (2)**

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Houting | Coregonus oxyrinchus |
| Steur   | Acipenser sturio     |

**Amfibieën (8)**

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Boomkikker      | Hyla arborea        |
| Geelbuikvuurpad | Bombina variegata   |
| Heikikker       | Rana arvalis        |
| Kamsalamander   | Triturus cristatus  |
| Knoflookpad     | Pelobates fuscus    |
| Poelkikker      | Rana lessonae       |
| Rugstreeppad    | Bufo calamita       |
| Vroedmeesterpad | Alytes obstetricans |

**Reptielen (3)**

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Gladde slang | Coronella austriaca |
| Muurhagedis  | Podarcis muralis    |
| Zandhagedis  | Lacerta agilis      |

**Vlinders (7)**

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Donker pimpernel-<br>blauwtje   | Maculinea nausithous   |
| Grote vuurvinder                | Lycaena dispar         |
| Moeraspelmoer-<br>vlinder *)    | Euphydryas aurinia     |
| Pimpernelblauwtje               | Maculinea teleius      |
| Teunisbloempijl-<br>staart      | Proserpinus proserpina |
| Tijmblauwtje *)                 | Maculinea arion        |
| Zilverstreephooi-<br>beestje *) | Coenonympha hero       |

**Libellen (8)**

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Bronslibel *)                    | Oxygastra curtisii      |
| Gaffellibel                      | Ophiogomphus cecilia    |
| Gevlekte witsnuit-<br>libel      | Leucorrhinia pectoralis |
| Groene glazenmaker               | Aeshna viridis          |
| Noordse winter-<br>juffer *)     | Sympecma paedisa        |
| Oostelijke witsnuit-<br>libel *) | Leucorrhinia albifrons  |
| Rivierrombout                    | Gomphus flavipes        |
| Sierlijke witsnuitlibel          | Leucorrhinia caudalis   |

**Kevers (5)**

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Brede geelrandwater-<br>roofkever | Dytiscus laticornis    |
| Gestreepte water-<br>roofkever    | Graphoderus bilineatus |
| Heldenbok                         | Cerambyx cerdo         |
| Juchtleerkever                    | Osmoderma eremita      |
| Vermiljoenkever                   | Cucujus cinnaberinus   |

**Overige soorten (2)**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Bataafse stroom-<br>mossel | Unio crassus      |
| Platte schijfhoren         | Anisus vorticulus |

\*) Soorten verdwenen uit Nederland maar die  
toch beschermd zijn op grond van artikel 3.5 en  
3.8 omdat er een gerede kans op terugkeer bestaat



**Soorten beschermd onder paragraaf 3.3 van de  
Wet natuurbescherming (artikel 3.10 en 3.11)**

Nederlandse naam Latijnse naam

**Planten (76)**

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Akkerboterbloem *)            | Ranunculus arvensis                             |
| Akkerdoornzaad *)             | Torilis arvensis                                |
| Akkerogentroost *)            | Odontites vernus vernus                         |
| Beklierde<br>ogentroost *)    | Euphrasia rostkoviana                           |
| Berggamander *)               | Teucrium montanum                               |
| Bergnachtorchis *)            | Platanthera chlorantha                          |
| Blaasvaren                    | Cystopteris fragilis                            |
| Blauw guichelheil *)          | Anagallis arvensis foemina                      |
| Bokkenorchis *)               | Himantoglossum<br>hircinum                      |
| Bosboterbloem *)              | Ranunculus pol.<br>nemorosus                    |
| Bosdravik *)                  | Bromopsis r. benekenii                          |
| Brave hendrik *)              | Chenopodium bonus-<br>henricus                  |
| Brede wolfsmelk *)            | Euphorbia platyphyllos                          |
| Breed wollegras *)            | Eriophorum latifolium                           |
| Bruinrode<br>wespenorchis     | Epipactis atrorubens                            |
| Dennenorchis *)               | Goodyera repens                                 |
| Dreps *)                      | Bromus secalinus                                |
| Echte gamander *)             | Teucrium cham.<br>germanicum                    |
| Franjegtentiaan               | Gentiana ciliata                                |
| Geelgroene<br>wespenorchis *) | Epipactis muelleri                              |
| Geplooid<br>vrouwenmantel *)  | Alchemilla subcrenata                           |
| Getande veldsla *)            | Valerianella dentata                            |
| Gevlekt zonneroosje*)         | Tuberaria guttata                               |
| Glad biggenkruid *)           | Hypochaeris glabra                              |
| Gladde zegge *)               | Carex laevigata                                 |
| Groene nachtorchis            | Coeloglossum viride                             |
| Groensteel *)                 | Asplenium viride                                |
| Groot spiegelklokje*)         | Legousia speculum-<br>veneris                   |
| Grote bosaardbei *)           | Fragaria moschata                               |
| Grote leeuwenklauw*)          | Aphanes arvensis                                |
| Honingorchis                  | Hermium monorchis                               |
| Kalkboterbloem *)             | Ranunculus polyanthenos<br>ssp. polyanthenoides |
| Kalketrip *)                  | Centaurea calcitrapa                            |
| Karhuizeranjer *)             | Dianthus carthusianorum                         |
| Karwijselie *)                | Selinum carvifolia                              |
| Kleine ereprijs *)            | Veronica verna                                  |
| Kleine Schorseneer *)         | Scorzonera humilis                              |
| Kleine wolfsmelk *)           | Euphorbia exigua                                |
| Kluwenklokje                  | Campanula glomerata                             |
| Knollathyrus *)               | Lathyrus linifolius                             |
| Knolspirea *)                 | Filipendula vulgaris                            |
| Korensla *)                   | Amoseris minima                                 |
| Kranskarwij *)                | Carum verticillatum                             |
| Kruipstijm *)                 | Thymus praecox                                  |
| Lange zonnedaauw              | Drosera longifolia                              |
| Liggende ereprijs *)          | Veronica prostrata                              |
| Moerasgamander *)             | Teucrium scordium                               |
| Muurbloem                     | Erysimum cheiri                                 |
| Naakte lathyrus *)            | Lathyrus aphaca                                 |
| Naaldenkervel *)              | Scandix pecten-veneris                          |
| Pijlscheeffelk                | Arabis h. sagittata                             |
| Roggelelie *)                 | Lilium bulbiferum<br>croceum                    |
| Rood<br>peperboompje *)       | Daphne mezereum                                 |
| Rozenkransje *)               | Antennaria dioica                               |
| Ruw parelzaad *)              | Lithospermum arvense                            |
| Stofzaad *)                   | Monotropa hypopitys                             |
| Scherpkruid *)                | Asperugo procumbens                             |
| Schubvaren                    | Ceterach officinarum                            |
| Schubzegge *)                 | Carex lepidocarpa                               |

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Smalle raai *)       | Galeopsis angustifolia  |
| Spits havikskruid *) | Hieracium lactucella    |
| Steenbraam *)        | Rubus saxatilis         |
| Stijve wolfsmelk *)  | Euphorbia stricta       |
| Tengere distel *)    | Carduus tenuiflorus     |
| Tengere veldmuur *)  | Minuartia hybrida       |
| Trosgamander *)      | Teucrium botrys         |
| Veenbloembies *)     | Scheuchzeria palustris  |
| Vliegenorchis        | Ophrys insectifera      |
| Vroege ereprijs *)   | Veronica praecox        |
| Wilde averuit *)     | Artemisia c. campestris |
| Wilde ridderspoor *) | Consolida regalis       |
| Wilde weit *)        | Melampyrum arvense      |
| Wolfskers *)         | Atropa bella-donna      |
| Zandwolfsmelk *)     | Euphorbia seguieriana   |
| Zinkviooltje         | Viola lutea calaminaria |
| Zweedse kornoelje *) | Cornus suecica          |

**Zoogdieren terrestrisch (31)**

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Aardmuis                     | Microtus agrestis       |
| Boommarter                   | Martes martes           |
| Bosmuis                      | Apodemus sylvaticus     |
| Bunzing                      | Mustela putorius        |
| Damhert                      | Dama dama               |
| Das                          | Meles meles             |
| Dwergmuis                    | Micromys minutus        |
| Dwergspitsmuis               | Sorex minutus           |
| Edelhert                     | Cervus elaphus          |
| Eekhoorn                     | Sciurus vulgaris        |
| Egel                         | Erinaceus europaeus     |
| Eikelmuis                    | Eliomys quercinus       |
| Gewone bosspitsmuis          | Sorex araneus           |
| Grote bosmuis                | Apodemus flavicollis    |
| Haas                         | Lepus europaeus         |
| Hermelijn                    | Mustela erminea         |
| Huisspitsmuis                | Crocidura russula       |
| Konijn                       | Oryctolagus cuniculus   |
| Molmuis *)                   | Arvicola scherman       |
| Ondergrondse<br>woelmuis     | Microtus subterraneus   |
| Ree                          | Capreolus capreolus     |
| Rosse woelmuis               | Clethrionomys glareolus |
| Steenarter                   | Martes foina            |
| Tweekleurige<br>bosspitsmuis | Sorex coronatus         |
| Veldmuis                     | Microtus arvalis        |
| Veldspitsmuis                | Crocidura leucodon      |
| Vos                          | Vulpes vulpes           |
| Waterspitsmuis               | Neomys fodiens          |
| Wezel                        | Mustela nivalis         |
| Wild zwijn                   | Sus scrofa              |
| Woelrat                      | Arvicola terrestris     |

**Zoogdieren marien (2)**

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Gewone zeehond | Phoca vitulina     |
| Grijze zeehond | Halichoerus grypus |

**Amfibieën (8)**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Alpenwater-<br>salamander   | Triturus alpestris     |
| Bruine kikker               | Rana temporaria        |
| Gewone pad                  | Bufo bufo              |
| Kleine water-<br>salamander | Triturus vulgaris      |
| Meerkikker                  | Rana ridibunda         |
| Middelste groene<br>kikker  | Rana klepton esculenta |
| Vinpootsalamander           | Triturus helveticus    |
| Vuursalamander              | Salamandra salamandra  |

**Reptielen (4)**

|       |              |
|-------|--------------|
| Adder | Vipera berus |
|-------|--------------|

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Hazelworm                | Anguis fragilis  |
| Levendbarende<br>hagedis | Lacerta vivipara |
| Ringslang                | Natrix natrix    |

**Vissen (6)**

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Beekdonderpad       | Cottus rhenanus         |
| Beekprik            | Lampetra planeri        |
| Elrits              | Phoxinus phoxinus       |
| Gestippelde alver   | Alburnoides bipunctatus |
| Grote modderkruiper | Misgurnus fossilis      |
| Kwabaal *)          | Lota lota               |

**Vlinders (20)**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Aardbeivlinder *)               | Pyrgus malvae         |
| Bosparelmoe-<br>vlinder *)      | Melitaea athalia      |
| Bruin dikkopje                  | Erynnis tages         |
| Bruine eikenpage *)             | Satyrus ilicis        |
| Duinparelmoe-<br>vlinder *)     | Argynnis niobe        |
| Gentiaanblauwtje *)             | Maculinea alcon       |
| Grote parelmoe-<br>vlinder *)   | Argynnis aglaja       |
| Grote vos *)                    | Nymphalis polychloros |
| Grote weerschijn-<br>vlinder *) | Apatura iris          |
| Iepenpage                       | Satyrus w-album       |
| Kleine heivlinder *)            | Hipparchia statilinus |
| Kleine ijsvogel-<br>vlinder *)  | Limenitis camilla     |
| Kommavilinder *)                | Hesperia comma        |
| Sleedoompage *)                 | Thecla betulae        |
| Spiegeldikkopje *)              | Heteropterus morpheus |
| Veenbesblauwtje *)              | Plebeius optilete     |
| Veenbesparelmoe-<br>vlinder     | Boloria aquilonaris   |
| Veenhooibeestje                 | Coenonympha tullia    |
| Veldparelmoe-<br>vlinder        | Melitaea cinxia       |
| Zilveren maan *)                | Boloria selene        |

**Libellen (8)**

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Beekrumbout *)         | Gomphus vulgatissimus         |
| Bosbeekjuffer *)       | Calopteryx virgo              |
| Donkere waterjuffer*)  | Coenagrion armatum            |
| Gevlekte glanslibel *) | Somatochlora<br>flavomaculata |
| Gewone bronlibel *)    | Cordulegaster boltonii        |
| Hoogveenglanslibel*)   | Somatochlora arctica          |
| Kempense               | Sympetrum                     |
| heidelibel *)          | depressiusculum               |
| Speerwaterjuffer *)    | Coenagrion hastulatum         |

**Kevers (1)**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Vliegend hert | Lucanus cervus |
|---------------|----------------|

**Overige soorten (1)**

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Europese rivierkreeft | Astacus astacus |
|-----------------------|-----------------|

\*) soort die geen wettelijke bescherming had  
onder de Flora- en faunawet