

Bedrijfsbehandelplan Melkvee

Algemene gegevens

UBN

425960

Veehouder

G.C. Kanters

Adres

Achterst Ven 15

Postcode

5461LD

Woonplaats

Veghel

Telefoonnummer

E-mail (notificatie)

g_kanters@online.nl

DAP

DAC Aadal

DAP-nummer

94073

Dierenarts

B.W.P.M. van Alphen

Telefoon DAP

0413-292929

E-mail DAP

info@aadal.nl

Datum opgesteld

14-12-2013

Koeien

Klinische mastitis

top ▲

Mild (vlokje in melk)

Alle beschikbare mastitisinjectoren zijn tweedekeus antibiotica, het is raadzaam om regelmatig een bacteriologisch onderzoek met gevoeligheidsbepaling te laten doen om zeker te zijn van de juiste keuze.

REG	NL	Middel	Doeldier	Toediening	Dosering	Freq.	Duur i. dgn	W.tijd M. i. dgn	W.tijd V. i. dgn	Opm.
9210		Albionic Formula injectoren	Alle	In de uier	1 injector per 1 kwartier	2 x per dag	2	3.5	1	
9427		Avuloxil injectoren	Alle	In de uier	1 injector per 1 kwartier	2 x per dag	2	3.5	7	
102306		Ubrolexin injectoren	Alle	In de uier	1 injector per 1 kwartier	1 x per dag	2	5	10	

Zieke koe met mastitis (koorts)

Alle beschikbare mastitisinjectoren zijn tweedekeus antibiotica, het is raadzaam om regelmatig een bacteriologisch onderzoek met gevoeligheidsbepaling te laten doen om zeker te zijn van de juiste keuze. Kies een injector en antibiotica in de nek, bij voorkeur ook een ontstekingsremmer gebruiken.

REG	NL	Middel	Doeldier	Toediening	Dosering	Freq.	Duur i. dgn	W.tijd M. i. dgn	W.tijd V. i. dgn	Opm.
10100		Tylan 200 injectie 100 ml	Alle	In de spier (IM)	1 ml per 20 kg LG	1 x per dag	3	5	28	
9427		Avuloxil injectoren	Alle	In de uier	1 injector per 1 kwartier	2 x per dag	2	3.5	7	
8762		Dofatrim-ject	Alle	In de spier (IM)	1 ml per 15 kg LG	1 x per dag	3 - 5	3	14	

REG NL Middel	Doeldier	Toediening	Dosering	Freq.	Duur i. dgn	W.tijd M. i. dgn	W.tijd V. i. dgn	Opm.
102306 Ubrolexin injectoren	Alle	In de uier	1 injector per 1 kwartier	1 x per dag	2	5	10	
9210 Albiotic Formula injectoren	Alle	In de uier	1 injector per 1 kwartier	2 x per dag	2	3.5	1	
108189 Meloxidyl	Alle	Onder de huid (SC)	1 ml per 40 kg LG	1 x per dag	1	5	15	
8652 Mamyzin	Alle	In de spier (IM)	10 gram per 1 rund	1 x per dag	3	4	10	
8784 Ketofen	Alle	In de spier (IM)	1 ml per 33 kg LG	1 x per dag	1 - 3	0	4	

Ernstig zieke koe met mastitis (sloom, hoge koorts)

Het is aan te bevelen ook een ondersteunende therapie te starten met: -de koe vaak uitmelken, evt na het spuiten van 2 cc oxytocine -het toedienen van Meloxidyl of Ketofen -de koe voldoende vocht te geven of bij voorkeur te drenchen en/of insfuus te laten toedienen

REG NL Middel	Doeldier	Toediening	Dosering	Freq.	Duur i. dgn	W.tijd M. i. dgn	W.tijd V. i. dgn	Opm.
8762 Dofatrim-ject	Alle	In de spier (IM)	1 ml per 15 kg LG	1 x per dag	3 - 5	3	14	
102306 Ubrolexin injectoren	Alle	In de uier	1 injector per 1 kwartier	1 x per dag	2	5	10	
9210 Albiotic Formula injectoren	Alle	In de uier	1 injector per 1 kwartier	2 x per dag	2	3.5	1	
9427 Avuloxil injectoren	Alle	In de uier	1 injector per 1 kwartier	2 x per dag	2	3.5	7	
2113 Pituisan S	Alle	In de spier (IM)	3 ml per 1 rund	4 x per dag	1	0	0	
8784 Ketofen	Alle	In de spier (IM)	1 ml per 33 kg LG	1 x per dag	1 - 3	0	4	
108189 Meloxidyl	Alle	Onder de	1 ml per 40 kg	1 x per	1	5	15	

REG	NL	Middel	Doeldier	Toediening	Dosering	Freq.	Duur i. dgn	W.tijd M. i. dgn	W.tijd V. i. dgn	Opm.
				huid (SC)	LG	dag				

Subklinische mastitis

top ▲

Begin lactatie

Subklinische mastitis is een niet-zichtbare mastitis (hoogcelgetalkoe). Bij het waarnemen van afwijkingen aan de melk treedt het protocol voor klinische mastitis in werking. Alleen Pirsue is een eerstekeus antibioticum, doe bij voorkeur een bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidsbepaling. Indien hierbij resistentie voor Pirsue aangetoond wordt mag men een tweedekeusmiddel gebruiken.

REG	NL	Middel	Doeldier	Toediening	Dosering	Freq.	Duur i. dgn	W.tijd M. i. dgn	W.tijd V. i. dgn	Opm.
10153		Pirsue injectoren	Alle	In de uier	1 injector per 1 kwartier	1 x per dag	8	5	23	

Einde lactatie

Subklinische mastitis is een niet-zichtbare mastitis (hoogcelgetalkoe). Bij het waarnemen van afwijkingen aan de melk treedt het protocol voor klinische mastitis in werking. Alleen Pirsue is een eerstekeus antibioticum, doe bij voorkeur een bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidsbepaling. Indien hierbij resistentie voor Pirsue aangetoond wordt mag men een tweedekeusmiddel gebruiken.

REG	NL	Middel	Doeldier	Toediening	Dosering	Freq.	Duur i. dgn	W.tijd M. i. dgn	W.tijd V. i. dgn	Opm.
10153		Pirsue injectoren	Alle	In de uier	1 injector per 1 kwartier	1 x per dag	8	5	23	

Droogzetten

top ▲

Laag celgetal

Preventieve behandelingen met antibiotica zijn niet toegestaan. De Richtlijn Droogzetten geeft aan dat koeien met een celgetal onder 50 en vaarzen met een celgetal onder 150 niet drooggezet mogen worden met antibiotica. Deze celgetaluitslag mag op de dag van droogzetten maximaal 6 weken oud zijn. Wanneer u niet deelneemt aan MPR kunt u een celgetal laten bepalen door ons laboratorium. Toedienen van Orbeseal is wel toegestaan en bovendien ook aan te bevelen.

REG NL	Middel	Doeldier	Toediening	Dosering	Freq.	Duur i. dgn	W.tijd M. i. dgn	W.tijd V. i. dgn	Opm.
10082	OrbeSeal	Alle	In de uier	1 injector per 1 kwartier	1 x per dag	1	0	0	

Hoog celgetal

De Richtlijn Droogzetten geeft aan dat koeien met een celgetal boven 50 en vaarzen met een celgetal boven 150 drooggezet mogen worden met een eerstekeus antibioticapreparaat. Deze celgetaluitslag mag op de dag van droogzetten maximaal 6 weken oud zijn. Wanneer u niet deelneemt aan MPR kunt u een celgetal laten bepalen door ons laboratorium. De toegestane injectoren (Orbenin extra dry cow én Orbenin dry cow) werken met name genezend en hebben een zeer beperkte beschermende werking. Om droogstaande koeien te beschermen tegen infecties vanuit de omgeving wordt toedienen van Orbeseal geadviseerd.

REG NL	Middel	Doeldier	Toediening	Dosering	Freq.	Duur i. dgn	W.tijd M. i. dgn	W.tijd V. i. dgn	Opm.
6901	Orbenin extra dry cow injectoren	Alle	In de uier	1 injector per 1 kwartier	1 x per dag	1	44	0	
10082	OrbeSeal	Alle	In de uier	1 injector per 1 kwartier	1 x per dag	1	0	0	
1381	Orbenin dry cow injectoren	Alle	In de uier	1 injector per 1 kwartier	1 x per dag	1	47	28	

Baarmoederproblemen

[top](#) ▲

Aan de nageboorte staan

Een koe die niet binnen 24 uur na kalven de nageboorte verloren heeft, staat aan de nageboorte. Dit kan gepaard gaan met een acute baarmoederontsteking, zie daarvoor het volgende item.

REG NL	Middel	Doeldier	Toediening	Dosering	Freq.	Duur i. dgn	W.tijd M. i. dgn	W.tijd V. i. dgn	Opm.
2398	Geomycine schuimtablet	Alle	In de baarmoeder	1 tablet per 1 rund	1 x per dag	1	5	35	

Acute baarmoederontsteking

Kan voorkomen in combinatie met aan de nageboorte staan. Gebruik een antibioticum gecombineerd met een ontstekingsremmer.

REG NL	Middel	Doeldier	Toediening	Dosering	Freq.	Duur i. dgn	W.tijd M. i. dgn	W.tijd V. i. dgn	Opm.
112615	Dexaject	Alle	In de spier (IM)	1,5 ml per 50 kg LG	1 x per dag	1	3	8	
8784	Ketofen	Alle	In de spier (IM)	1 ml per 33 kg LG	1 x per dag	1 - 3	0	4	
8291	Engemycine 10%	Alle	In de spier (IM)	1 ml per 20 kg LG	1 x per dag	3 - 5	5	18	
8762	Dofatrim-ject	Alle	In de spier (IM)	1 ml per 15 kg LG	1 x per dag	3 - 5	3	14	

Witvuilen (Chronische baarmoederontsteking)

Witvuilen vanaf 14 dagen na afkalven. Het verdient de voorkeur om Alfaglandin C te gebruiken, dit kan als er een geel lichaam aanwezig is (meestal vanaf 4 weken na afkalven).

REG NL	Middel	Doeldier	Toediening	Dosering	Freq.	Duur i. dgn	W.tijd M. i. dgn	W.tijd V. i. dgn	Opm.
10504	Alfaglandin C	Alle	In de spier (IM)	2 ml per 1 rund	1 x per dag	1	0	1	
8522	Metricure injectoren	Alle	In de baarmoeder	1 injector per 1 rund	1 x per dag	1	0	1	

Ontsteking rond geboorteweg (PVR)

Treedt op als het slijmvlies van de schede na het afkalven ingescheurd is. Gebruik een antibioticum gecombineerd met een ontstekingsremmer.

REG	NL	Middel	Doeldier	Toediening	Dosering	Freq.	Duur i. dgn	W.tijd M. i. dgn	W.tijd V. i. dgn	Opm.
112615		Dexaject	Alle	In de spier (IM)	1,5 ml per 50 kg LG	1 x per dag	1	3	8	
4259		Depocilline 100 ml	Alle	In de spier (IM)	1 ml per 25 kg LG	1 x per dag	3	4	7	

Klauwaandoeningen

[top](#) ▲

Stinkpoot

Komt vaak voor in combinatie met mortellaro. Zie voor verdere opmerkingen item mortellaro.

REG	NL	Middel	Doeldier	Toediening	Dosering	Freq.	Duur i. dgn	W.tijd M. i. dgn	W.tijd V. i. dgn	Opm.
9013		CTC spray	Alle	Op de vacht		1 x per dag	1 - 3	0	0	
102670		Engemycine spray	Alle	Op de vacht	1 stuk per 1 rund	2 x per dag	1 - 3	0	0	
100656		Animedazon spray	Alle	Op de vacht	1 stuk per 1 rund	1 x per dag	1 - 3	0	0	

Tussenklauwontsteking

Gebruik een antibioticum gecombineerd met een ontstekingsremmer.

REG	NL	Middel	Doeldier	Toediening	Dosering	Freq.	Duur i. dgn	W.tijd M. i. dgn	W.tijd V. i. dgn	Opm.
8291		Engemycine 10%	Alle	In de spier (IM)	1 ml per 20 kg LG	1 x per dag	3 - 5	5	18	
8784		Ketofen	Alle	In de spier (IM)	1 ml per 33 kg LG	1 x per dag	1 - 3	0	4	

Mortellaro

Komt vaak voor in combinatie met stinkpoot. Ernstige gevallen kunnen ook behandeld worden met hoofgel (1x daags aanbrengen op D0, D4 en D7). Daarna koppelbehandeling met een voetbad met formaline (4% van de handelsoplossing, 2x daags, na 14 dgn herhalen, voetbad verversen na 200-250 koepassages). Ook multicomponents 3 dagen per week zijn werkzaam.

REG NL	Middel	Doeldier	Toediening	Dosering	Freq.	Duur i. dgn	W.tijd M. i. dgn	W.tijd V. i. dgn	Opm.
100656	Animedazon spray	Alle	Op de vacht	1 stuk per 1 rund	1 x per dag	1 - 3	0	0	
9013	CTC spray	Alle	Op de vacht		1 x per dag	1 - 3	0	0	
102670	Engemycine spray	Alle	Op de vacht	1 stuk per 1 rund	2 x per dag	1 - 3	0	0	

Dikke hak/poot

Gebruik een antibioticum gecombineerd met een ontstekingsremmer.

REG NL	Middel	Doeldier	Toediening	Dosering	Freq.	Duur i. dgn	W.tijd M. i. dgn	W.tijd V. i. dgn	Opm.
8784	Ketofen	Alle	In de spier (IM)	1 ml per 33 kg LG	1 x per dag	1 - 3	0	4	
4259	Depocilline 100 ml	Alle	In de spier (IM)	1 ml per 25 kg LG	1 x per dag	3	4	7	

Overige aandoeningen

[top](#) ▲

Melkziekte

Denk eraan dat er naast een calciumtekort ook een fosfortekort kan optreden, dit is te ondervangen door het toedienen van Phosphor-Bovisal.

REG NL	Middel	Doeldier	Toediening	Dosering	Freq.	Duur i. dgn	W.tijd M. i. dgn	W.tijd V. i. dgn	Opm.
	Bovikalc	Alle	In de bek	1 bolus per 1 rund	2 x per dag	1	0	0	
	Phosphor-Bovisal	Alle	In de bek	1 stuk per 1 rund	1 x per dag	1	0	0	
	Ca-Mg infuus	Alle	In het bloedvat (IV)	450 ml per 1 rund	1 x per dag	1	0	0	

Slepende melkziekte

Indien de koe niet reageert op de behandeling is er sprake van een secundaire slepende melkziekte en zal naar de onderliggende oorzaak gezocht moeten worden.

REG NL	Middel	Doeldier	Toediening	Dosering	Freq.	Duur i. dgn	W.tijd M. i. dgn	W.tijd V. i. dgn	Opm.
112615	Dexaject	Alle	In de spier (IM)	10 ml per 1 rund	1 x per dag	1	3	8	
	E-pill	Alle	In de bek	2 bolus per 1 rund	1 x per dag	2	0	0	
	AA-Boost	Alle	In de bek	300 ml per 1 rund	2 x per dag	3	0	0	
110814	Kexxtone	Vaars/volwassen rund	In de bek	1 bolus per 1 rund	1 x per dag	1	0	0	

Longontsteking/bronchitis

Kies een antibioticum in combinatie met een ontstekingsremmer.

REG NL	Middel	Doeldier	Toediening	Dosering	Freq.	Duur i. dgn	W.tijd M. i. dgn	W.tijd V. i. dgn	Opm.
4259	Depocilline 100 ml	Alle	In de spier (IM)	1 ml per 25 kg LG	1 x per dag	3	4	7	
8784	Ketofen	Alle	In de spier (IM)	1 ml per 33	1 x per	1 - 3	0	4	

REG NL	Middel	Doeldier	Toediening	Dosering	Freq.	Duur i. dgn	W.tijd M. i. dgn	W.tijd V. i. dgn	Opm.
				kg LG	dag				
108189	Meloxidyl	Alle	Onder de huid (SC)	1 ml per 40 kg LG	1 x per dag	1	5	15	
8291	Engemycine 10%	Alle	In de spier (IM)	1 ml per 20 kg LG	1 x per dag	1	5	18	

Pijnbestrijding

Bij spier- en skeletaandoeningen.

REG NL	Middel	Doeldier	Toediening	Dosering	Freq.	Duur i. dgn	W.tijd M. i. dgn	W.tijd V. i. dgn	Opm.
8784	Ketofen	Alle	In de spier (IM)	1 ml per 33 kg LG	1 x per dag	1 - 3	0	4	

Overig

Diergeneesmiddelen die gebruikt kunnen worden ter verbetering van de fertiliteit

REG NL	Middel	Doeldier	Toediening	Dosering	Freq.	Duur i. dgn	W.tijd M. i. dgn	W.tijd V. i. dgn	Opm.
	Fertagyl	Alle	In de spier (IM)	5 ml per 1 rund	1 x per dag	1	0	0	
	Prid delta	Alle	Overig	1 stuk per 1 rund	1 x per dag	7	0	0	
	Alfaglandin C	Alle	In de spier (IM)	2 ml per 1 rund	1 x per dag	1	0	1	
	folligonan	Alle	In de spier (IM)	3 ml per 1 rund	1 x per dag	1	0	0	

Jongvee

Diarree

top ▲

Licht (binnen 14 dagen na geboorte)

Het verdient de voorkeur om eerst een diagnose te stellen, dit kan met een diarreesneltest. Bij diarree de eerste dag veel vocht met één van onderstaande middelen geven, als de diarree aanhoudt ook weer melk gaan geven, in kleinere porties. Ook het kalf warm en behaaglijk huisvesten.

REG NL	Middel	Doeldier	Toediening	Dosering	Freq.	Duur i. dgn	W.tijd M. i. dgn	W.tijd V. i. dgn	Opm.
	Bi-pill	Alle	In de bek	1 bolus per 1 rund	2 x per dag	4	0	0	
	Nutrifizz	Alle	In de bek	2 tablet per 2 liter	1 x per dag	1 - 7	0	0	
	Eurolectrol	Alle	In de bek	125 gram per 50 kg LG	4 x per dag	1	0	0	
	Benfital plus	Alle	In de bek	100 gram per 2 liter	3 x per dag	1 - 2	0	0	

Matig (binnen 14 dagen na geboorte)

Norodine 24 is minder pijnlijk bij injectie dan Dofatrim

REG NL	Middel	Doeldier	Toediening	Dosering	Freq.	Duur i. dgn	W.tijd M. i. dgn	W.tijd V. i. dgn	Opm.
8762	Dofatrim-ject	Alle	In de spier (IM)	1 ml per 15 kg LG	1 x per dag	3 - 5	3	14	
8300	Norodine 24 100 ml	Alle	In de spier (IM)	1 ml per 16 kg LG	1 x per dag	3 - 5	2	10	

Ernstig (binnen 14 dagen na geboorte)

Norodine 24 is minder pijnlijk bij injectie dan Dofatrim

REG NL	Middel	Doeldier	Toediening	Dosering	Freq.	Duur i. dgn	W.tijd M. i. dgn	W.tijd V. i. dgn	Opm.
--------	--------	----------	------------	----------	-------	-------------	------------------	------------------	------

REG	NL Middel	Doeldier	Toediening	Dosering	Freq.	Duur i. dgn	W.tijd M. i. dgn	W.tijd V. i. dgn	Opm.
8300	Norodine 24 100 ml	Alle	In de spier (IM)	1 ml per 16 kg LG	1 x per dag	3 - 5	2	10	
8762	Dofatrim-ject	Alle	In de spier (IM)	1 ml per 15 kg LG	1 x per dag	3 - 5	3	14	
108189	Meloxidyl	Alle	Onder de huid (SC)	1 ml per 40 kg LG	1 x per dag	1	5	15	

Kalf ouder dan 14 dagen

REG	NL Middel	Doeldier	Toediening	Dosering	Freq.	Duur i. dgn	W.tijd M. i. dgn	W.tijd V. i. dgn	Opm.
10427	Baycox Bovis	Kalf	In de bek	3 ml per 10 kg LG	1 x per dag	1	0	63	
8944	Buscopan compositum IM	Niet- melkgevend	In de spier (IM)	1 ml per 20 kg LG	1 x per dag	1 - 2	7	15	
108189	Meloxidyl	Alle	Onder de huid (SC)	1 ml per 40 kg LG	1 x per dag	1	5	15	
9660	Vecoxan	Kalf	In de bek	4 ml per 10 kg LG	1 x per dag	1	0	0	

cryptosporidium

REG	NL Middel	Doeldier	Toediening	Dosering	Freq.	Duur i. dgn	W.tijd M. i. dgn	W.tijd V. i. dgn	Opm.
9808	Halocur	Kalf	In de bek	2 ml per 10 kg LG	1 x per dag	7	0	13	
	Kryptophyt	Alle	In de bek	20 ml per 1 rund	1 x per dag	3	0	0	

Longontsteking

top ▲

Acuut

Kies een antibioticum en een ontstekingsremmer.

REG NL	Middel	Doeldier	Toediening	Dosering	Freq.	Duur i. dgn	W.tijd M. i. dgn	W.tijd V. i. dgn	Opm.
102429	Florkem 300 mg/ml	Alle	In de spier (IM)	1 ml per 15 kg LG	1 x per dag	2	0	37	
4259	Depocilline 100 ml	Alle	In de spier (IM)	1 ml per 25 kg LG	1 x per dag	3	4	7	
10539	Resflor	Niet-melkgevend (geen fokstier)	Onder de huid (SC)	2 ml per 15 kg LG	1 x per dag	1	0	46	
8291	Engemycine 10%	Alle	In de spier (IM)	1 ml per 12.5 kg LG	1 x per dag	1	5	18	
8784	Ketofen	Alle	In de spier (IM)	1 ml per 33 kg LG	1 x per dag	1 - 3	0	4	
108189	Meloxidyl	Alle	Onder de huid (SC)	1 ml per 40 kg LG	1 x per dag	1	5	15	

Chronisch

REG NL	Middel	Doeldier	Toediening	Dosering	Freq.	Duur i. dgn	W.tijd M. i. dgn	W.tijd V. i. dgn	Opm.
8290	Duphacycline 300 extend	Alle	In de spier (IM)	1 ml per 10 kg LG	1 x per dag	1	10	44	

Overige aandoeningen Jongvee

[top](#) ▲

Navelontsteking

REG NL	Middel	Doeldier	Toediening	Dosering	Freq.	Duur i. dgn	W.tijd M. i. dgn	W.tijd V. i. dgn	Opm.
4259	Depocilline 100 ml	Alle	In de spier (IM)	1 ml per 25 kg LG	1 x per dag	3	4	7	

Klauwaandoeningen

Gebruik een antibioticum gecombineerd met een ontstekingsremmer.

REG NL	Middel	Doeldier	Toediening	Dosering	Freq.	Duur i. dgn	W.tijd M. i. dgn	W.tijd V. i. dgn	Opm.
8291	Engemycine 10%	Alle	In de spier (IM)	1 ml per 12.5 kg LG	1 x per dag	3 - 5	5	18	
8784	Ketofen	Alle	In de spier (IM)	1 ml per 33 kg LG	1 x per dag	1 - 3	0	4	

Gewricht- en klauwontsteking

Gebruik een antibioticum gecombineerd met een ontstekingsremmer.

REG NL	Middel	Doeldier	Toediening	Dosering	Freq.	Duur i. dgn	W.tijd M. i. dgn	W.tijd V. i. dgn	Opm.
8784	Ketofen	Alle	In de spier (IM)	1 ml per 33 kg LG	1 x per dag	1 - 3	0	4	
4259	Depocilline 100 ml	Alle	In de spier (IM)	1 ml per 25 kg LG	1 x per dag	3	4	7	

Overig

Parasitaire middelen, een aantal van deze middelen zijn ook toegelaten voor melkvee, dan is er een wachttijd melk vermeld (indien er wachttijd melk 100 dgn staat betekent dat het niet is toegelaten voor melkgevend vee).

REG NL	Middel	Doeldier	Toediening	Dosering	Freq.	Duur i. dgn	W.tijd M. i. dgn	W.tijd V. i. dgn	Opm.
	Dophamec Cattle	Alle	Op de vacht	1 ml per 10 kg LG	1 x per dag	1	100	28	
	Imaverol	Alle	Op de vacht	1 liter per 1 rund	1 x per dag	4	0	0	
	Tactic	Alle	Op de vacht	20 ml per 10	1 x per	2	4	4	

REG NL	Middel	Doeldier	Toediening	Dosering	Freq.	Duur i. dgn	W.tijd M. i. dgn	W.tijd V. i. dgn	Opm.
				liter	dag				
	Dectomax	Alle	Onder de huid (SC)	1 ml per 50 kg LG	1 x per dag	1	100	75	
	Cysectin	Alle	Op de vacht	1 ml per 10 kg LG	1 x per dag	1	0	14	