

QUICKSCAN SOORTENBESCHERMING

ZWARTEWEG 50 TE MILSBEEK

Colofon

Quicksan soortenbescherming

Projectnummer: EP.22.1057

Versie: 1

Datum: 12 augustus 2022

Opdrachtnemer

Agrifirm NWE BV
Bedrijfsontwikkeling Exlan
Waalkade 33
5347 KR Oss

Postbus 300
5340 AH Oss

Locatie

Zwarteweg 50 Milsbeek

Contactpersoon

Anton van Zeeland
T: 088 – 488 2929
F: 088 – 488 2102
E: a.vanzeeland@agrifirm.com

Uitvoerders

Ing. A. van Zeeland
L.F.A. van Sleeuwen LL.B.

Collegiale check

AvZ

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN VERVEELVOLDIGD DOOR MIDDEL VAN DRUK, FOTOKOPIE, MICROFILM, GELUIDSBAND, ELEKTRONISCH OF OP WELKE ANDERE WIJZE DAN OOK, EN EVENMIN IN EEN GEAUTOMATISEERD GEGEVENSBESTAND WORDEN OPGESLAGEN, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN AGRIFIRM EXLAN.

Inhoudsopgave

Quickscan soortenbescherming

INLEIDING	4
HOOFDSTUK 1	6
TOETSINGSKADER	6
HOOFDSTUK 2	9
ONDERZOEKSRESULTATEN	9
HOOFDSTUK 3	24
CONCLUSIE	24
LITERATUUR	25
WAARNEMINGEN	26
EFFECTEN INDICATOR SOORTEN	32
PLAN PROJECTLOCATIE	34
NATUURGEGEVENS PROVINCIE LIMBURG BROEDVOGELINDICATIE	35

Inleiding

Planbeschrijving


Aanleiding

Het plangebied is gelegen aan de Zwarteweg 50 te Milsbeek. De plannen omvatten de sloop van de stal en een bijgebouw en de bouw van een nieuwe woning. In dit kader wordt door het bevoegde gezag een toets aan de soortenbescherming noodzakelijk geacht. Bij de uitvoering van de voorgenomen ingrepen moet rekening worden gehouden met het huidige voorkomen van de, op grond van de Wet natuurbescherming, beschermde soorten. Als de voorgenomen ingreep leidt tot het overtreden van verbodsbepalingen betreffende beschermde soorten, moet vrijstelling of ontheffing worden verkregen.

De voorliggende quickscan bevat een inventarisatie van de huidige aanwezigheid van beschermde soorten planten en dieren in en om het plangebied. Tevens worden de te verwachten effecten van de ingreep in het plangebied beoordeeld.

Plangebied

Het plangebied ligt in de plaats Milsbeek in de gemeente Gennep. Het perceel staat bekend als gemeente Ottersum, sectie D, nummers 4775 en 4776.



- Afbeelding 1: luchtfoto plangebied (bron: streetsmart.cyclomedia.com/streetsmart, geraadpleegd op 13/07/2022)

Onderzoeksmethode

Om een goede indicatie van de natuurwaarden binnen het plangebied te krijgen, wordt het onderzoek in verschillende stappen uitgevoerd. Op basis van bronnenonderzoek is nagegaan of er wettelijk beschermde planten- of diersoorten in het gebied voor kunnen komen waaraan extra aandacht geschonken dient te worden tijdens het terreinbezoek.

Na het bronnenonderzoek is een verkennend terreinbezoek gebracht aan het plangebied. Hierbij is, op basis van de gegevens van het literatuuronderzoek, beoordeeld voor welke soorten het gebied daadwerkelijk een geschikte habitat biedt en daarmee welke soorten er daadwerkelijk voor kunnen komen. Vervolgens zijn de mogelijke effecten op de verwachte beschermde soorten beschreven.

Op basis van de doorlopen procedures zijn conclusies getrokken met betrekking tot de eventuele negatieve effecten en/of obstakels inzake de Wet natuurbescherming.

Op vrijdag 29 juli 2022 is de locatie tussen 16:00 en 17:00 uur ter plaatse geïnventariseerd, om te onderzoeken of het plangebied een zodanig belangrijke status heeft dat een aanvullend veldonderzoek noodzakelijk is. Op het moment van inventarisatie was het 23 graden Celsius en zonnig.

Op basis van terreinkenmerken is beoordeeld of het terrein geschikt is voor de, in de regio voorkomende, beschermde soorten.

Doelstelling

Om een indicatie te krijgen van de effecten die de sloop- en bouwwerkzaamheden hebben op de natuurwaarden binnen het plangebied, dienen de volgende vragen te worden beantwoord:

1. Welke wettelijk beschermde soorten komen in het plangebied voor? Welke status hebben deze soorten?
2. Welke invloed heeft de geplande ingreep in het betreffende gebied op de beschermde soorten en komt daarmee de staat van instandhouding in gevaar?
3. Hoe dient omgegaan te worden met eventuele negatieve effecten van het plan op wettelijk beschermde planten- en diersoorten, en welke vervolgstappen zijn nodig?

1 Toetsingskader

Wet natuurbescherming

De bescherming van natuur is in Nederland vastgelegd in nationale wetgeving. De nationale wetgeving is een Nederlandse implementatie van de belangrijkste Europese wetgevingselementen. Per 1 januari 2017 zijn de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998 vervangen door de Wet natuurbescherming. De uitvoering van deze nieuwe wet is grotendeels in handen van de provincies gekomen.

1.1 Gebiedsbescherming

De Wet natuurbescherming noemt bekende maar ook enkele nieuwe soorten natuurgebieden die bescherming behoeven: de Natura 2000-gebieden, het Natuurnetwerk Nederland (NNN), bijzondere provinciale natuurgebieden en landschappen, bijzondere nationale natuurgebieden en de nationale parken. Bij ontwikkelingen met name in het buitengebied moet rekening worden gehouden met het al dan niet van toepassing zijn van de beschermingsregimes van deze natuurgebieden. Ieder gebied kent een eigen beschermingsregime dat afzonderlijk gewogen dient te worden in relatie tot plannen, projecten en andere handelingen met mogelijk nadelige effecten voor de beschermde natuurwaarden.

Natura 2000-gebieden

De bekendste natuurgebieden zijn de Natura 2000-gebieden, zij kennen tevens het meest strikte beschermingsregime. De basis voor Natura 2000 zijn de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. In Nederland zijn 164 gebieden als Natura 2000-gebied aangewezen. Voor ieder gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen bepaald die betrekking kunnen hebben op de bescherming van specifieke flora en fauna alsook leefgebieden van soorten. Alle projecten en handelingen binnen of buiten de gebiedsgrenzen mogen geen verstorend of verslechterend effect hebben op de instandhoudingsdoelstellingen. Voor de voorgenomen ontwikkeling is hier, voor zover van toepassing, separaat aan getoetst. In deze rapportage wordt hier verder niet op ingegaan.

Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS) is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. De provincies zijn belast met de taak een dergelijk netwerk tot stand te laten te komen en in stand te laten. De uitvoering hiervan is hoofdzakelijk gestuurd vanuit de ruimtelijke ordening (provinciale verordeningen). Binnen het Natuurnetwerk Nederland geldt een “nee, tenzij”- benadering.

Overige gebieden

Naast de bovengenoemde gebieden kunnen gebieden aangewezen worden als ‘bijzondere provinciale natuurgebieden’, ‘bijzondere provinciale landschappen’ of ‘nationaal park’. De bescherming van deze gebieden vindt net als bij het NNN plaats via het ruimtelijk spoor. Daarnaast kan een gebied aangewezen worden als ‘bijzonder nationaal gebied’, een soort voorloper van de aanwijzing als Natura 2000-gebied. De bescherming van deze gebieden stemt dan ook overeen met de bescherming van Natura 2000-gebieden.

1.2 Soortenbescherming

De Wet natuurbescherming deelt soorten in drie beschermingsregimes in. Daarnaast zijn er vrijgestelde soorten en jaarrond beschermde vogelnesten.

- 1) Beschermingsregime soorten vogelrichtlijn
- 2) Beschermingsregime soorten habitatrichtlijn
- 3) Beschermingsregime andere soorten
- 4) Vrijgestelde soorten
- 5) Jaarrond beschermde vogelnesten

Vogelrichtlijn

Onder de soorten van de Vogelrichtlijn vallen alle van nature in Nederland in het wild levende vogels. Het is verboden om:

- Opzettelijk vogels te doden of te vangen;
- Opzettelijk vogelnesten, -rustplaatsen en – eieren te vernielen of te beschadigen of vogelnesten weg te nemen;
- Eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben;
- Opzettelijk vogels te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

Habitatrichtlijn

Onder de soorten van de Habitatrichtlijn vallen soorten die genoemd zijn in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage I van het Verdrag van Bonn. In de Bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd.

Wat betreft deze soorten is het verboden om:

- Opzettelijk dieren te doden of te vangen;
- Opzettelijk dieren te verstoren;
- Opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen;
- Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
- Opzettelijk planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken, te verzamelen, af te snijden, te onttwortelen of te vernielen.

Ook is het verboden deze soorten te verkopen, te vervoeren voor verkoop, te verhandelen, te ruilen of te kopen, tenzij het gaat om gefokte of gekweekte dieren of planten.

Andere soorten

Onder het beschermingsregime andere soorten vallen soorten waarvan er geen Europese verplichting tot bescherming is. Dit zijn soorten die vanuit nationaal belang extra bescherming behoeven. Het beschermingsniveau van deze soorten kan per provincie verschillen.

Het is verboden om:

- 1) Opzettelijk dieren te doden of te vangen;
- 2) Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
- 3) Opzettelijk (vaat)planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken te verzamelen, af te snijden, te onttwortelen of te vernielen.

Provincies hebben de bevoegdheid om bij provinciale verordening vrijstelling te verlenen voor nationaal beschermde soorten.

Vrijgestelde soorten

De verboden zijn niet van toepassing op de bosmuis, de huisspitsmuis en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevinden. Ook vallen de zwarte rat, bruine rat, huismuis, de mol en exoten niet onder beschermingsregime van de Wet natuurbescherming en mogen opzettelijk gedood en gevangen worden. Daarnaast geldt, zoals hierboven reeds aangegeven, dat provincies de bevoegdheid hebben vrijstelling te verlenen voor bepaalde soorten.

Jaarrond beschermde vogelnesten

De opgestelde lijst met jaarrond beschermde nesten voor vogels is een beleidsdocument dat voortvloeit uit de voormalige Flora- en faunawet en meegenomen is onder de Wet natuurbescherming. De nesten zijn ingedeeld in categorieën (1 t/m 5) waarvan de categorie 1 t/m 4 jaarrond beschermd zijn. Nesten in categorie 5 zijn enkel beschermd bij afwezigheid van voldoende alternatieven.

- 1) Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats
- 2) Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
- 3) Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
- 4) Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen.
- 5) Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen.

1.3 Houtopstanden

De regels van de Boswet zijn grotendeels onveranderd opgenomen in de Wet natuurbescherming. Een houtopstand is een zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend, die een oppervlakte van 10 are of meer beslaat ofwel een rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat.

Buiten de bescherming vallen:

- houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom (voor deze wet);
- houtopstanden op erven of in tuinen
- fruitbomen en windschermen om boomgaarden;
- naaldbomen bedoeld als kerstbomen en niet ouder dan twintig jaar
- kweekgoed;
 - uit populieren of wilgen bestaande wegbeplantingen,
 - beplantingen langs waterwegen, en
 - eenrijige beplantingen langs landbouwgronden;
- Het dunnen van een houtopstand;
- uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die zijn bedoeld voor de productie van houtige biomassa indien zij:
 - ten minste eens per tien jaar worden geoogst;
 - bestaan uit minstens tienduizend per hectare per beplantingseenheid
 - bestaande uit een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee meter;
 - zijn aangelegd na 1 januari 2013.

2

Onderzoeksresultaten

2.1 Bronnenonderzoek

Gegevens van websites als www.waarneming.nl zijn geraadpleegd voor achtergrondinformatie. Een groot aantal amateurs en professionals publiceert op deze bekende websites zijn natuurwaarnemingen, die worden gecontroleerd door een validatiecommissie. Zodoende zijn de waarnemingen uit deze bronnen redelijk betrouwbaar, maar moeilijk te verifiëren. De waarnemingen geven eventueel wel een indicatie van soorten waar tijdens het veldonderzoek extra aandacht aan besteed dient te worden.

Natuurnetwerk Nederland

Het natuurbeheerplan is een beleidskader om het Europese, rijks- en provinciale natuur- en landschapsbeleid te realiseren. Het gaat hier om bestaande natuurgebieden, gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt, landbouwgebieden worden ingericht en beheerd volgens agrarisch natuurbeheer en de Natura 2000-gebieden.

Het plangebied ligt nabij het Natuurnetwerk Nederland en buiten andere natuurgebieden zoals Natura 2000. Het meest dichtbijgelegen Natura 2000-gebied is het Natura 2000-gebied “Sint Jansberg”. Dit Natura 2000-gebied is gelegen op een afstand van ca. 100 meter vanaf de projectlocatie.

De Limburgse natuurgebieden, waaronder ook de Natura 2000-gebieden, vormen samen het Limburgse deel van het Natuurnetwerk Nederland (samen ca. 53.000 ha). Het Natuurnetwerk Limburg is gelegen in delen van beekdalen, op hellingen en op veen- en stuifzandgebieden van de hoger gelegen gebieden. Binnen het Natuurnetwerk Limburg wordt ingezet op een goede kwaliteit en bescherming van de natuur met een bijzonder accent op bedreigde Limburgse dier- en plantensoorten. Daarnaast wordt ingezet op het bieden van mogelijkheden voor natuurbeleving.

De Natura 2000-gebieden (ca. 17.000 ha) vormen een selectie binnen het Natuurnetwerk Limburg. Hier ligt de absolute nadruk op de natuurwaarden: het zo spoedig mogelijk en verantwoord bereiken van een gunstige staat van instandhouding van de soorten en habitatten, waarop de aanwijzing als Natura 2000-gebied is gebaseerd. De Natuurbeheerplannen van de 23 Natura 2000-gebieden in Limburg geven inzicht in hetgeen daarvoor nodig is. Er zijn ook Natura 2000-gebieden (net) buiten de provinciegrens. Vanuit de Europese wet- en regelgeving geldt een strenge wet- en regelgeving gericht op beheer en bescherming van de natuurwaarden. Onder andere via het Aanvalsplan Stikstof wordt gewerkt aan het verbeteren van de omgevingskwaliteit van de Natura 2000-gebieden.



• Afbeelding 2: ligging Natuurmetwerk Nederland en Natura 2000
(bron: atlasleefomgeving.nl/kaarten, geraadpleegd op 13/07/2022)

2.2 **Veldonderzoek**

Op verschillende punten in het plangebied zijn waarnemingen verricht. Tijdens het veldbezoek is het gebied beoordeeld op de aanwezigheid van beschermde soorten en de habitatgeschiktheid voor beschermde soorten. Er is extra aandacht besteed aan de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen en vogelnesten.

De ecologische factoren in de omgeving zijn met behulp van een digitale fotocamera vastgelegd. Om de flora en fauna te kunnen determineren, is gebruik gemaakt van eigen kennis en literatuur.

• Afbeelding 3: buitenzijde te slopen stallen



• Afbeelding 4: caravanstalling in te slopen varkensstal niet geïsoleerd



• Afbeelding 5: binnenzijde te slopen varkensstal achterste gedeelte



- Afbeelding 6: buitenzijde te slopen stal



- Afbeelding 7: locatie nieuw te bouwen woning



• Afbeelding 8: achterzijde erf



• Afbeelding 9: zijkant locatie woning voorzide wordt gesloopt



- Afbeelding 10: solitaire bomen in het veld



- Afbeelding 11: zij aanzicht te slopen stal



• Afbeelding 12: solitaire zomereiken (ca. 20 – 30 jaar oud)



• Afbeelding 13: solitaire zomereiken (ca. 20 – 30 jaar oud)



• Afbeelding 14: zicht op bestaande woning



• Afbeelding 15: zijkant tuin



• Afbeelding 16: dak aansluiting te slopen woning



• Afbeelding 17: te slopen woning



• Afbeelding 18: te slopen woning



• Afbeelding 19: aanzicht te slopen loods



Flora algemeen

Bij de planlocatie zijn geen bijzondere beplantingen aangetroffen. Er is tevens gelet op de aanwezigheid van (beschermd) muurvegetatie. Op het erf staan diverse hagen, waarvan het merendeel bestaat uit beuken. De aanwezige laurier wordt vervangen door een inheemse soort. Aan de linkerzijde van het perceel, waar de nieuwe woning is voorzien, staan solitaire zomereiken van circa 20 – 30 jaar oud. Aan de rechterzijde staan verschillende solitaire zomereiken van circa 60 jaar. Alle beplanting blijft behouden. De houtwallen rondom het perceel bestaan o.a. uit meidoorn, vlier, vogelkers en hazelaar.

Grondgebonden zoogdieren

Specifiek wordt bekeken of binnen de betreffende inrichting verwacht kan worden of er streng beschermde zoogdieren; steenmarter, bunzing, hermelijn, wezel, eekhoorn, bever en das kunnen worden aangetroffen.

Door de aanwezigheid van katten, is dit geen interessante locatie voor grondgebonden zoogdieren. Er zijn sporen van muizen en mollen waargenomen.

Steenmarter

De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor de steenmarter. Steenmarters gebruiken hoozolders, loze ruimtes onder het dak, schuurtjes en dergelijke, als verblijfplaats. Een steenmarter heeft binnen zijn territorium verscheidene verblijfplaatsen. Daarnaast laten steenmarters enorm veel sporen achter. Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen, zoals uitwerpselen of prooi-resten aangetroffen die duiden op het gebruik van de onderzoekslocatie als vaste rust- of verblijfplaats door deze soort.

Kleine marterachtigen

De onderzoekslocatie biedt geen geschikte verblijflocaties voor de hermelijn, wezel en bunzing. De soorten maken gebruik van oude holen van onder andere mollen en muizen, maar ook houtwallen, steenhopen en ruimtes onder boomwortels. Desbetreffende soorten hebben binnen hun territorium verscheidene verblijfplaatsen. Tijdens het veldbezoek zijn er geen marters of sporen van marters aangetroffen op de onderzoekslocatie. Echter, dit betekent niet dat het gebied niet potentieel in gebruik is door de hermelijn, wezel en/of bunzing als migratieroute. Indien bij sloop/herinrichting van het gebied groenstructuren rond het perceel behouden blijven, is er geen sprake van een negatief effect op genoemde soorten.

Eekhoorn

De onderzoekslocatie is vanwege de afwezigheid van voldoende bomen niet geschikt als habitat voor de eekhoorn. Er staan te weinig bomen rondom de projectlocatie. Tevens worden er met de werkzaamheden geen bomen verwijderd. Een negatief effect als gevolg van de werkzaamheden is uitgesloten.

Bever

Voor de bever is op de onderzoekslocatie geen geschikt habitat aanwezig. Vaste rust- en verblijfplaatsen van de bever kunnen worden uitgesloten.

Das

Tijdens het veldbezoek zijn op de onderzoekslocatie en de directe omgeving geen loop- of eetsporen, latrines en/of wissels aangetroffen die duiden op de aanwezigheid en/of het gebruik van de onderzoekslocatie door de das. De planlocatie is gelegen in een dassengebied. Er zijn geen dassenburchten waargenomen in de houtwallen rondom het perceel. Dassen zullen eerder hun leefgebied hebben in de nabij gelegen natuurgebieden en de aansluitende weilanden. Verstoring ten aanzien van de das als gevolg van de voorgenomen ingreep is niet aan de orde.

Het voorkomen van overige grondgebonden zoogdieren waarvoor geen vrijstelling geldt, is tijdens het veldbezoek niet vastgesteld.

Vleermuizen

Het plangebied is zeer nauwkeurig beoordeeld op de mogelijke waarde voor vleermuizen. Hierbij is gelet op de geschiktheid van de aanwezige bebouwing als verblijfplaats voor deze dieren: aanwezigheid van spouwgaten en andere openingen in muren en daken, vetstreden, uitwerpselen en prooiresten bij gevelopeningen.

Verblijfsruimte voor vleermuizen hebben specifieke voorwaarden zoals een stabiele temperatuur en het tochtvrij zijn. Bij vleermuizen worden vier verblijfplaatsen onderscheiden; winterverblijven, zomerverblijven, kraamverblijven en paarverblijven. Aan de winterverblijven worden de hoogste eisen gesteld, daarna de kraamverblijven, dan de zomerverblijven en tenslotte de paarverblijven, waarbij de vleermuizen een zeer korte tijd op een bepaalde locatie kunnen verblijven.

De voormalige varkensstal is op het moment in gebruik als caravanstalling. Deze is geheel ongeïsoleerd. De te slopen woning wordt bewoond en is ongeïsoleerd. De woning bestaat uit houten wanden, enkel glas en golfplaten. Er zijn in en om de te slopen varkensstal en in het te slopen woonhuis geen sporen (vetstreden, uitwerpselen, prooiresten) aangetroffen.

Voerageerhabitat

De onderzoekslocatie zal, gelet op de aanwezige habitat, gebruikt kunnen worden door in de omgeving verblijvende vleermuizen om te voerageren. De plannen zullen echter geen aantasting van belangrijk voerageerhabitat vormen. Door de voorgenomen ingreep zal het aanbod van voerageermogelijkheden niet in het geding komen. In de directe omgeving is meer geschikt voerageerhabitat voor vleermuizen aanwezig in de vorm van bomenrijen en bosranden.

Vliegroutes

Vleermuizen maken veelal gebruik van lijnvormige (donkere) landschapselementen zoals houtsingels, beken en lanen om zich te verplaatsen tussen verblijfplaatsen en voerageergebieden. Doordat dergelijke lijnvormige elementen ontbreken op de onderzoekslocatie, worden er geen potentiële vliegroutes verstoord.

Vogels

Tijdens het bezoek is met name gelet op de aanwezigheid van nesten en rustplaatsen voor vogels.

Er zijn broedvogels waarvan de nesten ook beschermd zijn op het moment dat ze niet voor de voortplanting in gebruik zijn. Binnen het agrarische (buiten)gebied kunnen dit zijn: boomvalk, buizerd, havik, sperwer, wespandief, huismus, steenuil en de kerkuil.

Boomvalk

De boomvalk is een soort die geen eigen nest maakt, maar broedt in gebruikte kraaien- en/of eksternesten in verschillende typen bos(randen) of in solitaire bomen, populierensingels, of op erven. De soort komt vooral voor in open en halfopen landschappen zoals boerenland en dorpen, alsook in buitenwijken van steden. De bomen op- en nabij de projectlocatie zijn gecontroleerd op dergelijke nesten, deze zijn niet aangetroffen. Evenmin worden er met de beoogde werkzaamheden bomen verwijderd. Negatieve effecten op de boomvalk als gevolg van de werkzaamheden zijn derhalve niet aan de orde.

Buizerd en havik

De buizerd en havik broeden op grote nesten van ongeveer een meter in doorsnede en 60 centimeter diep. Dergelijke nesten zijn tijdens het veldbezoek niet waargenomen. Een broedgeval van de buizerd en havik is daarom uit te sluiten. Eveneens worden er met de beoogde werkzaamheden geen bomen gekapt, zodat het wegnemen van een jaarrond beschermd nest kan worden uitgesloten.

Wespendief en sperwer

De wespandief is doorgaans gebonden aan grotere bosgebieden van zowel loof- als naaldbomen. Bij voorkeur is er afwisseling binnen het bosgebied aanwezig in de vorm van open plekken. De sperwer broedt bij voorkeur meer verborgen in naaldbomen. Beide situaties zijn op de onderzoekslocatie niet aanwezig. Gezien de ligging van de onderzoekslocatie binnen agrarisch gebied en de afwezigheid van voldoende dekking is een nestplaats van de sperwer of wespandief niet te verwachten. Eveneens zijn er tijdens het veldbezoek geen nesten aangetroffen. Een broedgeval van zowel de wespandief als de sperwer zijn uitgesloten.

Steenuil en kerkuil

De kerkuil en steenuil hebben een voorkeur voor cultuurlandschappen met allerlei landschapselementen die voor afwisseling zorgen. Beide soorten broeden in gebouwen en gebruiken ook graag speciale nestkasten. Daarnaast worden door de steenuil ook wel boomholten gebruikt, mits er zich grote holten in bevinden. De gebouwen zijn in zijn geheel gecontroleerd op de aanwezigheid van steen- en kerkuilen en is vooral gelet op de aanwezigheid van sporen; braakballen, veren en uitwerpselen. Er zijn geen (sporen van) steen- en kerkuilen waargenomen. Er is geen sprake van een afname van belangrijk foerageergebied. Er blijft er voldoende foerageergebied aanwezig in de omgeving.

Huismus

Ook voor de huismus, die veel te vinden is in agrarisch gebied en vooral gebonden aan gebouwen is, is het nest jaarrond beschermd. Er zijn geen nesten van huismussen gevonden in de te slopen bebouwing. Huismussen zijn aanwezig bij de naastgelegen woning buiten het plangebied.

Overige broedvogels

De beplanting op de onderzoekslocatie kan nestgelegenheid bieden aan broedvogelsoorten zoals de merel en winterkoning. De nesten van deze soorten zijn alleen beschermd op het moment dat ze als zodanig in gebruik zijn. Er zijn geen nesten van overige broedvogels aangetroffen in de te slopen bebouwing.

Er zijn vogels gezien en gehoord, namelijk:

• Tabel 1: overzicht waargenomen vogels

Soort
Buizerd (overvliegend)
Huismussen (gehoord, aanwezig bij naastgelegen woonhuis)
Merel
Houtduiven
Koolmees

Reptielen, amfibieën en vissen

Er zijn tijdens het terreinbezoek geen reptielen, amfibieën en/of vissen waargenomen.

Voor de in Nederland voorkomende reptielsoorten zoals de hazelworm, de levendbarende hagedis en ringslang biedt de onderzoekslocatie geen geschikt habitat. Deze soorten worden vrijwel alleen aangetroffen in specifieke natuurgebieden.

Dit geldt ook voor de specifieke beschermende amfibieënsoorten die veel eisen stellen aan zijn habitat; alpenwatersalamander, heikikker, vinpootsalamander, poelkikker en rugstreeppad. Deze zijn allen uit te sluiten omdat de betreffende locatie geen goed habitat biedt voor deze soorten door het ontbreken van voldoende oppervlaktewater.

De onderzoekslocatie vormt wel een geschikt habitat voor algemene amfibieënsoorten als de bruine kikker en de gewone pad. Op de onderzoekslocatie kunnen deze soorten beschutting vinden tussen de begroeiing en onder de takken- of stenenhopen. Voor algemene

amfibieënsoorten geldt in het kader van de Wet natuurbescherming een vrijstelling, zodat een ontheffing bij verstoring niet noodzakelijk is. Het is echter wel zaak om aandacht te schenken aan de zorgplicht.

Vissen

Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater op de onderzoekslocatie kan deze soortgroep buiten beschouwing worden gelaten.

Overige

Van de overige soortgroepen, zoals dagvlinders, insecten en libellen, kan worden aangenomen dat deze soorten gedurende het jaar in het plangebied aanwezig kunnen zijn of dit gebied in de migratieroute hebben liggen.

Afhankelijk van het seizoen zijn mogelijk algemene soorten te vinden op/of binnen de planlocatie. Specifieke beschermende soorten zijn voornamelijk afhankelijk van specifieke terreinkenmerken met specifieke biotopen. Binnen het plangebied is een dergelijk biotoop niet aanwezig.

2.3 Effecten van de ingreep

De effecten op beschermde soorten zijn onderzocht op basis van het voornemen binnen het plangebied.

Flora algemeen

Er is geen bijzondere flora aangetroffen binnen het plangebied, negatieve effecten zijn uitgesloten.

Grondgebonden zoogdieren

Verstoring van algemene zoogdieren vindt mogelijk plaats. De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor een aantal soorten grondgebonden zoogdieren. Het gaat daarbij om algemene soorten als de egel, konijn en diverse muissoorten. De verblijfplaatsen van deze soorten worden door de voorgenomen ingreep echter niet aangetast. Verblijfplaatsen van beschermde zoogdiersoorten zijn ter plaatse niet aangetroffen.

Vleermuizen

Er zijn geen sporen van vleermuizen aangetroffen waaruit blijkt dat de gebouwen als verblijfplaats worden gebruikt. Nader onderzoek in het kader van de soortenbescherming is niet noodzakelijk.

Vogels

Door de voorgenomen ingreep worden geen vogels en jaarrond beschermde nesten aangetast.

Reptielen, amfibieën en vissen

Er zijn geen reptielen, amfibieën en/of vissen waargenomen. De instandhoudingsdoelstellingen komen niet in het gedrang.

Overige

Omdat er geen geschikt biotoop is waargenomen voor overige beschermde soorten, zijn negatieve effecten uitgesloten. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

3

Conclusie en aanbevelingen

Het natuuronderzoek is gebaseerd op inventarisatiegegevens van derden, literatuuronderzoek en een verkennend veldbezoek aan het plangebied. Het beeld dat uit het onderzoek naar voren is gekomen vormt voldoende basis om gefundeerd uitspraken te doen over de gevolgen van de voorgenomen werkzaamheden voor beschermde soorten en gebieden.

3.1 Conclusie

Voor de bepaling van de effecten en voor de beantwoording van de vraag of men in strijd komt met de Wet natuurbescherming, wordt de relatie gelegd tussen het initiatief met deze wet door waar mogelijk antwoord te geven op de volgende vragen:

1. *Welke wettelijk beschermde soorten komen in het plangebied voor? Welke status hebben deze soorten?*
2. *Welke invloed heeft de geplande ingreep in het betreffende gebied op de beschermde soorten en de staat van instandhouding?*
3. *Hoe dient omgegaan te worden met eventuele negatieve effecten van het plan op wettelijk beschermde planten- en diersoorten, en welke vervolgstappen zijn nodig?*

Het voornemen zoals opgenomen in de inleiding en de daarbij behorende werkzaamheden, zal naar verwachting geen negatief effect hebben op de staat van instandhouding van beschermde soorten. Binnen het plangebied zijn geen (verblijfplaatsen van) strikt beschermde soorten aangetroffen die door de werkzaamheden worden beïnvloed.

Uit de effectenbeschrijving blijkt dat er geen onevenredige directe of indirecte gevolgen zijn van de voorgenomen activiteiten op de voortplanting en instandhouding van beschermde dieren/of plantsoorten. Lokaal zullen mogelijk algemene soorten uit het plangebied trekken op zoek naar een vervangende biotoop.

Voor aanvang van de werkzaamheden dient derhalve geen aanvullend onderzoek plaats te vinden. Een ontheffing met betrekking tot aantasting van beschermde soorten is niet nodig. De werkzaamheden kunnen leiden tot een beschadiging of vernietiging van mogelijke verblijfplaatsen en/of verstoring van eventueel aanwezige algemene soorten. Een algehele vrijstelling is hierop van toepassing. De algemene zorgplicht blijft onverminderd van toepassing.



Literatuur

- Broekhuizen, S., Hoekstra, B., Laar, van, V., Smeenk, C. & Thissen, J.B.M., 1992
Atlas van de Nederlandse zoogdieren. Stichting uitgeverij van de KNNV, Utrecht.
- Europese Gemeenschappen,
Richtlijn no 92/409 inzake het behoud van de vogelstand. Brussel, 1979.
- Europese Gemeenschappen,
Richtlijn no 92/43 inzake instandhouding van de natuurlijke habitat en de wilde flora en fauna. Brussel, 1992.
- Provinciale Verordening (Wet) natuurbescherming
- Hollander, H., & Geest, van der, P., 1994.
Rode-Lijst van bedreigde zoogdieren in Nederland.
Red data book of threatened mammals in the Netherlands. Vereniging voor Zoogkunde en Zoogdierbescherming, Utrecht.
- Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Ministerie van Volkshuisvesting.
Ruimtelijke Ordening en milieu, 2004. Nota Ruimte.
- De Nederlandse libellen, Nederlandse Fauna, deel 4
Nationaal historisch museum, KNNV uitgeverij (2002)
- Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ)
- Vleermuizen en planologie, Zoogdierverseniging (2010)
- Wet natuurbescherming.
Vastgesteld d.d. 1 januari 2017.
- www.waarneming.nl
- www.synbiosys.alterra.nl
- www.atlasleefomgeving.nl
- www.ravon.nl
- www.sovon.nl
- www.google.nl
- www.ndff.nl
- www.floron.nl
- www.ruimtelijkeplannen.nl
- www.natura2000.nl
- www.ecologica.eu

1 Bijlage

Waarnemingen

Waarneming.nl NL Log in of registreer

Invoeren Ontdek Projecten Over ons Community

Milsbeek - Koningsvennen Limburg

Details Waarnemingen Foto's Geluiden Soorten gezien Ranglijst waarnemers

Naam	Data	Aantal	Gebruiker	Waarnemingen
Milsbeek - Koningsvennen	waarnemingen	9.595	Fred Hustings	2.968
Oppervlakte	gebruikers	466	Gert-Jan Caspers	487
Gemeente	Foto's	2.057	Bart Hoogesteger	322
Provincie	geluiden	3	rob en henny gorissen	302
	soorten	866	Joop Verbrugh	254

Waarneming.nl NL Log in of registreer

Invoeren Ontdek Projecten Over ons Community

Milsbeek - Koningsvennen Limburg

Details Waarnemingen Foto's Geluiden Soorten gezien Ranglijst waarnemers

2022-06-28 - 2022-07-13 selecteer een soort Alle soortgroepen Alle zeldzaamheden

Zoek Waarnemingen van iedereen Filter Wis filters Als kaart ☐ Toon geavanceerd

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2022-07-13 00:00	 Pinokkiomot - <i>Synapse punctalis</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	
2022-07-12 23:30	 Gewone worteluil - <i>Agrotis exclamationis</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	
2022-07-12 23:45	 Graswortelvlinder - <i>Apamea monoglyphia</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	
2022-07-12 23:32	 Oranje/Lichte boogbladroller - <i>Acleris notana/ferrugana</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	
2022-07-12 20:14	 Klein vliegend hert - <i>Dorcus parallelipipedus</i>	1 imago	Koningsvennen	J.W.	
2022-07-12 20:24	 Grote wederik - <i>Lysimachia vulgaris</i>	1	Koningsvennen	J.W.	
2022-07-10 23:05	 Gammalpalpmot - <i>Teleiodes vulgella</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	
2022-07-09 21:11	 Schildstipspanner - <i>Idaea biselata</i>	1 imago	Koningsvennen	Joke Andringa	
2022-07-09 23:25	 Schaduwstipspanner - <i>Idaea rusticata</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	
2022-07-09 23:27	 Graswortelvlinder - <i>Apamea monoglyphia</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	
2022-07-09 23:21	 Maïsboorder - <i>Ostrinia nubilalis</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	
2022-07-09 23:28	 Zwartrugrenspin - <i>Philodromus dispar</i>	1	Koningsvennen	Wouter Bos	
2022-07-08 23:20	 Paardenbloembladroller - <i>Celypha striana</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	
2022-07-08 23:22	 Sladistelknoopvlekje - <i>Eucosma conterminana</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	
2022-07-08 23:10	 Muntbladroller - <i>Phalonidia manniana</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	
2022-07-08 22:47	 Zwartbruine vlakjesmot - <i>Catoptria verellus</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	
2022-07-08 23:07	 Kroosvlindertje - <i>Cataglyphis lemnae</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	
2022-07-08 09:58	 Blauwe glazenmaker - <i>Aeshna cyanea</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	
2022-07-08 23:05	 Gemaskeerde roofwants - <i>Reduvius personatus</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	
2022-07-07 00:10	 Lijnsnuituil - <i>Herminia tarsipennalis</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	
2022-07-07 23:52	 Hazelaaruil - <i>Colocasia coryli</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	
2022-07-07 00:34	 Hazelaaruil - <i>Colocasia coryli</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	
2022-07-07 00:06	 Bruine huismot - <i>Hofmannophila pseudospretella</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	
2022-07-07 23:19	 Grijsgeklepte grasmineermot - <i>Elachista maculicerusella</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	
2022-07-07 00:24	 Grijsgeklepte grasmineermot - <i>Elachista maculicerusella</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2022-07-07 00:12	 Klispalmot - <i>Metzneria lappella</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	 
2022-07-07 00:05	 Slangenkruidbladroller - <i>Lobesia abscisana</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	 
2022-07-07 22:39	 Scherpe hermelijnbladroller - <i>Notocelia roborana</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	 
2022-07-07 00:27	 Bonte brandnetelmot - <i>Anania hortulata</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	 
2022-07-07 23:37	 Buxusmot - <i>Cydalima perspectalis</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	 
2022-07-07 23:26	 <i>Limnephilus lunatus</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	 
2022-07-06 23:51	 Koolmotje - <i>Plutella xylostella</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	 
2022-07-06 23:08	 Koolmotje - <i>Plutella xylostella</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	 
2022-07-06 23:54	 Zwaveldominomot - <i>Oegoconia caradjai</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	 
2022-07-06 23:56	 Puntvleugelpalmot - <i>Brachmia blandella</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	 
2022-07-06 23:28	 Puntvleugelpalmot - <i>Brachmia blandella</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	 
2022-07-06 23:25	 Kameleonbladroller - <i>Acleris hastiana</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	 
2022-07-06 23:07	 Donker c-smalsnuitje - <i>Aethes rubigana</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	 
2022-07-06 23:48	 Distelbladroller - <i>Agapeta hamana</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	 
2022-07-06 23:14	 Paardenbloembladroller - <i>Celypha striana</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	 
2022-07-06 23:55	 Distelknoopvlekje - <i>Eucosma cana</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	 
2022-07-06 23:19	 Distelknoopvlekje - <i>Eucosma cana</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	 
2022-07-06 23:06	 Gewone grasmot - <i>Chrysoteuchia culmella</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	 
2022-07-06 23:33	 Oranjebruine grasmot - <i>Pediasia contaminella</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	 
2022-07-06 23:22	 Parelmoermot - <i>Pleuropteryx ruralis</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	 
2022-07-06 23:26	 <i>Helcon spec.</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	 
2022-07-06 23:57	 <i>Enicospilus ramidulus</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	 
2022-07-05 22:33	 V-dwergspanner - <i>Chloroclystis v-ata</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	 
2022-07-05 23:20	 Grote meelmot - <i>Pyralis farinalis</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	 
2022-07-05 16:25	 Bosmestkever - <i>Geotrupes stercorosus</i>	1 imago	Koningsvennen	Piet Smeets	 

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2022-07-05 16:07	🟡 Klein vliegend hert - <i>Dorcus parallelipipedus</i>	1 ♂ imago	Koningsvennen	Piet Smeets	📷 📷
2022-07-04 11:09	🟢 Gewone viltvlieg - <i>Thereva nobilitata</i>	1 imago, gezien	Koningsvennen	Pieter Bruijsten	📷 📷
2022-07-04 11:05	🟢 Zwarte sneeuwballuis - <i>Aphis viburni</i>	1 gal, gezien	Koningsvennen	Pieter Bruijsten	📷 📷
2022-07-03 16:30	🟢 Bruin zandoogje - <i>Maniola jurtina</i>	1	Koningsvennen	Martin Broodbakker	📷 📷
2022-07-03 23:05	🟢 V-dwergspanner - <i>Chloroclystis v-ata</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	📷 📷
2022-07-03 22:41	🟢 Zwartkamdwergspanner - <i>Gymnoscelis rufifasciata</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	📷 📷
2022-07-03 22:48	🟢 Zilverstreep - <i>Deltoide bankiana</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	📷 📷
2022-07-03 00:05	🟢 Distelbladroller - <i>Agapeta hamana</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	📷 📷
2022-07-03 00:26	🟢 Bramenbladroller - <i>Notocelia uddmanniana</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	📷 📷
2022-07-03 23:02	🟢 Platte wielwebspin - <i>Nuctenea umbratica</i>	1	Koningsvennen	Wouter Bos	📷 📷
2022-07-02 07:39	🟢 Kleine Plevier - <i>Charadrius dubius</i>	4	Koningsvennen	Fred Hastings	📷
2022-07-02 07:59	🟢 Buizerd - <i>Buteo buteo</i>	2	Koningsvennen	Fred Hastings	📷
2022-07-02 07:52	🟢 Middelste Bonte Specht - <i>Dendrocoptes medius</i>	1	Violenberg	Fred Hastings	📷 📷
2022-07-02 07:51	🟢 Koolmees - <i>Parus major</i>	1	Violenberg	Fred Hastings	📷
2022-07-02 07:39	🟢 Spreeuw - <i>Sturnus vulgaris</i>	100	Koningsvennen	Fred Hastings	📷
2022-07-02 07:46	🟢 Roodborsttapuit - <i>Saxicola rubicola</i>	3 baltsend / zingend	Koningsvennen	Fred Hastings	📷
2022-07-02 07:49	🟢 Boompieper - <i>Anthus trivialis</i>	2 baltsend / zingend	Koningsvennen	Fred Hastings	📷
2022-07-02 08:02	🟢 Appelvink - <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	3 ♂	Koningsvennen	Fred Hastings	📷 📷
2022-07-02 14:47	🟢 Dagpauwoog - <i>Aglais io</i>	1	Koningsvennen	Joop Verbrugh	📷
2022-07-02 23:16	🟢 Schaduwstipspanner - <i>Idaea rusticata</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	📷 📷
2022-07-02 23:51	🟢 Lijnsnuituil - <i>Herminia tarsipennalis</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	📷 📷
2022-07-02 00:01	🟢 Lijnsnuituil - <i>Herminia tarsipennalis</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	📷 📷
2022-07-02 23:51	🟢 Heremietuil - <i>Ipimorpha retusa</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	📷 📷
2022-07-02 23:21	🟢 Gamma-uil - <i>Autographa gamma</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	📷 📷
2022-07-02 23:18	🟢 Bruine huismot - <i>Hofmannophila pseudospretella</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	📷 📷

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2022-07-02 21:58	▲ Bruine huismot - <i>Hofmannophila pseudospretella</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	■ 📷
2022-07-02 23:58	▲ Grijsgeklepte grasmineermot - <i>Elachista maculicerusella</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	■ 📷
2022-07-02 23:29	▲ Lisdodeveertje - <i>Limnaecia phragmitella</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	■ 📷
2022-07-02 23:48	▲ Distelknoopvlekje - <i>Eucosma cana</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	■ 📷
2022-07-02 23:43	▲ Bleke grasmot - <i>Crambus perlella</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	■ 📷
2022-07-02 23:34	▲ Blauwooggrasmot - <i>Agriphila straminella</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	■ 📷
2022-07-02 23:31	▲ Bonte brandnetelmot - <i>Anania hortulata</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	■ 📷
2022-07-02 17:41	▲ Weidebeekjuffer - <i>Calopteryx splendens</i>	10 imago	Koningsvennen	Jan Kuper	📷
2022-07-02 23:03	▲ Dansmug onbekend - <i>Chironomidae</i> indet.	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	■ 📷
2022-07-02 22:52	▲ Veldmestkever onbekend - <i>Aphodius spec.</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	■ 📷
2022-07-02 23:19	▲ <i>Hemerobius humulinus</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	■ 📷
2022-07-01 23:28	▲ Kleine zomervlinder - <i>Hemitea aestivaria</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	✅ 📷
2022-07-01 23:23	▲ Grijsgeklepte grasmineermot - <i>Elachista maculicerusella</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	■ 📷
2022-07-01 23:23	● Zwaveldominomot - <i>Oegoconia caradjai</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	■ 📷
2022-06-30 09:42	▲ Dagpauwoog - <i>Aglais io</i>	1	Koningsvennen	Fred Hustings	📷
2022-06-30 00:38	▲ Kleine zomervlinder - <i>Hemitea aestivaria</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	✅ 📷
2022-06-30 01:15	▲ Aangebrande spanner - <i>Ligdia adustata</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	■ 📷
2022-06-30 00:37	▲ Vliervlinder - <i>Ourapteryx sambucaria</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	✅ 📷
2022-06-30 01:08	● Bruine essenuil - <i>Lithophane semibrunnea</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	■ 📷
2022-06-30 00:42	▲ Gamma-uil - <i>Autographa gamma</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	📷 📷
2022-06-30 01:13	▲ Grijsgeklepte grasmineermot - <i>Elachista maculicerusella</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	■ 📷
2022-06-30 01:17	▲ Gouden boogbladroller - <i>Acleris bergmanniana</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	■ 📷
2022-06-30 01:23	▲ Rozenhermelijnbladroller - <i>Notocelia rosaeolana</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	■ 📷
2022-06-30 00:37	▲ Helmgrasmot - <i>Anerastia lotella</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	■ 📷
2022-06-30 01:20	▲ Triangelmot - <i>Hypsopygia costalis</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	■ 📷

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2022-06-30 01:30	▲ Eikenlichtmot - <i>Phycita roborella</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	■ 📷
2022-06-30 00:37	▲ Gewone grasmot - <i>Chrysoteuchia culmella</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	■ 📷
2022-06-30 01:31	▲ Bleke grasmot - <i>Crambus perlella</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	■ 📷
2022-06-30 00:49	▲ Egelskopmot - <i>Nymphula nitidulata</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	■ 📷
2022-06-30 00:37	▲ Egelskopmot - <i>Nymphula nitidulata</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	■ 📷
2022-06-30 00:38	▲ Bonte brandnetelmot - <i>Anania hortulata</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	🔍 📷
2022-06-30 00:49	▲ Maïsboorder - <i>Ostrinia nubilalis</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	■ 📷
2022-06-30 09:42	▲ Krasser - <i>Pseudochorthippus parallelus</i>	3 baltsend / zingend	Koningsvennen	Fred Hustings	■
2022-06-30 12:34	■ Greppelsprinkhaan - <i>Roeseliana roeselii</i>	1 baltsend / zingend	Koningsvennen	Fred Hustings	■
2022-06-30 09:42	■ Greppelsprinkhaan - <i>Roeseliana roeselii</i>	1 baltsend / zingend	Koningsvennen	Fred Hustings	■
2022-06-30 01:17	▲ <i>Psectrotanytus varius</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	■ 📷
2022-06-30 01:26	● Klein vliegend hert - <i>Dorcus parallelipipedus</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	■ 📷
2022-06-30 00:54	■ Roestbruine bladspruitkever - <i>Serica brunnea</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	✅ 📷
2022-06-30 00:55	■ <i>Iassus lanius</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	■ 📷
2022-06-30 01:21	▲ Goudoogje - <i>Chrysoperla carnea</i> s.l.	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	■ 📷
2022-06-29 19:46	▲ Boerenzwaluw - <i>Hirundo rustica</i>	1	Koningsvennen	Louis Geraets	■
2022-06-29 19:46	▲ Zwartkop - <i>Sylvia atricapilla</i>	1 baltsend / zingend	Koningsvennen	Louis Geraets	■
2022-06-29 14:00	■ Ringslang - <i>Natrix helvetica</i>	1	Koningsvennen	Langeraar J.C.	🔍 📷
2022-06-29 19:42	▲ Dagpauwoog - <i>Aglais io</i>	1 imago	Koningsvennen	Louis Geraets	🔍
2022-06-29 13:48	▲ Dagpauwoog - <i>Aglais io</i>	10 imago	Koningsvennen	Langeraar J.C.	🔍
2022-06-29 13:48	▲ Bruin zandoogje - <i>Maniola jurtina</i>	10 imago	Koningsvennen	Langeraar J.C.	🔍
2022-06-29 22:31	▲ Gamma-uil - <i>Autographa gamma</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	■ 📷
2022-06-29 23:31	▲ Paardenbloembladroller - <i>Celypha striana</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	■ 📷
2022-06-29 23:06	▲ Steltmuggen - <i>Limoniidae</i> indet.	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	■ 📷
2022-06-29 22:29	▲ Tijgerlangpootmug onbekend - <i>Nephrotoma spec.</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	■ 📷
Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2022-06-29 19:49	▲ Blauwzwarte schallebijter - <i>Carabus problematicus</i>	1 imago	Koningsvennen	Louis Geraets	✅ 📷
2022-06-29 19:48	▲ Bosmestkever - <i>Geotrupes stercorosus</i>	1 imago	Koningsvennen	Louis Geraets	■ 📷
2022-06-28 22:35	■ Kwartel - <i>Coturnix coturnix</i>	1 baltsend / zingend	Koningsvennen	Pim Lemmers	■
2022-06-28 18:50	▲ Klein koolwitje - <i>Pieris rapae</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	🔍 📷
2022-06-28 09:29	▲ Kolibrievlinder - <i>Macroglossum stellatarum</i>	1 imago	Koningsvennen	Wouter Bos	✅ 📷
2022-06-28 22:35	● Kleine glimworm - <i>Lamprohiza splendida</i>	5 imago	Koningsvennen	Pim Lemmers	■

2

Bijlage

Effecten indicator soorten



Beschermde natuur in Nederland: soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Effectenindicator soorten

Maatregelenindicator soorten

Routeplanner beschermde natuur

Effectenindicator Natura2000-gebieden

Effectenindicator soorten

1 Locatie


2 Activiteiten

3 Indicatie

Zoek en selecteer een locatie op postcode, of zoom in op de kaart en teken de grenzen van het plangebied: zet punten en sluit af met een dubbel-klik.

Postcode

6596 MJ



1 Locatie

2 Activiteiten

3 Indicatie

Geef aan voor welke [OLO-activiteit\(en\)](#) u een indicatie van effecten wilt ontvangen.

Top-10 activiteiten

[Alle activiteiten](#)

- ☒ Slopen en/of asbest verwijderen
- ☐ Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
- ☐ Bijbehorend bouwwerk bouwen
- ☐ Kappen
- ☐ Overig bouwwerk bouwen
- ☐ Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
- ☐ Dakkapel plaatsen
- ☒ Woning bouwen
- ☐ Nieuw kozijn plaatsen of bestaand kozijn of gevelpaneel veranderen
- ☐ Uitrit aanleggen of veranderen

Toon effecten

Locatie: 5,957/51,735 Oppervlakte: 94,63 ha

Disclaimer

- > De dekkingsgraad van waarnemingen uit de NDFF per locatie wisselt sterk. Als er geen waarnemingen uit de NDFF zijn, kunnen er dus wél beschermde soorten voorkomen. Een gebruiker is zelf verantwoordelijk om (eventueel met hulp van de gemeente) te achterhalen of er daadwerkelijk beschermde soorten in het plangebied voorkomen.
- > Beschermde soorten die naar verwachting geen schadelijke effecten ondervinden, worden niet in de uitvoer getoond.
- > De informatie uit de effectenindicator soorten is generiek. Om vast te stellen of een activiteit in de praktijk daadwerkelijk schadelijk is, is meer specifieke informatie nodig over de betreffende activiteit, de werklocatie en over het voorkomen van beschermde soorten in en rond het plangebied.

Activiteiten

☐ [Slopen en/of asbest verwijderen](#)

☐ [Woning bouwen](#)

Top 30 Wettelijk beschermde soorten

In het door u opgegeven plangebied komen de volgende soorten voor die het meest in het geding zijn bij ruimtelijke ingrepen en mogelijk schadelijke effecten ondervinden van de door u geselecteerde activiteit(en).

Vogels

☐ [Huismus](#)

Overige zoogdieren

☐ [Das](#)

Vleermuizen

☐ [Gewone dwergvleermuis](#)

☐ [Laatvlieger](#)

☐ [Rosse vleermuis](#)

Reptielen

☐ [Hazelworm](#)

☐ [Levendbarende hagedis](#)

☐ [Ringslang](#)

☐ [Zandhagedis](#)

Amfibieën

☐ [Bruine kikker](#)

Overige Wettelijk beschermde soorten

In het door u opgegeven plangebied komen bovendien de volgende aantallen Wettelijk beschermde soorten per soortengroep voor volgens de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) die mogelijk schadelijke effecten ondervinden van de door u geselecteerde activiteit(en).

Soortgroepen

☐ [Vogels \(13\)](#)

☐ [Zoogdieren \(10\)](#)

☐ [Amfibieën en reptielen \(1\)](#)

☐ [Libellen en vlinders \(3\)](#)

3

Bijlage

Plangebied projectlocatie



4

Bijlage

Natuurgegevens
broedvogelindicatie

provincie

Limburg

