

QUICKSCAN SOORTENBESCHERMING

VELDWEVERSTRAAT 3 TE NEDERWEERT

Colofon

Quicksan soortenbescherming

Projectnummer: EP.21.1031

Versie: 1

Datum: 21 april 2021

Opdrachtnemer

Agrifirm NWE BV
Bedrijfsontwikkeling Exlan
Waalkade 33
5347 KR Oss

Postbus 300
5340 AH Oss


Locatie

Veldweverstraat 3 Nederweert

Opdrachtgever

Bergs Advies
Leveroyseweg 9A
6093 NE Heythuysen

Contactpersoon



Uitvoerders



Collegiale check

AvZ

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN VERVEELVOLDIGD DOOR MIDDEL VAN DRUK, FOTOKOPIE, MICROFILM, GELUIDSBAND, ELEKTRONISCH OF OP WELKE ANDERE WIJZE DAN OOK, EN EVENMIN IN EEN GEAUTOMATISEERD GEGEVENSBESTAND WORDEN OPGESLAGEN, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN AGRIFIRM EXLAN.

Inhoudsopgave

Quickscan soortenbescherming

INLEIDING	4
HOOFDSTUK 1	6
TOETSINGSKADER	6
HOOFDSTUK 2	9
ONDERZOEKSRESULTATEN	9
HOOFDSTUK 3	20
CONCLUSIE	20
LITERATUUR	21
WAARNEMINGEN	22
EFFECTEN INDICATOR SOORTEN	29
PLAN PROJECTLOCATIE	31
NATUURGEGEVENS PROVINCIE LIMBURG BROEDVOGELINDICATIE	32

Inleiding

Planbeschrijving


Aanleiding

Het plangebied is gelegen aan de Veldweverstraat 3 te Nederweert. De plannen omvatten de sloop van alle varkensstallen. Daarnaast wordt een zonneweide aangelegd (nevenactiviteit) en blijft het grondgebronden akkerbouwbedrijf bestaan. In dit kader wordt door het bevoegde gezag een toets aan de soortenbescherming noodzakelijk geacht. Bij de uitvoering van de voorgenomen ingrepen moet rekening worden gehouden met het huidige voorkomen van de, op grond van de Wet natuurbescherming, beschermde soorten. Als de voorgenomen ingreep leidt tot het overtreden van verbodsbepalingen betreffende beschermde soorten, moet vrijstelling of ontheffing worden verkregen.

De voorliggende quickscan bevat een inventarisatie van de huidige aanwezigheid van beschermde soorten planten en dieren in en om het plangebied. Tevens worden de te verwachten effecten van de ingreep in het plangebied beoordeeld.

Plangebied

Het plangebied ligt in de plaats Nederweert in de gelijknamige gemeente Nederweert. Het plangebied bevindt zich buiten de verkeerskundige en stedenbouwkundige bebouwde kom van Nederweert.



■ Afbeelding 1: luchtfoto plangebied (bron: streetsmart.cyclomedia.com/streetsmart, geraadpleegd op 02/04/2021)

Onderzoeksmethode

Om een goede indicatie van de natuurwaarden binnen het plangebied te krijgen, wordt het onderzoek in verschillende stappen uitgevoerd. Op basis van bronnenonderzoek is nagegaan of er wettelijk beschermde planten- of diersoorten in het gebied voor kunnen komen waaraan extra aandacht geschonken dient te worden tijdens het terreinbezoek.

Na het bronnenonderzoek is een verkennend terreinbezoek gebracht aan het plangebied. Hierbij is, op basis van de gegevens van het literatuuronderzoek, beoordeeld voor welke soorten het gebied daadwerkelijk een geschikte habitat biedt en daarmee welke soorten er daadwerkelijk voor kunnen komen. Vervolgens zijn de mogelijke effecten op de verwachte beschermde soorten beschreven.

Op basis van de doorlopen procedures zijn conclusies getrokken met betrekking tot de eventuele negatieve effecten en/of obstakels inzake de Wet natuurbescherming.

Op dinsdag 13 april 2021 is de locatie tussen 15:00 en 16:00 uur ter plaatse geïnventariseerd, om te onderzoeken of het plangebied een zodanig belangrijke status heeft dat een aanvullend veldonderzoek noodzakelijk is. Op het moment van inventarisatie was het 7 graden Celsius en licht bewolkt.

Op basis van terreinkenmerken is beoordeeld of het terrein geschikt is voor de, in de regio voorkomende, beschermde soorten.

Doelstelling

Om een indicatie te krijgen van de effecten die de sloopwerkzaamheden hebben op de natuurwaarden binnen het plangebied, dienen de volgende vragen te worden beantwoord:

1. Welke wettelijk beschermde soorten komen in het plangebied voor? Welke status hebben deze soorten?
2. Welke invloed heeft de geplande ingreep in het betreffende gebied op de beschermde soorten en komt daarmee de staat van instandhouding in gevaar?
3. Hoe dient omgegaan te worden met eventuele negatieve effecten van het plan op wettelijk beschermde planten- en diersoorten, en welke vervolgstappen zijn nodig?

1 Toetsingskader

Wet natuurbescherming

De bescherming van natuur is in Nederland vastgelegd in nationale wetgeving. De nationale wetgeving is een Nederlandse implementatie van de belangrijkste Europese wetgevingselementen. Per 1 januari 2017 zijn de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998 vervangen door de Wet natuurbescherming. De uitvoering van deze nieuwe wet is grotendeels in handen van de provincies gekomen.

1.1 Gebiedsbescherming

De Wet natuurbescherming noemt bekende maar ook enkele nieuwe soorten natuurgebieden die bescherming behoeven: de Natura 2000-gebieden, het Natuurnetwerk Nederland (NNN), bijzondere provinciale natuurgebieden en landschappen, bijzondere nationale natuurgebieden en de nationale parken. Bij ontwikkelingen met name in het buitengebied moet rekening worden gehouden met het al dan niet van toepassing zijn van de beschermingsregimes van deze natuurgebieden. Ieder gebied kent een eigen beschermingsregime dat afzonderlijk gewogen dient te worden in relatie tot plannen, projecten en andere handelingen met mogelijk nadelige effecten voor de beschermde natuurwaarden.

Natura 2000-gebieden

De bekendste natuurgebieden zijn de Natura 2000-gebieden, zij kennen tevens het meest strikte beschermingsregime. De basis voor Natura 2000 zijn de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. In Nederland zijn 164 gebieden als Natura 2000-gebied aangewezen. Voor ieder gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen bepaald die betrekking kunnen hebben op de bescherming van specifieke flora en fauna alsook leefgebieden van soorten. Alle projecten en handelingen binnen of buiten de gebiedsgrenzen mogen geen verstorend of verslechterend effect hebben op de instandhoudingsdoelstellingen. Voor de voorgenomen ontwikkeling is hier, voor zover van toepassing, separaat aan getoetst. In deze rapportage wordt hier verder niet op ingegaan.

Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS) is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. De provincies zijn belast met de taak een dergelijk netwerk tot stand te laten te komen en in stand te laten. De uitvoering hiervan is hoofdzakelijk gestuurd vanuit de ruimtelijke ordening (provinciale verordeningen). Binnen het Natuurnetwerk Nederland geldt een “nee, tenzij”- benadering.

Overige gebieden

Naast de bovengenoemde gebieden kunnen gebieden aangewezen worden als ‘bijzondere provinciale natuurgebieden’, ‘bijzondere provinciale landschappen’ of ‘nationaal park’. De bescherming van deze gebieden vindt net als bij het NNN plaats via het ruimtelijk spoor. Daarnaast kan een gebied aangewezen worden als ‘bijzonder nationaal gebied’, een soort voorloper van de aanwijzing als Natura 2000-gebied. De bescherming van deze gebieden stemt dan ook overeen met de bescherming van Natura 2000-gebieden.

1.2 Soortenbescherming

De Wet natuurbescherming deelt soorten in drie beschermingsregimes in. Daarnaast zijn er vrijgestelde soorten en jaarrond beschermde vogelnesten.

- 1) Beschermingsregime soorten vogelrichtlijn
- 2) Beschermingsregime soorten habitatrichtlijn
- 3) Beschermingsregime andere soorten
- 4) Vrijgestelde soorten
- 5) Jaarrond beschermde vogelnesten

Vogelrichtlijn

Onder de soorten van de Vogelrichtlijn vallen alle van nature in Nederland in het wild levende vogels. Het is verboden om:

- Opzettelijk vogels te doden of te vangen;
- Opzettelijk vogelnesten, -rustplaatsen en – eieren te vernielen of te beschadigen of vogelnesten weg te nemen;
- Eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben;
- Opzettelijk vogels te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

Habitatrichtlijn

Onder de soorten van de Habitatrichtlijn vallen soorten die genoemd zijn in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage I van het Verdrag van Bonn. In de Bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd.

Wat betreft deze soorten is het verboden om:

- Opzettelijk dieren te doden of te vangen;
- Opzettelijk dieren te verstoren;
- Opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen;
- Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
- Opzettelijk planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken, te verzamelen, af te snijden, te onttwortelen of te vernielen.

Ook is het verboden deze soorten te verkopen, te vervoeren voor verkoop, te verhandelen, te ruilen of te kopen, tenzij het gaat om gefokte of gekweekte dieren of planten.

Andere soorten

Onder het beschermingsregime andere soorten vallen soorten waarvan er geen Europese verplichting tot bescherming is. Dit zijn soorten die vanuit nationaal belang extra bescherming behoeven. Het beschermingsniveau van deze soorten kan per provincie verschillen.

Het is verboden om:

- 1) Opzettelijk dieren te doden of te vangen;
- 2) Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
- 3) Opzettelijk (vaat)planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken te verzamelen, af te snijden, te onttwortelen of te vernielen.

Provincies hebben de bevoegdheid om bij provinciale verordening vrijstelling te verlenen voor nationaal beschermde soorten.

Vrijgestelde soorten

De verboden zijn niet van toepassing op de bosmuis, de huisspitsmuis en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevinden. Ook vallen de zwarte rat, bruine rat, huismuis, de mol en exoten niet onder beschermingsregime van de Wet natuurbescherming en mogen opzettelijk gedood en gevangen worden. Daarnaast geldt, zoals hierboven reeds aangegeven, dat provincies de bevoegdheid hebben vrijstelling te verlenen voor bepaalde soorten.

Jaarrond beschermde vogelnesten

De opgestelde lijst met jaarrond beschermde nesten voor vogels is een beleidsdocument dat voortvloeit uit de voormalige Flora- en faunawet en meegenomen is onder de Wet natuurbescherming. De nesten zijn ingedeeld in categorieën (1 t/m 5) waarvan de categorie 1 t/m 4 jaarrond beschermd zijn. Nesten in categorie 5 zijn enkel beschermd bij afwezigheid van voldoende alternatieven.

- 1) Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats
- 2) Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
- 3) Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
- 4) Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen.
- 5) Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen.

1.3 Houtopstanden

De regels van de Boswet zijn grotendeels onveranderd opgenomen in de Wet natuurbescherming. Een houtopstand is een zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend, die een oppervlakte van 10 are of meer beslaat ofwel een rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat.

Buiten de bescherming vallen:

- houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom (voor deze wet);
- houtopstanden op erven of in tuinen
- fruitbomen en windschermen om boomgaarden;
- naaldbomen bedoeld als kerstbomen en niet ouder dan twintig jaar
- kweekgoed;
 - uit populieren of wilgen bestaande wegbeplantingen,
 - beplantingen langs waterwegen, en
 - eenrijige beplantingen langs landbouwgronden;
- Het dunnen van een houtopstand;
- uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die zijn bedoeld voor de productie van houtige biomassa indien zij:
 - ten minste eens per tien jaar worden geoogst;
 - bestaan uit minstens tienduizend per hectare per beplantingseenheid
 - bestaande uit een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee meter;
 - zijn aangelegd na 1 januari 2013.

2

Onderzoeksresultaten

2.1 Bronnenonderzoek

Gegevens van websites als www.waarneming.nl zijn geraadpleegd voor achtergrondinformatie. Een groot aantal amateurs en professionals publiceert op deze bekende websites zijn natuurwaarnemingen, die worden gecontroleerd door een validatiecommissie. Zodoende zijn de waarnemingen uit deze bronnen redelijk betrouwbaar, maar moeilijk te verifiëren. De waarnemingen geven eventueel wel een indicatie van soorten waar tijdens het veldonderzoek extra aandacht aan besteed dient te worden.


Natuurnetwerk Nederland

Het natuurbeheerplan is een beleidskader om het Europese, rijks- en provinciale natuur- en landschapsbeleid te realiseren. Het gaat hier om bestaande natuurgebieden, gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt, landbouwgebieden worden ingericht en beheerd volgens agrarisch natuurbeheer en de Natura 2000-gebieden.

Het plangebied ligt nabij het Natuurnetwerk Nederland en buiten andere natuurgebieden zoals Natura 2000. Het meest dichtbijgelegen Natura 2000-gebied is het Natura 2000-gebied “Weerter- en Budelerbergen & Ringselven”.

De provincie Limburg kent 23 Natura 2000-gebieden. Begin november 2019 heeft het College van GS besloten om een Limburgs Aanvalsplan Stikstof Limburg op te stellen om te komen tot een structurele en gestructureerde aanpak van de stikstofproblematiek.

De stikstofdepositie in de 21 stikstofgevoelige Limburgse natuurgebieden moet substantieel verminderd worden en daar waar ontwikkelingen mogelijk zijn moet de vergunningverlening voor maatschappelijke en economische initiatieven weer ruimte worden geboden. Deze aanpak kent een korte (2020-2021) en een (middel)lange termijn (na 2021) gericht om te zorgen voor een hernieuwde balans tussen maatschappelijk en economische ontwikkelingen enerzijds en herstel en versterking van natuurkwaliteit en biodiversiteit anderzijds. Voor de korte termijn wordt ingezet op de mogelijkheden voor het aanpakken van zogeheten ‘piekbelasters’ rondom een gebied, een versnelde uitvoering in 2020-2021 van het natuurherstel en tenslotte vergunningverlening weer duurzaam op gang brengen. Voor de (middel) lange termijn zullen alle partners in de Limburgse samenleving binnen de verschillende sectoren de mogelijkheden moeten onderzoeken om maatregelen en nieuwe innovaties te stimuleren in het terugdringen emissiewaarden, het toewerken aan regionale kringlooplandbouw, de natuurinvesteringen voor de periode 2021-2027 uitvoeren, schone mobiliteit en de energietransitie en verduurzaming van Limburg verder vorm geven.



• Afbeelding 2: ligging Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000
(bron: atlasleefomgeving.nl/kaarten, geraadpleegd op 02/04/2021)

2.2 **Veldonderzoek**

Op verschillende punten in het plangebied zijn waarnemingen verricht. Het onderzoek is uitgevoerd binnen het toekomstig bouwvlak, waarbij zowel de sloop van de bestaande varkensstallen/bebouwing alsook de toekomstige locatie voor plaatsing van de zonnepanelen is beoordeeld. Tijdens het veldbezoek is het gebied beoordeeld op de aanwezigheid van beschermde soorten en de habitatgeschiktheid voor beschermde soorten. Er is extra aandacht besteed aan de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen en vogelnesten. De ecologische factoren in de omgeving zijn met behulp van een digitale fotocamera vastgelegd. Om de flora en fauna te kunnen determineren, is gebruik gemaakt van eigen kennis en literatuur.

• Afbeelding 3: te slopen stal



• Afbeelding 4: binnenzijde te slopen stal



• Afbeelding 5: binnenzijde te slopen stal



• Afbeelding 6: vooraanzicht gedeelte planlocatie



• Afbeelding 7: zomereiken locatie zonnepanelen



• Afbeelding 8: binnenzijde te behouden schuur



• Afbeelding 9: te behouden schuur en zicht op woonhuis



- Afbeelding 10: bosschage nabij planlocatie met daarin nest Buizerd



- Afbeelding 11: opslag diversen nabij te slopen varkensstal



Flora algemeen

Bij de planlocatie zijn geen bijzondere beplantingen aangetroffen. Er is tevens gelet op de aanwezigheid van (beschermde) muurvegetatie. Rondom de woning staat een houtwal met esdoorns, berken, zomereiken, vlier, kers, krenteboompje, fijnspar, etc. Deze bomen zijn circa

20 jaar oud. Op het erf, voor de schuur, staan zomereiken en een treurwilg. Deze zullen worden gekapt om plaats te maken voor de zonnepanelen. Op circa 200 meter staan kleine bosschages die overwegend uit essen bestaan.

Grondgebonden zoogdieren

Specifiek wordt bekeken of binnen de betreffende inrichting verwacht kan worden of er streng beschermde zoogdieren; steenmarter, bunzing, hermelijn, wezel, eekhoorn, bever en das kunnen worden aangetroffen.

Steenmarter

De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor de steenmarter. Steenmarters gebruiken hoozolders, loze ruimtes onder het dak, schuurtjes en dergelijke, als verblijfplaats. Een steenmarter heeft binnen zijn territorium verscheidene verblijfplaatsen. Daarnaast laten steenmarters enorm veel sporen achter. Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen, zoals uitwerpselen of prooiresten aangetroffen die duiden op het gebruik van de onderzoekslocatie als vaste rust- of verblijfplaats door deze soort.

Kleine marterachtigen

De onderzoekslocatie biedt geen geschikte verblijflocaaties voor de hermelijn, wezel en bunzing. De soorten maken gebruik van oude holen van onder andere mollen en muizen, maar ook houtwallen, steenhopen en ruimtes onder boomwortels. Desbetreffende soorten hebben binnen hun territorium verscheidene verblijfplaatsen. Tijdens het veldbezoek zijn er geen marters of sporen van marters aangetroffen op de onderzoekslocatie. Echter, dit betekent niet dat het gebied niet potentieel in gebruik is door de hermelijn, wezel en/of bunzing als migratieroute. Indien bij sloop/herinrichting van het gebied groenstructuren rond het perceel behouden blijven, is er geen sprake van een negatief effect op genoemde soorten.

Eekhoorn

De onderzoekslocatie is vanwege de afwezigheid van voldoende bomen niet geschikt als habitat voor de eekhoorn. Er staan te weinig bomen rondom de projectlocatie. Een negatief effect als gevolg van de werkzaamheden is uitgesloten.

Bever

Voor de bever is op de onderzoekslocatie geen geschikt habitat aanwezig. Vaste rust- en verblijfplaatsen van de bever kunnen worden uitgesloten.

Das

Tijdens het veldbezoek zijn op de onderzoekslocatie en de directe omgeving geen loop- of eetsporen, latrines en/of wissels aangetroffen die duiden op de aanwezigheid en/of het gebruik van de onderzoekslocatie door de das. Dassen zullen eerder hun leefgebied hebben in de nabij gelegen natuurgebieden en de aansluitende weilanden. Verstoring ten aanzien van de das als gevolg van de voorgenomen ingreep is niet aan de orde.

Het voorkomen van overige grondgebonden zoogdieren waarvoor geen vrijstelling geldt, is tijdens het veldbezoek wel vastgesteld. Er zijn sporen van ratten en mollen waargenomen.

Vleermuizen

Het plangebied is zeer nauwkeurig beoordeeld op de mogelijke waarde voor vleermuizen. Hierbij is gelet op de geschiktheid van de aanwezige bebouwing als verblijfplaats voor deze dieren: aanwezigheid van spouwgaten en andere openingen in muren en daken, vetstrepen, uitwerpselen en prooiresten bij gevelopeningen.

Verblijfsruimte voor vleermuizen hebben specifieke voorwaarden zoals een stabiele temperatuur en het tochtvrij zijn. Bij vleermuizen worden vier verblijfplaatsen onderscheiden; winterverblijven, zomerverblijven, kraamverblijven en paarverblijven. Aan de winterverblijven worden de hoogste eisen gesteld, daarna de kraamverblijven, dan de zomerverblijven en tenslotte de paarverblijven, waarbij de vleermuizen een zeer korte tijd op een bepaalde locatie kunnen verblijven.

Er zijn in en om de stallen geen sporen (vetstrepen, uitwerpselen, prooiresten) aangetroffen. Naast de onderzoekslocatie bevindt zich het woonhuis. Eventuele verblijfsplaatsen hierin ondervinden door de afstand tot de slooplocatie en de aard van de ingreep geen hinder.

Foerageerhabitat

De onderzoekslocatie zal, gelet op de aanwezige habitat, gebruikt kunnen worden door in de omgeving verblijvende vleermuizen om te foerageren. De plannen zullen echter geen aantasting van belangrijk foerageerhabitat vormen. Door de voorgenomen ingreep zal het aanbod van foerageermogelijkheden niet in het geding komen. In de directe omgeving is meer geschikt foerageerhabitat voor vleermuizen aanwezig in de vorm van bomenrijen en bosranden.

Vliegroutes

Vleermuizen maken veelal gebruik van lijnvormige (donkere) landschapselementen zoals houtsingels, beken en lanen om zich te verplaatsen tussen verblijfsplaatsen en foerageergebieden. Doordat dergelijke lijnvormige elementen ontbreken op de onderzoekslocatie, worden er geen potentiële vliegroutes verstoord.

Vogels

Tijdens het bezoek is met name gelet op de aanwezigheid van nesten en rustplaatsen voor vogels.

Er zijn broedvogels waarvan de nesten ook beschermd zijn op het moment dat ze niet voor de voortplanting in gebruik zijn. Binnen het agrarische (buiten)gebied kunnen dit zijn: boomvalk, buizerd, havik, sperwer, wespendif, huismus, steenuil en de kerkuil.

Boomvalk

De boomvalk is een soort die geen eigen nest maakt, maar broedt in gebruikte kraaien- en/of eksternesten in verschillende typen bos(randen) of in solitaire bomen, populierensingels, of op erven. De soort komt vooral voor in open en halfopen landschappen zoals boerenland en dorpen, alsook in buitenwijken van steden. De bomen op- en nabij de projectlocatie zijn gecontroleerd op dergelijke nesten, deze zijn niet aangetroffen. Negatieve effecten op de boomvalk als gevolg van de werkzaamheden zijn derhalve niet aan de orde.

Buizerd en havik

De buizerd en havik broeden op grote nesten van ongeveer een meter in doorsnede en 60 centimeter diep. Dergelijke nesten zijn tijdens het veldbezoek niet waargenomen. Een broedgeval van de buizerd en havik is daarom uit te sluiten. Wel is er een buizerdnest waargenomen in een solitaire bosschage op circa 200 meter van de planlocatie.

Wespendief en sperwer

De wespendif is doorgaans gebonden aan grotere bosgebieden van zowel loof- als naaldbomen. Bij voorkeur is er afwisseling binnen het bosgebied aanwezig in de vorm van open plekken. De sperwer broedt bij voorkeur meer verborgen in naaldbomen. Beide situaties zijn op de onderzoekslocatie niet aanwezig. Gezien de ligging van de onderzoekslocatie binnen agrarisch gebied en de afwezigheid van voldoende dekking is een nestplaats van de sperwer of wespendif niet te verwachten. Eveneens zijn er tijdens het veldbezoek geen nesten aangetroffen. Een broedgeval van zowel de wespendif als de sperwer zijn uitgesloten.

Steenuil en kerkuil

De kerkuil en steenuil hebben een voorkeur voor cultuurlandschappen met allerlei landschapselementen die voor afwisseling zorgen. Beide soorten broeden in gebouwen en gebruiken ook graag speciale nestkasten. Daarnaast worden door de steenuil ook wel boomholten gebruikt, mits er zich grote holten in bevinden. De gebouwen zijn in zijn geheel gecontroleerd op de aanwezigheid van steen- en kerkuilen en is vooral gelet op de aanwezigheid van sporen; braakballen, veren en uitwerpselen. Er zijn geen (sporen van)

steen- en kerkuilen waargenomen. Er is geen sprake van een afname van belangrijk foerageergebied. Er blijft er voldoende foeragegebied aanwezig in de omgeving.

Huismus

Ook voor de huismus, die veel te vinden is in agrarisch gebied en vooral gebonden aan gebouwen is, is het nest jaarrond beschermd. Er zijn geen nesten van huismussen gevonden in de te slopen bebouwing.

Overige broedvogels

De beplanting op de onderzoekslocatie kan nestgelegenheid bieden aan broedvogelsoorten zoals de merel en winterkoning. De nesten van deze soorten zijn alleen beschermd op het moment dat ze als zodanig in gebruik zijn. Er zijn geen nesten van overige broedvogels aangetroffen in de te slopen bebouwing.

Er zijn vogels gezien en gehoord, namelijk:

• Tabel 1: overzicht waargenomen vogels

Soort
Holenduif
Zwartkop
Kievit
Fazant
Heggenus
Roodborst
Tijftjaf
Zwarte Roodstaart

• Tabel 2: overzicht waargenomen vogelnesten

Soort
Buizerd (categorie indeling nestbescherming: 4)

Uitleg bij tabel:

Categorie 1:	Jaarrond gebruikte nesten (steenuil)
Categorie 2:	Zeer honkvaste koloniebroeders of afhankelijk bebouwing
Categorie 3:	Zeer honkvaste broeders of afhankelijk bebouwing (geen kolonie)
Categorie 4:	Vogels die ieder jaar terugkeren naar specifiek nest
Categorie 5:	Honkvaste broeders, maar voldoende flexibel

Reptielen, amfibieën en vissen

Er zijn tijdens het terreinbezoek geen reptielen, amfibieën en/of vissen waargenomen.

Voor de in Nederland voorkomende reptielsoorten zoals de hazelworm, de levendbarende hagedis en ringslang biedt de onderzoekslocatie geen geschikt habitat. Deze soorten worden vrijwel alleen aangetroffen in specifieke natuurgebieden.

Dit geldt ook voor de specifieke beschermende amfibieënsoorten die veel eisen stellen aan zijn habitat; alpenwatersalamander, heikikker, vinpootsalamander, poelkikker en rugstreeppad. Deze zijn allen uit te sluiten omdat de betreffende locatie geen goed habitat biedt voor deze soorten door het ontbreken van voldoende oppervlaktewater.

De onderzoekslocatie vormt wel een geschikt habitat voor algemene amfibieënsoorten als de bruine kikker en de gewone pad. Op de onderzoekslocatie kunnen deze soorten beschutting vinden tussen de begroeiing en onder de takken- of stenenhopen. Voor algemene amfibieënsoorten geldt in het kader van de Wet natuurbescherming een vrijstelling, zodat een ontheffing bij verstoring niet noodzakelijk is. Het is echter wel zaak om aandacht te schenken aan de zorgplicht.

Vissen

Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater op de onderzoekslocatie kan deze soortgroep buiten beschouwing worden gelaten.

Overige

Van de overige soortgroepen, zoals dagvlinders, insecten en libellen, kan worden aangenomen dat deze soorten gedurende het jaar in het plangebied aanwezig kunnen zijn of dit gebied in de migratieroute hebben liggen.

Afhankelijk van het seizoen zijn mogelijk algemene soorten te vinden op/of binnen de planlocatie. Specifieke beschermde soorten zijn voornamelijk afhankelijk van specifieke terreinkenmerken met specifieke biotopen. Binnen het plangebied is een dergelijk biotoop niet aanwezig.

2.3 Effecten van de ingreep

De effecten op beschermde soorten zijn onderzocht op basis van het voornemen binnen het plangebied.

Flora algemeen

Er is geen bijzondere flora aangetroffen binnen het plangebied, negatieve effecten zijn uitgesloten.

Grondgebonden zoogdieren

Verstoring van algemene zoogdieren vindt mogelijk plaats. De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor een aantal soorten grondgebonden zoogdieren. Het gaat daarbij om algemene soorten als de egel, konijn en diverse muissoorten. De verblijfplaatsen van deze soorten worden door de voorgenomen ingreep echter niet aangetast. Verblijfplaatsen van beschermde zoogdiersoorten zijn ter plaatse niet aangetroffen.

Vleermuizen

Er zijn geen sporen van vleermuizen aangetroffen waaruit blijkt dat de gebouwen als verblijfplaats worden gebruikt. Nader onderzoek in het kader van de soortenbescherming is niet noodzakelijk.

Vogels

Door de voorgenomen ingreep worden geen vogels en jaarrond beschermde nesten aangetast. Het buizerdnest is op een geruime afstand gelegen van de slooplocatie.

Reptielen, amfibieën en vissen

Er zijn geen reptielen, amfibieën en/of vissen waargenomen. De instandhoudingsdoelstellingen komen niet in het gedrang.

Overige

Omdat er geen geschikt biotoop is waargenomen voor overige beschermde soorten, zijn negatieve effecten uitgesloten. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

3

Conclusie en aanbevelingen

Het natuuronderzoek is gebaseerd op inventarisatiegegevens van derden, literatuuronderzoek en een verkennend veldbezoek aan het plangebied. Het beeld dat uit het onderzoek naar voren is gekomen vormt voldoende basis om gefundeerd uitspraken te doen over de gevolgen van de voorgenomen werkzaamheden voor beschermde soorten en gebieden.

3.1 Conclusie

Voor de bepaling van de effecten en voor de beantwoording van de vraag of men in strijd komt met de Wet natuurbescherming, wordt de relatie gelegd tussen het initiatief met deze wet door waar mogelijk antwoord te geven op de volgende vragen:

1. *Welke wettelijk beschermde soorten komen in het plangebied voor? Welke status hebben deze soorten?*
2. *Welke invloed heeft de geplande ingreep in het betreffende gebied op de beschermde soorten en de staat van instandhouding?*
3. *Hoe dient omgegaan te worden met eventuele negatieve effecten van het plan op wettelijk beschermde planten- en diersoorten, en welke vervolgstappen zijn nodig?*

Het voornemen zoals opgenomen in de inleiding en de daarbij behorende werkzaamheden, zal naar verwachting geen negatief effect hebben op de staat van instandhouding van beschermde soorten. Binnen het plangebied zijn geen (verblijfplaatsen van) strikt beschermde soorten aangetroffen die door de werkzaamheden worden beïnvloed.

Uit de effectenbeschrijving blijkt dat er geen onevenredige directe of indirecte gevolgen zijn van de voorgenomen activiteiten op de voortplanting en instandhouding van beschermde dieren/of plantsoorten. Lokaal zullen mogelijk algemene soorten uit het plangebied trekken op zoek naar een vervangende biotoop.

Voor aanvang van de werkzaamheden dient derhalve geen aanvullend onderzoek plaats te vinden. Een ontheffing met betrekking tot aantasting van beschermde soorten is niet nodig. De werkzaamheden kunnen leiden tot een beschadiging of vernietiging van mogelijke verblijfplaatsen en/of verstoring van eventueel aanwezige algemene soorten. Een algehele vrijstelling op basis van de Verordening natuurbescherming voor ruimtelijke ontwikkelingen is hierop van toepassing. De algemene zorgplicht blijft onverminderd van toepassing.




Literatuur

- Broekhuizen, S., Hoekstra, B., Laar, van, V., Smeenk, C. & Thissen, J.B.M., 1992
Atlas van de Nederlandse zoogdieren. Stichting uitgeverij van de KNNV, Utrecht.
- Europese Gemeenschappen,
Richtlijn no 92/409 inzake het behoud van de vogelstand. Brussel, 1979.
- Europese Gemeenschappen,
Richtlijn no 92/43 inzake instandhouding van de natuurlijke habitat en de wilde flora en fauna. Brussel, 1992.
- Provinciale Verordening (Wet) natuurbescherming
- Hollander, H., & Geest, van der, P., 1994.
Rode-Lijst van bedreigde zoogdieren in Nederland.
Red data book of threatened mammals in the Netherlands. Vereniging voor Zoogkunde en Zoogdierbescherming, Utrecht.
- Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Ministerie van Volkshuisvesting.
Ruimtelijke Ordening en milieu, 2004. Nota Ruimte.
- De Nederlandse libellen, Nederlandse Fauna, deel 4
Nationaal historisch museum, KNNV uitgeverij (2002)
- Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ)
- Vleermuizen en planologie, Zoogdierverseniging (2010)
- Wet natuurbescherming.
Vastgesteld d.d. 1 januari 2017.
- www.waarneming.nl
- www.synbiosys.alterra.nl
- www.atlasleefomgeving.nl
- www.ravon.nl
- www.sovon.nl
- www.google.nl
- www.ndff.nl
- www.floron.nl
- www.ruimtelijkeplannen.nl
- www.natura2000.nl
- www.ecologica.eu

1 Bijlage

Waarnemingen



Invoeren

Ontdek

Projecten

Over ons

Community



Nederweert - Laarderheide Limburg

Details

Waarnemingen

Foto's

Geluiden

Soorten gezien

Ranglijst waarnemers

2021-03-01

2021-04-02

selecteer een soort

Alle soortgroepen

Alle zeldzaamheden

Zoek

Filter

Wis filters

Als kaart

Toon geavanceerd

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2021-04-02	▲ Pijlstaart - <i>Anas acuta</i>	2	Laarderheide	Thijs Loven	■
2021-04-02	▲ Waterral - <i>Rallus aquaticus</i>	1 baltsend paar (ook paring)	Laarderheide	Thijs Loven	📷 📷
2021-04-02	■ Roerdomp - <i>Botaurus stellaris</i>	1 baltsend / zingend	Laarderheide	Thijs Loven	📷
2021-03-31 08:04	■ Roerdomp - <i>Botaurus stellaris</i>	1	Laarderheide	Meinse van der Velde	📷
2021-03-31 07:30	■ Roerdomp - <i>Botaurus stellaris</i>	1 roepend	Laarderheide	Thijs Loven	📷
2021-03-31 08:01	■ Kleine Bonte Specht - <i>Dryobates minor</i>	2	Laarderheide	Meinse van der Velde	📷 📷
2021-03-31 08:27	▲ Zwartkop - <i>Sylvia atricapilla</i>	1 ♀	Laarderheide	Meinse van der Velde	📷 📷
2021-03-30 16:40	■ Roerdomp - <i>Botaurus stellaris</i>	1 roepend	Laarderheide	Coen Gabriëls	📷
2021-03-29	■ Roodborsttapuit - <i>Saxicola rubicola</i>	1 ♂	Laarderheide	harry vossen	■
2021-03-26 13:17	▲ Torenvalk - <i>Falco tinnunculus</i>	1 foeragerend, gezien	Laarderheide	Martien Veekens	📷 📷
2021-03-25 17:10	■ Zwarte Ruiter - <i>Tringa erythropus</i>	3 foeragerend, gezien	Laarderheide	Ivo Coumans	📷 📷
2021-03-24	▲ Kievit - <i>Vanellus vanellus</i>	1 baltsend / zingend	Laarderheide	harry vossen	📷
2021-03-22 07:49	▲ Waterral - <i>Rallus aquaticus</i>	1 roepend	Laarderheide	Meinse van der Velde	📷 📷
2021-03-22 07:51	▲ Dodaars - <i>Tachybaptus ruficollis</i>	3	Laarderheide	Meinse van der Velde	📷
2021-03-22 16:08	▲ Wulp - <i>Numenius arquata</i>	2	Laarderheide	Albert Kleibeuker	📷 📷 📷
2021-03-22 07:51	■ Roerdomp - <i>Botaurus stellaris</i>	2	Laarderheide	Meinse van der Velde	📷 📷
2021-03-22 16:11	■ Slechtvalk - <i>Falco peregrinus</i>	1 adult, vastgesteld territorium	Laarderheide	Albert Kleibeuker	📷 📷
2021-03-22	▲ Aardhommel-groep (Europa) - <i>Bombus terrestris/lucorum/magnus/cryptarum</i>	2 ♀ imago, foeragerend, gezien	Laarderheide	Frank Raemakers	■
2021-03-21	■ Steenhuil - <i>Athene noctua</i>	1	Laarderheide	harry vossen	■
2021-03-20 18:46	■ Roerdomp - <i>Botaurus stellaris</i>	3 baltsend / zingend	Laarderheide	Henk Sierdsema	📷 📷
2021-03-15 15:46	▲ Grauwe Gans - <i>Anser anser</i>	12	Laarderheide	Toos Peerlings	📷 📷
2021-03-15 16:27	▲ Fazant - <i>Phasianus colchicus</i>	2 ♂	Laarderheide	Toos Peerlings	📷 📷
2021-03-15 07:44	▲ Waterhoen - <i>Gallinula chloropus</i>	1	Laarderheide	Meinse van der Velde	📷
2021-03-15 07:45	▲ Dodaars - <i>Tachybaptus ruficollis</i>	2	Laarderheide	Meinse van der Velde	📷 📷
2021-03-15 07:45	■ Roerdomp - <i>Botaurus stellaris</i>	2	Laarderheide	Meinse van der Velde	📷

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2021-03-15 16:59	▲ Tjiftjaf - <i>Phylloscopus collybita</i>	1	Laarderheide	Toos Peerlings	✓ 📷
2021-03-15 17:00	▲ Goudhaan - <i>Regulus regulus</i>	1	Laarderheide	Toos Peerlings	✓ 📷
2021-03-15 17:19	▲ Roodborst - <i>Erithacus rubecula</i>	1	Laarderheide	Toos Peerlings	✓ 📷
2021-03-15 14:33	■ Goudvink - <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	1 ♂	Laarderheide	Toos Peerlings	✓ 📷
2021-03-14	■ Roendomp - <i>Botaurus stellaris</i>	1 roepend	Laarderheide	harry vossen	✓ 📷
2021-03-13 10:34	▲ Kievit - <i>Vanellus vanellus</i>	3 gezien	Laarderheide	Ivo Coumans	✓ 📷
2021-03-11 17:11	▲ Kievit - <i>Vanellus vanellus</i>	4 baltsend paar (ook paring)	Laarderheide	Floris van den Burger	✓
2021-03-11 17:11	▲ Zwarte Kraai - <i>Corvus corone</i>	1	Laarderheide	Floris van den Burger	✓
2021-03-11 17:12	▲ Spreeuw - <i>Sturnus vulgaris</i>	175 foeragerend	Laarderheide	Floris van den Burger	✓
2021-03-09 07:14	▲ Nijlgans - <i>Alopochen aegyptiaca</i>	5 foeragerend, gezien	Laarderheide	Ivo Coumans	✓
2021-03-09 07:23	▲ Fazant - <i>Phasianus colchicus</i>	1 ♂ gezien	Laarderheide	Ivo Coumans	✓ 📷
2021-03-09 07:16	▲ Kievit - <i>Vanellus vanellus</i>	1 gezien	Laarderheide	Ivo Coumans	✓ 📷
2021-03-09 07:34	▲ Blauwe Reiger - <i>Ardea cinerea</i>	1 gezien	Laarderheide	Ivo Coumans	✓ 📷
2021-03-09 07:33	▲ Blauwe Reiger - <i>Ardea cinerea</i>	1 gezien	Laarderheide	Ivo Coumans	✓ 📷
2021-03-09 07:21	▲ Buizerd - <i>Buteo buteo</i>	2 gezien	Laarderheide	Ivo Coumans	✓
2021-03-09 07:23	▲ Koperwiek - <i>Turdus iliacus</i>	1 foeragerend, gezien en gehoord	Laarderheide	Ivo Coumans	✓
2021-03-08 14:11	▲ Grauwe Gans - <i>Anser anser</i>	12	Laarderheide	Edwin & Ivo	✓
2021-03-08 14:10	▲ Krakeend - <i>Mareca strepera</i>	2	Laarderheide	Edwin & Ivo	✓
2021-03-08 14:10	▲ Kuifeend - <i>Aythya fuligula</i>	3	Laarderheide	Edwin & Ivo	✓
2021-03-08 17:48	▲ Fazant - <i>Phasianus colchicus</i>	1 ♂ foeragerend, gezien	Laarderheide	Ivo Coumans	✓ 📷
2021-03-08 17:07	▲ Houtduif - <i>Columba palumbus</i>	2 foeragerend, gezien	Laarderheide	Ivo Coumans	✓
2021-03-08 14:13	▲ Waterhoen - <i>Gallinula chloropus</i>	1	Laarderheide	Edwin & Ivo	✓
2021-03-08 14:11	▲ Meerkooit - <i>Fulica atra</i>	14	Laarderheide	Edwin & Ivo	✓
2021-03-08 14:11	▲ Dodaars - <i>Tachybaptus ruficollis</i>	2	Laarderheide	Edwin & Ivo	✓
2021-03-08 17:50	▲ Wulp - <i>Numenius arquata</i>	1 baltsend / zingend, gehoord	Laarderheide	Ivo Coumans	✓

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2021-03-08 16:55	▲ Wulp - <i>Numenius arquata</i>	1 baltsend / zingend, gehoord	Laarderheide	Ivo Coumans	✓
2021-03-08 17:10	▲ Aalscholver - <i>Phalacrocorax carbo</i>	1 gezien	Laarderheide	Ivo Coumans	✓ @
2021-03-08 16:51	■ Roerdomp - <i>Botaurus stellaris</i>	2 baltsend / zingend, gehoord	Laarderheide	Ivo Coumans	✓
2021-03-08 13:54	■ Roerdomp - <i>Botaurus stellaris</i>	1 roepend	Laarderheide	Edwin & Ivonne	✓
2021-03-08	■ Roerdomp - <i>Botaurus stellaris</i>	2 roepend	Laarderheide	Thijs Loven	✓
2021-03-08 17:12	▲ Blauwe Reiger - <i>Ardea cinerea</i>	1 gezien	Laarderheide	Ivo Coumans	✓ @
2021-03-08 16:59	▲ Blauwe Reiger - <i>Ardea cinerea</i>	1 overvliegend zuidoost, gezien	Laarderheide	Ivo Coumans	✓ @
2021-03-08 16:43	▲ Blauwe Reiger - <i>Ardea cinerea</i>	1 gezien	Laarderheide	Ivo Coumans	✓ @
2021-03-08 17:01	▲ Staartmees - <i>Aegithalos caudatus</i>	10 foeragerend, gezien en gehoord	Laarderheide	Ivo Coumans	✓ @
2021-03-08 17:19	▲ Tjiftjaf - <i>Phylloscopus collybita</i>	1 roepend, gezien en gehoord	Laarderheide	Ivo Coumans	✓
2021-03-08 13:54	▲ Tjiftjaf - <i>Phylloscopus collybita</i>	1	Laarderheide	Edwin & Ivonne	✓
2021-03-08 16:37	▲ Winterkoning - <i>Troglodytes troglodytes</i>	1 foeragerend, gezien en gehoord	Laarderheide	Ivo Coumans	■
2021-03-08 16:40	▲ Koperwiek - <i>Turdus iliacus</i>	1 roepend, gezien en gehoord	Laarderheide	Ivo Coumans	✓ @
2021-03-08 16:35	▲ Zanglijster - <i>Turdus philomelos</i>	1 baltsend / zingend, gezien en gehoord	Laarderheide	Ivo Coumans	✓ @
2021-03-08 15:38	▲ Grote Lijster - <i>Turdus viscivorus</i>	1	Laarderheide	Edwin & Ivonne	✓
2021-03-08 17:47	▲ Roodborst - <i>Erithacus rubecula</i>	1 baltsend / zingend, gezien en gehoord	Laarderheide	Ivo Coumans	✓ @
2021-03-07 15:20	■ Roerdomp - <i>Botaurus stellaris</i>	1 roepend, gehoord	Laarderheide	Wietse van der Wurff	✓
2021-03-07 15:39	▲ Speerdistel - <i>Cirsium vulgare</i>	1 vegetatief, veldwaarneming	Laarderheide	Wietse van der Wurff	✓
2021-03-06	■ Manengans - <i>Chenonetta jubata</i>	1	Laarderheide	Stef de Martines	✓ @
2021-03-06	▲ Fazant - <i>Phasianus colchicus</i>	1 roepend, gehoord	Laarderheide	Stef de Martines	✓
2021-03-06 10:12	▲ Dodaars - <i>Tachybaptus ruficollis</i>	2 baltsend / zingend, gehoord	Laarderheide	Stef de Martines	✓
2021-03-06 09:03	▲ Kievit - <i>Vanellus vanellus</i>	12	Laarderheide	Stef de Martines	✓
2021-03-06 10:04	■ Roerdomp - <i>Botaurus stellaris</i>	2 roepend	Laarderheide	Stef de Martines	✓
2021-03-06 09:37	■ Roerdomp - <i>Botaurus stellaris</i>	1 roepend, gehoord	Laarderheide	Stef de Martines	✓
2021-03-06 09:55	▲ Blauwe Reiger - <i>Ardea cinerea</i>	1 overvliegend	Laarderheide	Stef de Martines	■

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2021-03-06 09:23	 Kleine Bonte Specht - <i>Dryobates minor</i>	1 ♂	Laanderheide	Stef de Martines	
2021-03-06 09:40	 Ceelgors - <i>Emberiza citrinella</i>	1	Laanderheide	Stef de Martines	
2021-03-06 10:47	 Rietgors - <i>Emberiza schoeniclus</i>	5	Laanderheide	Stef de Martines	
2021-03-05 07:50	 Fazant - <i>Phasianus colchicus</i>	1	Laanderheide	Rene Meex	
2021-03-05 07:51	 Houtduif - <i>Columba palumbus</i>	1	Laanderheide	Rene Meex	
2021-03-05 07:50	 Buizerd - <i>Buteo buteo</i>	2	Laanderheide	Rene Meex	
2021-03-05 07:52	 Grote Bonte Specht - <i>Dendrocopos major</i>	1	Laanderheide	Rene Meex	
2021-03-05 07:50	 Zwarte Kraai - <i>Corvus corone</i>	1	Laanderheide	Rene Meex	
2021-03-05 14:26	 Raaf - <i>Corvus corax</i>	1 overvliegend, gezien	Laanderheide	Marco Zonderland	 
2021-03-05 14:09	 Tjiftjaf - <i>Phylloscopus collybita</i>	2 gezien	Laanderheide	Marco Zonderland	
2021-03-05 07:51	 Spreeuw - <i>Sturnus vulgaris</i>	1	Laanderheide	Rene Meex	
2021-03-05 14:42	 Koperwiek - <i>Turdus iliacus</i>	1 gezien	Laanderheide	Marco Zonderland	
2021-03-05 07:50	 Zanglijster - <i>Turdus philomelos</i>	1	Laanderheide	Rene Meex	
2021-03-05 07:50	 Huismus - <i>Passer domesticus</i>	1	Laanderheide	Rene Meex	
2021-03-05 07:50	 Vink - <i>Fringilla coelebs</i>	1	Laanderheide	Rene Meex	
2021-03-03	 Grauwe Gans - <i>Anser anser</i>	2 adult, gezien	Laanderheide	Mark Koolen	 
2021-03-03	 Roerdomp - <i>Botaurus stellaris</i>	1 gehoord	Laanderheide	Mark Koolen	
2021-03-03	 Grote Zilverreiger - <i>Ardea alba</i>	1 adult, gezien	Laanderheide	Mark Koolen	 
2021-03-03	 Tjiftjaf - <i>Phylloscopus collybita</i>	1 adult, gezien	Laanderheide	Mark Koolen	 
2021-03-03	 Gewone pad - <i>Bufo bufo</i>	1 adult, gezien	Laanderheide	Mark Koolen	 
2021-03-03	 Bruine kikker - <i>Rana temporaria</i>	1 adult, gezien	Laanderheide	Mark Koolen	 
2021-03-03	 Bruine kikker - <i>Rana temporaria</i>	1 adult, gezien	Laanderheide	Mark Koolen	 
2021-03-03	 Bruine kikker - <i>Rana temporaria</i>	2 adult, parend, gezien	Laanderheide	Mark Koolen	 
2021-03-03	 Citroenvlinder - <i>Gonepteryx rhamni</i>	1 imago, gezien	Laanderheide	Mark Koolen	 
2021-03-03	 Grote voorjaarsspanner - <i>Agriopsis marginaria</i>	1 imago, gezien	Laanderheide	Mark Koolen	 

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2021-03-03	▲ Gewone zakdrager - <i>Psyche casta</i>	1 zak/koker, gezien	Laarderheide	Mark Koolen	📷
2021-03-03	■ Bruine winterjuffer - <i>Sympecma fusca</i>	1 imago, gezien	Laarderheide	Mark Koolen	📷
2021-03-03	▲ Honingbij - <i>Apis mellifera</i>	1 imago, gezien	Laarderheide	Mark Koolen	📷
2021-03-03	▲ Tweevlekkige snelkever - <i>Notiophilus biguttatus</i>	1 imago, gezien	Laarderheide	Mark Koolen	📷 📷 📷
2021-03-02 16:06	▲ Dodaars - <i>Tachybaptus ruficollis</i>	1 gehoord	Laarderheide	Arno van Stipdonk	📷
2021-03-02 16:06	■ Roerdomp - <i>Botaurus stellaris</i>	1 gehoord	Laarderheide	Arno van Stipdonk	📷
2021-03-02 14:09	■ Roerdomp - <i>Botaurus stellaris</i>	1 roepend	Laarderheide	Ton Timmermans	📷
2021-03-02 16:06	▲ Bulzerd - <i>Buteo buteo</i>	1	Laarderheide	Coen Gabriëls	📷 📷
2021-03-02 16:05	■ Slechtvalk - <i>Falco peregrinus</i>	2	Laarderheide	Coen Gabriëls	📷 📷 📷
2021-03-02 15:35	▲ Atalanta - <i>Vanessa atalanta</i>	1 imago	Laarderheide	Arno van Stipdonk	📷
2021-03-01 11:00	▲ Kuifeend - <i>Aythya fuligula</i>	2	Laarderheide	Math Bouts	📷
2021-03-01 11:00	▲ Kuifeend - <i>Aythya fuligula</i>	2	Laarderheide	Johan van den Kleboom	📷
2021-03-01 11:00	▲ Kuifeend - <i>Aythya fuligula</i>	2	Laarderheide	Hans van der Steen	📷
2021-03-01 10:57	▲ Fazant - <i>Phasianus colchicus</i>	1 roepend	Laarderheide	Math Bouts	📷
2021-03-01 10:57	▲ Fazant - <i>Phasianus colchicus</i>	1 roepend	Laarderheide	Hans van der Steen	📷
2021-03-01 10:57	▲ Fazant - <i>Phasianus colchicus</i>	1 roepend	Laarderheide	Johan van den Kleboom	📷
2021-03-01 11:55	▲ Waterral - <i>Rallus aquaticus</i>	1 roepend	Laarderheide	Math Bouts	📷
2021-03-01 11:55	▲ Waterral - <i>Rallus aquaticus</i>	1 roepend	Laarderheide	Johan van den Kleboom	📷
2021-03-01 11:55	▲ Waterral - <i>Rallus aquaticus</i>	1 roepend	Laarderheide	Hans van der Steen	📷
2021-03-01 10:59	▲ Waterhoen - <i>Gallinula chloropus</i>	1 roepend	Laarderheide	Math Bouts	📷
2021-03-01 10:59	▲ Waterhoen - <i>Gallinula chloropus</i>	1 roepend	Laarderheide	Johan van den Kleboom	📷
2021-03-01 10:59	▲ Waterhoen - <i>Gallinula chloropus</i>	1 roepend	Laarderheide	Hans van der Steen	📷
2021-03-01 10:06	▲ Dodaars - <i>Tachybaptus ruficollis</i>	1	Laarderheide	Math Bouts	📷
2021-03-01 10:06	▲ Dodaars - <i>Tachybaptus ruficollis</i>	1	Laarderheide	Johan van den Kleboom	📷
2021-03-01 10:06	▲ Dodaars - <i>Tachybaptus ruficollis</i>	1	Laarderheide	Hans van der Steen	📷

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2021-03-01 10:19	▲ Watersnip - <i>Gallinago gallinago</i>	1 opvliegend	Laarderheide	Math Bouts	■
2021-03-01 10:19	▲ Watersnip - <i>Gallinago gallinago</i>	1 opvliegend	Laarderheide	Hans van der Steen	■
2021-03-01 10:19	▲ Watersnip - <i>Gallinago gallinago</i>	1 opvliegend	Laarderheide	Johan van den Kieboom	■
2021-03-01 10:06	■ Roerdomp - <i>Botaurus stellaris</i>	1 roepend	Laarderheide	Math Bouts	🔊📷
2021-03-01 10:06	■ Roerdomp - <i>Botaurus stellaris</i>	1 roepend	Laarderheide	Johan van den Kieboom	🔊
2021-03-01 10:06	■ Roerdomp - <i>Botaurus stellaris</i>	1 roepend	Laarderheide	Hans van der Steen	🔊📷
2021-03-01 10:14	■ Kleine Bonte Specht - <i>Dryobates minor</i>	1	Laarderheide	Math Bouts	🔊
2021-03-01 10:14	■ Kleine Bonte Specht - <i>Dryobates minor</i>	1	Laarderheide	Johan van den Kieboom	■
2021-03-01 10:14	■ Kleine Bonte Specht - <i>Dryobates minor</i>	1	Laarderheide	Hans van der Steen	■
2021-03-01 10:19	▲ Scaartmees - <i>Aegithalos caudatus</i>	1	Laarderheide	Math Bouts	🔊
2021-03-01 10:19	▲ Scaartmees - <i>Aegithalos caudatus</i>	1	Laarderheide	Hans van der Steen	🔊
2021-03-01 10:19	▲ Scaartmees - <i>Aegithalos caudatus</i>	1	Laarderheide	Johan van den Kieboom	🔊
2021-03-01 10:55	▲ Tjiftjaf - <i>Phylloscopus collybita</i>	1	Laarderheide	Math Bouts	🔊
2021-03-01 10:55	▲ Tjiftjaf - <i>Phylloscopus collybita</i>	1	Laarderheide	Hans van der Steen	🔊
2021-03-01 10:55	▲ Tjiftjaf - <i>Phylloscopus collybita</i>	1	Laarderheide	Johan van den Kieboom	🔊
2021-03-01 11:54	▲ Goudhaan - <i>Regulus regulus</i>	2	Laarderheide	Math Bouts	🔊
2021-03-01 11:54	▲ Goudhaan - <i>Regulus regulus</i>	2	Laarderheide	Hans van der Steen	🔊
2021-03-01 11:54	▲ Goudhaan - <i>Regulus regulus</i>	2	Laarderheide	Johan van den Kieboom	🔊
2021-03-01 10:59	▲ Boomkruiper - <i>Certhia brachydactyla</i>	1	Laarderheide	Math Bouts	🔊
2021-03-01 10:59	▲ Boomkruiper - <i>Certhia brachydactyla</i>	1	Laarderheide	Math Bouts	🔊
2021-03-01 10:59	▲ Boomkruiper - <i>Certhia brachydactyla</i>	1	Laarderheide	Hans van der Steen	🔊
2021-03-01 10:59	▲ Boomkruiper - <i>Certhia brachydactyla</i>	1	Laarderheide	Johan van den Kieboom	🔊
2021-03-01 10:56	▲ Zanglijster - <i>Turdus philomelos</i>	1 baltsend / zingend	Laarderheide	Math Bouts	🔊
2021-03-01 10:56	▲ Zanglijster - <i>Turdus philomelos</i>	1 baltsend / zingend	Laarderheide	Johan van den Kieboom	🔊
2021-03-01 10:56	▲ Zanglijster - <i>Turdus philomelos</i>	1 baltsend / zingend	Laarderheide	Hans van der Steen	🔊

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2021-03-01 10:41	■ Goudvink - <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	2 ♀ gezien en gehoord	Laarderheide	Math Bouts	🔊
2021-03-01 10:41	■ Goudvink - <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	2 ♀ gezien en gehoord	Laarderheide	Johan van den Kieboom	🔊
2021-03-01 10:41	■ Goudvink - <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	2 ♀ gezien en gehoord	Laarderheide	Hans van der Steen	🔊
2021-03-01 10:40	■ Goudvink - <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	2 ♂ baltsend / zingend	Laarderheide	Math Bouts	🔊
2021-03-01 10:40	■ Goudvink - <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	2 ♀ baltsend / zingend	Laarderheide	Math Bouts	🔊
2021-03-01 10:32	■ Goudvink - <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	2 ♂ roepend, gezien en gehoord	Laarderheide	Math Bouts	🔊
2021-03-01 10:32	■ Goudvink - <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	2 ♂ roepend, gezien en gehoord	Laarderheide	Johan van den Kieboom	🔊
2021-03-01 10:32	■ Goudvink - <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	2 ♂ roepend, gezien en gehoord	Laarderheide	Hans van der Steen	🔊

2

Bijlage

Effecten indicator soorten



Beschermde natuur in Nederland: soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Effectenindicator soorten

Maatregelenindicator soorten

Routeplanner beschermde natuur

Effectenindicator Natura2000-gebieden

Effectenindicator soorten

1 Locatie


2 Activiteiten

3 Indicatie

Zoek en selecteer een locatie op postcode, of zoom in op de kaart en teken de grenzen van het plangebied: zet punten en sluit af met een dubbel-klik.

Postcode

8031 LM



1 Locatie

2 Activiteiten

3 Indicatie

Geef aan voor welke DLO-activiteit(en) u een indicatie van effecten wilt ontvangen.

[Top-10 activiteiten](#)

[Alle activiteiten](#)

Bouwen en verbouwen

- ☐ Alarmsinstallatie aanleggen
- ☐ Bijbehorend bouwwerk bouwen
- ☐ Dakkapel plaatsen
- ☐ Dakraam, lichtkoepel of lichtstraat plaatsen
- ☐ Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen
- ☐ Nieuw kozijn plaatsen of bestaand kozijn of gevelpaneel veranderen
- ☐ Normaal onderhoud uitvoeren
- ☐ Privacy scherm plaatsen
- ☐ (Schotel)antenne plaatsen
- ☒ Slopen en/of asbest verwijderen
- ☐ Slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht
- ☐ Slopen op grond van ruimtelijke regels
- ☐ Woning bouwen
- ☒ Zonnepaneel of -collector plaatsen
- ☐ Zonwering, rolhek of rolhek bevestigen
- ☐ Overig bouwwerk bouwen
- ☐ Overige veranderingen

- ☐ [Terrein inrichten of veranderen](#)
- ☐ [Werksaamheden met betrekking tot gebruik en milieu](#)
- ☐ [Specialistische werksaamheden](#)

Toon effecten

1 Locatie

2 Activiteiten

3 Indicatie

Locatie: 5,6984/51,2879 Oppervlakte: 46,55 ha

Disclaimer

- » De dekkingsgraad van waarnemingen uit de NDFF per locatie wisselt sterk. Als er geen waarnemingen uit de NDFF zijn, kunnen er dus wel beschermde soorten voorkomen. Een gebruiker is zelf verantwoordelijk om (eventueel met hulp van de gemeente) te achterhalen of er daadwerkelijk beschermde soorten in het plangebied voorkomen.
- » Beschermde soorten die naar verwachting geen schadelijke effecten ondervinden, worden niet in de uitvoer getoond.
- » De informatie uit de effectenindicator soorten is generiek. Om vast te stellen of een activiteit in de praktijk daadwerkelijk schadelijk is, is meer specifieke informatie nodig over de betreffende activiteit, de werklocatie en over het voorkomen van beschermde soorten in en rond het plangebied.

Activiteiten

- ☐ [Slopen en/of asbest verwijderen](#)
- ☐ [Zonnepaneel of -collector plaatsen](#)

Overige Wettelijk beschermde soorten

In het door u opgegeven plangebied komen bovendien de volgende aantallen Wettelijk beschermde soorten per soortengroep voor volgens de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) die mogelijk schadelijke effecten ondervinden van de door u geselecteerde activiteit(en).

Soortgroepen

☐ Vogels (2)

Mogelijke negatieve effecten

Hieronder ziet u de storende factoren die op kunnen treden bij de geselecteerde activiteit en de hierboven genoemde soort. Per storende factor kunt u een korte toelichting lezen. Er is ook een pdf met  geraadpleegde literatuur over de effecten per soortgroep.

Storende factoren per verbodsbepaling	Gevoeligheid
Het is verboden (opzettelijk) nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of vernielen.	
☐ verlies vaste voortplantings- rust- of verblijfplaatsen	gevoelig
☐ verlies functioneel leefgebied	gevoelig
Het is verboden opzettelijk beschermde soorten te doden en vangen.	
☐ directe sterfte	gevoelig
Het is verboden vogels opzettelijk te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de soort.	
☐ verstoring door geluid	gevoelig
☐ verstoring door trilling	gevoelig

☐ Zoogdieren (1)

Mogelijke negatieve effecten

Hieronder ziet u de storende factoren die op kunnen treden bij de geselecteerde activiteit en de hierboven genoemde soort. Per storende factor kunt u een korte toelichting lezen. Er is ook een pdf met  geraadpleegde literatuur over de effecten per soortgroep.

Storende factoren per verbodsbepaling	Gevoeligheid
Het is verboden (opzettelijk) nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of vernielen.	
☐ verlies vaste voortplantings- rust- of verblijfplaatsen	gevoelig
☐ verlies functioneel leefgebied	gevoelig
Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren.	
☐ verstoring door geluid	... onbekend
☐ verstoring door trilling	gevoelig
Het is verboden opzettelijk beschermde soorten te doden en vangen.	
☐ directe sterfte	gevoelig


3

Bijlage

Plan projectlocatie



Huidig bouwvlak



Toekomstige situatie, vormverandering bouwvlak

4

Bijlage

Natuurgegevens
broedvogelindicatie

provincie

Limburg



Kneu,
2017