

Inpassingsplan

Reutskamerdijk 10, Ospel

Rondom het plangebied is veel bestaand opgaand groen aanwezig. Zowel rondom de woning als de loods staat groen dat redelijk aansluit op het omliggend, kleinschalig gebied. Hier staan woningen met veel beukenhagen en verschillende boomstructuren. Deze elementen zijn ook in het plangebied terug te vinden.

Veel van het opgaand groen in het plangebied is niet inheems. Zowel de hagen als de heester zijn grotendeels exoten. Het inpassingsplan richt zich aan aankleden van de noord en zuidzijde van het plangebied met inheemse beplanting. Om de loods aan te kleden komt een struweel aan de noordzijde over de volledige lengte. Dit neemt de loods grotendeels uit het zicht.

Aan de zuidzijde komt over de volledige lengte van de bebouwing een beukenhaag. Dit sluit aan op de omliggende woningen dat een eenduidige uitstraling geeft aan deze zijde. Daarnaast is de beukenhaag een dichte structuur die ook in de winter zijn blad behoudt.

Beheer


De planten in een beukenhaag kunnen het beste tussen half november en eind april worden geplant voor dat de sapstroom op gang komt. Voer zo nodig grondverbetering uit bij de plantgaten. Geef gedurende twee jaar de planten ruim voldoende water. Om een dichte haag te krijgen verdient het aanbeveling om direct na het planten zowel de boven- als zijkant te snoeien. Dit stimuleert de vertakking waardoor een volle haag ontstaat.

Laat de haag elk jaar iets hoger worden tot de gewenste hoogte is bereikt. De eerste jaren na aanplant kan het beste tweemaal per jaar worden geknipt, waarvan de eerste keer vóór de langste dag (de haag heeft dan de kans om nog nieuwe loten te vormen) en de tweede keer rond 1 oktober. Na enkele jaren heeft het de voorkeur om slechts één keer per jaar de haag in het vroege voorjaar te snoeien. Jaarlijkse snoei garandeert het behoud van de vorm van de haag en stimuleert verdichting. Snoeiwerkzaamheden dienen vermeden te worden tijdens felle zon en nachtvorst om schade aan de haag te voorkomen.

Om een goed struweel ontwikkelen worden de heesters in groepen van 3 tot 5 veren aangeplant. Deze groepen worden willekeurig door elkaar geplant om een natuurlijke uitstraling te krijgen.

Voor struwelen ligt de voorkeur bij het snoeien in het vroege voorjaar. Dit onderhoud gebeurt één keer per 2 tot 3 jaar. Zo worden robuustere struwelen ontwikkeld die aantrekkelijk zijn voor vogels en overige fauna. Een andere optie is om de haag in delen sterk terug te snoeien. Door per snoeibeurt enkele planten te snoeien behoudt de struweelhaag zijn vorm. Verder is jaarrond begeleidingssnoei mogelijk in het geval van overhangende takken of gevaarlijke/hinderlijke situaties.

Het kappen en/of snoeien van bomen en struiken tijdens het broedseizoen, is in strijd met hoofdstuk 11 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) zodra er daadwerkelijk een vogel broedt in de betreffende boom of struik. Dit broedseizoen loopt over het algemeen van maart tot augustus, maar ook buiten deze periode kunnen snoei- en kapwerkzaamheden in strijd zijn met hoofdstuk 11 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Bijvoorbeeld wanneer er een jaarrond beschermd nest aanwezig is of een vogel broedt buiten het broedseizoen. Belangrijk is dan ook om altijd voorafgaand aan de werkzaamheden te controleren of eerdergenoemde situaties niet aan de orde zijn.



Sortiment

Latijnse naam	Nederlandse naam	Maat	Aantal
<i>Struweel</i>			
Corylus avellana	Hazelaar	80/100	30
Frangula alnus	Sporkehout	80/100	30
Prunus spinosa	Sleedoorn	80/100	30
Viburnum opulus	Gelderse roos	80/100	30
<i>Hagen</i>			
Fagus sylvatica	Beuk	80/100	440

* Beplanting wordt meegenomen in de landschappelijke inpassing