

QUICKSCAN SOORTENBESCHERMING

HOUTSBERG 5A TE NEDERWEERT-EIND

Colofon

Quicksan soortenbescherming


Projectnummer: EP.22.1076

Versie: 1

Datum: 2 september 2022

Opdrachtnemer

Agrifirm NWE BV
Bedrijfsontwikkeling Exlan



Locatie

Houtsberg 5a Nederweert-Eind

Contactpersoon



Uitvoerders



Collegiale check



ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN VERVEELVOLDIGD DOOR MIDDEL VAN DRUK, FOTOKOPIE, MICROFILM, GELUIDSBAND, ELEKTRONISCH OF OP WELKE ANDERE WIJZE DAN OOK, EN EVENMIN IN EEN GEAUTOMATISEERD GEGEVENSBESTAND WORDEN OPGESLAGEN, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN AGRIFIRM EXLAN.

Inhoudsopgave

Quickscan soortenbescherming

INLEIDING	4
HOOFDSTUK 1	6
TOETSINGSKADER	6
HOOFDSTUK 2	9
ONDERZOEKSRESULTATEN	9
HOOFDSTUK 3	24
CONCLUSIE	24
LITERATUUR	25
WAARNEMINGEN	26
EFFECTEN INDICATOR SOORTEN	31
PLAN PROJECTLOCATIE	35
NATUURGEGEVENS PROVINCIE LIMBURG BROEDVOGELINDICATIE	36

Inleiding

Planbeschrijving

Aanleiding

Het plangebied is gelegen aan de Houtsberg 5a te Nederweert-Eind. De plannen omvatten de wijziging naar een woonbestemming en daarnaast wordt een oude legpluimveestal gedeeltelijk gesloopt. In dit kader wordt door het bevoegde gezag een toets aan de soortenbescherming noodzakelijk geacht. Bij de uitvoering van de voorgenomen ingrepen moet rekening worden gehouden met het huidige voorkomen van de, op grond van de Wet natuurbescherming, beschermde soorten. Als de voorgenomen ingreep leidt tot het overtreden van verbodsbepalingen betreffende beschermde soorten, moet vrijstelling of ontheffing worden verkregen.

De voorliggende quickscan bevat een inventarisatie van de huidige aanwezigheid van beschermde soorten planten en dieren in en om het plangebied. Tevens worden de te verwachten effecten van de ingreep in het plangebied beoordeeld.

Plangebied

Het plangebied ligt in de plaats Nederweert-Eind in de gemeente Nederweert. Het plangebied bevindt zich buiten de verkeerskundige en stedenbouwkundige bebouwde kom van Nederweert-Eind.



- Afbeelding 1: luchtfoto plangebied (bron: streetsmart.cyclomedia.com/streetsmart, geraadpleegd op 29/08/2022)

Onderzoeksmethode

Om een goede indicatie van de natuurwaarden binnen het plangebied te krijgen, wordt het onderzoek in verschillende stappen uitgevoerd. Op basis van bronnenonderzoek is nagegaan of er wettelijk beschermde planten- of diersoorten in het gebied voor kunnen komen waaraan extra aandacht geschonken dient te worden tijdens het terreinbezoek.

Na het bronnenonderzoek is een verkennend terreinbezoek gebracht aan het plangebied. Hierbij is, op basis van de gegevens van het literatuuronderzoek, beoordeeld voor welke soorten het gebied daadwerkelijk een geschikte habitat biedt en daarmee welke soorten er daadwerkelijk voor kunnen komen. Vervolgens zijn de mogelijke effecten op de verwachte beschermde soorten beschreven.

Op basis van de doorlopen procedures zijn conclusies getrokken met betrekking tot de eventuele negatieve effecten en/of obstakels inzake de Wet natuurbescherming.

Op woensdag 31 augustus 2022 is de locatie tussen 08:30 en 09:30 uur ter plaatse geïnventariseerd, om te onderzoeken of het plangebied een zodanig belangrijke status heeft dat een aanvullend veldonderzoek noodzakelijk is. Op het moment van inventarisatie was het 17 graden Celsius en licht bewolkt.

Op basis van terreinkenmerken is beoordeeld of het terrein geschikt is voor de, in de regio voorkomende, beschermde soorten.

Doelstelling

Om een indicatie te krijgen van de effecten die de sloopbouwwerkzaamheden hebben op de natuurwaarden binnen het plangebied, dienen de volgende vragen te worden beantwoord:

1. Welke wettelijk beschermde soorten komen in het plangebied voor? Welke status hebben deze soorten?
2. Welke invloed heeft de geplande ingreep in het betreffende gebied op de beschermde soorten en komt daarmee de staat van instandhouding in gevaar?
3. Hoe dient omgegaan te worden met eventuele negatieve effecten van het plan op wettelijk beschermde planten- en diersoorten, en welke vervolgstappen zijn nodig?

1

Toetsingskader

Wet natuurbescherming

De bescherming van natuur is in Nederland vastgelegd in nationale wetgeving. De nationale wetgeving is een Nederlandse implementatie van de belangrijkste Europese wetgevingselementen. Per 1 januari 2017 zijn de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998 vervangen door de Wet natuurbescherming. De uitvoering van deze nieuwe wet is grotendeels in handen van de provincies gekomen.

1.1 Gebiedsbescherming

De Wet natuurbescherming noemt bekende maar ook enkele nieuwe soorten natuurgebieden die bescherming behoeven: de Natura 2000-gebieden, het Natuurnetwerk Nederland (NNN), bijzondere provinciale natuurgebieden en landschappen, bijzondere nationale natuurgebieden en de nationale parken. Bij ontwikkelingen met name in het buitengebied moet rekening worden gehouden met het al dan niet van toepassing zijn van de beschermingsregimes van deze natuurgebieden. Ieder gebied kent een eigen beschermingsregime dat afzonderlijk gewogen dient te worden in relatie tot plannen, projecten en andere handelingen met mogelijk nadelige effecten voor de beschermde natuurwaarden.

Natura 2000-gebieden

De bekendste natuurgebieden zijn de Natura 2000-gebieden, zij kennen tevens het meest strikte beschermingsregime. De basis voor Natura 2000 zijn de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. In Nederland zijn 164 gebieden als Natura 2000-gebied aangewezen. Voor ieder gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen bepaald die betrekking kunnen hebben op de bescherming van specifieke flora en fauna alsook leefgebieden van soorten. Alle projecten en handelingen binnen of buiten de gebiedsgrenzen mogen geen verstorend of verslechterend effect hebben op de instandhoudingsdoelstellingen. Voor de voorgenomen ontwikkeling is hier, voor zover van toepassing, separaat aan getoetst. In deze rapportage wordt hier verder niet op ingegaan.

Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS) is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. De provincies zijn belast met de taak een dergelijk netwerk tot stand te laten te komen en in stand te laten. De uitvoering hiervan is hoofdzakelijk gestuurd vanuit de ruimtelijke ordening (provinciale verordeningen). Binnen het Natuurnetwerk Nederland geldt een “nee, tenzij”- benadering.

Overige gebieden

Naast de bovengenoemde gebieden kunnen gebieden aangewezen worden als ‘bijzondere provinciale natuurgebieden’, ‘bijzondere provinciale landschappen’ of ‘nationaal park’. De bescherming van deze gebieden vindt net als bij het NNN plaats via het ruimtelijk spoor. Daarnaast kan een gebied aangewezen worden als ‘bijzonder nationaal gebied’, een soort voorloper van de aanwijzing als Natura 2000-gebied. De bescherming van deze gebieden stemt dan ook overeen met de bescherming van Natura 2000-gebieden.

1.2 Soortenbescherming

De Wet natuurbescherming deelt soorten in drie beschermingsregimes in. Daarnaast zijn er vrijgestelde soorten en jaarrond beschermde vogelnesten.

- 1) Beschermingsregime soorten vogelrichtlijn
- 2) Beschermingsregime soorten habitatrichtlijn
- 3) Beschermingsregime andere soorten
- 4) Vrijgestelde soorten
- 5) Jaarrond beschermde vogelnesten

Vogelrichtlijn

Onder de soorten van de Vogelrichtlijn vallen alle van nature in Nederland in het wild levende vogels. Het is verboden om:

- Opzettelijk vogels te doden of te vangen;
- Opzettelijk vogelnesten, -rustplaatsen en – eieren te vernielen of te beschadigen of vogelnesten weg te nemen;
- Eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben;
- Opzettelijk vogels te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

Habitatrichtlijn

Onder de soorten van de Habitatrichtlijn vallen soorten die genoemd zijn in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage I van het Verdrag van Bonn. In de Bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd.

Wat betreft deze soorten is het verboden om:

- Opzettelijk dieren te doden of te vangen;
- Opzettelijk dieren te verstoren;
- Opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen;
- Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
- Opzettelijk planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken, te verzamelen, af te snijden, te onttwortelen of te vernielen.

Ook is het verboden deze soorten te verkopen, te vervoeren voor verkoop, te verhandelen, te ruilen of te kopen, tenzij het gaat om gefokte of gekweekte dieren of planten.

Andere soorten

Onder het beschermingsregime andere soorten vallen soorten waarvan er geen Europese verplichting tot bescherming is. Dit zijn soorten die vanuit nationaal belang extra bescherming behoeven. Het beschermingsniveau van deze soorten kan per provincie verschillen.

Het is verboden om:

- 1) Opzettelijk dieren te doden of te vangen;
- 2) Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
- 3) Opzettelijk (vaat)planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken te verzamelen, af te snijden, te onttwortelen of te vernielen.

Provincies hebben de bevoegdheid om bij provinciale verordening vrijstelling te verlenen voor nationaal beschermde soorten.

Vrijgestelde soorten

De verboden zijn niet van toepassing op de bosmuis, de huisspitsmuis en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevinden. Ook vallen de zwarte rat, bruine rat, huismuis, de mol en exoten niet onder beschermingsregime van de Wet natuurbescherming en mogen opzettelijk gedood en gevangen worden. Daarnaast geldt, zoals hierboven reeds aangegeven, dat provincies de bevoegdheid hebben vrijstelling te verlenen voor bepaalde soorten.

Jaarrond beschermde vogelnesten

De opgestelde lijst met jaarrond beschermde nesten voor vogels is een beleidsdocument dat voortvloeit uit de voormalige Flora- en faunawet en meegenomen is onder de Wet natuurbescherming. De nesten zijn ingedeeld in categorieën (1 t/m 5) waarvan de categorie 1 t/m 4 jaarrond beschermd zijn. Nesten in categorie 5 zijn enkel beschermd bij afwezigheid van voldoende alternatieven.

- 1) Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats
- 2) Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
- 3) Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
- 4) Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen.
- 5) Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen.

1.3 Houtopstanden

De regels van de Boswet zijn grotendeels onveranderd opgenomen in de Wet natuurbescherming. Een houtopstand is een zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend, die een oppervlakte van 10 are of meer beslaat ofwel een rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat.

Buiten de bescherming vallen:

- houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom (voor deze wet);
- houtopstanden op erven of in tuinen
- fruitbomen en windschermen om boomgaarden;
- naaldbomen bedoeld als kerstbomen en niet ouder dan twintig jaar
- kweekgoed;
 - uit populieren of wilgen bestaande wegbeplantingen,
 - beplantingen langs waterwegen, en
 - eenrijige beplantingen langs landbouwgronden;
- Het dunnen van een houtopstand;
- uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die zijn bedoeld voor de productie van houtige biomassa indien zij:
 - ten minste eens per tien jaar worden geoogst;
 - bestaan uit minstens tienduizend per hectare per beplantingseenheid
 - bestaande uit een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee meter;
 - zijn aangelegd na 1 januari 2013.

2

Onderzoeksresultaten

2.1 Bronnenonderzoek

Gegevens van websites als www.waarneming.nl zijn geraadpleegd voor achtergrondinformatie. Een groot aantal amateurs en professionals publiceert op deze bekende websites zijn natuurwaarnemingen, die worden gecontroleerd door een validatiecommissie. Zodoende zijn de waarnemingen uit deze bronnen redelijk betrouwbaar, maar moeilijk te verifiëren. De waarnemingen geven eventueel wel een indicatie van soorten waar tijdens het veldonderzoek extra aandacht aan besteed dient te worden.

Natuurnetwerk Nederland

Het natuurbeheerplan is een beleidskader om het Europese, rijks- en provinciale natuur- en landschapsbeleid te realiseren. Het gaat hier om bestaande natuurgebieden, gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt, landbouwgebieden worden ingericht en beheerd volgens agrarisch natuurbeheer en de Natura 2000-gebieden.

Het plangebied ligt nabij het Natuurnetwerk Nederland en buiten andere natuurgebieden zoals Natura 2000. Het meest dichtbijgelegen Natura 2000-gebied is het Natura 2000-gebied "Sarsven en De Banen".

De Limburgse natuurgebieden, waaronder ook de Natura 2000-gebieden, vormen samen het Limburgse deel van het Natuurnetwerk Nederland (samen ca. 53.000 ha). Het Natuurnetwerk Limburg is gelegen in delen van beekdalen, op hellingen en op veen- en stuifzandgebieden van de hoger gelegen gebieden. Binnen het Natuurnetwerk Limburg wordt ingezet op een goede kwaliteit en bescherming van de natuur met een bijzonder accent op bedreigde Limburgse dier- en plantensoorten. Daarnaast wordt ingezet op het bieden van mogelijkheden voor natuurbeleving.

De Natura 2000-gebieden (ca. 17.000 ha) vormen een selectie binnen het Natuurnetwerk Limburg. Hier ligt de absolute nadruk op de natuurwaarden: het zo spoedig mogelijk en verantwoord bereiken van een gunstige staat van instandhouding van de soorten en habitatten, waarop de aanwijzing als Natura2000-gebied is gebaseerd. De Natuurbeheerplannen van de 23 Natura 2000-gebieden in Limburg geven inzicht in hetgeen daarvoor nodig is. Er zijn ook Natura 2000-gebieden (net) buiten de provinciegrens. Vanuit de Europese wet- en regelgeving geldt een strenge wet- en regelgeving gericht op beheer en bescherming van de natuurwaarden. Onder andere via het Aanvalsplan Stikstof wordt gewerkt aan het verbeteren van de omgevingskwaliteit van de Natura 2000-gebieden.



• Afbeelding 2: ligging Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000
(bron: a.lasleefomgeving.nl/kaarten, geraadpleegd op 29/08/2022)

2.2 **Veldonderzoek**

Op verschillende punten in het plangebied zijn waarnemingen verricht. Tijdens het veldbezoek is het gebied beoordeeld op de aanwezigheid van beschermde soorten en de habitatgeschiktheid voor beschermde soorten. Er is extra aandacht besteed aan de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen en vogelnesten.

De ecologische factoren in de omgeving zijn met behulp van een digitale fotocamera vastgelegd. Om de flora en fauna te kunnen determineren, is gebruik gemaakt van eigen kennis en literatuur.

• Afbeelding 3: zijkant stal volledig gesloten met vogelgaas bij luchtinlaten



- Afbeelding 4: zijaanzicht gebouw bestaande uit gasbetonblokken



- Afbeelding 5: inlaat



- Afbeelding 6: achteraanzicht



- Afbeelding 7: gebouw volledig gesloten met vogelschroot, gaas en overstek sluit naadloos aan op de buitengevel



- Afbeelding 8: gebouw volledig gesloten boeiboord geheel voorzien van spinnenwebben



- Afbeelding 9: binnenzijde gebouw



- Afbeelding 10: binnenzijde gebouw



- Afbeelding 11: gebouw volledig gesloten



- Afbeelding 12: aanzicht op bosgebied



- Afbeelding 13: zijaanzicht woonhuis potentiële plek voor vleermuizen



- Afbeelding 14: garage naast het te slopen gebouw



- Afbeelding 15: aanzicht garage



• Afbeelding 16: bos naast woning



• Afbeelding 17: bos naast het gebouw



- Afbeelding 18: achteraanzicht op het te slopen gebouw



- Afbeelding 19: erf



Gebouw

Het gebouw voormalige legpluimveestal staat al 7 jaar leeg, heeft geen spouwmuur en is gebouw van gasbetonblokken van 20 cm. Daarnaast is alles volledig gesloten met vogelgaas. Dit is aangebracht in zowel de nok als bij de inlaten. Aan de achterzijde zijn ook alle gaten gesloten met gaas en is de overstrek bedekt met spinnenwebben. Dit gebouw wordt gedeeltelijk gesloopt

Flora algemeen

Bij de planlocatie zijn geen bijzondere beplantingen aangetroffen. Er is tevens gelet op de aanwezigheid van (beschermde) muurvegetatie. Het betreft een siertuin met veel oude bomen waaronder tamme kastanje, esdoorn, grote solitaire Apenboom (in de voortuin) en daarnaast verschillende heggen. De locatie grenst aan een droog bos met veel grove den, zomereik en onderbegroeiing in de vorm van Amerikaanse vogelkers, vuilboom, bramen, lijsterbes, brandnetels en op sommige plekken verschillende soorten varens.

Grondgebonden zoogdieren

Specifiek wordt bekeken of binnen de betreffende inrichting verwacht kan worden of er streng beschermde zoogdieren; steenmarter, bunzing, hermelijn, wezel, eekhoorn, bever en das kunnen worden aangetroffen.

Steenmarter

De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor de steenmarter. Steenmarters gebruiken hooizolders, loze ruimtes onder het dak, schuurtjes en dergelijke, als verblijfplaats. Een steenmarter heeft binnen zijn territorium verscheidene verblijfplaatsen. Daarnaast laten steenmarters enorm veel sporen achter. Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen, zoals uitwerpselen of prooiresten aangetroffen die duiden op het gebruik van de onderzoekslocatie als vaste rust- of verblijfplaats door deze soort.

Kleine marterachtigen

De onderzoekslocatie biedt geen geschikte verblijflocaaties voor de hermelijn, wezel en bunzing. De soorten maken gebruik van oude hopen van onder andere mollen en muizen, maar ook houtwallen, steenhopen en ruimtes onder boomwortels. Desbetreffende soorten hebben binnen hun territorium verscheidene verblijfplaatsen. Tijdens het veldbezoek zijn er geen marters of sporen van marters aangetroffen op de onderzoekslocatie. Echter, dit betekent niet dat het gebied niet potentieel in gebruik is door de hermelijn, wezel en/of bunzing als migratieroute. Gezien de onderzoekslocatie kleiner is dan één hectare kan gesteld worden dat deze geen essentieel onderdeel uitmaakt van het leefgebied van een van genoemde soorten (Bouwens 2017). Indien bij sloop/herinrichting van het gebied groenstructuren rond het perceel behouden blijven, is er geen sprake van een negatief effect op genoemde soorten.

Eekhoorn

De onderzoekslocatie is vanwege de afwezigheid van voldoende bomen niet geschikt als habitat voor de eekhoorn. Er staan te weinig bomen rondom de projectlocatie. Tevens worden er met de werkzaamheden geen bomen verwijderd. Een negatief effect als gevolg van de werkzaamheden is uitgesloten.

Bever

Voor de bever is op de onderzoekslocatie geen geschikt habitat aanwezig. Vaste rust- en verblijfplaatsen van de bever kunnen worden uitgesloten.

Das

Tijdens het veldbezoek zijn op de onderzoekslocatie en de directe omgeving geen loop- of eetsporen, latrines en/of wissels aangetroffen die duiden op de aanwezigheid en/of het gebruik van de onderzoekslocatie door de das. Dassen zullen eerder hun leefgebied hebben in de nabij gelegen natuurgebieden en de aansluitende weilanden. Er zijn ook in het bos geen wissels en/of sporen gevonden van dassen. Verstoring ten aanzien van de das als gevolg van de voorgenomen ingreep is niet aan de orde.

Het voorkomen van overige grondgebonden zoogdieren waarvoor geen vrijstelling geldt, is tijdens het veldbezoek niet vastgesteld.

Vleermuizen

Het plangebied is zeer nauwkeurig beoordeeld op de mogelijke waarde voor vleermuizen. Hierbij is gelet op de geschiktheid van de aanwezige bebouwing als verblijfplaats voor deze dieren: aanwezigheid van spouwgaten en andere openingen in muren en daken, vetstrepen, uitwerpselen en prooiresten bij gevelopeningen.

Verblijfsruimte voor vleermuizen hebben specifieke voorwaarden zoals een stabiele temperatuur en het tochtvrij zijn. Bij vleermuizen worden vier verblijfplaatsen onderscheiden; winterverblijven, zomerverblijven, kraamverblijven en paarverblijven. Aan de winterverblijven worden de hoogste eisen gesteld, daarna de kraamverblijven, dan de zomerverblijven en tenslotte de paarverblijven, waarbij de vleermuizen een zeer korte tijd op een bepaalde locatie kunnen verblijven.

Er zijn geen sporen (vetstrepen, uitwerpselen, prooiresten) aangetroffen. Het gebouw heeft geen spouwmuur en alle openingen zijn afgedekt met vogelgaas of zijn voorzien van een laag spinnenwebben. Naast de onderzoekslocatie bevindt zich het woonhuis deze is veel meer geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen. Eventuele verblijfsplaatsen hierin ondervinden door de afstand tot de slooplocatie en de aard van de ingreep geen hinder.

Foerageerhabitat

De onderzoekslocatie zal, gelet op de aanwezige habitat, gebruikt kunnen worden door in de omgeving verblijvende vleermuizen om te foerageren. De plannen zullen echter geen aantasting van belangrijk foerageerhabitat vormen. Door de voorgenomen ingreep zal het aanbod van foerageermogelijkheden niet in het geding komen. In de directe omgeving is meer geschikt foerageerhabitat voor vleermuizen aanwezig in de vorm van bomenrijen en bosranden.

Vliegroutes

Vleermuizen maken veelal gebruik van lijnvormige (donkere) landschapselementen zoals houtsingels, beken en lanen om zich te verplaatsen tussen verblijfsplaatsen en foerageergebieden. Doordat dergelijke lijnvormige elementen ontbreken op de onderzoekslocatie, worden er geen potentiële vliegroutes verstoord.

Vogels

Tijdens het bezoek is met name gelet op de aanwezigheid van nesten en rustplaatsen voor vogels.

Er zijn broedvogels waarvan de nesten ook beschermd zijn op het moment dat ze niet voor de voortplanting in gebruik zijn. Binnen het agrarische (buiten)gebied kunnen dit zijn: boomvalk, buizerd, havik, sperwer, wespandief, huismus, steenuil en de kerkuil.

Boomvalk

De boomvalk is een soort die geen eigen nest maakt, maar broedt in gebruikte kraaien- en/of eksternesten in verschillende typen bos(randen) of in solitaire bomen, populierensingels, of op erven. De soort komt vooral voor in open en halfopen landschappen zoals boerenland en dorpen, alsook in buitenwijken van steden. De bomen op- en nabij de projectlocatie zijn gecontroleerd op dergelijke nesten, deze zijn niet aangetroffen. Evenmin worden er met de beoogde werkzaamheden bomen verwijderd. Negatieve effecten op de boomvalk als gevolg van de werkzaamheden zijn derhalve niet aan de orde.

Buizerd en havik

De buizerd en havik broeden op grote nesten van ongeveer een meter in doorsnede en 60 centimeter diep. Dergelijke nesten zijn tijdens het veldbezoek niet waargenomen. Een broedgeval van de buizerd en havik is daarom uit te sluiten. Eveneens worden er met de

beoogde werkzaamheden geen bomen gekapt, zodat het wegnemen van een jaarrond beschermd nest kan worden uitgesloten.

Wespendief en sperwer

De wespndief is doorgaans gebonden aan grotere bosgebieden van zowel loof- als naaldbomen. Bij voorkeur is er afwisseling binnen het bosgebied aanwezig in de vorm van open plekken. De sperwer broedt bij voorkeur meer verborgen in naaldbomen. Beide situaties zijn op de onderzoekslocatie niet aanwezig. Gezien de ligging van de onderzoekslocatie en de afwezigheid van voldoende dekking is een nestplaats van de sperwer of wespndief niet te verwachten. Eveneens zijn er tijdens het veldbezoek geen nesten aangetroffen. Een broedgeval van zowel de wespndief als de sperwer zijn uitgesloten.

Steenuil en kerkuil

De kerkuil en steenuil hebben een voorkeur voor cultuurlandschappen met allerlei landschapselementen die voor afwisseling zorgen. Beide soorten broeden in gebouwen en gebruiken ook graag speciale nestkasten. Daarnaast worden door de steenuil ook wel boomholten gebruikt, mits er zich grote holten in bevinden. De opstallen zijn in zijn geheel gecontroleerd op de aanwezigheid van steen- en kerkuilen en is vooral gelet op de aanwezigheid van sporen; braakballen, veren en uitwerpselen. Er zijn geen (sporen van) steen- en kerkuilen waargenomen. Er is geen sprake van een afname van belangrijk foerageergebied. Er blijft er voldoende foerageergebied aanwezig in de omgeving.

Huismus

Ook voor de huismus, die veel te vinden is in agrarisch gebied en vooral gebonden aan gebouwen is, is het nest jaarrond beschermd. Er zijn geen nesten van huismussen gevonden in de te slopen bebouwing. Daarnaast zijn er ook geen huismussen waargenomen en ook niet gehoord.

Overige broedvogels

De beplanting op de onderzoekslocatie kan nestgelegenheid bieden aan broedvogelsoorten zoals de merel en winterkoning. De nesten van deze soorten zijn alleen beschermd op het moment dat ze als zodanig in gebruik zijn. Er zijn geen nesten van overige broedvogels aangetroffen in de te slopen bebouwing.

Er zijn vogels gezien en gehoord, namelijk:

• Tabel 1: overzicht waargenomen vogels

Soort
Koolmees

Reptielen, amfibieën en vissen

Er zijn tijdens het terreinbezoek geen reptielen, amfibieën en/of vissen waargenomen.

Voor de in Nederland voorkomende reptielsoorten zoals de hazelworm, de levendbarende hagedis en ringslang biedt de onderzoekslocatie geen geschikt habitat. Deze soorten worden vrijwel alleen aangetroffen in specifieke natuurgebieden.

Dit geldt ook voor de specifieke beschermende amfibieënsoorten die veel eisen stellen aan zijn habitat; alpenwatersalamander, heikikker, vinpootsalamander, poelkikker en rugstreeppad. Deze zijn allen uit te sluiten omdat de betreffende locatie geen goed habitat biedt voor deze soorten door het ontbreken van voldoende oppervlaktewater.

De onderzoekslocatie vormt wel een geschikt habitat voor algemene amfibieënsoorten als de bruine kikker en de gewone pad. Op de onderzoekslocatie kunnen deze soorten beschutting vinden tussen de begroeiing en onder de takken- of stenenhopen. Voor algemene amfibieënsoorten geldt in het kader van de Wet natuurbescherming een vrijstelling, zodat een

onthefing bij verstoring niet noodzakelijk is. Het is echter wel zaak om aandacht te schenken aan de zorgplicht.

Vissen

Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater op de onderzoekslocatie kan deze soortgroep buiten beschouwing worden gelaten.

Overige

Van de overige soortgroepen, zoals dagvlinders, insecten en libellen, kan worden aangenomen dat deze soorten gedurende het jaar in het plangebied aanwezig kunnen zijn of dit gebied in de migratieroute hebben liggen.

Afhankelijk van het seizoen zijn mogelijk algemene soorten te vinden op/of binnen de planlocatie. Specifieke beschermende soorten zijn voornamelijk afhankelijk van specifieke terreinkenmerken met specifieke biotopen. Binnen het plangebied is een dergelijk biotoop niet aanwezig.

2.3 Effecten van de ingreep

De effecten op beschermde soorten zijn onderzocht op basis van het voornemen binnen het plangebied.

Flora algemeen

Er is geen bijzondere flora aangetroffen binnen het plangebied, negatieve effecten zijn uitgesloten.

Grondgebonden zoogdieren

Verstoring van algemene zoogdieren vindt mogelijk plaats. De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor een aantal soorten grondgebonden zoogdieren. Het gaat daarbij om algemene soorten als de egel, konijn en diverse muissoorten. De verblijfplaatsen van deze soorten worden door de voorgenomen ingreep echter niet aangetast. Verblijfplaatsen van beschermde zoogdiersoorten zijn ter plaatse niet aangetroffen.

Vleermuizen

Er zijn geen sporen van vleermuizen aangetroffen waaruit blijkt dat de gebouwen als verblijfplaats worden gebruikt. Nader onderzoek in het kader van de soortenbescherming is niet noodzakelijk.

Vogels

Door de voorgenomen ingreep worden geen vogels en jaarrond beschermde nesten aangetast.

Reptielen, amfibieën en vissen

Er zijn geen reptielen, amfibieën en/of vissen waargenomen. De instandhoudingsdoelstellingen komen niet in het gedrang.

Overige

Omdat er geen geschikt biotoop is waargenomen voor overige beschermde soorten, zijn negatieve effecten uitgesloten. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

3

Conclusie en aanbevelingen

Het natuuronderzoek is gebaseerd op inventarisatiegegevens van derden, literatuuronderzoek en een verkennend veldbezoek aan het plangebied. Het beeld dat uit het onderzoek naar voren is gekomen vormt voldoende basis om gefundeerd uitspraken te doen over de gevolgen van de voorgenomen werkzaamheden voor beschermde soorten en gebieden.

3.1 Conclusie

Voor de bepaling van de effecten en voor de beantwoording van de vraag of men in strijd komt met de Wet natuurbescherming, wordt de relatie gelegd tussen het initiatief met deze wet door waar mogelijk antwoord te geven op de volgende vragen:

1. *Welke wettelijk beschermde soorten komen in het plangebied voor? Welke status hebben deze soorten?*
2. *Welke invloed heeft de geplande ingreep in het betreffende gebied op de beschermde soorten en de staat van instandhouding?*
3. *Hoe dient omgegaan te worden met eventuele negatieve effecten van het plan op wettelijk beschermde planten- en diersoorten, en welke vervolgstappen zijn nodig?*

Het voornemen zoals opgenomen in de inleiding en de daarbij behorende werkzaamheden, zal naar verwachting geen negatief effect hebben op de staat van instandhouding van beschermde soorten. Binnen het plangebied zijn geen (verblijfplaatsen van) strikt beschermde soorten aangetroffen die door de werkzaamheden worden beïnvloed.

Uit de effectenbeschrijving blijkt dat er geen onevenredige directe of indirecte gevolgen zijn van de voorgenomen activiteiten op de voortplanting en instandhouding van beschermde dieren/of plantsoorten. Lokaal zullen mogelijk algemene soorten uit het plangebied trekken op zoek naar een vervangende biotoop.

Voor aanvang van de werkzaamheden dient derhalve geen aanvullend onderzoek plaats te vinden. Een ontheffing met betrekking tot aantasting van beschermde soorten is niet nodig. De werkzaamheden kunnen leiden tot een beschadiging of vernietiging van mogelijke verblijfplaatsen en/of verstoring van eventueel aanwezige algemene soorten. Een algehele vrijstelling is hierop van toepassing. De algemene zorgplicht blijft onverminderd van toepassing.

Literatuur

- [redacted] Atlas van de Nederlandse zoogdieren. [redacted] Utrecht.
- Europese Gemeenschappen, Richtlijn no 92/409 inzake het behoud van de vogelstand. Brussel, 1979.
- Europese Gemeenschappen, Richtlijn no 92/43 inzake instandhouding van de natuurlijke habitat en de wilde flora en fauna. Brussel, 1992.
- Provinciale Verordening (Wet) natuurbescherming
- [redacted] 1994.
Rode-Lijst van bedreigde zoogdieren in Nederland.
Red data book of threatened mammals in the Netherlands. Vereniging voor Zoogkunde en Zoogdierbescherming, Utrecht.
- Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Ministerie van Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en milieu, 2004. Nota Ruimte.
- De Nederlandse libellen, Nederlandse Fauna, deel 4
Nationaal historisch museum, KNNV uitgeverij (2002)
- Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ)
- Vleermuizen en planologie, Zoogdierverseniging (2010)
- Wet natuurbescherming.
Vastgesteld d.d. 1 januari 2017.
- www.waarneming.nl
- www.synbiosys.alterra.nl
- www.atlasleefomgeving.nl
- www.ravon.nl
- www.sovon.nl
- www.google.nl
- www.ndff.nl
- www.floron.nl
- www.ruimtelijkeplannen.nl
- www.natura2000.nl
- www.ecologica.eu


1 Bijlage

Waarnemingen

Nederweert - Houtsberg Limburg

Details Waarnemingen Foto's Geluiden Soorten gezien Ranglijst waarnemers

Naam	Nederweert - Houtsberg	Data	Aantal	Gebruiker	Waarnemingen
Oppervlakte	463.463 m ²	waarnemingen	1.603		87
Gemeente	Nederweert (gemeente)	gebruikers	160		54
Provincie	Limburg	foto's	678		54
		geluiden	1		47
		soorten	636		34



Nederweert - Houtsberg Limburg

Details Waarnemingen Foto's Geluiden Soorten gezien Ranglijst waarnemers

2021-08-29 - 2022-08-29 Selecteer een soort Alle soortgroepen Alle zeldzaamheden
 Zoek Waarnemingen van iedereen Filter Wis filters Als kaart ☐ Toon geavanceerd

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2022-08-22 10:12	■ Ooievaar - <i>Ciconia ciconia</i>	5	Houtsberg		📷 📷
2022-08-20 13:30	▲ Buitend - <i>Buteo buteo</i>	1 gezien en gehoord	Ven aan Banendijk		📷 📷
2022-08-20 13:44	▲ Dagpauwoog - <i>Aglaia io</i>	1 imago	Houtsberg		📷 📷
2022-08-20 13:23	▲ Landkaartje - <i>Araschnia levana</i>	1 imago	Ven aan Banendijk		📷 📷
2022-08-20 13:40	▲ Struiksprinkhaan - <i>Leptophyes punctatissima</i>	1 ♂ imago	Houtsberg		📷 📷
2022-08-08 15:29	▲ Wilde lijsterbes - <i>Sorbus aucuparia</i>	1	Houtsberg		📷 📷
2022-07-30 11:26	▲ Bruinrode heidelibel - <i>Sympetrum striolatum</i>	1 imago, gezien	Houtsberg		📷 📷
2022-07-30 18:49	▲ Vroege roggebraam - <i>Rubus nessensis</i>	2 ♀♀	Houtsberg		📷
2022-07-29 15:17	■ Wielewaal - <i>Oriolus oriolus</i>	1	Houtsberg		📷
2022-07-29 15:20	▲ Duitse wesp - <i>Vespa germanica</i> 🚫	1	Houtsberg		📷 📷
2022-07-29 15:20	▲ Doodskopzweefvlieg - <i>Myathropa florea</i>	1 imago	Houtsberg		📷 📷
2022-07-29 15:09	▲ Gewone smalboktor - <i>Stictoleptura rubra</i>	1 ♀ imago	Houtsberg		✅ 📷 🗨
2022-07-29 15:25	▲ Brede stekeelvaren - <i>Dryopteris dilatata</i>	1	Houtsberg		✅ 📷 🗨
2022-07-10 14:45	▲ Zandblauwtje - <i>Jasione montana</i>	1	Houtsberg		📷 📷
2022-07-05 08:57	▲ Gewone pad - <i>Bufo bufo</i>	1 subadult	Houtsberg		✅ 📷
2022-07-05 08:56	▲ Gewone heispanner - <i>Ematurga atomaria</i>	1 imago, gezien	Houtsberg		📷 📷
2022-07-05 08:57	▲ Sneeuw witte vedermot - <i>Pterophorus pentadactyla</i> 🚫	1 imago, gezien	Houtsberg		📷 📷
2022-07-01	■ Levendbarende hagedis - <i>Zootoca vivipara</i>	1 adult, gezien	Houtsberg		📷 📷
2022-07-01	▲ Groot dikkopje - <i>Ochlodes sylvanus</i>	1 imago, gezien	Houtsberg		📷 📷
2022-07-01	▲ Landkaartje - <i>Araschnia levana</i>	1 imago, gezien	Houtsberg		📷 📷
2022-07-01	▲ Bont zandoogje - <i>Pararge aegeria</i>	1 imago, gezien	Houtsberg		📷 📷
2022-07-01	▲ V-dwergspanner - <i>Chloroclystis vata</i>	1 imago, gezien	Houtsberg		✅ 📷
2022-07-01	▲ Gerande spanner - <i>Lomaspilis marginata</i>	1 imago, gezien	Houtsberg		📷 📷
2022-07-01	▲ Klaverspanner - <i>Chiasmia clathrata</i>	1 imago, gezien	Houtsberg		✅ 📷
2022-07-01	▲ Italiaanse kaneelstikkelmot - <i>Metalampra italica</i>	1 imago, gezien	Houtsberg		📷 📷

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2022-07-01	Blauwvleugelsprinkhaan - <i>Oedipoda caerulea</i>	1 imago, gezien	Houtsberg		 
2022-07-01	Knollenbladwesp - <i>Athalia rosae</i>	1 imago, gezien	Houtsberg		 
2022-07-01	Grote rupserdoder - <i>Ammophila sabulosa</i>	1 imago, gezien	Houtsberg		 
2022-07-01	Middelste wesp - <i>Dolichovespula media</i>	1 imago, gezien	Houtsberg		 
2022-07-01	<i>Clogmia albipunctata</i>	1 imago, gezien	Houtsberg		 
2022-07-01	Kleine rode weekschild - <i>Rhagonycha fulva</i>	1 imago, gezien	Houtsberg		 
2022-07-01	Viltbandkevertje - <i>Varimorda villosa</i>	1 imago, gezien	Houtsberg		 
2022-07-01	Fraaie schijnbok - <i>Oedemera nobilis</i>	1 ♀ imago, gezien	Houtsberg		 
2022-07-01	Veldsikkelwants - <i>Nabis ferus</i> 	1 imago, gezien	Houtsberg		 
2022-07-01	Rode hooiwagen - <i>Cpilio canestrinii</i>	1 imago, gezien	Houtsberg		 
2022-06-29 14:27	Tengere pantserjuffer - <i>Lestes virens</i>	1 ♀ imago, gezien	Ven aan Banendijk		 
2022-06-25 10:33	Klein geaderd witje - <i>Pieris napi</i>	1 imago	Houtsberg		 
2022-06-25 10:32	Tuinradijs - <i>Raphanus sativus</i>	1	Houtsberg		 
2022-06-25 10:35	Gewone dophci - <i>Erica tetralix</i>	1	Houtsberg		 
2022-06-25 10:36	Veelbloemige veldbies - <i>Luzula multiflora</i>	1	Houtsberg		 
2022-06-25 10:38	Sporkehout - <i>Frangula alnus</i>	1	Ven aan Banendijk		 
2022-06-25 10:41	Bitterzoet - <i>Solanum dulcamara</i>	1	Houtsberg		 
2022-06-24 06:20	Grote Lijster - <i>Turdus viscivorus</i>	1 adult	Houtsberg		
2022-06-21 12:33	Tuinfluit - <i>Sylvia borin</i>	1 baltsend / zingend	Ven aan Banendijk		
2022-06-21 12:33	Boompieper - <i>Anthus trivialis</i>	1 baltsend / zingend	Houtsberg		
2022-06-21 13:09	Tengere pantserjuffer - <i>Lestes virens</i>	1 imago	Houtsberg		 
2022-06-21 12:36	Gaffelwaterjuffer - <i>Coenagrion scitulum</i>	1 imago	Ven aan Banendijk		 
2022-06-14 10:20	Bergveldwesp - <i>Polistes biglumis</i>	1 imago	Houtsberg		 
2022-06-14 10:29	<i>Oedemera lurida/virescens</i>	1 imago	Houtsberg		 
2022-06-13 13:18	Gewone raket - <i>Sisymbrium officinale</i>	1	Houtsberg		 

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2022-06-12 18:47	▲ Snorzwefvlieg - <i>Episyrphus balteatus</i>	1 imago	Houtsberg		✓ 📷
2022-06-07 10:59	▲ Atalanta - <i>Vanessa atalanta</i>	1 imago	Houtsberg		📷
2022-05-29 11:19	▲ Borstelroofvlieg - <i>Dysmachus trigonus</i>	1 imago, gezien	Ven aan Banendijk		📷
2022-05-29 11:13	▲ Weidescorpionenvlieg - <i>Panorpa vulgaris</i>	1 imago	Houtsberg		📷
2022-05-29 11:24	▲ Gesnaveld klauwtjesmos - <i>Hypnum cupressiforme</i>	1	Ven aan Banendijk		✓ 📷
2022-05-26 13:19	▲ Grote rupsendoder - <i>Ammophila sabulosa</i>	1 imago	Houtsberg		📷
2022-05-26 11:21	■ Aardrupsendoder onbekend - <i>Podalonia spec.</i> ?	1	Houtsberg		📷
2022-05-26 11:47	■ Gewone doolhofspin - <i>Agelena labyrinthica</i>	1	Houtsberg		📷
2022-05-23 14:03	▲ Zwartkop - <i>Sylvia atricapilla</i>	1 baltsend / zingend	Ven aan Banendijk		📷
2022-05-23 14:03	▲ Tuinfluit - <i>Sylvia borin</i>	1 baltsend / zingend	Houtsberg		📷
2022-05-23 14:00	▲ Distelvinder - <i>Vanessa cardui</i>	1 imago	Houtsberg		📷
2022-05-08 14:43	▲ Kleine vuurvinder - <i>Lycaena phlaeas</i>	1 imago, gezien	Houtsberg		📷
2022-05-07 12:05	■ Wielewaal - <i>Oriolus oriolus</i>	1 baltsend / zingend	Houtsberg		■
2022-05-06 10:37	■ Nachtegaal - <i>Luscinia megarhynchos</i>	1	Houtsberg		■
2022-05-05 13:34	▲ Vierlek - <i>Libellula quadrimaculata</i>	1 imago	Houtsberg		📷
2022-04-20 14:18	▲ Dagpauwoog - <i>Aglais io</i>	2 imago, gezien	Houtsberg		📷
2022-04-20 15:19	▲ Leliehaantje - <i>Lilicercis lilii</i>	2 imago, gezien	Houtsberg		✓ 📷 🗨️ 🔄
2022-04-20 14:35	▲ Lelietje-van-dalen - <i>Convallaria majalis</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Houtsberg		✓ 📷
2022-04-20 14:53	▲ Pilzegge - <i>Carex pilulifera</i>	5 bloeiend, veldwaarneming	Houtsberg		📷
2022-04-20 15:15	▲ Brede wespenorchis - <i>Epipactis helleborine</i>	1 bladontplooiing, veldwaarneming	Houtsberg		✓ 📷 🗨️
2022-04-20 14:26	▲ Schijnaardbei - <i>Potentilla indica</i>	1 veldwaarneming	Houtsberg		📷
2022-04-18 13:36	■ Roodborsttapuit - <i>Saxicola rubicola</i>	1	Houtsberg		📷
2022-04-18 13:37	▲ Zuringrandwants - <i>Coreus marginatus</i>	1 imago	Houtsberg		📷
2022-03-30 15:14	▲ Bloemvlieg onbekend - <i>Anthomyiidae indet.</i> ?	7 gezien	Houtsberg		■ 📷
2022-03-30 14:46	● Bonte dennenschildwants - <i>Holcogaster fibulata</i>	23 imago, gezien	Houtsberg		✓ 📷 🗨️

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2022-03-30 14:32	■ Bosklomopereprijs - <i>Veronica hederifolia subsp. lucorum</i>	1 veldwaarneming	Houtsberg		✓  
2022-03-30 14:37	▲ Zilveren boomkussen - <i>Reticularia lycoperdon</i>	1 veldwaarneming	Houtsberg		✓  
2022-03-29 12:05	■ Grijze zandbij - <i>Andrena vaga</i>	10 imago	Houtsberg		■
2022-03-13	▲ Fazant - <i>Phasianus colchicus</i>	1	Houtsberg		 
2022-02-27 12:19	■ Boomleeuwerik - <i>Lullula arborca</i>	1 ♂ baltsend / zingend	Houtsberg		■
2022-02-23 15:25	▲ Platte wielwebspin - <i>Nuctenea umbratica</i>	1 gezien	Houtsberg		■  
2022-02-23 15:21	▲ Tijgerslak - <i>Limax maximus</i>	1 gezien	Houtsberg		✓ 
2022-02-04 11:39	▲ Roodporiehoutzwam - <i>Daedaleopsis confragosa</i>	1	Houtsberg		✓ 
2022-01-09 11:33	▲ Nijlgans - <i>Alopochen aegyptiaca</i>	1	Houtsberg		 
2022-01-09 11:37	▲ Vink - <i>Fringilla coelebs</i>	1	Houtsberg		 
2022-01-09 11:36	▲ Groenling - <i>Chloris chloris</i>	1	Houtsberg		✓  
2022-01-09 12:00	▲ Berkenzwam - <i>Piptoporus betulinus</i>	1	Houtsberg		✓ 
2022-01-03 11:33	▲ Torenvalk - <i>Falco tinnunculus</i>	1	Houtsberg		
2021-12-27 09:58	■ Zwarte Specht - <i>Dryocopus martius</i>	1 roepend	Houtsberg		
2021-12-26 15:00	▲ Rankende helmbloem - <i>Ceratocarpus claviculata</i>	1	Houtsberg		 
2021-12-22 11:17	▲ Buizerd - <i>Buteo buteo</i>	1	Houtsberg		✓ 
2021-12-22 15:47	▲ Grote Bonte Specht - <i>Dendrocopos major</i>	1	Houtsberg		
2021-12-10 09:34	■ Zwarte Specht - <i>Dryocopus martius</i>	2	Houtsberg		
2021-11-21 15:25	▲ Geschubde inktzwam - <i>Coprinus comatus</i>	1	Houtsberg		✓ 
2021-11-21 13:11	▲ Gewone hertenzwam - <i>Pluteus cervinus</i>	1	Houtsberg		✓ 
2021-11-14 11:55	■ Zwarte Specht - <i>Dryocopus martius</i>	2 gezien	Houtsberg		
2021-10-13 10:51	▲ Gewone zwavelkop - <i>Hypholoma fasciculare</i> ?	1	Houtsberg		■ 
2021-10-13 10:37	▲ Gewone zwavelkop - <i>Hypholoma fasciculare</i>	1	Houtsberg		■ 
2021-10-13 10:06	▲ Berkenzwam - <i>Piptoporus betulinus</i>	1	Houtsberg		✓ 
2021-10-08 11:58	▲ Groene Kikker onbetend - <i>Pelophylax spec.</i>	7 adult	Ven aan Banendijk		✓  
Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2021-10-08 17:03	■ Oranje kruidenmot - <i>Udea ferrugalis</i>	1 imago	Houtsberg		✓  
2021-09-17 12:30	▲ Bruinrode heidelibel - <i>Sympetrum striolatum</i>	1 imago, gezien	Ven aan Banendijk		 
2021-09-05 13:49	■ Groene Specht - <i>Picus viridis</i>	1 gehoord	Houtsberg		

2

Bijlage

Effecten indicator soorten



Beschermde natuur in Nederland: soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Effectenindicator soorten

Maatregelenindicator soorten

Routeplanner beschermde natuur

Effectenindicator Natura2000-gebieden

Effectenindicator soorten

1 Locatie


2 Activiteiten

3 Indicatie

Zoek en selecteer een locatie op postcode, of zoom in op de kaart en teken de grenzen van het plangebied: zet punten en sluit af met een dubbel-klik.

Postcode

6034 ST



1 Locatie

2 Activiteiten

3 Indicatie

Geef aan voor welke [OLO-activiteit\(en\)](#) u een indicatie van effecten wilt ontvangen.

Top-10 activiteiten

[Alle activiteiten](#)

- ☒ Slopen en/of asbest verwijderen
- ☐ Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
- ☐ Bijbehorend bouwwerk bouwen
- ☐ Kappen
- ☐ Overig bouwwerk bouwen
- ☐ Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
- ☐ Dakkapel plaatsen
- ☐ Woning bouwen
- ☐ Nieuw kozijn plaatsen of bestaand kozijn of gevelpaneel veranderen
- ☐ Uitrit aanleggen of veranderen

Toon effecten

Locatie: 5,7935/51,2585 Oppervlakte: 325,93 ha

Disclaimer

- > De dekingsgraad van waarnemingen uit de NDFF per locatie wisselt sterk. Als er geen waarnemingen uit de NDFF zijn, kunnen er dus wél beschermde soorten voorkomen. Een gebruiker is zelf verantwoordelijk om (eventueel met hulp van de gemeente) te achterhalen of er daadwerkelijk beschermde soorten in het plangebied voorkomen.
- > Beschermde soorten die naar verwachting geen schadelijke effecten ondervinden, worden niet in de uitvoer getoond.
- > De informatie uit de effectenindicator soorten is generiek. Om vast te stellen of een activiteit in de praktijk daadwerkelijk schadelijk is, is meer specifieke informatie nodig over de betreffende activiteit, de werklocatie en over het voorkomen van beschermde soorten in en rond het plangebied.

Activiteiten

☐ [Slopen en/of asbest verwijderen](#)

Top 30 Wettelijk beschermde soorten

In het door u opgegeven plangebied komen de volgende soorten voor die het meest in het geding zijn bij ruimtelijke ingrepen en mogelijk schadelijke effecten ondervinden van de door u geselecteerde activiteit(en).

Vleermuizen

☐ Gewone dwergvleermuis

Mogelijke negatieve effecten

Hieronder ziet u de storende factoren die op kunnen treden bij de geselecteerde activiteit en de hierboven genoemde soort. Per storende factor kunt u een korte toelichting lezen. Er is ook een pdf met geraadpleegde literatuur over de effecten per soortgroep.

Storende factoren per verbodsbepaling	Gevoeligheid
Het is verboden (opzettelijk) nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of vernielen.	
☐ verlies vaste voortplantings- rust- of verblijfplaatsen	gevoelig
☐ verlies functioneel leefgebied	gevoelig
Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren.	
☐ verstoring door geluid	gevoelig
☐ verstoring door trilling	gevoelig
Het is verboden opzettelijk beschermde soorten te doden en vangen.	
☐ directe sterfte	gevoelig

Mogelijke maatregelen bij negatieve effecten

Wanneer blijkt dat er schadelijke effecten te verwachten zijn op beschermde plant- en diersoorten, dan kan een activiteit soms zo aangepast worden dat schadelijke effecten kunnen worden voorkomen. Ook kunnen maatregelen deze effecten verminderen of herstellen. Zie de maatregelen hieronder. Meer informatie over mitigerende maatregelen voor deze soort is ook te vinden in de Soortenstandaard. Overleg met uw gemeente welke maatregelen het beste passen bij de door u geplande activiteit.

Disclaimer

De effectenindicator geeft generieke informatie over mogelijke maatregelen om de effecten te verminderen. Voor het vaststellen van de werkelijk te nemen maatregelen heeft u meer locatie-specifieke informatie nodig

- ☐ Inschakelen van een soortdeskundige
- ☐ Opstellen en gebruik van een ecologisch werkprotocol
- ☐ Werkzaamheden faseren in ruimte en tijd
- ☐ Kwaliteitsverbetering bestaand leefgebied
- ☐ Voorkomen van verstoring van verblijfplaatsen en van het doden van individuen
- ☐ Ongeschikt maken van verblijfplaatsen
- ☐ Werkzaamheden buiten de kwetsbare periode
- ☐ Alternatieve verblijfplaatsen inrichten

☐ Gewone grootoorvleermuis

Mogelijke negatieve effecten

Hieronder ziet u de storende factoren die op kunnen treden bij de geselecteerde activiteit en de hierboven genoemde soort. Per storende factor kunt u een korte toelichting lezen. Er is ook een pdf met geraadpleegde literatuur over de effecten per soortgroep.

Storende factoren per verbodsbepaling	Gevoeligheid
Het is verboden (opzettelijk) nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of vernielen.	
☐ verlies vaste voortplantings- rust- of verblijfplaatsen	 gevoelig
☐ verlies functioneel leefgebied	 gevoelig
Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren.	
☐ verstoring door geluid	 gevoelig
☐ verstoring door trilling	 gevoelig
Het is verboden opzettelijk beschermde soorten te doden en vangen.	
☐ directe sterfte	 gevoelig

Mogelijke maatregelen bij negatieve effecten

Wanneer blijkt dat er schadelijke effecten te verwachten zijn op beschermde plant- en diersoorten, dan kan een activiteit soms zo aangepast worden dat schadelijke effecten kunnen worden voorkomen. Ook kunnen maatregelen deze effecten verminderen of herstellen. Zie de maatregelen hieronder. Meer informatie over mitigerende maatregelen voor deze soort is ook te vinden in de [Soortenstandaard](#). Overleg met uw gemeente welke maatregelen het beste passen bij de door u geplande activiteit.

Disclaimer

De effectenindicator geeft generieke informatie over mogelijke maatregelen om de effecten te verminderen. Voor het vaststellen van de werkelijk te nemen maatregelen heeft u meer locatie-specifieke informatie nodig

- ☐ Inschakelen van een soortdeskundige
- ☐ Werkzaamheden faseren in ruimte en tijd
- ☐ Kwaliteitsverbetering bestaand leefgebied
- ☐ Voorkomen van verstoring van verblijfplaatsen en van het doden van individuen
- ☐ Ongeschikt maken van verblijfplaatsen
- ☐ Werkzaamheden buiten de kwetsbare periode
- ☐ Alternatieve verblijfplaatsen inrichten
- ☐ Opstellen en gebruik van een ecologisch werkprotocol

Overige Wettelijk beschermde soorten

In het door u opgegeven plangebied komen bovendien de volgende aantallen Wettelijk beschermde soorten per soortengroep voor volgens de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) die mogelijk schadelijke effecten ondervinden van de door u geselecteerde activiteit(en).

Soortgroepen
☐ Vogels (36)
Mogelijke negatieve effecten Hieronder ziet u de storende factoren die op kunnen treden bij de geselecteerde activiteit en de hierboven genoemde soort. Per storende factor kunt u een korte toelichting lezen. Er is ook een pdf met geraadpleegde literatuur over de effecten per soortgroep.

Storende factoren per verbodsbepaling	Gevoeligheid
Het is verboden (opzettelijk) nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of vernielen.	
☐ verlies vaste voortplantings- rust- of verblijfplaatsen	☐ gevoelig
☐ verlies functioneel leefgebied	☐ gevoelig
Het is verboden opzettelijk beschermde soorten te doden en vangen.	
☐ directe sterfte	☐ gevoelig
Het is verboden vogels opzettelijk te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de soort.	
☐ verstoring door geluid	☐ gevoelig
☐ verstoring door trilling	☐ gevoelig

☐ Zoogdieren (15)

Mogelijke negatieve effecten

Hieronder ziet u de storende factoren die op kunnen treden bij de geselecteerde activiteit en de hierboven genoemde soort. Per storende factor kunt u een korte toelichting lezen. Er is ook een pdf met  geraadpleegde literatuur over de effecten per soortgroep.

Storende factoren per verbodsbepaling	Gevoeligheid
Het is verboden (opzettelijk) nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of vernielen.	
☐ verlies vaste voortplantings- rust- of verblijfplaatsen	☐ gevoelig
☐ verlies functioneel leefgebied	☐ gevoelig
Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren.	
☐ verstoring door geluid	... onbekend
☐ verstoring door trilling	☐ gevoelig
Het is verboden opzettelijk beschermde soorten te doden en vangen.	
☐ directe sterfte	☐ gevoelig
Het is verboden (opzettelijk) nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of vernielen.	
☐ verlies vaste voortplantings- rust- of verblijfplaatsen	☐ gevoelig
☐ verlies functioneel leefgebied	☐ gevoelig
Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren.	
☐ verstoring door geluid	... onbekend
☐ verstoring door trilling	☐ gevoelig
Het is verboden opzettelijk beschermde soorten te doden en vangen.	
☐ directe sterfte	☐ gevoelig

☐ Planten (1)

Mogelijke negatieve effecten

Hieronder ziet u de storende factoren die op kunnen treden bij de geselecteerde activiteit en de hierboven genoemde soort. Per storende factor kunt u een korte toelichting lezen. Er is ook een pdf met  geraadpleegde literatuur over de effecten per soortgroep.

Storende factoren per verbodsbepaling	Gevoeligheid
Het is verboden plantensoorten opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.	
☐ directe sterfte	☐ gevoelig




3

Bijlage

Plan projectlocatie

Houtsberg 5a



Bouwwerken geen gebouwen zijnde: $4\text{ m} \times 13\text{ m} = 52\text{ m}^2$ (1 spant van de stal) + 6 m^2 tuinhuisje = 58 m^2
 De maximale inhoudsmaat woning en bijgebouwen is: $483,72\text{ m}^3 + 196\text{ m}^3 + 342\text{ m}^3 + 345,8\text{ m}^3 = 1.367,52\text{ m}^3$

4

Bijlage

Natuurgegevens
broedvogelindicatie

provincie

Limburg

