



Besluit
van Gedeputeerde Staten van Limburg

Vergunning

Artikel 19d Natuurbeschermingswet 1998

Ponyhof Femke, Thuserhof 22 te Asenray

Zaaknummer: 2014-0317

Kenmerk: 2014/39016 d.d. 17 juli 2014

Verzonden: **21 JULI 2014**

1. Aanvraag

Bij brief van 7 april 2014, ontvangen op 8 april 2014, heeft Arvalis Adviseurs, namens Ponyhof Femke, Thuserhof 22 te Asenray een vergunning ex artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) aangevraagd voor het wijzigen en exploiteren van een paardenhouderij, aan de Thuserhof 22 te Asenray. De inrichting is gelegen nabij de Nederlandse Natura 2000-gebieden 'Roerdal', 'Swalmdal', 'Meinweg' en 'Leudal' en de Duitse Natura 2000-gebieden 'Vogelschutzgebiet 'Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg'', 'Lüsekamp und Boschbeek', 'Elmpter Schwalmbruch', 'Wälder und Heiden bei Brüggens-Bracht', 'Meinweg mit Ritzroder Dünen', 'Tantelbruch mit Elmpter Bachtal und Teilen der Schwalmaue', 'Helpensteiner Bachtal-Rothenbach' en 'Schaagbachtal'. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2014-0317.

2. Procedure en zienswijze

2.1. Procedure

De aanvraag wordt afgehandeld met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De aanvraag om vergunning en een ontwerp van dit besluit hebben van 7 mei 2014 tot en met 17 juni 2014 voor een ieder ter inzage gelegen in het gouvernement te Maastricht (bibliotheek) en het gemeentehuis van de gemeente Roermond. Gedurende deze termijn kon een ieder bij het bestuursorgaan schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen inbrengen. Het ontwerpbesluit en de kennisgeving konden in genoemde periode tevens worden geraadpleegd via de internetsite van de Provincie Limburg (www.limburg.nl).

Binnen de termijn waarin de aanvraag en het ontwerpbesluit ter inzage hebben gelegen zijn geen zienswijzen ingediend.

2.2. Zienswijzen ten aanzien van de aanvraag

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 44, tweede en derde lid, van de Nbw 1998 hebben wij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond in de gelegenheid gesteld hun zienswijze naar voren te brengen over de aanvraag.

De gemeente Roermond heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om een zienswijze naar voren te brengen met betrekking tot deze aanvraag.

3. Beoordelingskader en de beschermde gebieden

3.1. Natuurbeschermingswet 1998 en artikel 6, derde lid, Habitatrichtlijn

Artikel 19d van de Nbw 1998 heeft betrekking op de vergunningplicht in verband met Natura 2000-gebieden (Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijngebieden). Op grond van artikel 19d, eerste lid, van de Nbw 1998 is een vergunning van Gedeputeerde Staten vereist voor de uitvoering van projecten of andere handelingen die de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Het gaat dan in ieder geval om projecten en handelingen die de natuurlijke kenmerken van het gebied kunnen aantasten.

Bij het beslissen op een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Nbw 1998 moet rekening worden gehouden met de gevolgen die een project of andere handeling kan hebben gelet op de instandhoudingsdoelstellingen van het betrokken Natura 2000-gebied (artikel 19e Nbw 1998). Tevens kan rekening worden gehouden met vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede met regionale en lokale bijzonderheden.

Op grond van artikel 19kd, eerste lid, van de Nbw 1998, zoals in werking getreden op 25 april 2013, worden onder significante gevolgen als bedoeld in de artikelen 19d, eerste lid, en 19j, tweede lid, van de Nbw 1998 niet verstaan de gevolgen van een handeling, onderscheidenlijk de in een plan voorziene activiteiten, door het veroorzaken van stikstofdepositie op voor stikstofgevoelige habitats in een Natura 2000-gebied in de volgende gevallen:

- a. de handeling is gebruik dat op de referentiedatum werd verricht, onderscheidenlijk het plan was van toepassing op de referentiedatum en is sedertdien niet of niet in betekenende mate gewijzigd, en heeft sedertdien per saldo geen toename van stikstofdepositie op de voor stikstof gevoelige habitats in een Natura 2000-gebied veroorzaakt;
- b. de handeling is een activiteit die na de referentiedatum is begonnen, of een gebruik dat na de referentiedatum in betekenende mate is gewijzigd, onderscheidenlijk het plan is van toepassing geworden na de referentiedatum, of is nadien in betekenende mate gewijzigd, waarbij is verzekerd dat, in samenhang met voor die activiteit getroffen maatregelen, de stikstofdepositie op de voor stikstof gevoelige habitats in een Natura 2000-gebied als gevolg van die activiteit of dat gebruik of dat plan, per saldo niet is toegenomen of zal toenemen.

De referentiedatum voor de Limburgse Habitatrichtlijngebieden is krachtens artikel 19kd, derde lid, van de Nbw 1998 7 december 2004. Met inachtneming van de huidige jurisprudentie, betekent dit concreet dat voor zover een aanvraag om vergunning als bedoeld in de artikelen 19d, eerste lid, van de Nbw 1998 strekt tot het veroorzaken van stikstofdepositie op één of meer stikstofgevoelige Limburgse Habitatrichtlijngebieden, de vergunning in zoverre met toepassing van artikel 19kd, eerste lid, onder a, van de Nbw 1998 in principe kan worden verleend indien de aanvraag per saldo niet voorziet in een toename van stikstofdepositie op de voor stikstof gevoelige habitats ten opzichte van de situatie waarvoor op 7 december 2004 toestemming bestond op grond van de Wet milieubeheer of de Hinderwet. Dit laatste lijkt blijkens uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 en 27 november 2013 (zaaknummers 201211640/1/R2 en 201303938/1/R2) uitzondering in gevallen waarin voor de exploitatie van de inrichting niet eerder een vergunning op grond van de Nbw 1998 of de

Natuurbeschermingswet (oud) is verleend en na 7 december 2004 in het kader van de Wet milieubeheer of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht minder ammoniak/NOx-emissie is toegestaan. In voorkomend geval kan met toepassing van artikel 19kd, eerste lid, onder a, van de Nbw 1998 uitsluitend een vergunning krachtens artikel 19d van de Nbw 1998 worden verleend, indien de aanvraag per saldo niet leidt tot een toename van stikstofdepositie op de voor stikstof gevoelige habitats in een Natura 2000-gebied ten opzichte van de na 7 december 2004 laagst toegestane ammoniak/NOx-emissie op grond van de Wet milieubeheer of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Is sprake van een geval als bedoeld in 19kd, eerste lid, onder b, van de Nbw 1998, dan dient er mede gezien de jurisprudentie vanuit te worden gegaan dat de betreffende vergunningaanvraag in zoverre kan worden gehonoreerd indien deze per saldo niet leidt tot een toename van stikstofdepositie op één of meer stikstofgevoelige Limburgse Habitatrichtlijngebieden ten opzichte van de situatie waarvoor toestemming bestaat op grond van de Wet milieubeheer of de Hinderwet.

Voor de Limburgse Vogelrichtlijngebieden geldt als referentiedatum, afhankelijk van de datum waarop het desbetreffende gebied ter uitvoering van de Vogelrichtlijn is aangewezen, 24 maart 2000 of 10 juni 1994. Daarbij is voor wat betreft het hanteren van de referentiedatum 10 juni 1994 aansluiting gezocht bij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 7 september 2011 (zaaknummer 201003301/1/R2). In deze uitspraak is onder meer geoordeeld dat in voorkomend geval dat een Vogelrichtlijngebied is aangewezen vóór 10 juni 1994 (de datum waarop de omzettingstermijn van de Habitatrichtlijn is afgelopen), voor het betreffende Vogelrichtlijngebied 10 juni 1994 als referentiedatum moet worden aangehouden. Met inachtneming van de juiste referentiedatum (24 maart 2000 of 10 juni 1994), is hetgeen hiervoor in relatie tot de Limburgse Habitatrichtlijngebieden werd gesteld ten aanzien van artikel 19kd van de Nbw 1998, van overeenkomstige toepassing op de Limburgse Vogelrichtlijngebieden.

Overigens kan bij de beoordeling van vergunningaanvragen als bedoeld in de artikelen 19d, eerste lid, van de Nbw 1998 die (mede) voorzien in het veroorzaken van stikstofdepositie op één of meer Limburgse Vogelrichtlijngebieden en waarbij is vastgesteld dat geen toepassing kan worden gegeven aan artikel 19kd van de Nbw 1998, de door ons college bij besluit van 27 november 2012 vastgestelde Beleidslijn "Toetsing stikstofdepositie bij Limburgse Vogelrichtlijngebieden" (verder: de beleidslijn) in aanmerking worden genomen, zoals deze heeft te gelden na de inwerkingtreding van het gewijzigde artikel 19kd van de Nbw 1998 per 25 april 2013. Wordt deze beleidslijn in aanmerking genomen dan dient, anders dan bij toepassing van artikel 19kd van de Nbw 1998, in principe aan de hand van een passende beoordeling te worden aangetoond dat voor zover de vergunningaanvraag strekt tot een (tijdelijke) toename van stikstofdepositie op één of meer Limburgse Vogelrichtlijngebieden bedoelde toename in de vorm van een saldering of anderszins wordt gemitigeerd. Volgens de beleidslijn geldt daarbij in de regel als toetsmoment 7 december 2004, hetgeen tevens veronderstelt dat in voorkomend geval dat wordt gesaldeerd, dit dient plaats te vinden met ammoniak/NOx-rechten die op deze datum bij de saldogevende locatie(s) aanwezig waren op grond van de Hinderwet of de Wet milieubeheer.

Wordt een vergunningaanvraag (mede) beoordeeld op grond van de artikelen 19e t/m 19h van de Nbw 1998, dan dient er verder op grond van huidige jurisprudentie vanuit te worden gegaan dat bij wijziging of uitbreiding van een bestaande inrichting – waarvoor nog niet eerder een vergunning krachtens de Nbw

1998 is verleend – de aanvraag betrekking dient te hebben op de exploitatie van de gehele inrichting na uitbreiding of wijziging.

Overigens vallen buitenlandse Natura 2000-gebieden niet onder de reikwijdte van artikel 19d Nbw 1998. In voorkomend geval dat een project op Nederlands grondgebied negatieve effecten kan hebben op één of meer buitenlandse Natura 2000-gebieden, dient evenwel te worden beoordeeld of vergunningverlening in overeenstemming is met artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn (zie onder meer de uitspraak van de Afdeling van 24 augustus 2011 inzake de Kolencentrale Eemshaven, zaaknummer 200902744/1/R2). Artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn bepaalt dat voor elk plan of project dat significante effecten kan hebben voor een Natura 2000-gebied een passende beoordeling moet worden gemaakt en slechts toestemming voor het plan of project wordt gegeven wanneer de zekerheid is verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet zal aantasten. Is bij een project op Nederlands grondgebied mogelijk sprake van significante negatieve effecten op een buitenslands Natura 2000-gebied, maar is geen passende beoordeling gemaakt en/of bestaat op grond daarvan niet de vereiste zekerheid, dan volgt uit artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn dat daarvoor geen toestemming kan worden gegeven en de daartoe aangevraagde vergunning krachtens de Nbw 1998 of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) dient te worden geweigerd.

Het beoordelingskader op grond van primair artikel 6 van de Habitatrichtlijn is in de praktijk met name van belang voor aanvragen voor projecten op Nederlands grondgebied die (mede) voorzien in stikstofdepositie op buitenlandse Natura 2000-gebieden. Resulteert een zodanige aanvraag niet in een toename van stikstofdepositie op één of meer buitenlandse Natura 2000-gebieden ten opzichte van de laagst toegestane ammoniak/NOx-emissie op grond van de Wet milieubeheer of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op of na de daarvoor geldende referentiedatum/referentiedata, dan dient er mede gezien de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vanuit te worden gegaan dat significante effecten in zoverre zijn uitgesloten. Alsdan verplicht artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn niet tot het maken van een passende beoordeling en verzet deze bepaling zich niet tegen vergunningverlening voor het betreffende project.

In voorkomend geval dat een vergunningaanvraag voor een project (wel) voorziet in een toename van stikstofdepositie op één of meer buitenlandse Natura 2000-gebieden ten opzichte van de op of na de daarvoor geldende referentiedatum/referentiedata laagst toegestane ammoniak/NOx-emissie op grond van de Wet milieubeheer of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, dan dient er - mede vanwege het vooralsnog overschrijden van de Kritische Depositie Waarden (KDW) - vanuit te worden gegaan dat de aanvraag significante effecten op deze gebieden kan hebben. Dat laatste impliceert dat op grond van artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn een passende beoordeling moet worden gemaakt. In een zodanige situatie kan de aangevraagde vergunning uitsluitend worden verleend indien door middel van een rechtsgeldige saldering, andere mitigerende (beheer)maatregelen of een adequate ecologische onderbouwing uit deze passende beoordeling blijkt dat significante effecten op de buitenlandse Natura 2000-gebieden zijn uitgesloten casu quo de zekerheid is verkregen dat de natuurlijke kenmerken van de buitenlandse Natura 2000-gebieden niet zullen worden aangetast.

3.2. De kenmerken van de beschermde gebieden

3.2.1. Meinweg

Bij besluit van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 20 mei 1994, kenmerk NBLF 944095 is het natuurgebied 'Meinweg' aangewezen als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste lid, van de Vogelrichtlijn, richtlijn 79/409/EEG van de raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (Pb L 103). Bij brief van 19 mei 2003 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het natuurgebied 'Meinweg' aangemeld bij de Europese Commissie als Speciale beschermingszone in het kader van de Habitatrichtlijn, richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (Pb L 206).

Kenschets

De Meinweg is een grensoverschrijdend, afwisselend gebied bestaande uit dennen- en loofbossen (o.a. Elzenbroekbos langs stromende wateren en hakhout), gagel- en wilgenstruwelen, droge heide (o.a. Herkenbosserbaan, De Lange Luier, hellingen Kombergen), vochtige heide (o.a. Zandbergslenk), schraallanden (o.a. dotterbloem- en kleine zeggengrasland in de Crayhoweide) en vennen (o.a. Elfenmeer, Rolvennen, Vossenkop). Loodrecht op de gradiënt met grote hoogteverschillen (hoog-, midden- en laagterras) liggen de beekdalen van de snelstromende terrasbeken Roode Beek en de kwelstroompjes. De beken hebben nog een vrij natuurlijk, kronkelend verloop met stroomversnellingen en grindbanken en bronbossen.

Landschap

Het reliëfrijke landschap van het Meinweggebied is gevormd in het Pleistoceen, al moeten we voor een goed begrip ervan veel verder in de tijd teruggaan, tot in het Carboon. Toen werd in Midden - Limburg de Centrale Slenk gevormd, die in het noorden (ter hoogte van Roermond) wordt begrensd door de Peelrandbreuk. De Peelrandbreuk is in het Meinweggebied herkenbaar als een twee meter hoog oprijzende rand. Deze breuk vormde later als het ware een epicentrum voor nieuwe tektonische bewegingen, waarbij secundaire breuken optraden. In het Meinweggebied zijn op deze manier de eveneens noordoost- zuidwest lopende Meinwegbreuk en Zandbergbreuk ontstaan. In het Pleistoceen werden in de omgeving van het huidige Meinweggebied door de toenmalige Maas en Rijn grote hoeveelheden zand en grind afgezet, die hebben geleid tot het ontstaan van het hoogterras. Het hoogste punt hiervan bevindt zich op 82 m boven NAP. Door latere insnijdingen van de Maas is het middenterras ontstaan, op een gemiddelde hoogte van ongeveer 50 m boven NAP.

Van nog recenter datum is het laagterras (van Maas en Roer), op ongeveer 10-30 m boven NAP. Het Meinweggebied wordt door een - met brede bosstroken geflankeerde - verharde weg (de Meinweg) verdeeld in een noordelijk en een zuidelijk deel. Het noordelijke deel van het natuurreservaat bestaat uit een omvangrijk heidegebied waarin diverse vennen zijn gelegen, waaronder de Rolvennen, de Vossenkop en het Elfenmeertje. Het zuidelijke deel is voor het grootste gedeelte begroeid met naaldopslag en eikenhakhout, al bevinden zich aan weerszijde van de grotendeels onverharde Lange Luier, parallel aan de Meinweg, vrij grote heidevelden. De bossen in het zuiden worden doorsneden door de goederenspoorweg de IJzeren Rijn, die een verbinding legt tussen het Antwerpse havengebied en het Duitse Ruhrgebied. Deze spoorlijn was min of meer in de vergetelheid geraakt maar houdt de laatste jaren de gemoederen weer bezig, omdat plannen bestaan de lijn te

reactiveren. Hierbij wordt een beroep gedaan op afspraken die in een ver verleden op papier zijn gezet. Aan de noordzijde van het Meinweggebied vormt de Boschbeek de grens met Duitsland, aan de zuidzijde markeert de fraaie natuurlijke bedding van de Roode Beek de landsgrens met onze oosterburen.

Habitatrichtlijn

Bij de aanmelding als habitatrichtlijngebied is als volgt overwogen. Het gebied is van belang voor habitattypen:

- H3160: Dystrofe natuurlijke poelen en meren;
- H4010: Noord-Alatische vochtige heide met *Erica tetralix*;
- H4030: Droge Europese heide;
- H7110: Actief hoogveen;
- H7150: Slenken in veegronen met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion;
- H9190: Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met *Quercus robur*;
- H91D0: Veenbossen;
- H91E0: Bossen op alluviale grond met *Alnus glutinosa* en *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*).

Het gebied is van belang voor de soorten:

- H1096: Beekprik;
- H1166: Kamsalamander;
- H1831: Drijvende waterweegbree.

Vogelrichtlijn

In het besluit tot aanwijzing van de Meinweg als Speciale beschermingszone als bedoeld in de Vogelrichtlijn is aangegeven dat het beheer gericht is op behoud van omvang en kwaliteit van leefgebied van de volgende soorten:

- A224: Nachtzwaluw;
- A246: Boomleeuwerik;
- A276: Roodborsttapuit.

3.2.2. Roerdal

Het Roerdal is aangemeld bij de Europese Commissie als Speciale beschermingszone in het kader van de Habitatrichtlijn, richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (Pb L 206).

Het Roerdal ligt in een slenk (de Centrale slenk of Roerdalslenk) die ontstaan is door opheffing van de omliggende gebieden (de horsten) langs aardbreuken. Het Nederlandse deel van Roer ligt daardoor in een vrij vlak gebied en heeft grote meanders. Langs de oevers bevinden zich plaatselijk grindbanken en er zijn steile oeverwallen aanwezig. Het gebied bestaat uit de Roer, waarin de gemeenschap van vlottende waterranonkel aanwezig is, met de omliggende gronden, bestaande uit landbouwgronden en natuurterreinen met bossen, inunderende graslanden, afgesloten meanders, plassen en poelen en floristisch waardevolle wegbermen. Een groot deel van de oevers bestaat uit voedselrijke ruigten. Landgoed Hoosden herbergt een complex van tenminste drie oude meanders, waarin zeer nat, relatief ongestoord elzenbroekbos aanwezig is. Voormalige rivierinvloed heeft hier opvallende 5 tot 10 meter hoge steilranden gecreëerd. De meanders bij Paarlo behoren grotendeels tot het overstromingsgebied

van de Roer. In een zone waar veel kwel tot aan of nabij het oppervlak komt is sprake van een elzenbronbos met overgangen naar elzen-vogelkersbos en wilgenstruweel. De Kwekkert ligt in een oude meander net ten noorden van de Zwarte Berg. Er is een complex van natte graslanden, zeggemoeras en broekbos aanwezig. Het Herkenbosscher Broek en Het Broek zijn bossen die in een oude meander liggen met een enkele meters hoge steilrand aan de oostzijde. De Turfkoelen is gelegen in een kleine oude meander. Het is een oostelijke uitloper van het Herkenbosscherbroek die niet is ontgonnen, maar wel is verveend. Nieuwe verlanding heeft echter plaatsgevonden, waardoor er plaatselijk meer dan 2 meter veen aanwezig is. De noord- en zuid-oostzijde worden begrensd door een 3-5 meter hoge steilrand. De Boschbeek stroomt door het gebied. Er komt langs de westrand broekbos voor. Verder ligt ten noorden van de zandweg een wilgenbroek, omgeven door elzenbroek. Lang de oevers aan de zuid-oostzijde komen hier en daar verlandingsvegetaties voor. Dit grenst aan een gagelstruweel, met daarachter een berkenbos.

Het Roerdal zal worden aangewezen als speciale beschermingszone voor de volgende natuurlijke habitattypen opgenomen in bijlage I van de Habitatrichtlijn (prioritaire typen aangeduid met een sterretje):

H3260	Beken en rivieren met waterplanten
H6510	Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
H91D0*	Hoogveenbossen
H91E0*	Vochtige alluviale bossen

Daarnaast zal het Roerdal als speciale beschermingszone worden aangewezen voor de volgende soorten opgenomen in bijlage II van Habitatrichtlijn (prioritaire typen aangeduid met een sterretje):

H1016	Zeggekorfslak
H1037	Gaffellibel
H1061	Donker pimperlblaauwtje
H1095	Zeeprik
H1096	Beekprik
H1099	Rivierprik
H1134	Bittervoorn
H1163	Rivierdonderpad
H1166	Kamsalamander
H1337	Bever
H1059	Pimperlblaauwtje (complementair doel)

3.2.3. Swalmdal

Habitatrichtlijngebied

Bij brief van 19 mei 2003 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het natuurgebied "Swalmdal" aangemeld bij de Europese Commissie als Speciale beschermingszone in het kader van de Habitatrichtlijn, richtlijn 92/43/ EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (Pb L 206).

De Swalm is een meanderende beek in Midden-Limburg, diep ingesneden in het maasterrassenlandschap. De beek ligt op de overgang van het plateau tussen Maas en Rijn naar het maasdal. Op diverse plaatsen aan de voet van de terrassen treedt kwel op en ontspringen bronnetjes; hier zijn soortenrijke elzenbroekbossen ontstaan met daarin een van de grootste populaties van de zeggekorfslak.

Het gebied is in eerste instantie aangemeld voor de volgende soorten en habitats:

Habitattypen

H3260 Submontane en laaglandrivieren met vegetaties behorend tot het *Ranunculion fluitantis* en het *Callitrichio-Batrachion*

H91E0 *Bossen op alluviale grond met *Alnus glutinosa* en *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

Habitatrichtlijnsoorten

H1016 Zeggekorfslak

H1163 Rivierdonderpad

Op rijksniveau wordt overwogen om hier de volgende soorten en habitats aan toe te voegen. Alhoewel nog niet zeker is of deze soorten daadwerkelijk in de definitieve aanwijzingsbesluiten zullen voorkomen is hier in deze vergunning wel rekening mee gehouden om te voorkomen dat lopende de aanwijzing mogelijk significant negatieve effecten zouden kunnen optreden.

Habitattype

H6120 Kalkminnend grasland op dorre zandbodem

Soorten

H1037 Gaffelibel

H1337 Bever

3.2.4. Leudal

Habitatrichtlijngebied

Het Leudal omvat de dalen van een aantal beken die vanuit de Roerdalslenk naar het dal van de Maas stromen. Door het hoogteverschil zijn de beken diep ingesneden en is de stroomsnelheid van het water vrij groot. De kern van het beekdal wordt gevormd door twee meanderende beken, de Zelsterbeek of Roggelsebeek en de Leubeek of Tungalroysebeek. Met name de Zelsterbeek is voor een groot deel aan kanalisatie ontkomen, dit geldt ook voor het stroomafwaartse deel van de Leubeek.

De genormaliseerde trajecten van beide beken zijn in 2000 weer meanderend gemaakt.

De vegetatie rondom de beken is zeer gevarieerd. De afgesneden meanders van de beken herbergen soortenrijke moerasvegetaties. Ten oosten van het klooster liggen veldrusschraallanden. De natte tot vochtige bossen behoren tot het elzenbos, vogelkersessenbos en haagbeukenbos. Lokaal komen gagelstruwelen en berkenbroekbossen voor.

Hoger op de gradiënt, op de flanken van de beekdalen, bestaan de bossen uit eikenbeukenbossen, eiken-berkenbossen en naaldbossen. Plaatselijk komen matig voedselrijke tot voedselrijke graslanden voor en zijn enkele heideterreintjes aanwezig.

Om aan de eisen van de Habitatrichtlijn te voldoen is het gebied aanmerkt als speciale beschermingszone voor de volgende natuurlijke habitattypen en soorten opgenomen in respectievelijk bijlage I en II van Richtlijn 92/43/EEG. Prioritaire typen zijn aangeduid met een sterretje.

H3260 - Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het *Ranunculion fluitantis* en het *Callitrichio-Batrachion*

Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit beken en rivieren met waterplanten, *waterranonkels* (subtype A). Er zijn enkele soorten van het habitatype beken en rivieren met waterplanten, *waterranonkels* (subtype A) aanwezig, waaronder vlottende waterranonkel. Het habitatype is echter sterk achteruitgegaan en behoeft uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.

H9160 - Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eikenhaagbeukenbossen behorend tot het *Carpinion-betuli*

Behoud oppervlakte en kwaliteit eiken-haagbeukenbossen, *hogere zandgronden* (subtype A). Het habitatype eiken-haagbeukenbossen, *hogere zandgronden* (subtype A) komt in beperkte mate voor als smalle zones tussen het beekdal en het hoger gelegen plateau.

H91E0 - *Bossen op alluviale grond met *Alnus glutinosa* en *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit vochtige alluviale bossen, *beekbegeleidende bossen* (subtype C).

Een deel van het bos van het habitatype vochtige alluviale bossen, *beekbegeleidende bossen* (subtype C) is te rekenen tot de zeldzame subassociatie *cardaminetosum* van het elzenbroekbos. Er zijn potenties voor uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit voor dit subtype, dat landelijk in een matig ongunstige staat van instandhouding verkeert.

H1337 - Bever

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.

In 2002 is een kleine groep bevers in het gebied uitgezet. Er is voldoende leefgebied voor de soort aanwezig. Het gebied kan een grotere bijdrage gaan leveren als onderdeel van een levensvatbare populatie in het Maasdal.

3.2.5. Vogelschutzgebiet 'Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg' (Duitsland)

Gebiedsbeschrijving

Het in het midden van het gebied Schwalm-Nette-Platte gelegen, 7272 hectare omvattende, vogelreservaat bestaat uit een uniek mozaïek van leefgebieden. Het gebied bestaat deels uit natuurlijke waterlopen, waarvan het zwaartepunt in het deelgebied Krickenbecker Seen ligt. Lichte dennen- en eikenbossen, afgewisseld met heidevenen en heideterreinen bevinden zich grotendeels langs de Duits-Nederlandse grens (Grenzwald met het voormalig depot Brüggen-Bracht, Lüsekamp en Meinweg). Biotopen met heidevenen bevinden zich voornamelijk in Elmpeter Bruch en Lüsekamp, evenals in delen nabij natuurlijke waterlopen met een smalle danwel brede zone van venen, bronnen, moerassen en beekbegeleidende bossen, maar ook Beuken- en Eikenbossen.

Flora en fauna

Dit grote gebied met een diversiteit aan habitats met een goede kwaliteit maakt het tot een zeer aantrekkelijk vogelgebied, enerzijds voor een groot aantal voorkomende broedvogelsoorten met voor sommige soorten aanzienlijke populaties en anderzijds tevens als voedsel-, rust en overwinteringgebied voor trekvogels. Het vogelreservaat Schwalm-Nette-Platte vormt een grensoverschrijdend natuurgebied. Aan de Nederlandse zijde strekt het gebied zich onder andere uit in het Nationale Park de Meinweg. Het huidige vogelreservaat Krickenbecker Seen en de extensieve gebieden met open water hebben enerzijds voor tal van broedvogelsoorten nationale betekenis (zoals Roerdomp, Kleine karekiet, Wintertaling, Waterral en Dodaars) en worden anderzijds door veel vogelsoorten (waaronder Visarend, Roerdomp, Zwarte stern en Nonnetje) als rust- en overwinteringgebied gebruikt. Lichte gemengde Dennen-Eikenbossen, lokaal afgewisseld met uitgestrekte heidevelden (met het zwaartepunt in voormalig depot Brüggen-Bracht) en kleinschalige veengebieden vormen het leefgebied van een populatie van nationaal belang voor de broedvogelsoorten Boomleeuwerik, Nachtzwaluw en Roodborsttapuit. De grootste dichtheid in het laagland van de Nederrijn van de broedpopulaties van de Zwarte specht en Wespandief bevinden zich in de gemengde Beuken- en Eikenbossen. De deelgebieden Elmpeter Schwalmbruch en Lüsekamp/ Boschbeek herbergen de grootste broedpopulatie van het land van de Blauwborst, welke tevens van nationale betekenis is. Als kenmerkende soort van natuurlijke oppervlaktewatersystemen heeft ook de IJsvogel hier, aan de noordwestkant van haar verspreidingsgebied, een significante populatie. De grote verscheidenheid aan leefgebieden, vaak in goede staat van instandhouding, heeft geleid tot de aanwijzing van grote oppervlakten natuurbeschermingsgebied als vogelreservaat.

Status Natura 2000

Het gebied Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald und Meinweg is als Natura 2000 gebied aangewezen als Vogelrichtlijngebied en omvat als overkoepelend gebied diverse Habitatrichtlijngebieden (waaronder bijvoorbeeld Meinweg mit Ritzroder dünen, Lüsekamp und Boschbeek, Elmpeter Schwalmbruch en Wälder und heiden bei Brüggen-bracht).

Gebiedscode: DE-4603-401

De Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald und Meinweg omvat als vogelrichtlijngebied meerdere habitatrichtlijngebieden in de Kreisen Moenchengladbach, Kleve, Viersen en Heinsberg. Het heeft een totale omvang van 7220 ha en grenst ten oosten aan de Nederlandse Natura 2000-gebieden Meinweg en Swalmdal.

De doelstelling voor Schalm-Nette-Platte mit Grenzwald und Meinweg is om de bestaande habitatdiversiteit en karakteristieke avifauna te behouden en verder te ontwikkelen. Maatregelen die als gevolg hebben dat er versnippering of isolatie plaatsvindt of ecologische verbindingen doorbreken moeten worden vermeden. Het bosbeheer dient een natuurlijk bossysteem na te streven en gericht te zijn op instandhouding van natuurwaarden. Het beheer dient een redelijk aandeel gemengd Eiken- en Dennenbos veilig te stellen. De veengebieden zullen door uitbreiding van heide en vochtige heidegebieden met natuurlijke overgangen in de grenszones een grootschalig verbonden netwerk moeten gaan vormen. Het natuurlijke grond- en oppervlaktewaterregime moet behouden blijven. De wateren moeten worden beschermd tegen eutrofiëring via extensivering van aangrenzende graslandgebieden. Ontwikkeling van natuurlijke open wateren is gewenst. Effectief zijn ook de maatregelen die, ook grensoverschrijdend werkzaam, de ecologische processen stimuleren alsmede recreatief medegebruik mogelijk maken. Veel van de maatregelen voor het behoud van leefgebieden voor de betreffende vogelsoorten worden uitgevoerd in het kader van bescherming- en ontwikkelingsmaatregelen van natuurbeschermingsgebieden die onderdeel uitmaken van het overkoepelende Vogelrichtlijngebied.

Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald und Meinweg is aangewezen als beschermd natuurgebied voor de volgende vogelsoorten van de Vogelrichtlijn:

- A224: Nachtzwaluw (broedvogel)
- A021: Roerdomp (wintergast)
- A246: Boomleeuwerik (broedvogel)
- A236: Zwarte specht (broedvogel)
- A068: Nonnetje (wintergast)
- A073: Zwarte wouw (broedvogel)
- A272: Blauwborst (broedvogel)
- A082: Blauwe kiekendief (wintergast)
- A072: Wespandief (broedvogel)
- A094: Visarend (trekvogel)
- A197: Zwarte stern (trekvogel)
- A229: IJsvogel (broedvogel)

3.2.6. Lüsekamp und Boschbeek (Duitsland)

Gebiedsbeschrijving

Dit Natura 2000-gebied bestaat uit een groot veen-heide-broekboscomplex op voedselarme bodems, dat langs de natuurlijk meanderende Boschbeek strekt. De Boschbeek stroomt op de Duits-Nederlandse grens aan de noordzijde van Nationaal Park de Meinweg.

In het landschap van de Maasterrassen (Schwalm-Nette-Platte), waar toe het natuurgebied Lüsekamp und Boschbeek behoort, bevindt zich een van de grootste Hoogveen(berken)bossen van Noord-Rijnland Westfalen. Ook de droge en natte heideterreinen van dit Natura 2000-gebied zijn van grote omvang binnen de regio Noord-Rijnland Westfalen, met bovendien één van de grootste overgangsvelden van de omgeving. Andere habitats van communautair belang, met verschillende stadia van ontwikkeling zijn tevens aanwezig in dit natuurgebied, zoals stuifzandheiden en vennencomplexen.

Voor het deelgebied Lüsekamp is de overgang van het hoger gelegen hoogterras met zijn droge Beuken- en Dennenbossen naar de kwelgebieden onderaan de terrasrand typerend. Naast de Berkenbroekbossen en Gagelmoerassen bevinden zich langs de terrasrand heischrale graslanden en vochtige heiden. De open vegetaties worden door de kudde veenschappen kort gehouden. Het dal van de Boschbeek is eveneens gekarakteriseerd door de overgang van hoger en droger naar lager en nat. Met de voortdurende verandering van de loop van de Boschbeek verandert ook de grens tussen Nederland en Duitsland, daar de grens precies in het midden van de Boschbeek gelegen is.

Flora en fauna

Van nationaal belang is de broedpopulatie van de in Noord-Rijnland-Westfalen zeer bedreigde Blauwborst, waarvan in Lüsekamp und Boschbeek de grootste populatie van Noord-Rijnland Westfalen broedt. Daarnaast is dit Natura 2000-gebied het broedgebied van de Boomleeuwerik, Nachtzwaluw en Zwarte specht. Voor andere soorten biedt het natuurreservaat rust- en foerageergebieden. Het natuurgebied Lüsekamp en Boschbeek behoort vanwege zijn onaangetaste veen-, heide- en broekbosbiotopen en de soortenrijke plant- en diergroepen tot één van de belangrijkste natuurgebieden in Noord-Rijnland Westfalen. Naast de natte graslanden die onderdeel uitmaken van de overstromingsvlakten, Zeggessystemen en brongebieden bevinden zich in het gebied standplaatsen van de bedreigde Kleinste egelskop-gemeenschap en de Korensla-associatie. Het gebied is ook leefgebied voor bedreigde soorten als Korensla en Moerashertshooi.

In beide deelgebieden (Lüsekamp en Boschbeek) van het natuurgebied bevinden zich grotere complexen van gagelmoerassen waar Roodborsttapuiten en Blauwborsten broeden. In het natuurgebied Lüsekamp und Boschbeek en het aangrenzende Nationaalpark De Meinweg bevindt zich de grootste adderpopulatie langs de gehele Nederlands-Duitse grens. Het gebied herbergt verder Dassen en Wilde zwijnen. Als gevolg van uitgevoerde beheers- en natuurontwikkelingsprojecten kon het gebied in de afgelopen decennia sterk aan betekenis toenemen.

Status Natura 2000

Het gebied Lüsekamp und Boschbeek is als Natura 2000-gebied onderdeel van het overkoepelende gebied Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald und Meinweg.
Gebiedscode: DE-4802-301

Het 253 hectare grote natuurgebied Lüsekamp und Boschbeek is gelegen in de gemeente Niederkrüchten in de Kreis Viersen. Het grenst direct aan de noordzijde van Nationaal Park de Meinweg in Nederland.

Het primaire ontwikkelingsdoel van dit Natura 2000-gebied is het behoud van een natuurlijk voedselarm veen-, heide- en bronboscomplex, waarbij de preventie van aanvoer van nutriënten van groot belang is. Het natuurgebied Lüsekamp Boschbeek en is een prominente schakel in het ecologisch netwerk van de Duits-Nederlandse grensgebieden tussen de Swalm en de Maas. Het is daarom een belangrijk internationaal rustgebied voor aan voedselarme veen- en heidegebieden gebonden soorten en levensgemeenschappen.

Habitattypen waarvoor het gebied is aangewezen:

- H2310: Stuifzandheiden met struikhei
- H3130: Zwakgebufferde vennen
- H3160: Zure vennen
- H4010: Vochtige heiden
- H4030: Droge heiden
- H7140: Overgangs- en trilvenen
- H7150: Pioniersvegetaties met snavelbiezen
- H9110: Veldbies-beukenbossen
- H9190: Oude eikenbossen
- H91D0: Hoogveenbossen

Habitatsoorten waarvoor het gebied is aangewezen:

- H1166: Kamsalamander

Vogelsoorten waarvoor het gebied is aangewezen:

- A246: Boomleeuwerik
- A236: Zwarte specht
- A272: Blauwborst
- A072: Wespendif
- A082: Blauwe kiekendif
- A224: Nachtzwaluw

3.2.7. Elmpeter Schwalmbruch (Duitsland)

Gebiedsbeschrijving

Het 286 ha grote Habitatrichtlijngebied Elmpeter Schwalmbruch is gelegen binnen de gemeente Niederkrüchten in de Kreis Viersen, ten zuiden van de provinciale weg L373 van Swalmen naar Brüggen. Centraal bevindt zich het gelijknamige natuurbelevingsgebied met gemarkeerde wandelpaden en een uitkijktoren. Het in het dal van de Swalm gelegen natuurgebied is in het westen begrensd door de staatsgrens in en het oosten door het vakantiedorp Venekoten. Het gebied maakt onderdeel uit van het grotere natuurgebied "Maas-Swalm-Nette" en van vogelrichtlijngebied DE-4603-401 "Schwalm-Nette - Platte mit Grenswald und Meinweg".

Het Elmpeter Schwalmbruch is een uitgestrekt laaglandgebied langs de benedenloop van de Swalm. Kenmerkend zijn de moerasbossen en heiden met een verscheidenheid aan stilstaande of stromende wateren. Centraal in het gebied bevindt zich een 65 hectare groot veenmoeras. Dit is het enige restant van de vroegere weid verspreide veenmoerassen in het dal van de Swalm. Kenmerkend voor de veenmoerassen zijn de Gagelstruiken en de vochtige heidevegetaties met Wolgras en Beenbreek. Hier bevinden zich de broedplaatsen van de zeldzame Blauwborst en de Waterral. De omgeving wordt gedomineerd door Eiken-berkenbossen en dennen-sparrenbossen, waarbij de aanwezige vijvers en grotere vergravingsputten de diversiteit aan habitats ten goede komen.

Flora en fauna

Het gebied is van nationaal belang vanwege de unieke combinatie van diverse, waaronder prioritaire, habitats.

Vooraf de op grote fhaal voorkomende Berkenmoerasbossen en veenheidegebieden met Gagelstruweel zijn bijzonder. Dit geldt eveneens voor de veenputten met typische moerasvegetaties.

Op de overgang naar het veel drogere hoogterras is het grootste Jeneverbesstruweel van de Nederrehein gelegen.

In het gebied broeden diverse Vogelrichtlijnsoorten, zoals een grote populatie van de blauwborst, en meerdere broedparen van de IJsvogel en de Wielewaal. Binnen de drogere heideterreinen bevinden zich de broedplaatsen van de Roodborsttapuit en de Boomleeuwerik en kan de Gladde Slang worden aangetroffen. Het beschermd natuurgebied Elmpter Schwalmbruch is een van de rijkste en belangrijkste gebieden voor amfibieën en libellen langs de Nederlands-Duitse grens. In de wateren komt Kamsalamander voor en verder herbergt het gebied de grootste populatie van de Zeggekorfslak in Noordrein-Westfalen. Bovendien heeft het gebied een beschermde status door het voorkomen van landelijk bedreigde habitattypen, zoals het Elzenbroekbos, de Jeneverbesstruwelen en heiden. Daarnaast bevinden zich hier soortgroepen van plantengemeenschappen (gemeenschap van Kleinste egelskop, Oeverzegge-associatie) die in Noordrijn-Westfalen met uitsterven worden bedreigd en bijzondere planten zoals Veenmosorchis en Slank wollegras.

Status Natura 2000

Het primaire ontwikkelingsdoel is het behoud en de verbetering van de veenmoerassen en natuurlijke beeklopen met aangrenzende oeverzones. Door de gerichte zonering van bezoekers zullen de kwetsbare biotopen beschermd worden, rekening houdende met zowel de recreatieve functie als de ecologische waarden van het gebied. Van belang is dat het gebied wordt beschermd tegen eutrofiërende invloeden en dat de kwelvegetaties behouden blijven. Vanwege de ruime aanwezigheid van goed ontwikkelde en zeldzame biotopen is het Elmpter Schwalmbruch in combinatie met aangrenzende gebieden van het Vogelrichtlijngebied "Schwalm-Nette-Platte" een landelijk waardevolle stapsteen in het internationale ecologisch netwerk in de grensstreek met Nederland.

Het gebied Elmpter Schwalmbruch is als Natura 2000 gebied aangewezen als Habitatrichtlijngebied en maakt onderdeel uit van het overkoepelend Vogelrichtlijngebied "Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald und Meinweg". Het Elmpter Schwalmbruch sluit bovenstrooms, oostelijk aan op het Nederlandse Natura 2000-gebied Swalmdal.

Elmpter Schwalmbruch is aangewezen als beschermd natuurgebied voor de volgende habitattypen van de Habitatrichtlijn:

- H4030: Droge heiden;
- H5130: Jeneverbesstruwelen;
- H7140: Overgangs- en trilvenen;
- H7150: Pioniervegetaties met snavelbiezen;
- H9190: Oude eikenbossen;
- H91D0: Hoogveenbossen;
- H3130: Zwakgebufferde vennen;
- H3150: Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden;
- H9110: Veldbies-beukenbossen;
- H3160: Zure vennen;
- H4010: Vochtige heiden

Elmpter Schwalmbruch is aangewezen als beschermd natuurgebied voor de volgende soort van de Habitatrichtlijn:

- H1016: Zeggekorfslak;
- H1166: Kamsalamander

Elmpter Schwalmbruch is aangewezen als beschermd natuurgebied voor de volgende vogelsoorten van de Vogelrichtlijnrichtlijn:

- A021: Roerdomp;
- A224: Nachtzwaluw;
- A236: Zwarte specht;
- A246: Boomleeuwerik;
- A272: Blauwborst;
- A094: Visarend;
- A072: Wespendif;
- A082: Blauwe kiekendif;
- A229: IJsvogel

3.2.8. Wälder und Heiden bei Brüggem-Bracht (Duitsland)

Gebiedsbeschrijving

Dit gebied omvat een complex van circa 16 vierkante kilometer van vier afzonderlijke natuurreservaten in het noordwesten van het gebied Schwalm-Nette-Platte op de grens met Nederland. Het gebied wordt gekenmerkt door uitgebreide Dennen- en Eiken-Berkenbossen met een netwerk van grootschalige heideterreinen en stuifzanden evenals uitgestrekte veengebieden.

Flora en fauna

Het gebied wordt gekenmerkt door nationaal waardevolle gebiedsdelen met omvangrijke beschermde habitattypen die van landelijke betekenis zijn. Met name voor de Atlantische regio zijn de aanwezige droge heiden en veengebieden met overgang- en trilvenen van bijzondere betekenis. Ook de kleinere voedselarme vennen met typische soortensamenstelling met in Noordrijn-Westfalen extreem zeldzame plantensoorten zijn benoemenswaardig. Tevens bevinden zich uitgestrekte rietmoerassen in het gebied. De talrijke binnenduinen bevatten een rijkdom van pioniersbegroeiingen van stuifzanden. Het mozaïek van een grote verscheidenheid en tegelijkertijd zeer zeldzame biotoopstructuren vormt geschikt leefgebied voor een grote groep beschermingswaardige soorten. Bovendien herbergt het omvangrijke reservaat het zwaartepunt van de verspreiding van de in Noordrijn-Westfalen bedreigde soorten Roodborsttapuit, Boomleeuwerik en Nachtzwaluw. Areaalgeografisch gezien is het voorkomen van de Atlantische gemeenschap van Rode dophei van bijzondere betekenis, omdat het de enige groeiplaats in Duitsland betreft.

Status Natura 2000

Het gebied Wälder und heiden bei Brüggem-Bracht is als Natura 2000 gebied aangewezen als Habitatrichtlijngebied en maakt onderdeel uit van het overkoepelend Vogelrichtlijngebied "Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald und Meinweg". Het is gelegen in de Kreis Viersen, heeft een omvang van 1611 hectare en is gelegen ten oosten van het Limburgse Natura 2000-gebied Swalmdal.

De doelstelling voor het gebiedscomplex Wälder und heiden bei Brügggen-Bracht is het behoud, optimalisatie en verbetering van heidegebieden, arme zandgronden, restanten van veengebieden, binnenduinen en Berken-Eikenbossen. De omvang en mozaïekvormen evenals de ligging maken het biotopencomplex een essentieel onderdeel van het nationale ecologisch netwerk, in het bijzonder ook grensoverschrijdend met Nederland, waar zich soortgelijke gebieden bevinden.

Wälder und heiden bei Brügggen-Bracht is aangewezen als beschermd natuurgebied voor de volgende habitattypen van de Habitatrichtlijn:

- H3160: Zure vennen
- H7140: Overgangs- en trilvenen
- H2330: Zandverstuivingen
- H3130: Zwakgebufferde vennen
- H4010: Vochtige heiden
- H4030: Droge heiden
- H6230: Heischrale graslanden
- H9110: Veldbies-beukenbossen
- H9190: Oude eikenbossen
- H91D0: Hoogveenbossen
- H2310: Stuifzandheiden met struikhei
- H7210: Galigaanmoerassen

Wälder und heiden bei Brügggen-Bracht is aangewezen als beschermd natuurgebied voor de volgende soorten van de Habitatrichtlijn:

- H1042: Gevlekte witsnuitlibel
- H1166: Kamsalamander

Wälder und heiden bei Brügggen-Bracht is aangewezen als beschermd natuurgebied voor de volgende vogelsoorten van de Vogelrichtlijnrichtlijn:

- A246: Boomleeuwerik
- A224: Nachtzwaluw
- A236: Zwarte specht
- A072: Wespendif

3.2.9. Meinweg mit Ritzroder Dünen (Duitsland)

Gebiedsbeschrijving

Voor de natuur in de Nederrijnse laaglanden en Kölner Bucht zijn de moerassen van de Meinweg en Ritzroder dünen met hun soortenrijkdom en hun oligotrofe (voedselarm) omstandigheden van bijzondere waarde. De diversiteit van de natuurlijke stadia van ontwikkeling (van de open heidevennen op verschillende vormen van de overgang naar vochtige heide) zijn meestal indicator van goede omstandigheden en dat dit gebied een prominente plaats in de natuurwaarde van het landschap bezet.

De Meinweg is een gesloten bosgebied, gevormd in de duinvalleien en depressies in het terrein. Heidevennen, moerassen en natte heideovergangen kenmerken het gebied. Eikenbossen op zure bodems en droge heidegebieden domineren op delen van het Duitse Meinweggebied, wat grenst aan Nationaal Park "De Meinweg" aan de Nederlandse kant.

Op het plateau bestaat de bodem grotendeels uit zand en grind, soms met stuifzanden. Her en der bevinden zich Eikenbossen op de zure gronden, met verder een voor het gebied belangrijk en waardevol areaal droge heide. De vennencomplexen van de Meinweg vormen een zeer belangrijk onderdeel van de vochtige natuurwaarden in het natuurgebied.

Fauna

Als het leefgebied van beschermde soorten zoals Boomleeuwerik, Adder en verschillende soorten libellen is de Meinweg met Ritzroder dünen van nationaal belang. Tevens maakt dit Natura 2000-gebied onderdeel uit van het leefgebied (en broedgebied) van de Nachtzwaluw, Zwarte specht en Wespandief. De voormalige vlakke dalen in het noorden van het gebied rond de Ritzroder dünen zijn van grote culturele en historische betekenis. Bovendien bevatten de periodiek droogvallende poelen veel waardevolle, kleine veranderende habitats voor vele dier- en plantensoorten.

Status Natura 2000

Het Duitse Natura 2000-gebied Meinweg met Ritzroder dünen vormt een belangrijke schakel in de ecologische corridor die in Nederland aansluit op Nationaal park de Meinweg.

Gebiedscode: DE-4802-302

De Meinweg met Ritzroder dünen is een 188 hectare groot gebied dat onderdeel uitmaakt van het overkoepelende Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald und Meinweg.

Als onderdeel van de het landelijke habitatnetwerk (vergelijkbaar met de Ecologische Hoofd Structuur in Nederland) van bosgebieden, moerassen en wetlands is de Meinweg met Ritzroder dünen een kerngebied. Het gebied speelt een centrale rol in de ecologische as Schwalmvallei, Nederlands Nationaal Park de Meinweg en Boschbeek-Elmptewoud. Daarmee wordt ook de grote betekenis van Meinweg met Ritzroder dünen binnen het internationaal ecologisch netwerk duidelijk. Het behoud en de ontwikkeling van habitatdiversiteit in de veen- en heidecomplexen in het gebied hebben absolute prioriteit. De ontwikkeling zal zich richten op de omvorming van bossen naar inheemse soorten die passen bij de lokale omstandigheden. Daarmee worden bosgemeenschappen met een hoge Zomer- of Wintereiken component voorzien, maar ook het bescherming van het veencomplex en de ontwikkeling van de heide door uitdunnen van de dennenbossen binnen de netwerken van het heidelandschap.

Habitattypen waarvoor het gebied is aangewezen:

- H4030: Droge heiden
- H7140: Overgangs- en trilvenen
- H9110: Veldbies-beukenbossen
- H9190: Oude eikenbossen

Vogelsoorten waarvoor het gebied is aangewezen:

- A224: Nachtzwaluw
- A246: Boomleeuwerik
- A236: Zwarte specht
- A072: Wespandief

3.2.10. Tantelbruch mit Elmpter Bachtal und Teilen der Schwalmaue (Duitsland)

Gebiedsbeschrijving

Het gebied Tantelbruch met Elmpter beekdal en delen van de Swalm bestaat uit een divers mozaïek van venen, Elzenbroekbos, Elzen-Essenbos, (Beuken-)Eikenbossen en de beek de Swalm. Met de typische watervegetatie van de Swalm kenmerkt dit deel van de beek, met inbegrip van de zijtakken, een waardevol beekdal.

Flora en fauna

De verbinding tussen de aan grondwater gebonden vochtige alluviale bossen in het dal, open wateren en verlandingsvegetaties, de beeklopen met begeleidende oeverzones en overgangen naar hogere terrasdelen met Eiken- en Beukenbossen, maken het gebied tot een onmisbaar onderdeel van het netwerk van natuurreservaten langs de Swalm en haar zijbeken. Uitermate kenmerkend voor deze regio zijn de onaangetaste en goed bewaard gebleven biotopen van stromend water en gemengde Eikenbossen.

Status Natura 2000

Het gebied Tantelbruch mit Elmpter Bachtal und Teilen der Schwalmaue is als Natura 2000 gebied aangewezen als Habitatrichtlijngebied en maakt grotendeels onderdeel uit van het overkoepelend Vogelrichtlijngebied "Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald und Meinweg". Het is gelegen in de Kreis Viersen, heeft een omvang van 236 hectare en is gelegen ten oosten van het Limburgse Natura 2000-gebied Swalmdal.

De hoofddoelstelling is het behouden en ontwikkelen (natuurherstel) van stromend (Elmpterbeek, Swalm) en stilstaand open water met moerasplantengemeenschappen, evenals het behoud en natuurlijke ontwikkeling van vochtige alluviale bossen, gemengde Eikenbossen en Beukenbossen. Hiervoor is het noodzakelijk om het grondwaterregime voor kenmerkende kwelvegetaties te behouden, het gebied te beschermen tegen negatieve veranderingen in het kenmerkende hydrologische systeem en hydrochemische vereisten van grond- en oppervlaktewateren te beschermen. Het gebied is onderdeel van het netwerk van beschermde natuurreservaten, waarvan de Swalm en haar zijbeken onderdeel uitmaakt.

Tantelbruch mit Elmpter Bachtal und Teilen der Schwalmaue is aangewezen als beschermd natuurgebied voor de volgende habitattypen van de Habitatrichtlijn:

- H9190: Oude eikenbossen
- H3260: Beken en rivieren met waterplanten
- H9110: Veldbies-beukenbossen
- H91D0: Hoogveenbossen
- H91E0: Vochtige alluviale bossen

Tantelbruch mit Elmpter Bachtal und Teilen der Schwalmaue is aangewezen als beschermd natuurgebied voor de volgende soort van de Habitatrichtlijn:

- H1016: Zeggekorfslak

Tantelbruch mit Elmpter Bachtal und Teilen der Schwalmaue is aangewezen als beschermd natuurgebied voor de volgende vogelsoorten van de Vogelrichtlijnrichtlijn:

- A072: Wespendif
- A236: Zwarte specht
- A229: IJsvogel

3.2.11. Helpensteiner Bachtal-Rothenbach (Duitsland)

Gebiedsbeschrijving

Het natuurgebied Helpensteiner Bachtal-Rothenbach bevindt zich binnen de gemeenten Wegberg en Wassenberg in de Kreis Heinsberg. Gedeeltelijk grenst dit natuurgebied direct aan het nationaal park De Meinweg.

Tussen Wildenrath en Dalheim-Rödgen meandert de Helpensteiner Bach nog als vrijwel geheel natuurlijke beek in het noordelijke deel van het natuurgebied. De oevers worden gevormd door vochtige en oude Elzenbroekbossen die op sommige plaatsen het karakter van een oerbos hebben. Het natuurgebied werd in 2003 uitgebreid met het voormalige vliegveld. Hier hadden zich als gevolg van het militair gebruik zeldzame en bedreigde levensgemeenschappen ontwikkeld.

Het Helpsteiner beekdal en Rothenbeek is een beekdal bos complex met grote oppervlakten van prioritaire habitats, zoals oude Elzenbossen en Berken- en Elzenbroekbos, binnen het overkoepelende natuurgebied Schwalm-Nette. Op de hellingen en drogere delen bevinden zich Beuken-eikenbossen. Er is een groot areaal moerasbos dat door de beekdynamiek beïnvloed wordt en bestaat uit kenmerkende vegetaties van natuurlijke beeksystemen en brongebieden. Dit vochtige natuurgebied is van nationale waarde en herbergt bedreigde soorten vares.

Fauna

Helpensteiner bachtal-Rothenbach is een bovenloopgebied van het beekstelsel en bevat boscomplexen met Elzenbiotopen en loofwoud in waterrijk gebied. Het betreft een relatief vochtig bosgebied waarin verschillende vogelsoorten leven (IJsvogel en Nachtegaal). In de directe omgeving bevindt zich het leefgebied van de Boomleeuwerik, de Zwarte Specht, de Klapekster en verschillende insecten, zoals de Koninginnepage. Verder bevindt zich hier een belangrijke populatie van de Wespenspin.

Cultuurhistorische waarden

Het beekdal van de Helpensteiner Bach is tevens het dal van de „Motten“. Eén van deze in vroegere tijden door de mens opgeworpen verhogingen in de moerassige bovenloop van de beek is de Motte Duivelsberg. Een paar honderd meter benedenstrooms ligt in de buurt van Dalheim de „Alde Berg“, één van de best bewaard gebleven motten van de Nederij. Hier vandaan is uitzicht over het cultuurlandschap bestaande uit de motte, de voorburch, slotgrachten en verdere cultuurhistorisch interessante ruïnes. Verder stroomafwaarts bevindt zich het voormalige Dalheimer klooster en de Dalheimer molen. Ten zuidoosten van de Dalheimer molen liggen de zandafgravingen van de Rosentaler zandwerken. Hier bevinden zich natuurlijke waterplassen met een recreatieve nevenfunctie.

Status Natura 2000

Het gebied Helpensteiner bachtal-Rothenbach is als Natura 2000-gebied onderdeel van het overkoepelende Schwalm-Nette-Rur en vormt hierin een belangrijke ecologische schakel.
Gebiedscode: DE-4803-303

Helpensteiner bachtal-Rothenbach is een 163 hectare groot rijk gestructureerd alluviaal bosgebied ten zuiden van de Meinweg, met verschillende bosgemeenschappen en doorsneden door een (semi)natuurlijk beekstelsel.

De ontwikkeling is gericht op het behoud en ontwikkeling van loofbosgemeenschappen en de natuurlijke beekprocessen, in het bijzonder van de elzen- en berkenbroekbossen. Beschermen tegen de invloeden van eutrofiëring zijn van belang voor het behoud van kenmerkende vegetatietypen van grondwaterstandafhankelijke systemen en de handhaving en ontwikkeling van (semi)natuurlijke beekdynamiek. Het Helpsteiner beekdal en Rothenbach is een belangrijke ecologische verbindingszone in de grensoverschrijdende Schwalm-Nette-Rur corridor en een deel van het kerngebied in het Nederlands-Duitse natuurpark Maas-Schwalm-Nette.

Habitattypen waarvoor het gebied is aangewezen:

- H9110: Veldbies-beukenbossen
- H9160: Eiken-haagbeukenbossen
- H9190: Oude eikenbossen
- H91D0: Hoogveenbossen
- H91E0: Vochtige alluviale bossen

Habitatrichtlijnsoorten waarvoor het gebied is aangewezen:

- H1166: Kamsalamander

Vogelsoorten waarvoor het gebied is aangewezen:

- A229: IJsvogel

3.2.12. Schaagbachtal (Duitsland)

Gebiedsbeschrijving

Het in het natuurgebied Schwalm-Nette-Platte gelegen Schaagbeekdal is als (vrijwel) natuurlijk beekdalsysteem van nationaal belang vanwege de diversiteit en het voorkomen van een complex aan biotopen en leefgebieden met een belangrijk aandeel Elzen- en Essenbos en Berken moerasbos. Het gebied kenmerkt zich door een grote diversiteit en soortenrijkdom en een volledig natuurlijke inrichting en heeft daardoor als beschermd leefgebied een belangrijke betekenis binnen het natuurgebied Schwalm-Nette-Platte.

Het Schaagbeekdal bestaat voornamelijk uit een (half)natuurlijke beekvallei met brongebieden, beekbegeleidende bossen en vochtige open delen langs de bovenloop van de Schaagbeek ten westen van Wildenrath. Er is een grote diversiteit van biotopen, met grote oppervlakten Elzen- essenbossen en Elzen- berkenbossen in het dal, langs de meanderende beek. Op de hellingen van het beekdal groeien Beuken-eikenbossen.

Flora en fauna

Het Schaagbeekdal is het broedgebied voor de Zwarte specht en de IJsvogel. Het gebied herbergt grote oppervlakten, soortenrijke, beekbegeleidende Elzenbroekbossen in voorbeeldige en voor het natuurgebied representatieve ontwikkelingsstadia. Bovendien zijn in het gebied vochtige graslanden en kwelgebieden, maar ook kleinschalige moerassen en Vochtige heide te vinden. Het is het leefgebied van de Beekrombout, een in Nordrhein westfalen met uitsterven bedreigde Libellensoort, de Rugstreeppad en de Graspieper, en Koningsvaren groeit in het Schaagbeekdal.

Het vrijwel natuurlijke beekdalsysteem in de bovenloop van de Schaagbeek bevat diverse brongebieden (kwel) en aanzienlijke hoeveelheden Elzen-Essenbossen, moerassen en moerasbossen.

Cultuurhistorische waarden

Het gebied herbergt restanten van middeleeuwse verdedigingswallen en een middeleeuwse motte (kunstmatige aarden heuvel waarop een mottekasteel gebouwd werd).

Status Natura 2000

Het gebied Schaagbeekdal is als Natura 2000 gebied onderdeel van het overkoepelende gebied Schwalm-Nette-Platte.

Gebiedscode: DE-4803-302

Het Schaagbeekdal omvat beekdalsysteem met een oppervlakte van 150 hectare en is gelegen ten westen van Wildenrath in de gemeenten Wegberg en Wassenberg in de Kreis Heinsberg. Ten noorden van dit gebied bevindt zich het Nederlandse Natura 2000-gebied de Meinweg.

De doelstelling voor het Schaagbeekdal is het behoud en de ontwikkeling van het structuurrijke en natuurlijke beekdalsysteem, met zijn bossen. In het bijzonder, naast een bijna natuurlijk bosbeheer, is extensief gebruik van het grasland en de heide in het beheer opgenomen. Bescherming tegen invloeden van eutrofiëring zijn van belang voor het behoud van de kenmerkende vegetatiesystemen die gerelateerd zijn aan de grondwaterstanden en de handhaving en ontwikkeling van een natuurlijke dynamiek in de waterloop is vereist. Het Schaagbeekdal is een belangrijke ecologische verbindingszone in de grensoverschrijdende Rur-Schwalm-Nette corridor en een deel van het kerngebied in het Nederlands-Duitse natuurpark Maas-Schwalm-Nette.

Habitattypen waarvoor het gebied is aangewezen:

- H3260: Beken en rivieren met waterplanten
- H9110: Veldbies-beukenbossen
- H9160: Eiken-haagbeukenbossen
- H9190: Oude eikenbossen
- H91D0: Hoogveenbossen
- H91E0: Vochtige alluviale bossen

Vogelsoorten waarvoor het gebied is aangewezen:

- A236: Zwarte specht
- A229: IJsvogel

4. Overwegingen

4.1. Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op het wijzigen en/of exploiteren van een paardenhouderij van Ponyhof Femke, gelegen aan de Thuserhof 22 te Asenray. Er wordt vergunning gevraagd voor de situatie als weergegeven in tabel 1.

Type	Code Stal	Aantal dieren	Emissie (kg NH ₃ / dier / jaar)	Totaal (kg NH ₃ / jaar)
Paarden (volwassen)	K 1	10	5	50,0
Pony's (volwassen)	K 3	8	3,1	24,8
Pony's (in opfok)	K 4	4	1,3	5,2
			Totaal	80,0

Tabel 1 aangevraagde situatie

4.2. Vigerende vergunning

4.2.1. Uitgangssituatie vigerende Natuurbeschermingswetvergunning

Nederlandse Natura 2000 gebieden: 'Roerdal', 'Swalmdal', 'Meinweg' en 'Leudal'.

Duitse Natura 2000-gebieden: 'Vogelschutzgebiet 'Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u.

Meinweg', 'Lüsekamp und Boschbeek', 'Elmpter Schwalmbruch', 'Wälder und Heiden bei

Brüggen-Bracht', 'Meinweg mit Ritzroder Dünen', 'Tantelbruch mit Elmpter Bachtal und Teilen der Schwalmaue', 'Helpensteiner Bachtal-Rothenbach' en 'Schaagbachtal'.

De vigerende vergunning is op 14 november 2013 door Gedeputeerde Staten van Limburg op grond van artikel 16/19d van de Nbwet 1998 verleend (kenmerk: 2013/62899) voor het wijzigen exploiteren van een paardenhouderij aan de Thuserhof 22 te Asenray nabij de beschermde Natura 2000-gebieden 'Roerdal', 'Swalmdal', 'Meinweg', 'Leudal'. De vergunning van 14 november 2013 dient als uitgangspunt voor deze aanvraag, zoals weergegeven in tabel 2.

Type	Code Stal	Aantal dieren	Emissie (kg NH ₃ / dier / jaar)	Totaal (kg NH ₃ / jaar)
Paarden	K1	16	5	80
			Totaal	80

Tabel 2 situatie op 14 november 2013

4.3. Effecten op de beschermde natuurgebieden

De inrichting ligt nabij onderstaande beschermde gebieden:

Naam gebied	Afstand in km
Nederland	
Roerdal	3,5
Swalmdal	5,2
Meinweg	0,8
Leudal	9,4
Duitsland	
Vogelschutzgebiet 'Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg'	2,0
Lüsekamp und Boschbeek	2,0
Elmpter Schwalmbruch'	5,2
Wälder und Heiden bei Brüggen-Bracht	6,0
Meinweg mit Ritzroder Dünen	6,7
Tantelbruch mit Elmpter Bachtal und Teilen der Schwalmaue	8,8
Helpensteiner Bachtal-Rothenbach	9,0
Schaagbachtal	6,7

Tabel 3 afstand tot de beschermde gebieden

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag wordt getoetst of het project/handeling, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten kan verslechteren of een significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor de gebieden zijn aangewezen. Zure depositie leidt in voedselarme milieus, zoals die aanwezig zijn in de nabij gelegen natuurgebieden, tot verrijking van het milieu (vermesting). Tevens neemt de zuurgraad toe (verzuring). Deze processen hebben een negatieve invloed op de natuurwaarden.

Het verspreidingsmodel AAgro-Stacks behorend bij het door ons gehanteerde vergunningenbeleid, waarmee de stikstofdepositie op beschermde natuurgebieden kan worden berekend, houdt rekening met de feitelijke omstandigheden van de veehouderijbedrijven en de windrichting.

Door de invoer van de feitelijke gegevens van de gebouwen (stallen), zoals onder andere staltype, gebouwhoogte, uittreedsnelheid en het aantal dieren, kan het rekenmodel een (relatief) nauwkeurige weergave maken van de stikstofdepositie op de nabij gelegen natuur. Dit rekenmodel achten wij wetenschappelijk gezien op dit moment het beste en meest nauwkeurig.

Om een goed beeld te krijgen van de depositie op de Natura 2000-gebieden is, gebruikmakend van het computermodel AAgro-Stacks, de depositie berekend op verschillende punten. Een aantal punten hebben wij overgenomen in tabel 4 (zie ook bijlage 1). Weergegeven is de depositie op het dichtstbijzijnde punt in elk gebied, in de bestaande en aangevraagde situatie.

Naam	X-coördinaat	Y-coördinaat	Depositie uitgangssituatie (mol N / ha / jaar)	Depositie aangevraagde situatie (mol N / ha / jaar)	Afname
Nederland					
Roerdal	197.500	354.662	0,0	0,0	0,0
Swalmdal	201.569	360.404	0,0	0,0	0,0
Meinweg	201.717	355.212	0,7	0,7	0,0
Leudal	193.997	361.560	0,0	0,0	0,0
Duitsland					
Vogelschutzgebiet 'Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg'	202.933	355.278	0,1	0,1	0,0
Lüsekamp und Boschbeek	202.933	355.278	0,1	0,1	0,0
Elmpter Schwalmbruch	203.808	359.491	0,0	0,0	0,0
Wälder und Heiden bei Brüggen-Bracht	203.633	360.487	0,0	0,0	0,0
Meinweg mit Ritzroder Dünen	207.564	354.039	0,0	0,0	0,0
Tantelbruch mit Elmpter Bachtal und Teilen der Schwalmaue	207.647	360.927	0,0	0,0	0,0
Helpensteiner Bachtal- Rothenbach	209.283	351.651	0,0	0,0	0,0
Schaagbachtal	208.558	349.216	0,0	0,0	0,0

Tabel 4 depositie op de beschermde gebieden

Uit de berekeningen blijkt dat de stikstofdepositie op geen enkel berekend punt in voornoemde beschermde gebieden toeneemt. Indien er op geen enkele van deze punten een toename berekend wordt, kan men stellen dat er nergens in het gebied een toename zal plaatsvinden.

Uit de aanvraag blijkt verder dat er geen andere - niet aan stikstofdepositie gerelateerde - negatieve effecten (zoals geluid, trillingen, licht, grondwaterstand-/grondwaterkwaliteitveranderingen etc.) te verwachten zijn die de natuurlijke kenmerken van voornoemde beschermde gebieden kunnen aantasten.

4.4. Conclusie

Op grond van bovenstaande beoordeling concluderen wij dat gelet op de instandhoudingdoelstellingen onderhavige door Ponyhof Femke, Thuserhof 22 te Asenray aangevraagde activiteiten geen (significante) negatieve effecten zullen veroorzaken op de betrokken Nederlandse en Duitse Natura 2000-gebieden. Het natuurschoon en de natuurwetenschappelijke betekenis zullen geen negatieve gevolgen ondervinden, mits deze vergunning en de daaraan verbonden voorschriften worden nageleefd.

5. Besluit

Gelet op het bepaalde in de Natuurbeschermingswet 1998, de Habitatrichtlijn en voorgaande overwegingen, besluiten wij:

1. aan Ponyhof Femke een vergunning krachtens artikel 19d van de Nbwet 1998 te verlenen voor het in de nabijheid van de Natura 2000-gebieden 'Roerdal', 'Swalmdal', 'Meinweg' en 'Leudal' wijzigen en exploiteren van een paardenhouderij zoals aangevraagd d.d. 8 april 2014 met kenmerk 2014-0317 aan de Thuserhof 22 te Asenray;
2. aan de vergunning de beperkingen te stellen en voorschriften te verbinden, zoals opgenomen onder hoofdstuk 7;
3. dat de aanvraag en de bijbehorende stukken ontvangen op 8 april 2014, deel uitmaken van deze vergunning, behoudens en voor zover daarvan bij dit besluit niet wordt afgeweken;
4. dat op het moment dat het onderhavige besluit definitief en onherroepelijk is geworden, dit in de plaats treedt van de voor de inrichting verleende vergunning Nbwet 1998 d.d. 14 november 2013 (kenmerk 2013-62899).

6. Rechtsbescherming

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u, tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht alsmede de redenen van het beroep (motivering). Het beroepschrift moet worden gericht aan: Raad van State; Afdeling bestuursrechtspraak; Postbus 20019; 2500 EA Den Haag. Als u een beroepschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Raad van State, www.raadvanstate.nl. Klik op 'ONZE WERKWIJZE'. Klik op 'Bestuursrechtspraak'.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,



Ing. E.A.P.H. Haesen
Clustermanager Vergunningen

7. Voorschriften

Aan deze vergunning worden de volgende voorschriften verbonden:

- De vergunning heeft betrekking op het houden van de dieren aantallen op het stalsysteem aan de Thuserhof 22 te Asenray zoals weergegeven in onderstaande tabel:

Type	Code stal	Aantal dieren
Paarden (volwassen)	K 1	10
Pony's (volwassen)	K 3	8
Pony's (in opfok)	K 4	4

- De vergunning heeft betrekking op de emissie van 80 kg NH₃ / jaar, resulterend in een stikstofdepositie op het beschermde natuurgebied zoals weergegeven in onderstaande tabel:

Naam	X-coördinaat	Y-coördinaat	Depositie (mol N / ha / jaar)
Meinweg	201.717	355.212	0,7

8. Afschriften


Een afschrift van dit besluit hebben wij verzonden aan:

- Ponyhof Femke, Thuserhof 22, 6042 KW te Asenray, als besluit op de aanvraag;
- Arvalis Adviseurs, Staat 40, 6031 EM te Nederweert, ter kennisname;
- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond, Postbus 900, 6040 AX te Roermond, ter kennisname;
- Ministerie van Economische Zaken, DG Natuur en Regio, Directie PD Natura 2000, Postbus 20401, 2500 EK te Den Haag, ter kennisname;
- Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 32, Postfach 30 08 65, 40408 Düsseldorf Deutschland, ter kennisname.

Bijlage 1 - Ligging bedrijf en natuurgebieden

Legenda

- Bedrijf
- Rand natuurgebied
- Rijksgrens
- Provinciegrens
- Beschermd natuurmonument
- Vogelrichtlijngebied
- Habitatrichtlijngebied
- Vogel- en habitatrichtlijngebied
- Habitatrichtlijngebied en beschermd natuurmonument
- Vogel- en habitatrichtlijngebied en beschermd natuurmonument
- Buitenlands Natura 2000-gebied



600 Meters
 schaal: 1:100.000
 Datum: 30-10-2013
 © Provincie Limburg afdeling Geospatialen en Verkeers
 Top. ontwerpen & topografie & foto: Huisman & Brouwer Breda

