

Arvalis Adviseurs

Staat 40
6031EM Nederweert

www.arvalis.nl
JHeuvelmans@arvalis.nl
Telefoon 0651490276

Gedeputeerde Staten van Limburg
Afdeling Vergunningen en Subsidies
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT

Datum 4 juli 2014
Betreft Aanvraag Natuurbeschermingswetvergunning
Ons kenmerk 20140602/Jheuvelmans/5632770
Uw kenmerk

Geachte College,

Tot mij wendde zich Mevr. A. Vleeshouwers , gevestigd aan de Pruiskesweg 14 te 6006RT Weert, namens V.O.F. Vleeshouwers gevestigd aan de Pruiskesweg 14 te 6006VG Weert , hierna te noemen cliënt, en te dezer zake woonplaats kiezende ten kantore van J. Heuvelmans gevestigd aan de en kantoorhoudende aan de Staat 40 te 6031EM Nederweert . Die door aanvrager ten deze als gemachtigde wordt gesteld met de macht van substitutie.

Cliënt heeft voornemens een dierenasiel te exploiteren te Weert .

Bij dit schrijven is een aanvraag gevoegd voor een natuurbeschermingswetvergunning. Namens cliënte wil ik u verzoeken deze aanvraag zo op korte termijn in behandeling te nemen.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met ondergetekende, telefonisch of per mail.

Met vriendelijke groet,

J. Heuvelmans ,
bedrijfsadviseur

Machtigingsformulier

VOLMACHT

Ondergetekende:

Naam : A. Vleeshouwers
Adres en woonplaats : Pruiskesweg 14 , Weert

Verklaart hierbij volmacht te geven aan:

J. Heuvelmans , medewerker van Arvalis, gevestigd en kantoorhoudende aan de Staat 40 te 6031EM Nederweert , die door hem ten deze als gemachtigde wordt gesteld voor de werkzaamheden welke betrekking hebben op de aanvraag en werkzaamheden voor de omgevingsvergunning en natuurbeschermingswet.

Opgemaakt en getekend te op 4 juli 2014,

A. Vleeshouwers

arvalis



Natuurbeschermingswet

Vergunningsaanvraag

“Wijffelterbroekdijk 65 Weert ”



Datum: 4 juli 2014

AANVRAAGFORMULIER

Aanvraagformulier vergunning Natuurbeschermingswet
Beschermdenatuurmonumenten, art. 16 Natuurbeschermingswet 1998
Natura 2000-gebieden, art. 19d e.v. Natuurbeschermingswet 1998

Om tot een ontvankelijke aanvraag te komen is het gewenst dat met de provincie vooroverleg wordt gevoerd. Door de concept aanvraag af te stemmen wordt voorkomen dat de definitief ingediende aanvraag onvolledig is en derhalve buiten behandeling moet worden gelaten.

Aanvrager

1 Bedrijf

KvK-nummer	12050618
Statutaire naam	V.O.F. Vleeshouwers

2 Eventueel persoonsgegevens

Contactpersoon	A. Vleeshouwers
Telefoon / e-mail	asielweert@planet.nl

Correspondentieadres

Postbus / Straat en nr.	Pruiskesweg 14
Postcode	6006RT
Plaats	Weert

Locatie voorgenomen activiteit(en)

Straat en nr.	Wijffelterbroekdijk 65
Postcode	6006VG
Plaats	Weert
Gemeente	Weert
X en Y coördinaten [minimaal zes cijfers]	X: 174.230 Y: 357.316

Eventueel gemachtigde / adviesbureau

Naam gemachtigde	Arvalis
Contactpersoon	J. Heuvelmans
Telefoon	0651490276
E mail	JHeuvelmans@arvalis.nl
Straat en nr.	Staat 40
Postcode	6031EM
Plaats	Nederweert

Beschermde gebieden waarop de activiteit gevolgen heeft c.q. van invloed is / zijn

Beschermd natuurmonument(en)	Geen beschermd natuurmonument binnen straal van 10 kilometer rond het bedrijf.
Natura 2000-gebied(en)	"Weerter- en Budelerbergen & Ringselven", "Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en bergervan", "Abeek met aangrenzende moerasgebieden" en "Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierheide en Mariahof"

Bedrijfsactiviteit voorgenomen activiteit(en)

Grondwateronttrekking(en)	☐ zie bijlage
Drainage	☐ zie bijlage
Ammoniak- en/of No _x -emissies bij agrarische activiteiten	☐ zie bijlage
Overig	☒

Beschrijving voorgenomen activiteit(en)

Het bedrijf houdt zich bezig met de tijdelijke huisvesting van honden en katten (dierenasiel). Hiervoor zijn op het terrein van de inrichting huisvestinggebouwen voor honden en katten gerealiseerd, waarin totaal 40 honden en 100 katten gelijktijdig kunnen worden gehuisvest.

Periode waarin de activiteiten/werken worden uitgevoerd

Startdatum	Op korte termijn, zo spoedig mogelijk
Einddatum	n.v.t.
Tijdstip	

[indien van toepassing]

Wijziging of verlenging bestaande vergunning Natuurbeschermingswet

Datum vergunning	n.v.t.
Kenmerk vergunning	n.v.t.

Nawoord en Ondertekening

Bijlagen

Aantal bijlagen	3
-----------------	---

Korte omschrijving van de bijlagen

- Bijlage 1. Overzichtstekening locatie en betrokken gebieden
- Bijlage 2. Beschrijving van de aangevraagde situatie met bijbehorende tekeningen.
- Bijlage 3. Beschrijving van de overige effecten.

Persoonsgegevens

Geeft u toestemming om de persoonsgegevens openbaar te maken.	☐ Ja ☒ Nee
---	--

Hierbij verklaar ik dat de aanvraag naar waarheid is ingevuld

Handtekening aanvrager

Datum	
Handtekening	

Eventueel Handtekening gemachtigde

Datum	
Handtekening	


De aanvraag inclusief bijlagen dient in 5-voud te worden ingediend bij:

Gedeputeerde Staten van Limburg
Afdeling Vergunningen en Subsidies
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT

Informatie
Vergunningenloket: tel. (043) – 389 76 49

Bijlagen;

Bijlage 1. Overzichtstekening locatie en betrokken gebieden



Bijlage 2. Beschrijving van de aangevraagde situatie met bijbehorende tekeningen.

Namens de VOF Vleeshouders, Wijffelterbroekdijk 65 6006 VC te Weert wordt een Nb-wet vergunning aangevraagd bij de provincie Limburg voor een "dierenasiel".
Bedrijfssituatie waarvoor een NB wet vergunning wordt aangevraagd conform artikel 19d van de natuurbeschermingswet betreft het houden van maximaal 40 honden en 100 katten.

Bijgesloten is een tekening van de bedrijfssituatie waarvoor een NB wet vergunning wordt aangevraagd.

Bijlage 3. Beschrijving van de overige effecten.

Effecten op de beschermde natuurgebieden

De inrichting ligt nabij onderstaande beschermde gebieden:

Binnen een straal van 10 kilometer bevinden zich enkele Natura 2000 gebieden, zie kaart in Bijlage 1.

nr.	Naam	afstand	datum		
			Nb-wet BN	Vogelrichtlijn gebied	Habitatrichtlijn gebied
138	Weerter- en Budelerbergen & Ringselven	1.767 m.		24-3-2000	7-12-2004
	België				
	Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en bergervan	7.620 m.			07-12-2004
	Abeek met aangrenzende moerasgebieden (B)	2.000 m.			7-12-2004
	Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierheide en Mariahof (België)	1.012 m.		10-06-1994	

Tabel 1, afstand tot de beschermde gebieden

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag wordt getoetst of het project/handeling, gelet op de instandhoudingsdoelstelling(en), de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten kan verslechteren of een significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor de gebieden zijn aangewezen.

Gebiedsbeschrijvingen

1 Weerter- en Budelerbergen & Ringselven (VR + HR)

Habitatrichtlijngebied

Voor de bescherming van natuurlijke habitats en habitats van beschermde soorten wijzen de EU-lidstaten gebieden aan waar deze soorten en habitats voorkomen. Begin juli 2003 heeft de Europese Commissie ingestemd met de lijst van gebieden die Nederland voor de Habitatrichtlijn heeft ingediend. In december 2004 stelde de Europese Commissie voor de Atlantische biogeografische regio (waaronder Nederland valt) de 'communautaire lijst' als bedoeld in artikel 4 lid 2 van de Habitatrichtlijn (92/43/EEG) vast. De Habitatrichtlijngebieden 'Weerterbos' en 'Ringselven en Kruispeel' maken deel uit van het Natura 2000-gebied 'Weerter- en Budelerbergen en Ringselven'.

Het 'Weerterbos' is opgenomen vanwege het voorkomen van het habitattype oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Littorelletalia uniflorae en/of Isoeto-Nanojuncetea [3130] en *Veenbossen [91D0] daarnaast komt de Meervleermuis hier voor.

Het complex van 'Ringselven en Kruispeel' is opgenomen vanwege de daar voorkomende habitattypen oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Littorelletalia uniflorae en/of Isoeto-Nanojuncetea [3130] en *Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en soorten van het Caricion davallianae [7210]. Daarnaast komen de volgende soorten uit de habitatrichtlijn voor: Bittervoorn, Kleine modderkruiper, Kamsalamander en Drijvende waterweegbree.

Habitatype met een (*) zijn de zogenaamde kwalificerende habitats.

Vogelrichtlijngebied

Bij besluit van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 24 maart 2000, kenmerk N/2000/343 is natuurgebied Weerter- en Budelerbergen aangewezen als Speciale beschermingszone als bedoeld in de Vogelrichtlijn, richtlijn 97/409/EEG. De aanwijzing heeft betrekking op de volgende vogelsoorten: -

- Geoorde fuut (broedvogel) -
- Woudaapje (broedvogel) -
- Zwartkopmeeuw (broedvogel) -
- Nachtzwaluw (broedvogel) -
- Boomleeuwerik (broedvogel) * -
- Roodborsttapuit (broedvogel) -
- Snor (broedvogel)

Soorten gemarkeerd met een sterretje (*) zijn zg. 'kwalificerende soorten' waarvoor het gebied is geselecteerd als Vogelrichtlijngebied.

De voor dit Vogelrichtlijngebied vermelde vogelsoorten zijn ontleend aan de nota van toelichting bij het aanwijzingsbesluit. Het betreft de soorten waarvoor het gebied blijkens aantal gegevens uit de periode 1993-97 is aangewezen als Vogelrichtlijngebied. In geval van verschillen tussen bovenstaande opsomming en de nota van toelichting is de laatste doorslaggevend. Voor al deze vogelsoorten worden momenteel per gebied instandhoudingdoelen opgesteld.

Effectenindicator

Storingsfactor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Bittervoorn	■	■	■	■	...	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Drijvende waterweegbree	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kamsalamander	■	■	■	■	...	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kleine modderkruiper	■	■	■	■	...	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Meervleermuis	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Habitatype 3130	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Habitatype 7210	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Habitatype 91D0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■	zeer gevoelig
■	gevoelig
■	niet gevoelig
■	n.v.t.
...	onbekend

2 Abeek met aangrenzende moerasgebieden (B)

De Abeek is een typische laaglandbeek die niet door enkele puntbronnen maar door uitvloeiend grondwater langs haar hele loop gevoed wordt. Het brongebied ligt in de gemeente Meeuwen-Gruitrode en vervolgens stroomt de Abeek door Peer, Bocholt, Bree en Kinrooi om daarna in Nederland ter hoogte van Neer in de Maas uit te monden. De bovenloop is zeer intact gebleven. Hier heeft de beek zich diep ingesneden in het Kempisch Plateau en de ruimte gekregen om meanderend zich een weg stroomafwaarts te banen. Na de deelgemeente Reppel stroomt de Abeek in de Vlake van Bocholt en is vanaf hier grotendeels recht getrokken en verlegd.

Van bron tot enkele km's voor Reppel behoort het gebied tot het Kempisch plateau of Limburgs hoogplateau. Het plateau helt licht en eerder gelijkmatig af van 80 m in het brongebied tot 45 m in Reppel. Het oorspronkelijk vlakke reliëf is getekend door insnijdingen van evenwijdig lopende consequente beken. De beken waaronder de Abeek vloeien in noordoostelijke richting. Ze snijdt vrij diep (5 tot 10 m) in het plateau. Nabij Reppel is er een vrij bruuske daling van meer dan 10 m (breuk van Rotem) naar de Vlake van Bocholt. Op de plateaus is het landschap grotendeels open of geperceleerd half-open. In de valleien is het vooral een (ongeperceleerd) half-open landschap.

Fysisch milieu

Op geologisch vlak wordt het gebied vooral gedetermineerd door pleistocene grintafzettingen van de Maas (puinkegel). In een latere periode werd de vallei opgevuld met alluviale beekafzettingen en ontwikkelden er zich vooral belangrijke veenpartijen. Langs de beekvalleien vinden we vooral lemigzanderige bodems. Ook zandbodems kunnen grote oppervlakten beslaan. De afzettingen hebben bijna allemaal een profiel. Bodems met een (matig) duidelijke podzolstructuur bedekken de grootste oppervlakte. Plaggenbodems komen ook regelmatig voor. Hydrografisch hoort de Abeekvallei tot het aasbekken. De Abeek is een laaglandbeek met een nog vrij natuurlijke loop. Ze is één van de zeldzame beken van Vlaanderen die haar goede structuur van bron tot monding behouden heeft. Meandering, holle oevers, talrijke natuurlijke kwelzones, wisselende bodemsubstraten zijn enkele van haar kwaliteiten. De kwaliteit van het water is matig goed tot goed. Het merendeel van de vallei heeft een niet tot een slechts lokaal verstoorde waterhuishouding.

Vegetaties

In de hieronder gegeven beschrijving wordt de nadruk gelegd op de vegetaties die volgens de Habitat Richtlijn (92/43/EEG) bescherming verdienen. De habitattypen die de EG als prioritair beschouwd, zijn daarom aangeduid met een *.

Het brongebied onderscheidt zich van de eigenlijke beekvallei ook op vegetatiekundig vlak door de aanwezigheid van een indrukwekkend landschap van uitgestrekte droge, vochtige en natte heiden, met vennen, stuifduinen en zelfs met enkele hoogveentjes. Op verschillende plaatsen liggen er landduinen, een zeldzaam geworden milieu. Open pioniersvegetaties van het type Thero-Airion (habitatype) zijn relatief uitgestrekt. Droge heide (habitatype) heeft er de grootste bedekking. Ook grote oppervlakten natte heide te rekenen tot *Ericetum tetralicis* (habitatype) zijn aanwezig, die plaatselijk zeer goed zijn ontwikkeld (o.a. met Heidekartelblad, Liggende vleugeltjesbloem en Beenbreek). Deze natte heide bevat een mozaïek van veenslenken van het type *Rhynchosporion albae* (habitatype) met o.a. twee soorten snavelbiezen en zonnedauw en Moeraswolfsklauw.

De vennen behoren er tot het oligotroof type (habitatype) met o.m. Klein blaasjeskruid, Duizendknoopfonteinkruid en Veelstengelige waterbies. Op kleinere oppervlakte ontwikkelt zich hoogveen (Habitatype *) met o.a. Veenbes, Lavendelheide en Eenarig wollegras.

Tussen de heides in, komen kleine oppervlakten Gagel-Berken-struweel (*Betuletum pubescentis*) voor. Verder stroomafwaarts vormt de Abeek een uitgesproken beekdal. Op de flanken vinden we plaatselijk ook droge heide. Ook oude Eiken-berkenbossen (habitatype) zijn hier te vinden. Dat vele van deze bossen een opener (heide)verleden gekend hebben, getuige het voorkomen van Blauwe bosbes en op enkele plaatsen Jeneverbes.

Vaak zijn de randen van de productiegraslanden nog bloemrijk met o.a. Grasklokje, Kleine leeuwentand en Knolboterbloem.

De middenloop van de vallei wordt vooral gekenmerkt door grondwater beïnvloede vegetaties. Deze kwelzones hebben de successie aanzienlijk vertraagd en zijn onmisbaar voor de aanwezige drijftillen (habitatype). Binnen de reeks drijftillen is er een duidelijke verschuiving van relatief zure en voedselarme drijftillen (in de bovenloop vooral door meeuwen) naar meer mesotrofe milieus. Het zijn alle unieke en kwetsbare vegetaties. In de bovenloop domineren Snavelzegge, Zompzegge, Zwarte zegge en Wateraardbei. Meer stroomafwaarts duiken vooral meer Holpijp en Adderwortel op, terwijl Moerasstreekzaad, Waterdrieblad, Pluimzegge, Valse cyperzegge en Moerasvaren hun intrede doen.

Een belangrijk deel van de gronden bestaat uit (verruigde) hooilanden. Getuigen van het hooilandverleden zijn de fragmenten van zuur laagveenmoeras type *Caricion curta-nigrae* (met o.m. Wateraardbei, Schildereprijs, Zeegroene muur en Sterzegge) en van blauwgrasland type *Molinion* met o.m. Pijpestrootje, Ruw walstro en Veldrus. Hoewel deze fragmenten bijna steeds nog aanwezig zijn, zijn de meeste van deze natte graslanden reeds geëvolueerd naar rietland, wilgenstruweel of elzenbos. Wegens het achterwege blijven van bemesting en/of verdroging blijven de herstelkansen zeer reëel. Op enkele percelen komt nog een fraai ontwikkeld Blauwgrasland (habitatype) voor. Naast veel Moerasviooltje en Pijpestrootje groeien er ook zeldzame soorten als Klein glidkruid, Groengele en Late zegge.

De lichtjes minder natte graslanden kunnen tot het *Calthion palustris* en/of *Arrhenatherion* gerekend worden. Kenmerkende soorten zijn er Dotterbloem, Adderwortel, Wilde bertram, Tweerijige zegge en Bosbies. Draadrus en vooral Knolsteenbreek kunnen lokaal algemeen zijn.

Naast graslanden, drijftillen en ruigten beslaan broekbossen en beekbegeleidend loofbos het overige deel van de vallei. De natte bossen zijn in hoofdzaak te typeren als mesotroof tot eutroof elzenbroek (habitatype *) en Sporken-wilgenbroekstruweel (*Salicion cineræe*). Kenmerkende soorten zijn Elzenzegge, IJle zegge, Blauw glidkruid. Door de sterke kwel groeit hier ook veel Bittere veldkers en plaatselijk Paarbladig goudveil. Plaatselijk zijn er zeer waardenvolle overgangen van droge zandgrond naar mesotroof elzenbroek en beekbegeleidend bos over een oligotrofe fase van berk- en elzenbroek met vele veenmossen en Moerasviooltje.

De Abeek wordt over grote delen door een met het *Stellario-Carpinetum* (habitatype) en *Carici remotæe*-*Fraxinetum* verwant type loofbos begeleid met voor de regio een aantal niet-alledaagse soorten. Een bijna alomtegenwoordige verschijning hier is Verspreidbladig goudveil. Geregeld groeit hier ook Reuzenzwenkgras. Ook Grote keverorchis en Veelbloemige salomonszegel werden er lokaal gevonden. Op een paar plaatsen groeit in de bosrand ook Wilde peer.

De meeste stilstaande wateren hebben geen bijzondere hoge natuurwaarde. Een aantal evolueren echter gunstig. Hier kan men soorten als Drijvend fonteinkruid, Grof hoornblad vinden. In één plas groeien kranswiervetaties (habitatype). De regionale plantenatlas maakt op één plaats melding van Drijvende waterweegbree.

De begroeiingen in de Abeek zelf zijn binnen het interessegebied plaatselijk. Onder meer Drijvend fonteinkruid vormt er vegetaties. De databank van het Lisec maakt duidelijk dat in het onderzoeksgebied tijdens de periode 1972 - 1992 precies 346 hogere plantensoorten gevonden werden. De plantengemeenschappen van natte heiden, laagvenen, natte graslanden en droge zure graslanden zijn zeer goed ontwikkeld. Ook de bosflora is goed vertegenwoordigd. Bij deze soorten zijn er 35 soorten die momenteel als bedreigd worden beschouwd.

Habitattypen waarvoor het gebied is aangewezen:

- H4010: Vochtige heide
- H4030: Droge heide
- H7140: Overgangs- en trilveen
- H7150: Pioniervegetaties met snavelbiezen
- H9190: Oude eikenbossen
- H91E0: Vochtige alluviale bossen (prioritair habitatype)

Fauna

Systematisch onderzoek naar zoogdieren is nog niet verricht. O.m. leven er Ree en Bunzing. Visdeskundigen benadrukken dat de Abeek door haar visfauna voor Vlaanderen een uitzonderlijke waarde heeft. Ze herbergt nog grote en evenwichtige populaties van o.a. Serpeling, Beekprik, Vetje en Bermpje.

Ook voor amfibieën en reptielen heeft het gebied een betekenis. Liefst vijf soorten die opgenomen werden in de Rode lijst komen in het gebied voor, met een concentratie in het brongebied : Heikikker, Rugstreeppad, Vinpootsalamander, Gladde slang * en Levendbarende hagedis.

Van de insectengroep werden vooral de dagvlinders en libellen reeds bestudeerd. De heideterreinen zijn zeer belangrijk voor vlinders met een kleine populatie van Veenhooibeestje (waarschijnlijk de laatste populatie van Vlaanderen) en grotere populaties van Heideblauwtje, Gentiaanblauwtje, Groentje en Bont dikkopje. In de middenstroom vliegt ook Bont dikkopje rond. In de Abeek kwam tot 1996 ook nog Zilveren maan voor. Met het verdwijnen van deze vliegplaats is deze soort in Vlaanderen uitgestorven. In 2004 werd terug een populatie Kleine parelmoervlinder waargenomen.

Het aantal soorten libellen bedraagt tegenwoordig 22. Vooral de middenstroom heeft een grote betekenis door het voorkomen van de kwetsbare soorten Bruine korenbout, Metaalglanslibel, Grote roodoogjuffer, Weide- en Bosbeekjuffer. Van deze laatste is de populatiegrootte zeer hoog. Het brongebied was gekend van Gevlekte witsnuitlibel *, een inmiddels uit Vlaanderen verdwenen vensoort.

Sprinkhanen werden nog niet systematisch onderzocht. Toch duiden de waarnemingen ook hier reeds op het entomologisch belang van het gebied. Het brongebied is de enige Vlaamse vindplaats van de Zadel sprinkhaan. In de middenstroom zijn de grote populaties van Zompsprinkhaan en Boskrekkel belangrijk.

De Abeekvallei is zonder twijfel één van de belangrijkste vogelgebieden van Vlaanderen. De broedvogelwaarnemingen voor de periode 1985 -1992 verzameld in databank bij Lisec geeft een soortenlijst van maar liefst 115 soorten broedvogels. Een recente kartering bevestigde dit. Het militair domein vormt het enige levensgebied van Korhoen in Vlaanderen, voor Grauwe kiekendief* (onregelmatig) praktisch het enige. In het brongebied broeden ook nog Wespendif*, Bruine kiekendief *, Boomleeuwerik*, Blauwborst*, Dodaars, Fuut, Slobeend, Wintertaling, Kuifeend, Tafeleend, Havik, Grutto, Wulp, Tapuit, Rietzanger, Kleine karekiet. Tot eind jaren tachtig broedden er ook nog Roerdomp*, Duinpieper*, Grauwe klauwier*, Kuifleeuwerik en Paapje. Porseleinhoen* broedt er onregelmatig. Tijdens de trekperiode is het gebied belangrijk voor Kraanvogel* en Regenwulp. 's Winters pleisteren er o.a. Blauwe kiekendief * en Roerdomp*.

Ook het middenstrooms gedeelte telt op avifaunistisch vlak goed mee. Het gebied werd opgenomen in het vogelrichtlijngebied dat specifiek ter bescherming van de laatste leefgebieden van Ortolaan*. IJsvogel*, Zwarte specht*, Blauwborst*, Wintertaling, Watersnip, Grote gele kwikstaart, Vuurgoudhaantje en Kruisbek broeden er ook.

Soorten als Goudvink, Havik, Houtsnip, Appelvink en Zwarte specht* breiden zichtbaar uit. Men telde daarenboven hoge dichtheden van Spotvogel, Matkop en Wielewaal.

Soorten met een * zijn opgenomen in Bijlage I van de Vogelrichtlijn 79/409/EEG.

Vogelsoorten waarvoor het gebied is aangewezen:

- Zwarte specht
- IJsvogel
- Blauwborst
- Ortolaan

3 Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierheide en Mariahof (België)

Het Vogelrichtlijngebied is aangewezen voor broedvogels van bos, heide en vennen, en diverse doortrekkers en wintergasten. Het gebied bestaat uit landduinen, droge en vochtige heiden, moerassen, vijvers, houtwallen en loofbossen. In het gebied liggen oude grindgaten die zijn ingericht als natuurvriendelijke plassen.

Het Hamonterheide bestaat uit oude landduinen, heidevelden met vennen en naaldbos. Het Hageven bestaat uit droge en natte heide, vennen en rietland. Op enkele kleine plekken komt broekbos voor met 7 wilgen en elzen. Het gebied Buitenheide wordt gedomineerd door akkers met sloten en bomenrijen en vormt een geschikt terrein voor weidevogels.

De Stamprooierheide is een voormalig heide- en stuifzandgebied dat begin twintigste eeuw is beplant met grove dennen. Het gebied bestaat uit wilgenstruwelen, lage eikenbossen, open moerasvegetaties en daarnaast uit kleine heidevelden, natte hooilanden, weilanden en dennenbossen.

De Mariahof bestaat uit oude zwem- en visvijvers. In 1998 is het gebied heringericht als natuurgebied. Het gebied kenmerkt zich door het open water en de moerasvegetaties. De enigszins voedselrijke plassen worden omringd door zeggenvelden en rietvegetaties.

Ook komen er nog restanten van natte heide vegetaties voor. Bij de vijvers van de Mariahof komen onder andere de Roerdomp, Zomertaling en IJsvogel voor, evenals diverse soorten libellen en vlinders.

Flora en fauna

De heide van het Hageven is grotendeels vergrast met grassen als Bochtige smele en Pijpenstrootje. De zandvlaktes zijn vastgelegd door Buntgras en Ruig haarmos. Door middel van beheermaatregelen worden er open zandvlaktes gecreëerd voor onder andere Graafwespen, Tapuit, Korstmossen en Zandloopkevers.

In de elzenbossen van de Stamprooierheide komen Elzenzegge, Kamvaren, Moerasvaren en Blauw glidkruid voor. In de naaldbossen broeden mezen, vinken en spechten. De moerasvegetaties bestaan onder andere uit Moerasviooltje, Wateraardbei, Waterdrieblad, Waternavel, Draadzegge, Gele lis en Grote boterbloem. Op de kleine heidevelden komen Kruipbrem, Klokjesgentiaan en Zandblauwtje voor. De plassen van de Mariahof bevatten goed ontwikkelde waterplantenvegetaties. Aanwezige soorten zijn Veenwortel, Pluimzegge, Stijve zegge, Snavelzegge, Hoge cyperzegge, Moeraszegge, Scherpe zegge, Witte waterlelie, Duizendknoopfontein en Haarfonteinkruid. De natte heidevegetaties bestaan uit Gewone dophei, Struikhei, Ronde zonnedaauw, Moeraswolfsklauw, Pijpenstrootje en Wilde gagel.

Status Natura 2000

Gebiedscode: BE-2221314

Voor aangewezen soorten zijn door de Belgische overheid nog geen instandhoudingsdoelen geformuleerd.

Het Natura 2000-gebied Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierheide en Mariahof heeft een totale omvang van 13125 hectare. Het gebied grenst in het noorden

aan het Nederlandse Natura 2000- gebied Leenderbos, Groote Heide en de Plateaux en Weerter- en Budelerbergen & Ringselven. Het gebied overlapt voor een klein deel met de habitatrictlijngebieden 'Hageven, met Dommelvallei, Beverbeekse heide, Warmbeek en Wateringen', 'Abeekvallei met aangrenzen moerasgebieden', 'Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek' en 'Itterbeek met Brand, Jagersborg, Schootsheide en Bergerven'.

Vogelsoorten waarvoor het gebied is aangewezen:

- A229 IJsvogel (broedvogel)
- A222 Velduil (broedvogel)
- A021 Roerdomp (broedvogel)
- A224 Nachtzwaluw (broedvogel)
- A081 Bruine kiekendief (broedvogel)
- A236 Zwarte specht (broedvogel)
- A022 Woudaapje (broedvogel)
- A339 Grauwe klauwier (broedvogel)
- A246 Boomleeuwerik (broedvogel)
- A272 Blauwborst (broedvogel)
- A072 Wespendif (broedvogel)
- A094 Visarend (trekvogel)
- A119 Porseleinhoen (trekvogel)
- A192 Dougalls stern (trekvogel)
- A037 Kleine zwaan (trekvogel)

4 Itterbeek met Brand, Jagersborg, Schootsheide en Bergerven' (België)

Het habitatrictlijngebied Itterbeek met Brand, Jagersborg, Schootsheide en Bergerven valt grotendeels onder het vogelrichtlijn gebied Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierheide en Mariahof (BE-22221314).

Het gebied bestaat uit de boven- en middenloop van de Itterbeek met moerassen, bosgebieden en heiden. Delen van de middenloop van Zander- en Bosbeek zijn opgenomen.

Het dal van de Itterbeek bestaat uit hooilanden, vijvers en bron- en broekbossen. Het elzenbronbos heeft Verspreidbladige goudveil en Bittere veldkers als begeleidende soorten. Hoger op de helling komt wintereiken-beukenbos voor.

Het bosgebied De Brand bestaat voornamelijk uit populieren, sparren, eiken en haagbeuken en met lokaal droge heide. Het gebied heeft een bijzondere vogelrijkdom. Vooral de dichtheid aan vogelsoorten, gebonden aan kleine bosjes, houtkanten, hagen en ruigten, is hoog (nachttegaal, wielewaal). Andere veelvoorkomende vogelsoorten zijn geelgors, tuinfluiter, grasmus, wulp en roodborsttapuit. Ook komen er diverse amfibieën voor, waaronder de heikikker en alpenwatersalamander.

Het Jagersborg is een complex van eiken- en broekbossen met enkele vijvers.

Schootsheide en Bergerven bestaat uit heide en heischrale terreinen Het bevat in hoofdzaak voedselarme biotopen en is een belangrijke groeiplaats van Drijvende waterweegbree. In de Itterbeek en de Bosbeek komt de beekprik voor.

Status Natura 2000

Gebiedscode: BE-2200034

Voor aangewezen habitattypen en soorten zijn door de Belgische overheid nog geen instandhoudingsdoelen geformuleerd.

Het Natura 2000-gebied Itterbeek met Brand, Jagersborg, Schootsheide en Bergerven heeft een totale omvang van 1869 hectare.

Habitattypen waarvoor het gebied is aangewezen:

- H3110 Zeer zwak gebufferde vennen
- H3130 Zwak gebufferde vennen
- H4010 Vochtige heiden
- H4030 Droge heiden
- H6230 Heischrale graslanden
- H6510 Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
- H9190 Oude eikenbossen
- H91E0 Vochtige alluviale bossen

Habitatrichtlijnsoorten waarvoor het gebied is aangewezen:

- H1096 Beekprik
- H1831 Drijvende waterweegbree

Diverse verstoringsfactoren

De diverse verstoringsfactoren worden besproken voor het dichtstbij gelegen gebied. Als de aangevraagde situatie geen effecten heeft op dit dichtstbij gelegen gebied, dan heeft ze zeker geen effecten op de verdere weg gelegen gebieden.

Verlies oppervlak

Verlies aan leefgebied is evident van invloed op planten- en diersoorten. Door afname van het beschikbare oppervlak neemt ook het aantal individuen van een soort af. Om duurzaam te kunnen voortbestaan moet elke soort uit een minimum aantal individuen bestaan; bij diersoorten wordt meestal van een minimum aantal paartjes (reproductieve eenheden) gesproken. Wanneer een populatie te klein wordt neemt de kans op uitsterven toe, zeker als deze populatie geen onderdeel uitmaakt van een samenhangend netwerk van leefgebieden. Bij een populatie die uit te weinig individuen bestaat, neemt ook de kans op inteelt toe en dus de genetische variatie af. Hierdoor wordt een populatie kwetsbaar voor veranderingen tengevolge van bijvoorbeeld predatie, extreme seizoensinvloeden of ziekten. Ook is bij kleine leefgebieden de grens met het omringende landschap relatief langer. Hierdoor neemt de invloed van de directe omgeving op de abiotische gesteldheid van het leefgebied toe. De kwaliteit van het leefgebied kan daardoor worden aangetast.

De voorgenomen ontwikkeling leidt niet tot een verlies aan oppervlakte. De bedrijfsactiviteit in de eerder genoemde bedrijfsgebouwen vinden plaats op ruime afstand van de nabij gelegen natura 2000 gebieden.

Verzuring

Als er stoffen in het milieu terecht komen die leiden tot het zuurder worden van de lucht, neerslag, bodem, oppervlaktewater of grondwater spreken we van verzuring. Dit leidt tot een directe of indirecte afname van de buffercapaciteit (het neutralisatievermogen) van bodem of water. Op termijn resulteert dit proces in een daling van de zuurgraad. Hierdoor zullen voor verzuring gevoelige soorten verdwijnen, wat kan resulteren in een verandering van het habitatype en daarmee mogelijk het verdwijnen van typische (dier)soorten.

De bedrijfsactiviteit vindt voornamelijk plaats binnen gebouwen gelegen buiten de nabij gelegen natura 2000 gebieden. De uitstoot van stoffen in het milieu is verwaarloosbaar klein. De honden hebben beschikking over een uitloopweide. Deze uitloopweide dient als speel en loopruimte voor de dieren. Door de regelmaat waarmee honden worden gehouden, eten en ontlasting, is er minimale uitstoot in speelweide. De uitwerpselen van de dieren worden wekelijks per container afgevoerd. Eventuele stoffen in de ontlasting in de speelweide kunnen door de buffercapaciteit van de grond voldoende worden opgenomen zonder nadelige gevolgen voor verzuring. Daarmee komen er geen stoffen direct in de bodem van natura 2000 gebieden.

Vermesting

Vermesting betreft elke extra aanvoer van voedingsstoffen, met name stikstof en fosfaat. Het kan gaan om aanvoer door de lucht (droge en natte neerslag van ammoniak en stikstofoxiden) of nitraat- en fosfaataanvoer door het oppervlaktewater. Ook verhoogde mineralisatie, dat wil zeggen de omzetting van plantenresten en humus tot voedingsstoffen en CO₂, leidt tot vermisting.

Zoals eerder beschreven vindt de activiteit binnen plaats buiten de natura 2000 gebieden. Vrijwel alle stikstof en fosfaat wordt afgevoerd. Eventuele uitstoot in speelweide is minimaal.

Verzilting en verzoeting

Verzilting treedt op als het water te zout/chloriderijk is voor een optimaal grondgebruik of voor zoete natuurtypen. Verzilting komt voor over het gehele spectrum tussen zoet (<200 mg Cl/l) en zeer zout (> 30.000 mg Cl/l) en is niet beperkt tot zout en brak water. Verzoeting treedt op als het chloridegehalte in het water afneemt, en niet meer geschikt is voor de beoogde zoute of brakke natuurtypen.

De gevraagde ontwikkeling leidt niet tot verzilting of verzoeting van de betrokken gebieden.

Verontreiniging

Er is sprake van verontreiniging wanneer stoffen, die onder natuurlijke omstandigheden niet of in zeer lage concentraties voorkomen, door menselijke activiteiten in een gebied terechtkomen. Het gaat om een zeer brede groep van ecosysteem/gebiedsvreemde stoffen: organische verbindingen, zware metalen, schadelijke stoffen die ontstaan door verbranding of productieprocessen, straling (radioactief en niet radioactief), geneesmiddelen, endocrien werkende stoffen etc.

Er vinden geen productieprocessen plaats. Het betreft een activiteit van zeer beperkte omvang. Bij deze bedrijfsactiviteit komen geen schadelijke stoffen vrij die kunnen leiden tot verontreiniging van het nabij gelegen Natura 2000 gebied.

Verdroging

Er is sprake van verdroging als door menselijk ingrijpen de actuele grondwaterstand lager is dan de gewenste grondwaterstand (weersomstandigheden, bijvoorbeeld de effecten van een droge zomer, tellen niet mee). Als gevolg hiervan ontstaat een vochttekort bij planten die juist van grondwater afhankelijk zijn. Daarnaast treden er veranderingen op doordat de aard en de beschikbaarheid van voedingsstoffen veranderen.

In het kader van Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) dient het hemelwater afkomstig van nieuwe verhardingen en nieuwe gebouwen afgekoppeld te worden. Bij de realisatie van het dierenasiel wordt geen nieuw verhard oppervlakte gerealiseerd. Er vindt daardoor geen verlies plaats van hemelwater. Het komt weer ten goede aan het algehele grondwater. Op de locatie zelf vindt geen grondwater onttrekking plaats. Er

vindt vanuit de voorgenomen activiteit geen significante verslechtering plaats ten aanzien van de verdroging.

Vernatting

Vernatting is het permanent verhogen van het grondwaterpeil door menselijk handelen. Vernatting is een storende factor voor vegetatietypen en soorten die van nature onder drogere omstandigheden voorkomen. Bij verdergaande vernatting kan een gebied ongeschikt worden voor planten en dieren.

Als gevolg van het planvoornemen is er geen vernatting van het natura 2000 gebied te verwachten.

Verandering overstromingsfrequentie

Overstromingen zijn van invloed op de vochttoestand, de zuurgraad, de voedselrijkdom en het zoutgehalte van een gebied. Een verandering in overstromingsfrequentie heeft dus invloed op de genoemde factoren. Voor een voedselarme vegetatie bijvoorbeeld leidt een toenemende overstroming met voedselrijk water tot vermesting: verrijking van de bodem en daardoor verruiging van de vegetatie. Bij boezemlanden die regelmatig worden overstroomd leidt een afname van de overstromingsfrequentie tot verzuring van de bodem, waardoor basen-minnende plantensoorten kunnen verdwijnen. Langdurige overstroming kan leiden tot zuurstofgebrek in de wortels van planten waardoor planten kunnen afsterven.

Het planvoornemen vindt plaats buiten het stroomvoerend en/of waterbergend winterbed van de maas. Ook is het plangebied niet gelegen binnen het overloop gebied van een beek. Van verandering van de overstromingsfrequentie door de gewenste ontwikkeling is geen sprake.

Verstoring door geluid

Voor sommige soortgroepen zijn nadelige effecten van geluidsbelasting bekend. Van broedvogels is bijvoorbeeld bekend dat gebieden met een te hoge geluidsbelasting vermeden worden en dat het reproductiesucces in deze gebieden lager is dan in ongestoorde gebieden.

In verband met milieuprocedure is er een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek geeft als conclusie dat er geen bezwaar bestaat uit akoestisch oogpunt in kader wet geluidshinder. Ten aanzien van geluid geeft het blaffen van de honden een mogelijke verstoring van de instandhoudingsdoelstellingen. In verschillende onderzoeken zijn opvliegafstanden van vogels bepaald. Dit is de afstand van de verstoring totdat een vogel opvliegt. Voor de Grutto en de Wulp, de meest gevoelige vogels varieert de afstand tussen de 134 en 300 meter bij verstoring door een wandelaar. Op basis daarvan kan worden geconcludeerd dat verstoring van vogels tot maximaal 300 meter vanaf de rand van het natura 2000 gebied plaatsvindt. Het dierenasiel wordt op ca. 1,1 kilometer van de rand van het natura 2000 gerealiseerd. Cumulatieve effecten zijn vanaf de Wijffelterbroekdijk 65 te Weert niet te verwachten omdat andere effecten uit te sluiten zijn als gevolg van de realisatie van het dierenasiel.

Verstoring door licht

Kunstmatige verlichting van de nachtelijke omgeving kan tot verstoring van het normale gedrag van soorten leiden. Naar mogelijke effecten is nog vrij weinig onderzoek gedaan. Veel kennis gaat daarom nog niet verder dan het kwalitatief signaleren van risico's. Door de ruime afstand van de activiteit tot aan de genoemde Natura 2000 gebieden, is een verstoring als gevolg van licht niet te verwachten.

Verstoring door mechanische effecten

Door mechanische activiteiten kunnen negatieve effecten op soorten en habitats optreden. Ook hier geldt dat de kennis over effecten vaak nog is beperkt tot het kwalitatief signaleren van risico's.

Door de ruime afstand van de activiteit tot aan de genoemde Natura 2000 gebieden, is een verstoring als gevolg van mechanische effecten niet te verwachten

Verandering in populatie dynamiek

De activiteit heeft een dermate beperkte invloed op de diverse beïnvloedingsfactoren dat er als gevolg van deze activiteit geen gevolgen voor de populatiedynamiek zijn te verwachten.

Bewuste verandering soorten samenstelling

De gevraagde activiteit brengt geen bewuste verandering van de soorten samenstelling met zich mee.

Conclusie

Namens de VOF Vleeshouwers, voor de inrichting te Wijffelterbroekdijk 65 te Weert, wordt een Nb-wet vergunning gevraagd bij de Provincie Limburg. Het bedrijf houdt zich bezig met de tijdelijke huisvesting van honden en katten. Hiervoor worden op het terrein van de inrichting huisvestinggebouwen voor honden en katten gerealiseerd, waarin totaal 40 honden en 100 katten gelijktijdig kunnen worden gehuisvest.

In verband met milieuprocedure is er een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek geeft als conclusie dat er geen bezwaar bestaat uit akoestisch oogpunt. De gevraagde ontwikkeling heeft geen significante negatieve invloed op de beschermde natuurwaarden van de gebieden. Er zal derhalve geen sprake zijn van aantasting van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebieden: "Weerter- en Budelerbergen & Ringselven", "Abeek met aangrenzende moerasgebieden," "Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof" en "Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven".

Op grond van bovenstaande kan geconcludeerd worden dat voor voorgenomen bedrijfsactiviteit een vergunning in het kader van NB wet 1998 verleend kan worden.



Arvalis Adviseurs
Staat 40
6031 EM NEDERWEERT

Cluster	VRG	Behandeld	mevrouw G. Sharifzadeh
Zaaknummer	2014-0578	Telefoon	(043) 389 77 13
Ons kenmerk	2014/32470	Fax	(043) 389 78 11
		E-mail	g.sharifzadeh@prvlimburg.nl
Uw kenmerk	20140602/JHeuvelmans/5632770	Maastricht	19 juni 2014
Bijlage(n)	-	Verzonden	19 JUNI 2014

Onderwerp

Bericht van ontvangst

Geachte heer, mevrouw,

Op 12 juni 2014 hebben wij uw, namens VOF Vleeshouwers ingediende aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 19d / artikel 16 van de Natuurbeschermingswet 1998 ontvangen. Deze aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2014-0578.

Op de voorbereiding van de beschikking op uw aanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Dit in aanvulling op de in hoofdstuk VIII van de Natuurbeschermingswet 1998 genoemde voorbereiding. Tevens is de kring van inspraakgerechtigden verruimd tot een ieder. Dit betekent dat een ieder zijn zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren kan brengen.

Omdat door toepassing van afdeling 3.4 Awb de in de Natuurbeschermingswet 1998 gestelde beslistermijn van 13 weken in het algemeen te kort is om een definitief besluit te nemen op een aanvraag, verlengen wij de beslistermijn eenmalig met 13 weken. Dit betekent dat wij uiterlijk binnen een termijn van 26 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit zullen nemen op uw aanvraag. Uiteraard streven wij ernaar om de beslistermijn zo kort mogelijk te houden.

Wij verzoeken u bij alle correspondentie het aangehaalde zaaknummer te vermelden.



Op www.limburg.nl/vergunningen kunt u vergunningsbesluiten raadplegen.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

ing. E.A.P.H. Haesen,
Clustermanager Vergunningen