



Boekenbruglaan 61

Quickscan natuur

Gemeente Teylingen

4 oktober 2022

Project
Opdrachtgever

Boekenbruglaan 61
Gemeente Teylingen

Document
Status
Datum
Referentie

Quicksan natuur
Concept 01
4 oktober 2022
129715/22-014.095

Projectcode
Projectleider
Projectdirecteur

129715
[Redacted]
[Redacted]

Auteur(s)
[Redacted]
Goedgekeurd door

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Paraaf

[Redacted]

Adres

Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Witteveen+Bos is gecertificeerd op basis van ISO 9001.
© Witteveen+Bos

Niets uit dit document mag worden veeleenvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Witteveen+Bos noch mag het zonder dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd, behoudens schriftelijk anders overeengekomen. Witteveen+Bos aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade die voortvloeit uit of verband houdt met het wijzigen van de inhoud van het door Witteveen+Bos geleverde document.

INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	5
1.1	Aanleiding	5
1.2	Doel	5
1.3	Leeswijzer	5
2	PLANGEBIED	6
2.1	Beschrijving	6
2.2	Werkzaamheden	7
3	TOETSINGSKADER	8
3.1	Wet natuurbescherming	8
3.1.1	Gebiedsbescherming	8
3.1.2	Soortenbescherming	8
3.2	Natuurnetwerk Nederland (NNN)	10
4	GEBIEDSBESCHERMING	12
4.1	Natura 2000 (Wet natuurbescherming)	12
4.1.1	Gegevens	12
4.1.2	Effecten en conclusie	14
4.2	Natuurnetwerk Nederland	14
4.2.1	Gegevens	14
4.2.2	Effecten & conclusie	15
5	SOORTENBESCHERMING	16
5.1	Methode	16
5.2	Beschrijving per soortgroep	16
5.2.1	Flora	16
5.2.2	Grondgebonden zoogdieren	18
5.2.3	Vleermuizen	19
5.2.4	Vogels	22
5.2.5	Amfibieën	25
5.2.6	Reptielen	28

5.2.7	Vis	28
5.2.8	Vlinders, libellen en andere ongewervelden	28
6	SAMENVATTING	31
6.1	Gebiedsbescherming	31
6.2	Soortenbescherming	31
7	LITERATUUR	34
	Laatste pagina	34
	Bijlage(n)	Aantal pagina's
I	Instandhoudingsdoelstellingen (IHD's) Natura 2000	2

1

INLEIDING

1.1 Aanleiding

In opdracht van de gemeente Teylingen is door Witteveen+Bos quickscan natuur uitgevoerd ten behoeve van voorgenomen herontwikkeling van de Boekenburglaan 61 te Voorhout. Het adres bevindt zich aan de rand van de nieuw te ontwikkelen woonwijk Nieuw Boekhorst. De sloop van Boekenburglaan 61 en het nieuw ontwikkelen van dit adres is niet meegenomen in het bestemmingsplan voor Nieuw Boekhorst en wordt via een apart bestemmingsplan geregeld.

De sloop van de gebouwen en ontwikkeling van de locatie kunnen effecten hebben op beschermde natuurwaarden in en rondom het plangebied. In deze quickscan worden mogelijke effecten op beschermde gebieden (Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland) en beschermde soorten door de geplande werkzaamheden beoordeeld en getoetst. Naast het bepalen van de effecten van het voornemen op beschermde gebieden en soorten, worden ook de juridische consequenties en de eventueel noodzakelijke vervolgstappen, zoals een ontheffingsaanvraag en eventuele mitigerende en/of compenserende maatregelen, inzichtelijk gemaakt.

1.2 Doel

Het doel van deze quickscan is om te toetsen:

- welke effecten de werkzaamheden hebben op:
 - beschermde gebieden (Natura 2000) in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb);
 - het Natuurnetwerk Nederland (NNN);
 - beschermde soorten in het kader van de Wet natuurbescherming;
- wat de consequenties van deze mogelijke effecten zijn in het kader van de natuurwetgeving en het natuurbeleid (ontheffings- en/of vergunningaanvraag in combinatie met mitigerende/compenserende maatregelen).

1.3 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft het plangebied en de geplande werkzaamheden. Hoofdstuk 3 gaat in op het toetsingskader in relatie tot de natuurwet- en regelgeving. In hoofdstuk 4 wordt verkend of effecten zijn te verwachten op beschermde gebieden die vallen binnen de Wnb en het Natuurnetwerk Nederland. Hoofdstuk 5 beschrijft of er voor het kappen van een deel van het kleine bos een omgevingsvergunning kappen of melding Wet natuurbescherming houtopstanden nodig is. In hoofdstuk 6 wordt per soortgroep beschreven of in of nabij het plangebied beschermde soorten aanwezig zijn en wat de effecten van het voornemen op deze beschermde soorten Wnb zijn. In hoofdstuk 7 zijn de belangrijkste conclusies samengevat en in hoofdstuk 8 is de geraadpleegde literatuur weergegeven.

2

PLANGEBIED

2.1 Beschrijving

Het plangebied, de panden van Boekenburglaan 61, is gelegen aan de noordwest zijde van Voorhout en aan de rand van de nieuw te ontwikkelen woonwijk Nieuw Boekhorst. Het plangebied bestaat uit een woning met bijbehorende schuren en deel van een kas op een agrarisch erf met bij de woning een tuin. De tuin bestaat deels uit gras, is deels aangeplant met gecultiveerde beplanting en er zijn een paar coniferen en kleine bomen aanwezig. Er bevinden zich drie watergangen nabij het plangebied. Ten zuidoosten van het plangebied bevindt zich een primaire watergang, de Molentocht. Ten noordoosten en zuidwesten van het plangebied zijn twee kleine poldersloot aanwezig. De watergangen worden niet gedempt. Aan de noordkant rond het plangebied bevindt zich de polder waar de woonwijk Nieuw Boekhorst gerealiseerd gaat worden. In afbeelding 2.1 is de ligging en in afbeelding 2.2 een impressie van het plangebied weergegeven.

Afbeelding 2.1 Ligging plangebied



Afbeelding 2.2 Impressie plangebied



2.2 Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het slopen van alle binnen het plangebied aanwezige bebouwing en het verwijderen van het erf met de aanwezige beplanting. Binnen het plangebied worden vervolgens drie woningen gebouwd. De exacte planning voor de werkzaamheden is nog niet bekend. Daarom geldt voor deze quickscan natuur het uitgangspunt dat de werkzaamheden gedurende het hele jaar uitgevoerd kunnen worden.

TOETSINGSKADER

3.1 Wet natuurbescherming

3.1.1 Gebiedsbescherming

In hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming zijn de bepalingen voor gebiedsbescherming vastgelegd. De regels hebben als doel het beschermen en in stand houden van natuurgebieden met bijzondere of kwetsbare waarden. Hiermee zijn internationale verplichtingen uit de Vogelrichtlijn (VR) en Habitatrichtlijn (HR), maar ook verdragen als bijvoorbeeld het Verdrag van Ramsar (Wetlands) in nationale regelgeving verankerd.

Nederland past een vergunningstelsel toe bij de bescherming van Natura 2000-gebieden. Projecten die, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, significante gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied, zijn volgens artikel 2.7 lid 2 van de Wet natuurbescherming vergunningplichtig.

Voor elke ontwikkeling in of nabij een Natura 2000-gebied dient te worden beoordeeld of kan worden uitgesloten dat de werkzaamheden/ontwikkeling een significant negatief effect hebben op de beschermde natuurwaarden in het betreffende gebied. Indien significant negatieve effecten niet op voorhand kunnen worden uitgesloten, dient een 'passende beoordeling' te worden uitgevoerd.

In het geval de passende beoordeling niet de zekerheid verschaft dat er geen sprake is van een aantasting van de natuurlijke kenmerken van het betrokken Natura 2000-gebied, moet de vergunning, c.q. de instemming, worden geweigerd, tenzij aan de 'ADC-criteria' voldaan wordt. Dit betekent dat er geen alternatieven zijn (A), er sprake is van bij de wet genoemd belang (D) en dat door compensatie de algehele samenhang van het Natura 2000-netwerk gewaarborgd blijft (C).

Effecten op Natura 2000-gebieden worden beoordeeld aan de hand van de IHD die in de aanwijzingsbesluiten voor de betreffende gebieden zijn vastgesteld. IHD betreffen zowel habitattypen als habitat- en vogelsoorten. In het kader van de alternatievenafweging wordt beoordeeld of er onderscheid is in de mate waarin de verschillende alternatieven effect hebben op de IHD en of er voor de verschillende alternatieven de kans bestaat dat significant negatieve effecten optreden.

3.1.2 Soortenbescherming

Onder de Wet natuurbescherming bestaat de soortenbescherming uit drie beschermingsregimes: een beschermingsregime voor Vogelrichtlijnsoorten (art. 3.1), Habitatrichtlijnsoorten (art. 3.5) en 'Andere soorten' (art. 3.10). Voor ieder van deze regimes gelden afzonderlijke verbodsbepalingen. In de navolgende paragrafen worden de verbodsbepalingen waaraan getoetst wordt, toegelicht.

Vogelrichtlijnsoorten

Het beschermingsregime voor Vogelrichtlijnsoorten heeft betrekking op de soorten zoals aangeduid in artikel 1 van de Vogelrichtlijn. Dit betreft alle van nature in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied. Voor vogelsoorten gelden de volgende verbodsbepalingen:

- het is verboden opzettelijk vogels te doden of te vangen (artikel 3.1, lid 1, Wnb);
- het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te beschadigen, of nesten weg te nemen (artikel 3.1, lid 2, Wnb);
- het is verboden eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben (artikel 3.1, lid 3, Wnb);
- het is verboden vogels opzettelijk te storen (artikel 3.1, lid 4, Wnb).

Het laatste verbod is echter niet aan de orde indien kan worden onderbouwd dat de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. Het bepalen of sprake is van een wezenlijke invloed is per soort en per situatie maatwerk.

De meeste vogelsoorten maken elk broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat om een nieuw nest te maken. Deze vogelnesten voor eenmalig gebruik vallen alleen tijdens het broedseizoen onder de hiervoor beschreven verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming. Voor deze soorten is geen ontheffing nodig voor werkzaamheden buiten het broedseizoen. Buiten het broedseizoen mogen deze nesten worden verwijderd of verplaatst, tenzij in specifieke situaties er een ecologisch zwaarwegend belang is om nesten die normaliter niet jaarrond beschermd zijn toch jaarrond te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer door een ingreep een groot deel van de nestgelegenheid van een bepaalde populatie dreigt te verdwijnen. Voor het verstoren van vogels (in het broedseizoen) is het verkrijgen van een ontheffing in principe niet mogelijk omdat bijna altijd een alternatief voorhanden is, namelijk werken wanneer geen broedende vogels aanwezig zijn. De Wet natuurbescherming kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Het gaat erom of er een broedgeval is.

De verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming zijn altijd relevant voor vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten. Jaarrond beschermde nesten zijn:

- 1 nesten die buiten het broedseizoen worden gebruikt als vaste rust- en verblijfplaats (bijvoorbeeld steenuil);
- 2 nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop (bijvoorbeeld roek, gierzwaluw en huismus);
- 3 nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing (bijvoorbeeld ooievaar, kerkuil en slechtvalk);
- 4 vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen (bijvoorbeeld boomvalk, buizerd en ransuil).

Habitatrichtlijnsoorten

Het beschermingsregime voor Habitatrichtlijnsoorten heeft betrekking op in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn. De verbodsbepaling voor flora heeft betrekking op soorten (in hun natuurlijke verspreidingsgebied) uit bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern.

Voor deze fauna en flora van de Habitatrichtlijn gelden de volgende verbodsbepalingen:

- het is verboden dieren opzettelijk te doden of te vangen (artikel 3.5, lid 1, Wnb);
- het is verboden dieren opzettelijk te verstoren (artikel 3.5, lid 2, Wnb);
- het is verboden eieren opzettelijk te vernielen of te rapen (artikel 3.5, lid 3, Wnb);
- het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen (artikel 3.5, lid 4, Wnb);
- het is verboden planten opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen (artikel 3.5, lid 5, Wnb).

Als deze verbodsbepalingen voor deze soorten worden overtreden, moet een ontheffing van de Wet natuurbescherming worden aangevraagd.

'Andere soorten'

Het beschermingsregime voor de 'Andere soorten' heeft betrekking op de soorten uit bijlage A en B bij de Wet natuurbescherming. Hierin zijn lijsten met overige plant- en diersoorten opgenomen die, buiten de Vogel- en Habitatrichtlijn om, nationaal beschermd worden. Voor deze soorten gelden de volgende

verbodsbepalingen:

- het is verboden dieren opzettelijk te doden of te vangen (artikel 3.10, lid 1, sub a, Wnb);
- het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren opzettelijk te beschadigen of te vernielen (artikel 3.10, lid 1, sub b, Wnb);
- het is verboden vaatplanten opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen (artikel 3.10, lid 1, sub c, Wnb).

Binnen de soortenlijsten in bijlage A en B bij de Wet natuurbescherming is geen onderscheid gemaakt tussen licht en zwaar beschermde soorten. Zowel het Ministerie van LNV als de provincies zijn bevoegd om binnen deze lijsten soorten aan te wijzen waarvoor een vrijstelling geldt of waarvoor aangepaste voorwaarden gelden in het geval van een ontheffingsaanvraag.

Als er sprake is van een overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van deze soorten is een ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig.

Zorgplicht

In artikel 1.11 lid 1 en lid 2 van de Wet natuurbescherming is de zorgplicht beschreven: 'Eenieder neemt voldoende zorg in acht voor in het wild levende dieren en hun directe leefomgeving. Eenieder laat handelingen na, waarvan redelijkerwijs te vermoeden is, dat ze nadelig zijn voor in het wild levende dieren. Als dat nalaten in redelijkheid niet gevergd kan worden, dienen de gevolgen van dat handelen voor die dieren zoveel mogelijk voorkomen, beperkt of ongedaan gemaakt te worden'. De zorgplicht geldt altijd.

3.2 Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Het plangebied ligt in de provincie Zuid-Holland. Het Provinciale NNN-beleid is uitgezet in de Omgevingsvisie Zuid-Holland (2019) en de Omgevingsverordening Zuid-Holland (2019), beide zijn geconsolideerd in 2022. In de Omgevingsverordening Zuid-Holland (2019) is de nadere regelgeving omtrent de NNN opgesteld. Hierin wordt verder verwezen naar het Natuurbeheerplan en de Beleidsregel Compensatie Natuur, Recreatie en Landschap Zuid-Holland 2013 (hierna Beleidsregel Compensatie), waarin bepalingen met betrekking tot het beheer en de compensatie bij aantasting van de NNN zijn opgenomen.

Omgevingsverordening Zuid-Holland 2019

In de provincie Zuid-Holland kent de bescherming van het NNN geen externe werking. In artikel 6.24 van de Omgevingsverordening Zuid-Holland 2019 is wel vastgesteld dat geen bestemmingen *in* gebieden aangeduid als NNN of als strategische reservering natuur mogelijk zijn als deze de wezenlijke kenmerken en waarden van deze gebieden significant beperken, of leiden tot een significante vermindering van de oppervlakte, kwaliteit en/of samenhang. Indien dat wel gebeurt, moet er compensatie plaatsvinden, waaraan de volgende voorwaarden zijn verbonden:

- 1 de compensatie leidt niet tot een nettoverlies van areaal, samenhang en kwaliteit van de wezenlijke kenmerken en waarden;
- 2 de compensatie vindt plaats:
 - 1 aansluitend aan of nabij het aangetaste gebied, met dien verstande dat een duurzame situatie ontstaat;
 - 2 door realisering van kwalitatief gelijkwaardige waarden of fysieke compensatie op afstand van het gebied als fysieke compensatie aansluitend aan of nabij het gebied niet mogelijk is; of
 - 3 op financiële wijze als zowel fysieke compensatie als compensatie door kwalitatief gelijkwaardige aarden op korte termijn redelijkerwijs niet mogelijk is.

In artikel 6.24 zijn tevens de ontheffingsbepalingen gegeven, waarin als voorwaarden aan een ontheffing bij bestemmingen in NNN-gebied of in gebieden aangewezen als Belangrijk weidevogelgebied dat, er geen reële alternatieven mogelijk zijn en dat de aangetaste waarden gecompenseerd worden.

Nee, tenzij-regime

Het Nee, tenzij-regime is van toepassing op ingrepen in de NNN 'op het land', in de Belangrijke weidevogelgebieden, in de recreatiegebieden in de Zuidvleugel en in de gebieden in de strategische reservering natuur. Dat wil zeggen dat er in deze gebieden geen nieuwe (ruimtelijke en niet-ruimtelijke) ontwikkelingen zijn toegestaan die de wezenlijke kenmerken en waarden van deze gebieden significant aantasten, tenzij daarmee een groot openbaar belang gediend is en er geen reële andere mogelijkheden voorhanden zijn. In dat geval moet de schade zoveel mogelijk beperkt worden door het treffen van mitigerende maatregelen en moet de resterende schade gecompenseerd worden. In principe zijn alle plannen of projecten die ertoe leiden dat delen van de NNN, Belangrijke weidevogelgebieden, recreatiegebieden in de Zuidvleugel en gebieden in de strategische reservering natuur een andere bestemming moeten krijgen, en daardoor in oppervlakte afnemen, als significant aan te merken.

4


GEBIEDSBESCHERMING

4.1 Natura 2000 (Wet natuurbescherming)

4.1.1 Gegevens

De dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden zijn 'Kennemerland-Zuid' op circa 3,2 km, 'Coepelduynen' op circa 3,3 km en 'Meijndel & Berkheide' op circa 5,8 km ten westen van het plangebied. Alle drie de Natura 2000-gebieden betreffen Habitatrichtlijngebieden. In afbeelding 4.1 is de ligging van het plangebied ten opzichte van de Natura 2000-gebieden in de omgeving weergegeven.

Afbeelding 4.1 Ligging Natura 2000-gebieden in de omgeving van het plangebied [lit. 1]



Hieronder wordt voor het Natura 2000-gebied een korte beschrijving gegeven van het gebied en van relevante aandachtspunten met betrekking tot het gebied.

Kennemerland-Zuid

Kennemerland-Zuid is een uitgestrekt duingebied aan de zuidkant van het Noordzeekanaal. Het is een reliëfrijk en landschappelijk afwisselend gebied, dat grotendeels bestaat uit kalkrijke duinen. De overgang tussen de kalkrijke jonge duinen en ontcalciteerde oude duinen ligt ter hoogte van Zandvoort. Dit levert een soortenrijke en kenmerkende begroeiing op, met duinroosvegetaties in het open duin, duingraslanden, vochtige en droge duinvalleien, plasjes, goed ontwikkelde struwelen en diverse vormen van duinbossen. Vegetaties van vochtige en natte duinvalleien komen met name voor ten zuiden van Zandvoort, waarvan het Houtglob het best ontwikkelde kalkrijke, natte duinvallei is. Het areaal kalkrijk duingrasland is vooral rondom Zandvoort groot. Hier komen over voorbeelden van het zeedorpenlandschap voor. De oudere duinen van het zuidoostelijk gedeelte herbergen goed ontwikkeld kalkarm duingrasland. Ook zijn er in het zuidelijke puntje en ter hoogte van Zandvoort paraboolduincomplexen aanwezig. Het Kennemerstrand is de enige locatie langs de Hollandse vastelandsduinen waar een jonge strandvlakte met embryonale duinen en een uitgestrekte oppervlakte met kalkrijke duinvalleien aanwezig is. Aan de binnenduintrand zijn diverse landgoederen aanwezig. Hier zijn een aantal oude buitenplaatsen gelegen, die voor een aanzienlijk deel bebost zijn met naaldbos en loofbos, waaronder oude bossen met rijke stinze flora [lit. 2].

Voor dit Natura 2000-gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen (IHD) geformuleerd voor 17 habitattypen en vier habitatsoorten. Een volledig overzicht van deze typen en soorten en de bijhorende instandhoudingsdoelstellingen is opgenomen in bijlage I.

Coepelduynen

De Coepelduynen omvatten de smalle strook kustduinen tussen Katwijk en Noordwijk. Het relatief kleine gebied heeft een gevarieerd duinlandschap dat reliëfrijk en landschappelijk zeer afwisselend is. Het gebied behoort tot de kalkrijke jonge duinen. Er is geen duidelijke binnenduintrand aanwezig, waardoor de overgang naar het polderlandschap vrij abrupt is. Delen zijn in het verleden door de mens beïnvloed en gebruikt voor het drogen van netten, het weiden van vee en als duinakkers. Hierdoor is een specifiek open duinlandschap ontstaan met een afwisseling van duingraslanden, struwelen en bos waarin waardevolle flora en fauna voorkomt. Zo zijn er twee duinvalleien, Guytendel en Spijkerdel. Van 1890 tot 1965 werden deze duinpannen gebruikt als aardappelveld. Recent zijn hier natuurherstelmaatregelen getroffen door de valleien uit te graven tot op het grondwaterniveau. Er komen op grote schaal goed ontwikkelde, kalkrijke duingraslanden voor die kenmerkend zijn voor het zeedorpenlandschap, met daarin veel zeldzame plantensoorten [lit. 2].

Voor dit Natura 2000-gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen (IHD) geformuleerd voor zeven habitattypen. Er zijn geen habitatsoorten aangewezen. Een volledig overzicht van deze typen en soorten en de bijhorende instandhoudingsdoelstellingen is opgenomen in bijlage I.

Meijndel & Berkheide

Meijndel en Berkheide bestaat uit een brede duinstrook met een gevarieerd en uitgestrekt, kalkrijk duinlandschap, dat reliëfrijk en landschappelijk zeer afwisselend is. Het zuidelijke deelgebied Meijndel is een relatief laag gelegen gebied met grote 'uitgestorven duinvlakten', dat in het zuidelijk deel minder reliëfrijk is. In het noordelijke deelgebied Berkheide liep het zand vast in de oorspronkelijk natte stroombedding van de oude Rijn. Het is gevormd door overstuiving van oude duinen, waardoor het een relatief hooggelegen duinmassief is. Hier is de kweldruk dan ook groter dan in Meijndel. Het landschap heeft een kenmerkende opbouw van evenwijdige duinenrijen met opeenvolgende hoge paraboolduinen en moerassige laagten met struweel, waarin grote valleien liggen zoals Kijfhoek, Bierlap en de vallei Meijndel. Dit zijn duinakkers die nu vooral uit bos bestaan; het gebied kent dan ook een aantal goed ontwikkelde bostypen. Plaatselijk, zoals in de Libellenvallei, komen soortenrijke duinvalleibegroeiingen voor. Na grootschalig herstel van een aantal valleien bij de Wassenaarse Slag breiden deze begroeiingen zich uit. In Berkheide is, met name in de buurt van Katwijk, een groot areaal goed ontwikkeld kalkrijk duingrasland aanwezig, ontstaan door het eeuwenlange menselijke gebruik van het zogenaamde zeedorpenlandschap [lit. 2].

Voor dit Natura 2000-gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen (IHD) geformuleerd voor 14 habitattypen en vier habitatsoorten. Een volledig overzicht van deze typen en soorten en de bijhorende instandhoudingsdoelstellingen is opgenomen in bijlage I.

4.1.2 Effecten en conclusie

Fysieke effecten

Het plangebied ligt op een afstand van circa 3,2 km van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied. Als gevolg van deze afstand en tussenliggende obstakels, zoals bebouwing, kan worden uitgesloten dat directe effecten zoals oppervlakteverlies en verstoring door geluid, licht, trilling of optische verstoring optreden binnen de Natura 2000-gebieden.

Stikstofdepositie

Op 1 juli 2021 zijn de Wet natuurbescherming (Wnb) en het Besluit natuurbescherming (Bnb) op onderdelen gewijzigd. Eén van deze onderdelen is de partiële vrijstelling van de Natura 2000-vergunningsplicht op grond van artikel 2.9a Wnb, welke geldt voor de volgende activiteiten (artikel 2.5 Bnb):

- het verrichten van een bouwactiviteit of een sloopactiviteit die het feitelijk verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden aan een bouwwerk betreft, met inbegrip van de daarmee samenhangende vervoersbewegingen;
- het aanleggen, veranderen of verwijderen van een werk, met inbegrip van de daarmee samenhangende vervoersbewegingen.

De werkzaamheden bij Boekenburglaan 61 vallen onder het verrichten van een sloop- en bouwactiviteit. Concreet betekent dit dat de werkzaamheden onder de vrijstelling vallen en de gevolgen van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden als gevolg van de werkzaamheden niet vergunningsplichtig zijn. Deze gevolgen hoeven om deze reden ook niet verder onderzocht te worden. De vrijstelling geldt echter niet voor de gebruiksfase van de locatie. Daarom is voor de gebruiksfase een AERIUS-berekening uitgevoerd (Uitgangspunten en resultaten stikstofdepositie, referentie 129715/22-004.7145). Hieruit blijkt dat op voorhand uitgesloten kan worden dat negatieve effecten optreden op Natura 2000-gebieden ten gevolge van stikstofdepositie. Het planvoornemen is inpasbaar binnen de voorschriften van de Wnb.

Indirecte effecten

Indirecte effecten kunnen een zeer grote reikwijdte hebben. Voorbeelden van mogelijke indirecte effecten zijn 'verzuring', 'verzoeting', 'verziltig', 'verontreiniging', 'verdroging' of 'vernatting'. De voorgenomen werkzaamheden zorgen niet voor één van deze effecten binnen de omliggende Natura 2000-gebieden omdat de werkzaamheden geen effect hebben op de waterhuishouding of verontreiniging veroorzaken.

4.2 Natuurnetwerk Nederland

4.2.1 Gegevens

In de directe omgeving van het plangebied bevinden zich gebieden behorende tot het NNN-netwerk van de provincie Zuid-Holland. De dichtstbijzijnde percelen van het NNN-netwerk zijn gelegen op een afstand van circa 370 meter. De wezenlijke kenmerken en waarden van het dichtstbijzijnde deel van het NNN worden gevormd door de natuurbeheertypen N00.01 (Nog om te vormen naar natuur). In afbeelding 4.2 is de ligging van het NNN ten opzichte van het plangebied weergegeven.

Afbeelding 4.2 Ligging van het plangebied ten opzichte van het Natuurnetwerk Nederland [lit. 3]



4.2.2 Effecten & conclusie

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van het NNN, waardoor ruimtebeslag van het voornemen in NNB-gebieden op voorhand is uitgesloten. Daarbij grenst het plangebied ook niet direct aan het NNN. De provincie Zuid-Holland hanteert voor het NNN geen externe werking als toetsingscriterium. Een nadere procedure in de vorm van een 'Nee, tenzij-toets' is niet noodzakelijk waardoor belemmeringen vanuit provinciaal natuurbeleid niet aan de orde zijn.

5

SOORTENBESCHERMING

5.1 Methode

Om de aanwezigheid van beschermde flora en fauna in of rondom het plangebied vast te kunnen stellen is een bureaustudie uitgevoerd en is gebruik gemaakt van gebiedskennis op basis van verschillende veldbezoeken in 2021 en 2022 in het gebied in het kader van de te realiseren woonwijk Nieuw-Boekhorst. De bureaustudie bestaat uit het raadplegen van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) [lit. 4]. Aanvullend hierop zijn, als daar aanleiding voor is, verspreidingsatlassen, internetbronnen en de op internet vrij verkrijgbare verspreidingsgegevens geraadpleegd. Soortgerichte inventarisaties en tellingen van afzonderlijke dier- en plantensoorten waren geen onderdeel van het onderzoek. De inventarisatie is niet vlakdekkend en slechts indicatief, maar is voor deze fase voldoende gedetailleerd.

Op basis van de biotoopeisen van beschermde soorten, de gebiedskennis van de betrokken ecologen en de resultaten van de bureaustudie is bepaald of beschermde soorten leefgebied kunnen vinden in en nabij het plangebied en of daar nader onderzoek naar nodig is. Aan de hand van de geplande werkzaamheden en de verstoringgevoeligheid van soorten is vervolgens bepaald of negatieve effecten kunnen optreden, en of sprake is van een overtreding van de Wnb.

5.2 Beschrijving per soortgroep

5.2.1 Flora

Bureaustudie

Uit de database van de NDFF [lit. 4] blijkt dat de afgelopen vijf jaar binnen drie kilometer van het plangebied alleen de beschermde plantsoorten akkerboterbloem en tengere distel zijn waargenomen.

De meeste onder de Wnb beschermde flora zijn zeldzaam tot zeer zeldzaam en komen voor in zeer specifieke biotopen. Voorbeelden van biotopen waar onder de Wnb beschermde flora lokaal kunnen voorkomen zijn loof- en naaldbossen, hakhout en struwelen op kalkrijke, humeuze, vrij voedselarme, compacte en lemige bodems. Ook in heiden en borstelgraslanden en in onbemeste riet- en hooilanden, leemrijke akker (vooral onder wintergraan), op rivierduintjes, in kalkgraslanden en lemige blauwgraslanden, in duinvalleien en soms in het winterbed van rivieren komen de soorten voor. Daarnaast zijn enkele soorten specifiek gebonden aan stenig substraat. Deze soorten zijn te vinden op rotsen, puinhellingen en oude (kalkrijke) muren.

Afbeelding 5.1 Waarnemingen uit de NDFF van beschermde flora in de omgeving van het plangebied (rode contour) [lit. 4]¹



De biotoopeisen van deze soort worden in onderstaand kader beschreven.

Akkerboterbloem

Akkerboterbloem is te vinden op zonnige, open plekken op matig voedselrijke, vrij droge tot vochtige, kalkrijke, leemrijke grond. Ze groeit in wintergraanakkers, zelden op omgewerkte grond en ruderaal plaatsen. Akkerboterbloem is zeer zeldzaam in Zuid-Limburg en bijna verdwenen in het rivierengebied [lit. 5].

Tengere distel

Tengere distel groeit bij voorkeur in de nabijheid van de zee kust, grazige plekken in de duinen, op zeekliffen en op verstoorte plaatsen in bermen, in kalkrijke ruigten, op bouw- en haventerreinen en op dijken. Het heeft matig voedselrijke tot voedselrijke grond nodig die droog en zonnig is [lit. 5].

Beoordeling op basis van gebiedskennis

Tijdens veldbezoeken in het gebied is geen beschermde flora waargenomen. Daarbij bestaat het plangebied uit een woning met schuren, een kas en een tuin. Het betreft een ruderaal terrein dat niet geschikt is voor akkerboterbloem en waarbij er geen wintergraanakker aanwezig is. Ook voor tengere distel is geen geschikt biotoop aanwezig. Er is in het plangebied geen sprake van duinen, verstoorte plaatsen in bermen of kalkrijke ruigten en bouw- en of haventerreinen op dijken. Op basis van de gebiedskenmerken (gebouwen met agrarisch erf en tuin) biedt het plangebied ook geen geschikt biotoop voor andere beschermde flora. Het voorkomen van beschermde flora wordt daarom uitgesloten.

Effecten en conclusie

Uit de database van de NDFF [lit. 4] blijkt dat in de wijdere omgeving (circa 3 km) van het plangebied gedurende de afgelopen vijf jaar alleen enkele waarnemingen de beschermde plantsoorten akkerboterbloem

¹ Deze informatie is (deels) afkomstig uit de NDFF en mag niet zonder toestemming van BIJ12 worden verstrekt aan derden of op enige andere wijze openbaar gemaakt worden.

en tengere distel bekend zijn. Op basis van de locatie en gebiedskenmerken is het voorkomen van onder de Wnb beschermde flora in het plangebied uitgesloten. Hierdoor zijn negatieve effecten voor deze soortgroep niet aan de orde. Vervolgstappen in het kader van de Wnb zijn niet nodig.

5.2.2 Grondgebonden zoogdieren

Bureaustudie

Op basis van de NDFF databank [lit. 4] zijn in de afgelopen vijf jaar in de wijde omgeving (<3 km) van het plangebied verschillende waarnemingen bekend van de in Zuid-Holland vrijgestelde 'Andere soorten' bunzing, dwergmuis, egel, haas, huisspitsmuis, ree, veldmuis, vos en woelrat. Daarnaast zijn waarnemingen bekend van de in Zuid-Holland niet vrijgestelde 'Andere soorten' boommarter. Er zijn geen waarnemingen van Habitatrichtlijnsoorten bekend. In afbeelding 5.1 zijn de waarnemingen van beschermde en niet vrijgestelde grondgebonden zoogdieren weergegeven.

Afbeelding 5.2 Waarnemingen uit de NDFF van beschermde zoogdieren in de omgeving van het plangebied (rode contour) [lit. 4]¹



De biotoopeisen van deze soorten worden in onderstaand kader beschreven.

Boommarter

De boommarter leeft bij voorkeur in bossen. Als behendige klimmer en springer kan hij zijn leefgebied vanaf de grond tot in de boomtoppen benutten. Bij de boommarter wordt al gauw gedacht aan oud (loof)bos. In Nederland klopt dat beeld in ieder geval niet; de boommarter komt hier in allerlei typen en leeftijden bos voor. Boommarters leven bijvoorbeeld ook in de jonge bossen van de Flevopolders en in Moerasbossen in Overijssel en Utrecht [lit. 6].

¹ Deze informatie is (deels) afkomstig uit de NDFF en mag niet zonder toestemming van BIJ12 worden verstrekt aan derden of op enige andere wijze openbaar gemaakt worden.

Beoordeling op basis van gebiedskennis

Er zijn in het gebied geen waarnemingen gedaan van, onder de Wnb, beschermde grondgebonden zoogdiersoorten. Het plangebied biedt wel geschikt biotoop aan verschillende algemeen voorkomende soorten ('Andere soorten'), zoals egel, haas, konijn, vos en verschillende algemeen voorkomende muissoorten.

Het plangebied biedt geen geschikt biotoop aan boommarter. Hiervoor ontbreekt het aan geschikte bomen. Ook voor overige beschermde soorten biedt het gebied geen geschikt biotoop.

Effecten en conclusie

Het voorkomen van verschillende algemeen voorkomende grondgebonden zoogdiersoorten ('Andere soorten') binnen het plangebied is op basis van aanwezige biotopen en ligging van het plangebied ten opzichte van de bekende verspreiding van deze soorten niet uit te sluiten. Voor het verstoren van deze algemeen voorkomende soorten geldt binnen de provincie Zuid-Holland een algemene vrijstelling. Wel geldt de algemene zorgplicht (zie paragraaf 3.1.2). Rondom het plangebied zijn voldoende alternatieve leefgebieden en uitwijkmogelijkheden. Door één kant op te werken tijdens de uitvoering van de werkzaamheden krijgen aanwezige soorten de kans om het werkgebied te verlaten.

Voor boommarter geldt in de provincie Zuid-Holland geen vrijstelling. Voor deze soort (en overige beschermde grondgebonden zoogdieren) biedt het plangebied echter geen geschikt biotoop. Op basis van de locatie en gebiedskenmerken is het voorkomen van onder de Wnb beschermde grondgebonden zoogdieren in het plangebied uitgesloten. Hierdoor zijn negatieve effecten voor deze soortgroep niet aan de orde. Vervolgstappen in het kader van de Wnb zijn niet nodig.


5.2.3 Vleermuizen

Bureaustudie

Alle soorten vleermuizen zijn in Nederland beschermd onder de Wnb en vallen onder bijlage IV van de Habitatrichtlijn (HR). Volgens de NDFF database [lit. 4] komen tenminste vijf soorten vleermuizen voor in de directe omgeving van het plangebied. Het betreft waarnemingen van overvliegende en/ of foeragerende individuen van gewone dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en watervleermuis. In afbeelding 5.3 zijn de waarnemingen weergegeven.

Nabij het plangebied, bij Boekenburglaan 57/57a, is in 2021 een vleermuisonderzoek uitgevoerd door Witteveen+Bos (ref. 121840/22-012.755). Hieruit bleek dat op die locatie geen verblijfplaatsen of andere essentiële onderdelen van vleermuizen aanwezig zijn. Wel is hierbij geconcludeerd dat boven de watergang (Molentocht) mogelijk een (essentiële) vliegroute aanwezig is. Tijdens het onderzoek zijn in de directe omgeving vijf vleermuissoorten vastgesteld: gewone- en ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, laatvlieger en een soort van het geslacht myotis (myoot sp. Vermoedelijk meervleermuis).

Afbeelding 5.3 Waarnemingen uit de NDFF van vleermuizen in de omgeving van het plangebied (rode contour) [lit. 4]¹



De biotooppeisen van de soorten staan in onderstaand kader beschreven.

Gewone dwergvleermuis

(Kraam)kolonies zijn in Nederland vooral in gebouwen, in spouwmuren, achter betimmering en daklijsten, of onder dakpannen gevonden. Gewone dwergvleermuizen zijn plaatstrouw, maar gebruiken meerdere verblijfplaatsen en verhuizen relatief vaak. Gebouwen worden ook als winterverblijf gebruikt, waarbij vergelijkbare plaatsen als in de zomer benut worden. Overwinterende gewone dwergvleermuizen worden vooral bij toeval gevonden in spouwmuren, onder dakpannen, achter betimmering en daklijsten. Daarnaast zijn ze ook in spleten in de muur van kerktorens, en in spleten in grotten, groeves, betonnen bruggen en parkeergarages en dergelijke gevonden. Ze kiezen temperatuurgevoelige winterslaapplaatsen. Bij vorst zoeken ze vaak verwarmde huizen op [lit. 7].

Laatvlieger

Kraamkolonies komen voor zover bekend alleen in gebouwen voor. Ze wonen in de spouwmuur, achter de betimmering, onder daklijsten en dakpannen of onder het lood rondom de schoorsteen. Soms worden ze ook op zolders aangetroffen. Laatvliegers bewonen een netwerk van verschillende huizen die op een afstand van hooguit enkele honderden meters van elkaar liggen. Ze verhuizen soms wel, maar zijn in principe erg plaats- en gebiedstrouw. In de winter zoeken laatvliegers nauwe en relatief droge plaatsen op zoals spouwmuren, spleten en scheuren in zolders, oude kelders en soms ook kieren dicht bij de ingang van grotten [lit. 7].

Meervleermuis

Kolonies van meervleermuizen bevinden zich vrijwel altijd in gebouwen zoals op kerkzolders, in spouwmuren en onder dakpannen. In de winter verdwijnen de meeste meervleermuizen op mysterieuze wijze. In

¹ Deze informatie is (deels) afkomstig uit de NDFF en mag niet zonder toestemming van BIJ12 worden verstrekt aan derden of op enige andere wijze openbaar gemaakt worden.

Nederland worden in de winter totaal ongeveer 400 meervleermuizen waargenomen. Voor zover we weten overwinteren meervleermuizen in Nederland in mergelgroeven, bunkers, forten, vestingwerken, oude steenfabrieken en kelders. Ook worden af en toe dieren waargenomen in gebouwen. De vleermuis vliegt na zonsondergang uit, waarbij afstanden tot zo'n 10 km worden overbrugd [lit. 7].

Rosse vleermuis

Kraamkolonies zijn hoofdzakelijk bekend uit laaggelegen gebieden in Noord-Duitsland en Nederland. De rosse vleermuis is in West-Europa een uitgesproken boombewonende soort. Zowel solitaire mannetjes, groepen vrouwtjes met jongen, als dieren in winterslaap gebruiken boomholten als onderkomen. In Midden-Europa staat de rosse vleermuis bekend als een trekkende soort. Met behulp van ringonderzoek zijn in het verleden ook in Nederland waarnemingen gedaan die wijzen op trek. Anderzijds zijn er gebieden waar tijdens alle seizoenen rosse vleermuizen gevonden kunnen worden [lit. 7].

Ruige dwergvleermuis

Uit het buitenland zijn verblijfplaatsen vooral aangetroffen in spleten en gaten in bomen, in nest- en vleermuiskasten, in gebouwen achter betimmeringen, achter daklijsten, onder dakbedekking en op zolders. Twee Nederlandse kolonies bewoonden spouwmuren. Vele solitaire mannetjes of kleine groepen zijn gevonden in spleten en gaten in bomen, achter loshangend schors en in kasten. Als winterverblijf zijn gebouwen (spouwmuur, dakpannen, betimmering), houtstapels, maar ook boomholtes en nest- en vleermuiskasten bekend [lit. 7].

Watervleermuis

De watervleermuis is een boombewonende soort van half open tot gesloten, waterrijk en bosrijk landschap. Grotere dichtheden worden vooral daar gevonden waar zowel beschut water als ouder bos of oudere bomen aanwezig zijn. De verspreiding toont een duidelijke binding met de oudere bossen in de duinen in het westen van Nederland, en de bossen op de hogere zandgronden en het krijtlandschap in het oosten en zuiden van Nederland. Desondanks komt de soort ook voor in het laagland op plaatsen waar oudere bossen of parken aanwezig zijn. In het noordwestelijke laagland worden in bosarme omgeving soms kleine groepen op zolders gevonden [lit. 7].

Beoordeling op basis van gebiedskennis

Het plangebied bestaat uit verschillende gebouwen op een agrarisch erf met tuin. In de omgeving van het plangebied bevinden zich een watergang (Molentocht), een polder en de bebouwde kom van Voorhout. Tussen de gebouwen en boven het oppervlaktewater zijn omstandigheden aanwezig die het geschikt maken voor foeragerende vleermuizen. Het is dan ook niet uitgesloten dat het plangebied onderdeel is van foerageergebied van in de omgeving foeragerende vleermuizen. Er is echter ruim voldoende geschikt foerageergebied in de omgeving aanwezig, waardoor er binnen het plangebied geen sprake is van essentieel foerageergebied. Daarnaast wordt de Molentocht mogelijk gebruikt als vliegroute, deze blijft bij de werkzaamheden echter ongemoeid. Bij verlichting wordt er voor gezorgd dat deze niet richting de molentocht schijnt. Verder kunnen in de gebouwen binnen het plangebied, met uitzondering van de kas, mogelijk verblijfplaatsen van gebouw bewonende vleermuizen (gewone dwergvleermuis, laatvlieger en ruige dwergvleermuis) aanwezig zijn.

Effecten en conclusie

In de wijdere omgeving van het plangebied komen verschillende vleermuissoorten voor. Het betreft de soorten gewone dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en watervleermuis.

Foerageergebied en vliegroutes

In de omgeving foeragerende en overvliegende vleermuizen kunnen worden verstoord wanneer de werkzaamheden zorgen voor geluid, licht of trillingen in het gebied. Het verstoren (en daarmee tevens indirect aantasten van het leefgebied) van vleermuizen is onder de Wnb verboden. Deze vorm van verstoring is echter te voorkomen door werkzaamheden uit te voeren buiten de actieve periode voor vleermuizen, bij daglicht (tussen een uur na zonopkomst en een uur voor zonsondergang). Waar verlichting nodig is dient gebruik te worden gemaakt van efficiënt lichtbeheer. Dit dient gedaan te worden door:

- gebruik te maken van vleermuisvriendelijke verlichting;

- het kunstmatig licht enkel daar te richten waar het ook daadwerkelijk nodig is (doelgericht);
- gebruikt te maken van armaturen die het licht door middel van een scherpe bundel één bepaalde kant (en weg van het foerageergebied/ de vliegroute) richten;
- gebruik te maken van aangepaste armaturen die verstrooiing van licht minimaliseren;
- het aantal lampen, de lichtintensiteit en het gebruik van hoge lichtmasten met veel lichtverstrooiing te beperken;
- voor en na de werkzaamheden het gebruik van kunstverlichting te beperken tot enkel verlichting ter beveiliging van opslagterreinen. Ook hiervoor gelden de bovenvermelde restricties.

Verblijfplaatsen

Binnen het plangebied zijn gebouwen aanwezig waarin verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig kunnen zijn. De gebouwen worden gesloopt, waardoor mogelijk verblijfplaatsen van vleermuizen vernietigd worden. Daarom dient nader onderzocht te worden of verblijfplaatsen van vleermuizen in de te slopen gebouwen aanwezig zijn. Hiervoor dient een gericht vleermuisonderzoek conform het vleermuisprotocol 2021 uitgevoerd te worden.


Het vleermuisonderzoek conform vleermuisprotocol 2021 bestaat uit enkele veldbezoeken in de periode tussen 15 mei en 15 juli en tussen 15 augustus en 1 oktober. Hierbij worden de zomer- en kraamverblijven, paarverblijven en winterverblijfplaatsen van vleermuizen geïnventariseerd. Indien verblijfplaatsen worden aangetoond die worden vernietigd dan zijn een ontheffing Wet natuurbescherming en mitigerende en/of compenserende maatregelen nodig

5.2.4 Vogels

Bureaustudie

Op basis van de NDFF [lit. 4] zijn in de afgelopen vijf jaar in de omgeving (<3 km) van het plangebied verschillende algemeen voorkomende vogelsoorten waargenomen zoals boomklever, boomkruiper, groenling, grote bonte specht, koolmees, merel, pimpelmees en tjiftjaf. Daarnaast zijn in de omgeving van het plangebied verschillende nestindicerende waarnemingen bekend van buizerd, gierzwaluw, grote gele kwikstaart, havik, huismus en sperwer waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn. In afbeelding 5.4 zijn de locaties van deze waarnemingen weergegeven.

Afbeelding 5.4 Waarnemingen uit de NDFF van vogels met een jaarrond beschermd nest die nestindicerend gedrag vertonen nabij het plangebied (rode contour) [lit. 4]¹



De biotooppeisen van de soorten staan in onderstaand kader beschreven.

Buizerd

Is te vinden in uitgestrekte bossen afgewisseld met heide en boerenland, moerasbossen, boerenland met bosjes en houtwallen, duinvalleien met struweel, bosjes in steden. Combinatie van geschikte nestgelegenheid (bos of een bosje) met open land met veel voedsel is ideaal [lit. 8].

Gierzwaluw

Voor hun nestgelegenheid zijn gierzwaluwen afhankelijk van beschikbaarheid van gebouwen met geschikte holtes. Ze jagen boven uiteenlopende habitats in dorpen en steden. Al het voedsel wordt gevangen in de lucht, ze zijn gespecialiseerd in het vangen van insecten in volle vlucht. Daarvoor zoeken ze meestal de luchtlagen op die op dat moment de meeste insecten bevatten, en dat kan best een flinke hoogte zijn [lit. 8].

Grote gele kwikstaart

De grote gele kwikstaart broedt en foerageert vrijwel uitsluitend aan de oevers van beken en rivieren, liefst met loofbos of loofbomen omzoomd. Bij voorkeur zijn die snelstromend, maar hij broedt ook aan zwak of zelfs nauwelijks stromend water, zoals in Nederland. Het broeden in de bebouwing, en met name in dorpen waardoor een beek loopt, komt in de bolwerken (Twente, Achterhoek, Limburg) van de grote gele kwikstaart regelmatig voor. In de laatste decennia zijn grote gele kwikstaarten ook in steden buiten het reguliere broedgebied vastgesteld, zoals in Groningen en Breda. Een westelijke buitenpost is Utrecht, waar de grote gele kwikstaart langs de singels in het centrum van de stad heeft gebroed [lit. 8].

¹ Deze informatie is afkomstig uit de NDFF en mag niet zonder toestemming van BIJ12 worden verstrekt aan derden of op enige andere wijze openbaar gemaakt worden.

Havik

Combinatie van bos met geschikte nestbomen met open land om te jagen. Broedt in naald- en loofbossen, ook in moerasbos, soms in parken. Jaagt in het bos, maar ook in tussenliggende weilanden en akkers, in aangrenzende open gebieden (heide en hoogveen, moerassen, boerenland) en steeds vaker ook in de stad. Belangrijk is de aanwezigheid van geschikte prooien. In de winter ook in nog opener terrein te vinden, zoals kwelders [lit. 8].

Huismus

Huismussen stellen prijs op een rommelige menselijke omgeving, met struikgewas, schuren, weilanden met vee, gemorst graan en zo verder. Talrijkst in dorpen en in oudere buitenwijken, met rommelige tuinen. Als er veel hoge bomen staan, verdwijnt de huismus. De huismus heeft 2 tot 3 legsels per broedseizoen met elk 4-6 eieren. Broedduur: 11-12 dagen. Huismussen broeden in een los kolonieverband. Het nest wordt vooral gemaakt onder dakpannen, in gaten en kieren van gebouwen en in mussenkasten. Het slordige nest bestaat uit takjes, stro, veertjes en hondenharen [lit. 8].

Sperwer

Broedt in bossen, soms tuinen en parken, meestal in een dicht, jong bos met naaldbomen (fijnspar, lariks), het liefst in halfopen landschappen. Soms ook in de stad of in tuinen, in open boerenland in windsingels, bosjes en op erven [lit. 8].

Beoordeling op basis van gebiedskennis

Het plangebied biedt mogelijk leefgebied aan verschillende vogelsoorten. De gebouwen en struiken binnen en rond het plangebied bieden nestgelegenheid aan verschillende soorten algemeen voorkomende broedvogels.

In het gebied zijn geen waarnemingen gedaan van vogelsoorten waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn. Tevens zijn geen jaarrond beschermde nesten waargenomen. In de woning op het perceel kunnen echter wel nesten van huismus en/of gierzwaluw aanwezig zijn. De woning is voorzien van een pannendak en in de omgeving zijn elementen aanwezig die het geschikt kunnen maken als leefgebied voor deze soorten. De aanwezigheid van nesten van huismus en/of gierzwaluw in het plangebied is daarom niet op voorhand uit te sluiten. Voor de soorten buizerd, grote gele kwikstaart, havik en sperwer biedt het plangebied geen geschikte nestgelegenheid. Voor deze soorten wordt de aanwezigheid van een nest daarom wel uitgesloten.

Effecten en conclusie

Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels zijn beschermd onder artikel 3.1 van de Wnb. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen (artikel 3.1 Wnb).

Vogels met jaarrond beschermde nesten

Het voorkomen van jaarrond beschermde nesten van huismus en/of gierzwaluw in de woning in het plangebied is op voorhand niet uit te sluiten. Bij de sloop van de woning is daarom mogelijk sprake van het vernietigen van nesten van huismus en/of gierzwaluw. Er dient daarom nader onderzoek uitgevoerd te worden naar de aanwezigheid van nesten van gierzwaluw en huismus.

Nader onderzoek gierzwaluw

De inventarisatie van gierzwaluw bestaat uit een onderzoek naar de aanwezigheid van nestlocaties van de soort. De inventarisatie wordt uitgevoerd conform de soorteninventarisatieprotocollen van het Netwerk Groene Bureaus. De inventarisatie bestaat uit minimaal drie bezoeken tussen twee uur voor zonsondergang tot zonsondergang in de periode 15 mei - 15 juli, waarvan minimaal 1 inventarisatie tussen 20 juni en 7 juli. Tussen de inventarisaties wordt een minimum tussenperiode van tien dagen gehanteerd. Voor de te onderzoeken gebouwen wordt aangegeven:

- waar in het gebouw jaarrond beschermde nesten van gierzwaluw aanwezig zijn;
- wat, rekening houdend met het bovenstaande punt, de (juridische) consequenties en vervolgstappen ten aanzien van jaarrond beschermde nesten van gierzwaluwen zijn (bv. ontheffing, compensatie).

Nader onderzoek huismus

De inventarisatie van huismus bestaat uit onderzoek naar de aanwezigheid van nestlocaties van de soort. Tevens worden aanwezige groenelementen van het functioneel leefgebied binnen het plangebied in kaart gebracht. De inventarisatie wordt uitgevoerd conform de soorteninventarisatieprotocollen van het Netwerk Groene Bureaus. De inventarisatie bestaat uit twee bezoeken van minimaal één uur tussen één uur na zonsopkomst en één uur voor zonsondergang in de periode 1 april - 20 juni. Tussen de twee inventarisaties wordt een minimum tussenperiode van tien dagen gehanteerd. Voor de te onderzoeken gebouwen wordt aangegeven:

- waar in het gebouw jaarrond beschermde nesten van huismus aanwezig zijn;
- een opsomming van de aanwezige groenelementen bijhorend het functioneel leefgebied van huismus;
- wat, rekening houdend met het bovenstaande punt, de (juridische) consequenties en vervolgstappen ten aanzien van jaarrond beschermde nesten van huismussen zijn (bijvoorbeeld ontheffing, compensatie).

Overige broedvogels

Het onderzoeksgebied biedt leefgebied aan verschillende algemeen voorkomende broedvogels. Het voorkomen van algemeen voorkomende broedvogels binnen de verstoringscontour van de werkzaamheden gedurende het broedseizoen is dan ook aannemelijk. Voor aanwezige broedvogels geldt dat werkzaamheden tijdens het broedseizoen (globaal van 15 maart tot 15 juli) voor verstoring kunnen zorgen door trillingen of geluid. Voor alle inheemse vogelsoorten geldt dat opzettelijk verstoren in het broedseizoen (individueel, nesten of eieren) verboden is volgens de Wnb. Het verkrijgen van ontheffing voor het verstoren van broedvogels is meestal niet mogelijk. De effecten op vogels en daarmee een overtreding van de verbodsbepalingen van de Wnb zijn namelijk gemakkelijk te voorkomen, te weten door in principe drie mogelijkheden:

- buiten het broedseizoen werken, dit met risico dat sommige vogels tot in september kunnen broeden;
- de werkzaamheden vlak voor het broedseizoen inzetten en dan continue doorwerken (werkzaamheden niet langer dan enkele dagen stilleggen), zodat vogels niet gaan broeden in het gebied waar gewerkt wordt;
- het plangebied voor het broedseizoen ongeschikt maken voor broedvogels.


5.2.5 Amfibieën

Bureaustudie

Op basis van de NDFF databank [lit. 4] zijn in de afgelopen vijf jaar in de omgeving (<3 km) van het plangebied waarnemingen bekend van enkele vrijgestelde amfibiesoorten (beschermingsregime 'Andere soorten'): bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander. Van niet vrijgesteld soorten van dit beschermingsregime zijn geen waarnemingen bekend. Van de Habitatrichtlijnsoorten zijn verschillende waarnemingen van rugstreeppad bekend. De waarnemingen zijn weergegeven in afbeelding 5.5.

Bij een in 2021 door Witteveen+Bos uitgevoerd onderzoek naar rugstreeppad (ref. 121840/21-016.514) is ook de aanwezigheid van habitat in de nabij het plangebied gelegen polder vastgesteld. In afbeelding 5.6 is het bij dit onderzoek vastgesteld habitat van rugstreeppad weergegeven.

Afbeelding 5.5 Waarnemingen uit de NDFF van beschermde amfibieën nabij het plangebied (rode contour) [lit. 4]¹



¹ Deze informatie is afkomstig uit de NDFF en mag niet zonder toestemming van BIJ12 worden verstrekt aan derden of op enige andere wijze openbaar gemaakt worden.

Afbeelding 5.6 Habitat rugstreeppad (onderzoek Witteveen+Bos 2021)



De biotoopeisen van deze soort worden in onderstaand kader beschreven.

Rugstreeppad

De rugstreeppad is een bewoner van zandige terreinen met een betrekkelijk hoge dynamiek, zoals de duinen, de uiterwaarden van de grote rivieren, opgespoten terreinen, heidevelden en akkers. Maar hij wordt ook op klei- en veengronden aangetroffen. Voor de voortplanting is de rugstreeppad afhankelijk van ondiepe wateren, die vrij snel opwarmen. Vaak wordt gebruik gemaakt van tijdelijke poeltjes en plassen, maar ook slootjes en vennen kunnen geschikt zijn. Een voorwaarde is wel dat het water niet zuurder is dan pH 5. Brak water wordt getolereerd [lit. 9].

Beoordeling op basis van gebiedskennis

Het plangebied vormt geschikt foerageergebied voor de algemeen voorkomende vrijgestelde amfibiesoorten bruine kikker en gewone pad. Rond het plangebied zijn verschillende waarnemingen van rugstreeppad bekend. Het plangebied kan enkel deels geschikt zijn voor rugstreeppad, doordat de soort hier rommelige hoekjes vindt om weg te kruipen in de winter. Voorplantingshabitat voor rugstreeppad is niet aanwezig binnen het plangebied. Voor overige beschermde amfibiesoorten biedt het plangebied geen geschikt biotoop.

Effecten en conclusie

Het plangebied vormt mogelijk geschikt foerageergebied voor gewone pad en bruine kikker. Voor deze soorten geldt een algemene vrijstelling. Van de beschermde en niet vrijgestelde amfibiesoorten kan alleen de aanwezigheid van winterhabitat voor rugstreeppad (rommelige hoekjes om weg te kruipen) niet uitgesloten worden. In het kader van de realisatie van de nieuwe woonwijk Nieuw Boekhorst is de aanwezigheid van rugstreeppad reeds uitvoerig onderzocht (nader soortenonderzoek rugstreeppad, referentie 121840/21-016.514, november 2021). Hierbij is de aanwezigheid van rugstreeppad in het gebied aangetoond.

Het verwonden of doden van individuen van de rugstreeppad is onder de Wnb verboden. Overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wnb. Om te voorkomen dat tijdens de sloop van de gebouwen individuen van rugstreeppad worden gedood dient in de periode april - juli een amfibieënscherm rond het plangebied geplaatst te worden. In deze periode bevindt rugstreeppad zich in het voortplantingswater en foerageergebied in de polder en wordt voorkomen dat rugstreeppad zich voor de winter naar het plangebied kan verplaatsen. Het scherm dient regelmatig gecontroleerd te worden op kieren en op overhangende vegetatie. Deze maatregelen moeten worden uitgevoerd en gemonitord onder begeleiding van een deskundig ecooloog. Wanneer deze maatregelen zorgvuldig worden uitgevoerd is het voorkomen van de rugstreeppad binnen het plangebied tijdens de werkzaamheden uit te sluiten. Vervolgstappen in kader van de Wnb voor het mogelijk doden of verwonden van individuen van rugstreeppad zijn dan niet nodig. Alle mitigerende maatregelen worden uitgewerkt in een ecologisch werkprotocol.

Ook het vernietigen van landhabitat van rugstreeppad, in dit geval overwinteringsplaatsen, is een overtreding van de Wnb. Het landhabitat zal gecompenseerd moeten worden en er is een ontheffing nodig. In dit geval valt het aanwezige landhabitat onder het leefgebied van rugstreeppad dat in het kader van de nieuwe woonwijk Nieuw Boekhorst is onderzocht. Op basis daarvan is voor zowel de nieuwe woonwijk als de voorgenomen activiteit op het perceel van Boekenburglaan 61 reeds een ontheffing aangevraagd en vindt compensatie plaats. Er hoeft derhalve geen nieuwe ontheffing Wnb aangevraagd te worden en nieuwe compensatie plaats te vinden.

5.2.6 Reptielen

Bureaustudie

Op basis van de NDFF databank [lit. 4] zijn in de afgelopen vijf jaar in de omgeving (< 3 km) van het plangebied geen waarnemingen bekend van de reptielen (beschermingsregime 'Andere soorten' en/of Habitatrichtlijnsoorten).

Beoordeling op basis van gebiedskennis

Het plangebied en de omgeving bieden geen geschikt leefgebied van reptielen en liggen ook volledig buiten het verspreidingsgebied van reptielsoorten in Nederland [lit. 9]

Effecten en conclusie

Door de afwezigheid van geschikt biotoop voor reptielsoorten, kan worden uitgesloten dat reptielen binnen de grenzen van het plangebied aanwezig zijn. Hierdoor zijn negatieve effecten van de geplande werkzaamheden op deze soortgroep uit te sluiten. Vervolgstappen in het kader van de Wnb zijn niet nodig.

5.2.7 Vis

Nabij het plangebied is wel oppervlaktewater aanwezig, maar hierin vinden geen werkzaamheden plaats. De aanwezigheid binnen het plangebied van de werkzaamheden en de verstoring van beschermde vissoorten is daarmee uit te sluiten. Nader onderzoek en/of een ontheffingsaanvraag is niet nodig.

5.2.8 Vlinders, libellen en andere ongewervelden

Bureaustudie

Op basis van de NDFF databank [lit. 4] is in de afgelopen vijf jaar in de omgeving (<3 km) van het plangebied enkel een waarneming bekend van de Habitatrichtlijnsoort platte schijfhoren bekend. Het betreft een waarneming op ruim een kilometer ten noordwesten van het plangebied. In afbeelding 5.7 is de waarneming weergegeven.

Onder de Wnb beschermde dagvlinders, libellen of andere ongewervelde komen vooral in leefgebieden voor waar hun biotoop nog grotendeels intact is. Dit betreffen veelal zeer specifieke soorten habitats waar de

betreffende soort zijn levenscyclus volledig kan doorlopen. De leefgebieden van onder de Wnb beschermde ongewervelden liggen dan ook vooral binnen en rondom natuurgebieden. Voorbeelden van biotopen waar onder de Wnb beschermde ongewervelden lokaal kunnen voorkomen zijn droge en schrale kalkgraslanden, vochtige bossen in het oosten van het land en Zuid-Limburg, in blauwgraslanden, kruidenrijke heidevelden, vochtige duinvalleien en duingraslanden, kapvlakten in droog en oud eikenbos, wilgenbroekbos in beekdalen, voedselarme tot matig voedselrijke verlandende wateren met een dichte krabbenscheervegetatie (petgaten), hoogveentjes omgeven door bos en gebufferde vennen, langs zuurstofrijke bovenlopen van beken, en langs stromingsluwe oevers langs rivieren waar fijn sediment en organisch materiaal voorhanden is. Een belangrijke voorwaarde voor het voorkomen van dagvlinders is het voorkomen van waardplanten [lit. 10].

Afbeelding 5.7 Waarnemingen uit de NDFF van beschermde ongewervelden nabij het plangebied (rode contour) [lit. 6]¹



De biotoopeisen van de waargenomen ongewervelden worden in onderstaand kader beschreven.

Platte schijfhoren

De platte schijfhoren wordt voornamelijk aangetroffen in stilstaande of zeer zwak stromende, zoete wateren. De soort is afwezig in brakke wateren of wateren die periodiek droogvallen. In het veenweidegebied waar de sloten extensief worden beheerd en krabbenscheer met draadwieren aanwezig zijn, kunnen van de platte schijfhoren hoge dichtheden worden aangetroffen van meer dan honderd exemplaren per vierkante meter. Deze situaties komen veel voor in laagveenmoerasgebieden. Deze behoren tot de beste en meest stabiele leefgebieden voor de platte schijfhoren. In intensief beheerde veenweidegebieden, waar sloten intensief worden geschoond, komt de platte schijfhoren het meest voor in wateren met een gevarieerde vegetatie [lit. 11].

¹ Deze informatie is afkomstig uit de NDFF en mag niet zonder toestemming van BIJ12 worden verstrekt aan derden of op enige andere wijze openbaar gemaakt worden.

Beoordeling op basis van gebiedskennis

Nabij het plangebied bevindt zich oppervlaktewater, maar hierin vinden geen werkzaamheden plaats. Negatieve effecten op platte schijfhoren kunnen daardoor uitgesloten worden. Het plangebied en de directe omgeving voldoen daarnaast niet aan de (over het algemeen hoge) eisen van beschermde vlinders, libellen en ongewervelden. Daarnaast komen de waardplanten van de soorten niet in het plangebied voor.

Effecten en conclusie

Door de afwezigheid van geschikt biotoop en waardplanten voor beschermde vlinder- of libelsoorten, kan worden uitgesloten dat beschermde dagvlinders, libellen of andere ongewervelde binnen de grenzen van het plangebied aanwezig zijn. Hierdoor zijn negatieve effecten van de geplande werkzaamheden op deze soortgroepen uit te sluiten. Vervolgstappen in het kader van de Wnb zijn niet nodig.

6

SAMENVATTING

6.1 Gebiedsbescherming

Natura 2000

Het plangebied ligt op een afstand van circa 3,2 km van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied. Als gevolg van deze afstand en tussenliggende obstakels, zoals bebouwing, kan worden uitgesloten dat directe effecten zoals oppervlakteverlies en verstoring door geluid, licht, trilling of optische verstoring optreden binnen de Natura 2000-gebieden.

Bij zowel de sloop en bouw als de gebruiksfase kan er sprake zijn van stikstofdepositie op Natura 2000-gebied. De sloop en bouw vallen onder de partiële vrijstelling van de Natura 2000-vergunningsplicht op grond van artikel 2.9a Wnb, en zijn daarom niet vergunningplichtig. De gevolgen als gevolg van stikstofdepositie vanwege de sloop hoeven om deze reden ook niet verder onderzocht te worden. De vrijstelling geldt echter niet voor de gebruiksfase na de sloop en bouw. Daarom is voor de gebruiksfase een AERIUS-berekening uitgevoerd (Uitgangspunten en resultaten stikstofdepositie, referentie 129715/22-004.7145). Hieruit blijkt dat op voorhand uitgesloten kan worden dat negatieve effecten optreden op Natura 2000-gebieden ten gevolge van stikstofdepositie. Het planvoornemen is inpasbaar binnen de voorschriften van de Wnb.

Natuurnetwerk

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van het NNN, waardoor ruimtebeslag van het voornemen in NNN-gebieden op voorhand is uitgesloten. Daarbij grenst het plangebied ook niet direct aan het NNN. De provincie Zuid-Holland hanteert voor het NNN geen externe werking als toetsingscriterium. Een nadere procedure in de vorm van een 'Nee, tenzij-toets' is niet noodzakelijk waardoor belemmeringen vanuit provinciaal natuurbeleid niet aan de orde zijn.

6.2 Soortenbescherming

In tabel 6.1 zijn de bevindingen en conclusies ten aanzien van de beschermde soorten samengevat.

Tabel 6.1 Samenvattende tabel soortenbescherming

Soortgroep	Kans op overtreding Wnb?	Vervolgstappen nodig?		Ontheffing aanvragen?
		Mitigerende maatregelen	Vervolgonderzoek (indien mitigatie niet mogelijk of niet voldoende)	
flora	nee	geen, wel zorgplicht	nee	nee
grondgebonden zoogdieren	nee	geen, wel zorgplicht	nee	nee
vleermuizen	ja, indien foeragerende/overvliegende vleermuizen worden verstoord	ja, door: - werkzaamheden overdag uitvoeren en gebruik maken van vleermuisvriendelijk lichtbeheer	nee	nee, mits mitigerende maatregelen in acht worden genomen
vleermuizen	ja, indien verblijfplaatsen van vleermuizen worden vernietigd	nee	ja, vleermuisonderzoek conform het vleermuisprotocol 2021 naar de aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen in de te slopen gebouwen (behalve de kassen)	ja, als uit het onderzoek blijkt dat verblijfplaatsen in de gebouwen aanwezig zijn die als gevolg van de werkzaamheden worden vernietigd of verstoord
vogels - algemeen voorkomende broedvogels	ja, indien broedparen worden verstoord	ja drie mogelijkheden: - buiten het broedseizoen werken - werkzaamheden voor het broedseizoen inzetten en continu doorwerken - of plangebied ongeschikt maken voor broedvogels In een ecologisch werkprotocol dient uitgewerkt te worden hoe negatieve effecten voorkomen worden	nee	nee, mits mitigerende maatregelen in acht worden genomen
Vogels - jaarrond beschermde nesten	ja, indien jaarrond beschermde nesten van huismus en/of gierzwaluw worden verstoord of vernietigd	nee, mitigerende maatregelen niet mogelijk	ja, onderzoek naar de aanwezigheid van nesten van huismus en/of	ja, indien uit het vervolgonderzoek blijkt dat

Soortgroep	Kans op overtreding Wnb?	Vervolgstappen nodig?		Ontheffing aanvragen?
		Mitigerende maatregelen	Vervolgonderzoek (indien mitigatie niet mogelijk of niet voldoende)	
amfibieën	ja, doordat landhabitat van rugstreeppad vernietigd wordt en mogelijk individuen van rugstreeppad gedood en/of verstoord worden	ja, het doden en verstoren van individuen voorkomen door in de periode april - juli een amfibieënscherm te plaatsen rond het plangebied met de te slopen gebouwen. Hiermee wordt voorkomen dat rugstreeppadden het plangebied gebruiken als winterhabitat. Voor het vernietigen van landhabitat is geen mitigatie mogelijk. De compensatie van het landhabitat wordt echter al meegenomen in de compensatie die voor de nieuwe woonwijk Nieuw Boekhorst wordt uitgevoerd	gierzwaluw in de woning op het perceel conform de soorteninventarisatieprotocollen van het Netwerk Groene Bureaus nee, in het kader van de nieuwe woonwijk Nieuw Boekhorst heeft in het gebied reeds onderzoek naar rugstreeppad plaatsgevonden. Het landhabitat in het plangebied maakt onderdeel uit van het leefgebied dat bij dit onderzoek is aangetoond. Het vernietigen van landhabitat als gevolg van de sloopwerkzaamheden is al onderdeel van een ontheffingsaanvraag en compensatie die uitgevoerd wordt	in gebruik zijnde jaarrond beschermde nesten van huismus en/of gierzwaluw in de te slopen woning aanwezig zijn Ja, maar deze ontheffing is reeds aangevraagd samen met de werkzaamheden die in het kader van de nieuwe woonwijk Nieuw-Boekhorst worden uitgevoerd
reptielen	nee	geen, wel zorgplicht	nee	nee
vissen	nee	geen, wel zorgplicht	nee	nee
vlinder, libellen & ongewervelden	nee	geen, wel zorgplicht	nee	nee

LITERATUUR

- 1 Kaart N2000, <https://geodata.nationaalgeoregister.nl/natura2000/wfs?version=2.0.0>, op 15 september gebruikt in QGIS.
- 2 Natura 2000 gebieden, <https://www.natura2000.nl/gebieden/>, geraadpleegd op 15 september 2022.
- 3 Kaart NNN, <https://geodata.nationaalgeoregister.nl/provincies/ps/wfs/v1?version=2.0.0>, op 15 september gebruikt in QGIS.
- 4 NDFF-ecogrid database, www.ndff.nl, geraadpleegd op 15 september 2022.
- 5 www.verspreidingsatlas.nl, geraadpleegd op 21 september 2022.
- 6 www.zoogdiervereniging.nl, geraadpleegd op 21 september 2022.
- 7 www.vleermuis.net, geraadpleegd op 21 september 2022.
- 8 www.vogelbescherming.nl, geraadpleegd op 21 september 2022.
- 9 www.ravon.nl, geraadpleegd op 21 september 2022.
- 10 www.vlinderstichting.nl, geraadpleegd op 21 september 2022.
- 11 www.annemoon.org, geraadpleegd op 21 september 2022.

BIJLAGE: INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN (IHD'S) NATURA 2000

Kennemerland - Zuid

Habitattypen

Habitatype ?	Habitatsubtype ?	Status doel ?	Oppervlakte ?	Kwaliteit ?	Relatieve bijdrage ?	Kernopgave ?
H2110 - Embryonale duinen		definitief	=	=	C	2.01
H2120 - Witte duinen		definitief	>	>	B1	2.01
H2150 - Duinheiden met struikhei		definitief	=	=	B1	
H2160 - Duindoornstruwelen		definitief	= (<)	=	A1	
H2170 - Kruipwilgstruwelen		definitief	= (<)	=	C	
H7210 - Galigaanmoerassen		ontwerp	=	=	C	
H2130A - Grijze duinen	kalkrijk	definitief	>	>	A2	2.02,SG
H2130B - Grijze duinen	kalkarm	definitief	=	>	B2	2.02,SG
H2190B - Vochtige duinvalleien	kalkrijk	definitief	>	>	B2	2.05,W
H2130C - Grijze duinen	heischraal	definitief	>	>	C	2.02,SG
H2140B - Duinheiden met kraaihei	droog	ontwerp	=	=	C	
H2180A - Duinbossen	droog	definitief	=	=	A1	2.04
H2180B - Duinbossen	vochtig	definitief	=	>	B1	
H2180C - Duinbossen	binnenduinrand	definitief	=	=	A1	
H2190A - Vochtige duinvalleien	open water	definitief	>	>	A1	2.05,W
H2190C - Vochtige duinvalleien	ontkalkt	definitief	=	=	C	2.05,W
H2190D - Vochtige duinvalleien	hoge moerasplanten	definitief	>	>	B1	2.05,W

Habitatrichtlijnsoorten

Soort ?	Status doel ?	Populatie ?	Omvang leefgebied ?	Kwaliteit leefgebied ?	Relatieve bijdrage ?	Kernopgaven ?
H1014 - Nauwe korfslak	definitief	=	=	=	A1	2.05,W
H1149 - Kleine modderkruiper	ontwerp	=	=	=		
H1318 - Meervleermuis	definitief	=	=	=	C	
H1903 - Groenknolorchis	definitief	>	>	>	C	2.05,W

Coepelduynen

Habitattypen

Habitatype ?	Habitatsubtype ?	Status doel ?	Oppervlakte ?	Kwaliteit ?	Relatieve bijdrage ?	Kernopgave ?
H2110 - Embryonale duinen		ontwerp	=	=	C	
H2120 - Witte duinen		definitief	=	>	C	
H2160 - Duindoornstruwelen		definitief	=	=	C	
H2130A - Grijze duinen	kalkrijk	definitief	=	=	B1	2.02
H2190B - Vochtige duinvalleien	kalkrijk	definitief	=	>	C	
H2180C - Duinbossen	binnenduinrand	ontwerp	=	=	C	
H2190D - Vochtige duinvalleien	hoge moerasplanten	ontwerp	=	>	C	

Meijendel & Berkheide

Habitattypen

Habitatype ?	Habitatsubtype ?	Status doel ?	Oppervlakte ?	Kwaliteit ?	Relatieve bijdrage ?	Kernopgave ?
H2110 - Embryonale duinen		ontwerp	=	=	B1	2.01
H2120 - Witte duinen		definitief	=	>	B1	2.01
H2160 - Duindoornstruwelen		definitief	= (<)	=	B2	
H3140 - Kranswienwateren		ontwerp	=	=	C	
H2130A - Grijze duinen	kalkrijk	definitief	>	>	B2	2.02,SG
H2130B - Grijze duinen	kalkarm	definitief	>	>	B1	2.02,SG
H2190B - Vochtige duinvalleien	kalkrijk	definitief	>	>	C	2.05,W
H2180A - Duinbossen	droog	definitief	=	=	B2	2.04
H2180B - Duinbossen	vochtig	definitief	=	=	C	
H2180C - Duinbossen	binnenduinrand	definitief	=	>	B1	
H2190A - Vochtige duinvalleien	open water	definitief	>	>	B1	2.05,W
H2190C - Vochtige duinvalleien	ontkalkt	ontwerp	>	>	C	2.05,W
H2190D - Vochtige duinvalleien	hoge moerasplanten	definitief	>	>	B2	2.05,W
H6430A - Ruigten en zomen	moerasspirea	ontwerp	=	=	C	

Habitatrichtlijnsorten

Soort ?	Status doel ?	Populatie ?	Omvang leefgebied ?	Kwaliteit leefgebied ?	Relatieve bijdrage ?	Kernopgaven ?
H1014 - Nauwe korfslak	definitief	=	=	=	A1	2.05,W
H1149 - Kleine modderkruiper	ontwerp	=	=	=		
H1166 - Kamsalamander	ontwerp	=	=	=		
H1318 - Meervleermuis	definitief	=	=	=	A2	

