

Ontwikkeling/Regulier beheer	Maatregel per beheersgroep	Bewerkingspercentage per plantvak	Frequentie per jaar	Frequentie periode 10 jaar		Periode van uitvoering
------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	---------------------	----------------------------	--	------------------------

Kruidenmengsel (Bloemenmengsel M4 middellaag Cruydt Hoeck)

Doelsoorten: bijen, vlinders en andere bloembezoekende insecten

Aanleg/Ontwikkelingsbeheer 1e jaar	Bij toepassen van kruidenmengsel allereerst de grond bewerken. De huidige graszode van de paardewei verwijderen en afvoeren door de bovenste 5 cm af te steken. Daarna bovenste 5 cm frezen zodat de topklaag los is. Het kruidenmengsel zaaien in de nazomer omdat de meeste zaden dan rijp zijn en de omstandigheden het beste zijn om te kiemen. (bron: Cruydt Hoeck)	100,0%	1	1		nazomer
	Maaien 2-3x. Er ontwikkelen waarschijnlijk veel snelgroeende onkruiden zoals Melde en Perzikkruid. Deze kunt u bestrijden door in het eerste jaar, twee tot drie keer te maaien en het maaisel af te voeren, afhankelijk van de ontwikkeling van het mengsel. Laat de begroeiing niet hoger worden dan zo'n veertig centimeter en maai deze terug tot zo'n vijf centimeter. Hierdoor valt er veel licht op de bodem en kunnen veel zaden kiemen. In dit eerste jaar kan de zode met bloemplanten zich goed ontwikkelen. (bron: Cruydt Hoeck)	100,0%	2-3		2 tot 3x per jaar	Maaien bij hoogte van 40 cm bij voorkeur in juli en september/oktober
	Vrijgekomen materiaal afvoeren op composthoop	100,0%	2-3		2 tot 3x per jaar	
Regulier beheer > 2 jaar	Sinus maaien (gefaseerd maaien) door "hoge delen" en "lage delen" in het terrein op verschillende tijdstippen te maaien. Hoge delen worden in juli gemaaid en de lage delen in september/oktober. Bij matige groei is het ook mogelijk dat er slechts 1x per 2 jaar gemaaid wordt. Gezien de schrale grond kunnen er kale plekken in de vegetatie voorkomen, dit past bij dergelijke omgeving, deze plekken mogen kaal blijven. Door een constant beheer wordt een stabiele bloemrijke vegetatie verkregen, doordat soorten zich in de vegetatie kunnen vestigen en handhaven. (bron: Cruydt Hoeck)	100,0%	1	10	1x per jaar	1e maaironde: juli 2e maaironde: tweede helft september- eerste helft oktober
	Vrijgekomen materiaal afvoeren op composthoop	100,0%	1	10	1x per jaar	

Graspad

regulier beheer 1-10 jaar	Uitmaaien graspad (strook van 0,75-1 meter breed)	100,0%	10	100	10x per jaar	
	Vrijgekomen materiaal afvoeren op composthoop	100,0%	10	100	10x per jaar	

Struweel/boszoom N16.01 Droogbos met productie (Bal et al, H.I. 3.8 struweel, mantel- en zoombegroeiing)

Doelsoorten: broedvogels: Zwartkop, Winterkoning en Heggenmus

Foeragemogelijkheden voor: Appelvink, Boomklever, Geelgors, Groene specht, Keep, Vuurgoudhaan

Aansluiting op leefgebied: Hazelworm, Das

ontwikkelingsbeheer 0-9 jaar	Water geven indien nodig	100,0%	4	2	4-8x per jaar	groeiseizoen
	Bestrijden ongewenste onkruidgroei	75,0%	1	4	4x (eerste 4 jaar)	mei-oktober
	Dunning door verwijderen buitenste rijen	33,0%	1	1	1x (4e jaar)	wintermaanden
	Vrijgekomen snoeihout op takkenrillen leggen	100,0%	1	1	1x (4e jaar)	
	Dunning volgens de "blijver en wijker" methode (blijvende struiken kiezen met voldoende afstand)	33,0%	1	1	1x (8e jaar)	wintermaanden
	Vrijgekomen snoeihout op takkenrillen leggen	100,0%	1	1	1x (8e jaar)	
regulier beheer > 9 jaar	Overkokende struiken verwijderen (Struiken die uitlopen buiten plantvak)	20,0%	1	1	1x per 3 jaar	wintermaanden
	Vrijgekomen snoeihout op takkenrillen leggen	100,0%	1	1	1x per 3 jaar	

Ontwikkeling/Regulier beheer	Maatregel per beheersgroep	Bewerkingspercentage per plantvak	Frequentie per jaar	Frequentie periode 10 jaar		Periode van uitvoering
------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	---------------------	----------------------------	--	------------------------

Heide

Doelsoorten: bijen, vlinders en andere bloembezoekende insecten

ontwikkelingsbeheer 0-2 jaar

regulier beheer > 0 jaar

Onkruidvrij maken	50,0%	5	10	5x per jaar	mei-oktober
Planten terug te snoeien tot even onder de uitgebloeide bloemtrossen van het jaar ervoor. Hiermee wordt de begrazing gesimuleerd die in natuurlijke omgeving plaatsvindt door begrazing van bijvoorbeeld schapen	100,0%	1	10,00	1x per jaar	maart-half april
Plaggen, 5-10cm van de bovenlaag van de grond afschrappen en afvoeren, helft van het areaal om de 30 jaar	50,0%	0,03	0,06	1x per 30 jaar	oktober