



Buitengoed Amerongse Berg



Opdrachtgever

Naam: **Buitengoed Amerongse Berg**
Contactpersoon: **Dhr. P. Schuttenbelt**
Adres: **Dwarsweg 69 a**
PC / Woonplaats: **3959 AH Overberg**
Telefoon / Fax:
Mobiel:

Project

Naam: **Buitengoed Amerongse Berg**
Adres: **Dwarsweg 69 a**
PC / Woonplaats: **3959 AH Overberg**
Projectomschrijving: **Terreininrichtingsplan**
Tuinvormgever: **Henk ten Hove**
Projectnummer / Schaal: **08 195 / 2** 1 : 1000
Datum: **6 april 2011 gew.**
Wijzigingsdatum / Versie:

	houtwal met inheemse bomen en struiken soorten o.a. Quercus robur, Sorbus aucuparia, Rhamnus frangula Betula pendula, Viburnum opulus		eventueel te verwijderen bomen
	amfibiepoelen met rondom natuurlijke vegetatie en "groenlongen" naar landschap		brug
	(natte) heide velden		recreatiewoning vrijstaand
	vijver met "natuurlijke" oevers		recreatiewoning geschakeld
	bestaande bomen		parkeren
	paden / wegen		centrale voorziening

Opbouw en (soorten)invulling houtwal rondom buitengoed Amerongse Berg

aan te planten soorten		laag			percentage
wetenschappelijke naam	nederlandse naam	A	B	C	
Alnus glutinosa	zwarte els	x			7
Betula pendula	ruwe berk	x			5
Cornus sanguinea	rode kornoelje			x	7
Crataegus monogyna	eenstijlige meidoorn		x		5
Cytisus scoparius	bezembrem			x	7
Euonymus europaeus	kardinaalsmuts			x	5
Ilex aquifolium	hulst		x		7
Prunus spinosa	sleedoorn			x	5
Quercus petraea	wintereik	x			5
Quercus robur	zomereik	x			7
Rhamnus frangula	vuilboom / sporkehout		x		10
Rosa canina	hondsroos			x	5
Rosa rubiginosa	eglantier			x	5
Sambucus nigra	gewone vlier		x		5
Sorbus aucuparia	lijsterbes		x		5
Viburnum opulus	gelderse roos			x	10

Aan de binnenzijde (parkzijde) van de houtwal / singel kan verder nog worden aangeplant o.a.

Polystichum setiferum	zachte naaldvaren
Polypodium vulgare	gewone eikvaren
Lonicera periclymenum	wilde kamperfoelie
Polygonatum multiflorum	gewone salomonszegel
Verbascum nigrum	zwarte toorts

Door een goed hakhoutbeheer moet het doel, een gevarieerde en gesloten begroeiing, worden bereikt. Dit om een ecologisch waardevolle houtwal te doen ontstaan; een goed ontwikkelde boomlaag, struiklaag en kruidlaag, met voldoende variatie in soorten en leeftijd.

Dit bereikt men door bij de periodieke, gefaseerde kap, zogenaamde "overstaanders" te sparen. Kapbeheer mag niet over een te grote lengte plaatsvinden, zodat organismen zich kunnen terugtrekken in de "onaangeroerde" gedeelten.

Dood hout en takhout wat vrijkomt bij het kapbeheer kan worden gebruikt voor stapels of wallen, die beschutting bieden aan vogels en kleine zoogdieren.

Vanaf de houtwal komen "verbindingszones" naar centraal op het terrein gelegen kwel- / oppervlaktewater, de "natte natuurontwikkeling".

De beplanting hier bestaat uit o.a. elzenzegge (*Carex elongata*), zwarte bes (*Ribes nigrum*), dotterbloem (*Caltha palustris*), bosereprijs (*Veronica montana*), struikheide (*Calluna vulgaris*), dopheide (*Erica tetralix*), vossebes (*Vaccinium vitis-idaea*) en bochtige smele (*Deschampsia flexuosa*).