

Aan Gemeente Cuijk

Van Kragten, Roy Janssen


Betreft Jaarrond beschermde vogelnesten Randweg Haps

Datum 23 januari 2014

Broedvogels die in Nederland voorkomen zijn krachtens de Flora- en faunawet beschermd. De bescherming heeft voornamelijk betrekking op nesten. Dit betekent dat in gebruik zijnde nesten van broedvogels niet verstoord of verwijderd mogen worden. Hiernaast geldt voor een aantal vogelsoorten dat het nest ook buiten het broedseizoen beschermd is (jaarrond beschermde vogelnesten). Voor het plangebied van de randweg Haps is nagegaan of jaarrond beschermde nesten aanwezig zijn. Daartoe is een inspectie van het plangebied uitgevoerd op 22 januari jl. door de een ecoloog van ons bureau (dhr. R. Janssen). Doordat in de winter de bomen geen of nauwelijks nog blad bevatten, zijn nesten goed waar te nemen.

Resultaten

Reeds is in 2013 een nestplaats van de steenuil (*Athene noctua*) vastgesteld (Faunaconsult, 2013). Tijdens de inspectie in januari 2014 zijn geen aanvullende waarnemingen gedaan van jaarrond beschermde nestplaatsen binnen en in de directe omgeving van het plangebied. Wel werden enkele nesten waargenomen in de omgeving van het plangebied, waarvoor een omgevingscheck moet uitwijzen of de omgeving voldoende alternatieve nestgelegenheid biedt. Het betreft de nesten van de zwarte kraai (*Corvus corone*) en ekster (*Pica pica*). Hiervan bevond zich het meest westelijke nest van de zwarte kraai zich binnen het plangebied. De overige nesten bevinden zich buiten het plangebied. In onderstaande afbeelding zijn de locaties van deze nesten weergegeven.



Conclusie

Op de steenuil na zijn binnen en in de nabijheid van het plangebied geen jaarrond beschermde vogelnesten waargenomen. Aanbevelingen voor de steenuil zijn reeds opgenomen in het rapport van Faunaconsult (2013), hier wordt daarom niet verder op in gegaan. Door de werkzaamheden buiten het broedseizoen (globaal van 15 maart tot 15 juli) uit te voeren, worden negatieve effecten op broedvogels voorkomen. Afhankelijk van de klimatologische

omstandigheden kunnen vogels eerder of later in het jaar tot broeden komen. Het merendeel van de aanwezige nesten van de ekster en zwarte kraai blijven behouden doordat de nestbomen zich niet binnen het plangebied bevinden. Voor de nesten die niet behouden blijven in de toekomstige inrichting biedt de omgeving van het plangebied ruim voldoende alternatief geschikt nestgebied. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een deskundige op het gebied van vogels de vegetatie te controleren op het voorkomen van broedende vogels. Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan, zijn negatieve effecten op broedvogels uitgesloten.