

Beplantingsplan RVR

Boshovensestraat naast 4a


Riethoven

15 april 2022; 14 februari 2023; 30 oktober 2024

Inhoud

- ▶ Situatieschets
- ▶ Doel Beplantingsplan RVR
- ▶ Soorten beplanting

Situatieschets



Doel Beplantingsplan RVR

- ▶ Doel van dit plan is om een landschap te creëren dat past in de omgeving. Er wordt een diversiteit van soorten toegepast om een leefplek te realiseren voor vogels, insecten, e.d. Er is gekozen voor een variatie aan inheemse bomen en heesters.
- ▶ Als erfafscheiding wordt een haag geplant. De ecologische kwaliteiten en de historische functie van hagen zorgen ervoor dat dit past in dit plan. Een haag is van oudsher op veel boerenerven te vinden, tot nut en genoegen van niet alleen de mens, maar vooral ook de vogels, insecten en kleine zoogdieren op het erf. Hagen waren bedoeld om grenzen te stellen en de levende have binnen dan wel buiten de (groenten)perken te houden.
- ▶ Bovenstaande zorgt voor een versterking van de landschappelijke beleving. De kwaliteit van het landschap wordt hierdoor verhoogd.

Alnus glutinosa

Zwarte els is een veel voorkomende boomsoort. Overal waar voldoende vocht aanwezig is, langs waterkanten, beek- en rivieroeveren, broekbossen en moerassen kunnen we deze boom aantreffen.

Makkelijke herkenningspunten zijn het donkere uiterlijk van de boom met enigszins paarse knoppen, de elzenproppen, dit zijn de verhoude vrouwelijke katjes, de enigszins kleverige ronde bladeren met een afgeknotte of zelfs iets uitgerande top. Ook de jonge takken zijn enigszins kleverig.

Aantal: 7



Beukenhaag

Fagus sylvatica

Deze haagplant vergt weinig onderhoud en zorgt snel voor de benodigde privacy, zoals hier als erfafscheiding. Het past bij een landschappelijke beplanting. De beukenhaag zorgt zowel in de zomer als winter voor een dichte, volle haag. De beukenhagen doen het goed op zanderige gronden die niet te nat zijn. Ze hebben zomers een mooi groen blad, welke in het najaar verkleurt naar een herfstbruine kleur. De haag behoudt zijn blad, zodat er ook in de winter een mooie volle haag is. In het voorjaar maakt het bruine blad plaats voor nieuw, groen blad.

Aantal: 5 per m¹

Hoogte Haag: 120 cm



Heesters

- ▶ Diverse soorten:
 - *Viburnum opulus*
 - *Amelanchier lamarckii*
 - *Sambucus nigra*
 - *Rhamnus frangula*
 - *Sorbus aucuparia*
- ▶ 3 rijen
- ▶ Plantafstand: 1,5 m

Gelderse roos

Viburnum opulus

In de randen van bossen, maar ook in zelfstandige struwelen en hagen vind je de Gelderse roos met zijn platte bloeiwijzen bestaande uit twee typen witte bloemen. De bloeiwijzen zijn tuilen, hoewel ze wat op schermen lijken. De grote bloemen aan de buitenrand zijn geslachtsloos en dienen ertoe om hele bloeiwijze meer aantrekkelijk te maken voor bestuivers. Na de bloei ontwikkelen de scharlakenrode vruchten die pas door vooral lijster en pestvogels worden gegeten als in de winter de vorst over de vruchten is gegaan.



Krent

Amelanchier lamarckii

Wanneer in het vroege voorjaar de grote witte bloemen van het Amerikaans krentenboompje zich ontfouwen komen ook de fijne bladeren te voorschijn uit de knoppen. Deze bladeren zijn ovaal tot omgekeerd eirond van vorm met een zeer fijn gezaagde rand en de kleur is in het begin tamelijk roodachtig, maar naar de middennerf toe groener. De schors van de takken is lichtbruin en glad. In de nazomer ontstaan uit de vruchtbeginsels besachtige "krenten", die sappig zijn.



Vlier

Sambucus nigra

In onze struwelen, heggen en bosranden valt de Gewone vlier, een plantensoort uit de Muskuskruidfamilie, niet alleen tijdens de bloei op, maar ook door zijn zwarte, glanzende vruchten in de nazomer. De bloei is in juni en juli en bestuiving vindt plaats door insecten, die al pollen verzamelen over de schermvormige bloeiwijzen scharrelen of door de wind. De bloemen staan geplaatst in wat we deftig wel een tuil of schermvormige tros noemen. De vruchten zijn in september en oktober rijp. De plant vermeerderd zich door zaad, dat door vogels, met name door spreeuwen, die dol op de bessen zijn, wordt verspreid. Botanisch gezien zijn de bessen steenvruchten en het gedeelte 'nigra' van de soortnaam betekent 'zwart'.



Vuilboom

Rhamnus frangula

Deze struiken van het Sporkehout, Frangula alnus, vroeger bekend onder de naam Rhamnus frangula, is goed herkenbaar aan de armbloemige trosjes met groenachtig tot witte bloemetjes die in de oksels van bladeren staan. De gaafrandige bladeren staan verspreid aan de takken. De besachtige vruchten kleuren van helder groen eerst rood en later zwart.



Lijsterbes

Sorbus aucuparia

De wilde lijsterbes is gemakkelijk te herkennen aan de tuilen met witte bloemen in de voorzomer en aan de oranje tot vuurrode besvormige vruchten in de nazomer en herfst. Ook de oneven geveerde bladeren met hun gezaagde bladranden herken je goed. De algemeen voorkomende soort staat in veel verschillende bostypen en struweelranden.



Knotwilg

Salix Alba

In het voorjaar heeft de kroon een zilverige glans als gevolg van de zijde-achtige beharing op beide zijden van de smalle, langwerpige bladeren. De rand van de bladeren is fijn gezaagd. De katjes komen tegelijk met de jonge bladeren tevoorschijn. De bomen met mannelijk bloeiende katjes vallen op doordat de langwerpige katjes eerst zilverig behaard en daarna geel kleuren door de gele helmknoppen van de meeldraden. De langwerpige katjes van de vrouwelijk bloeiende bomen vallen veel minder op door een lichtgroengele kleur.

Aantal: 4 stuks



Bronnen

- ▶ Floravannederland.nl
- ▶ Basis tekening Franken Architectuur bv
- ▶ Tekeningen zijn niet verschaald weergegeven.



Hoveniersbedrijf
Wassink

Weebosserweg 71
5571 LL Bergeijk
Tel.: 06 55 11 89 82

■ teunwassink@hotmail.com
■ www.hoveniersbedrijfwassink.nl