

BURO SRO B.V.
t.a.v. ir. drs. R. van den Oetelaar
't Goylaan 11
3525 AA Utrecht

Datum 16 augustus 2017
Kenmerk BE/2016/417/r
Uw kenmerk Email d.d. 21 december 2016
Auteur(s) T.J.P. den Otter
Projectleider C.J. Blom

BLOM ECOLOGIE B.V.
ADVIES & ONDERZOEK

Kerkstraat 4
4181 AB Waardenburg
t 0418 820 288
e info@blomecologie.nl
i www.blomecologie.nl
KvK 67221904
BTW 856882999B01
IBAN NL21RABO0314240683

Oriënterend onderzoek naar beschermde flora en fauna aan de Herenweg ong. te Rijnsaterwoude

Tussen de Herenweg 14a en Herenweg 16 te Rijnsaterwoude is een graslandperceel gelegen. Op het perceel is een particulier voornemens om een woning te realiseren. Het huidige bestemmingsplan voorziet niet in deze ontwikkelingsmogelijkheid en dient derhalve te worden gewijzigd.

De beoogde ontwikkeling heeft mogelijk een negatief effect op beschermde flora en fauna en/of beschermde natuurgebieden. Ten behoeve van de ontwikkeling geldt de wettelijke verplichting onderzoek te verrichten naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de mogelijk effecten van de ruimtelijke ingreep daarop. Middels voorliggende ecologische quickscan is de (potentiele) aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de betekenis van het plangebied voor deze soorten in kaart gebracht.

Buro SRO B.V. begeleidt de ruimtelijke procedure en heeft Blom Ecologie bv verzocht het plangebied te onderzoeken op aanwezigheid van beschermde flora en fauna en vervolgens deze te toetsen aan de effecten van de werkzaamheden en vigerend beleid.

Onderzoeksdoel

Middels dit oriënterend onderzoek worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord:

- Is het bestemmingsplan dat wordt opgesteld voor het project zoals hiervoor omschreven uitvoerbaar zoals het bepaalde in de Wro (artikel 3.1.6 Bro)?
- Welke, krachtens de Wet natuurbescherming, beschermde flora en fauna zijn (potentieel) aanwezig in het plangebied?
- Welke negatieve effecten treden op voor (potentieel) aanwezige flora en fauna als gevolg van de beoogde ruimtelijke ingreep?
- Heeft de beoogde ruimtelijke ingreep een negatief effect op het de instandhoudingsdoelen van Natura2000 gebieden of de wezenlijke kenmerken en waarden van Natuurnetwerk Nederland?

Planlocatie

De planlocatie is gelegen tussen de Herenweg 14A en Herenweg 16 te Rijsaterwoude. Het terrein bestaat uit drassig grasland. In het midden van het perceel ligt een nagenoeg dichtgegroeide sloot. In bijlage 1 zijn een aantal foto's opgenomen die een impressie geven van de planlocatie en de directe omgeving hiervan.

De planlocatie wordt begrensd door een weide aan de Herenweg 16 (noordzijde), een kippen- en schapenweide (oostzijde), het perceel aan de Herenweg 14 (zuidzijde) en een watergang (westzijde). De directe omgeving van de planlocatie wordt gekenmerkt door oppervlaktewater (Braassemermeer) en veenweidegebied met kavelsloten, lijnvormige weides, landwegen en boerenerven. Op een afstand van circa 75m in westelijke richting is het oppervlaktewater het Braassemermeer gesitueerd en circa 600m ten oosten is de provinciale weg de N207 gelegen.



Figuur 1 De planlocatie (rood kader) is gelegen aan de Herenweg te Rijsaterwoude (bron: ruimtelijkeplannen.nl).

Funcieverandering en effecten

De beoogde ingreep betreft de realisatie van een nieuwe woning. Onderstaand volgt een korte opsomming van de ingrepen en effecten. Onderstaand volgt een korte opsomming van de ingrepen en effecten:

- verwijderen vegetatie: afvoer groen;
- herstel oever en dempen sloot: aanvoer grond en graafwerkzaamheden;
- vergraven terrein en egaliseren; graafwerkzaamheden en grondtransport;
- terrein bouwrijp maken; aanbrengen puinbed, aanleg nutsvoorzieningen e.d.;
- realisatie nieuwe woning: algemene bouwwerkzaamheden;
- revitalisatie terrein: algemene hoveniers- en overige werkzaamheden.

Alle thans aanwezige (ecologische) functies van de planlocatie komen geheel of deels te vervallen. Negatieve effecten die op kunnen treden voor beschermde soorten zijn: vernietiging en/of afname van geschikt leefgebied (permanent of tijdelijk) en opzettelijke verstoring (tijdelijk).

Methode

Inventarisatie

De inventarisatie is een oriënterend onderzoek waarbij gedetailleerd een beoordeling wordt gegeven van de aanwezigheid van de specifieke potentie voor beschermde flora en fauna in het plangebied, de betekenis van het plangebied voor de aanwezige soorten en de effecten van de voorgenomen ingrepen op de soorten. De quickscan bestaat uit veldbezoek en raadpleging van externe bronnen.

Veldbezoek

Het veldbezoek is een momentopname van de aanwezige beschermde flora en fauna. Tijdens het veldbezoek wordt het plangebied nauwkeurig onderzocht waarbij ook gelet wordt op sporen en delen of restanten van planten en/of dieren. Het veldbezoek heeft plaatsgevonden op 10 januari 2017. De weersomstandigheden tijdens het veldbezoek waren; motregen, 8/8 bewolkt, 6° Celsius en windkracht 2-3 (Bft.)

Externe bronnen

Vaak zijn er al gegevens bekend over een plangebied en de directe omgeving hiervan. Deze gegevens worden onder andere beheerd in rapporten en naslagwerken en door het Natuurloket (www.natuurloket.nl). Raadpleging van externe bronnen levert vaak nuttige aanvullende informatie op en daarmee een vollediger beeld van de (mogelijk) aanwezige flora en fauna.

Wet natuurbescherming

Per 1 januari 2017 is de voormalige Flora- en faunawet samen met de Boswet en Natuurbeschermingswet vervangen door de Wet natuurbescherming (Wnb). Onder de Wet natuurbescherming vervallen de huidige tabellen 1, 2 en 3 waarin de beschermde soorten zijn opgenomen. Tevens zijn er circa 200 soorten niet langer beschermd en worden enkele bedreigde soorten toegevoegd. De soortenbescherming binnen de Wet natuurbescherming is opgedeeld in de volgende beschermingsregimes: Vogelrichtlijnsoorten, Habitatrichtlijnsoorten en andere soorten. Voor alle beschermde soorten geldt een ontheffingsplicht. Het bevoegd gezag (de provincie) kan voor de soorten die zijn opgenomen in het 'beschermingsregime andere soorten' vrijstellingsbesluit nemen en hierin onderscheid maken tussen meer en minder strikt beschermde soorten.

In de ruimtelijke verordening van de provincie Zuid-Holland is voor de volgende soorten vrijstelling opgenomen in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen:

<i>Aardmuis</i>	<i>Gewone bosspitsmuis</i>	<i>Ree</i>
<i>Bastaardkikker</i>	<i>Gewone pad</i>	<i>Rosse woelmuis</i>
<i>Bosmuis</i>	<i>Haas</i>	<i>Veldmuis</i>
<i>Bruine kikker</i>	<i>Hermelijn</i>	<i>Vos</i>
<i>Bunzing</i>	<i>Huisspitsmuis</i>	<i>Wezel</i>
<i>Dwergmuis</i>	<i>Kleine watersalamander</i>	<i>Woelrat</i>
<i>Dwergspitsmuis</i>	<i>Konijn</i>	
<i>Egel</i>	<i>Meerkikker</i>	

Beoordeling

Op basis van de bureaustudie en veldonderzoek wordt per soortgroep besproken wat de potentie van de planlocatie en de invloedssfeer daarvan is en welke effecten daarop te verwachten zijn. Er is gelet op vogelrichtlijnsoorten (art 3.1 Wnb), habitatrichtlijnsoorten (art 3.5 Wnb) en nationaal beschermde soorten (overige soorten; art 3.10 Wnb) met uitzondering van de soorten die zijn opgenomen in de provinciale vrijstellingsbesluiten.

Vaatplanten

Zwaarder beschermde vaatplanten en/of sporen en delen hiervan zijn niet aangetroffen op de planlocatie (art 3.5 Wnb; art 3.10 Wnb). Het terrein bestaat met name uit grasland. Het perceel was ten tijde van het onderzoek kort gemaaid. De waargenomen soorten betreffen onder andere: robertskruid, raaigras, paardenbloem, riet, zwarte els en riet. De habitatpreferentie van kwetsbare en zeldzame soorten bestaat met name uit specifieke en bijzondere kenmerken zoals schrale gronden, stuifzandduinen en zure vennetjes. Dergelijke kenmerken zijn niet aangetroffen op de planlocatie. Gelet op de functie van de planlocatie in relatie tot de habitatpreferentie van kwetsbare en zeldzame soorten wordt de aanwezigheid hiervan niet verwacht.

Zoogdieren

Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen aangetroffen van (beschermde) wilde zoogdieren. Het terrein is omheind en grenst aan een brede watergang. Zoogdieren prefereren een leefomgeving waarin voldoende voedsel, rust en voortplantingsmogelijkheden aanwezig zijn. Door de aangrenzende kippen- en schapenweide is er een dagelijkse verstoring door menselijke activiteit. Op de locatie is vrijwel geen natuurlijke vegetatie aanwezig. De locatie is gelegen binnen veenweidegebied. Binnen een straal van circa 5km zijn geen bossen of grote bosschages aanwezig. Bovendien zijn op en rondom de planlocatie geen sporen aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van habitatrictlijnsoorten en/of overige soorten die buiten de vrijstellingsverordening vallen. De locatie heeft geen functie voor in het wild levende grote zoogdieren en zoogdieren van de habitatrictlijn (art 3.5 Wnb).

Opportunistische soorten kunnen de planlocatie in gebruik nemen. Dit betreft soorten als mol, veldmuis, konijn en egel. De beoogde nieuwbouw leidt echter niet tot een afname van het functionele leefgebied van potentieel aanwezige soorten. Alle soorten die mogelijk gebruik maken van de planlocatie zijn opgenomen in de vrijstellingsbesluiten conform de (concept)verordening van de provincie Zuid-Holland. Een groot gedeelte van de planlocatie is gedurende en na de beoogde ontwikkeling bovendien weer geschikt leefgebied voor een aantal soorten. Tevens is in de directe omgeving voldoende vergelijkbaar habitat waar eventueel aanwezige zoogdieren zich al dan niet tijdelijk kunnen ophouden.

Vleermuizen

Laanvormige bomenrijen, oude bomen met gaten en scheuren, (oude) gebouwen met kieren, oppervlaktewater en spleten en/of andere structuurrijke groenelementen kunnen een functioneel onderdeel zijn van een vleermuishabitat (Limpens et al., 1997; Dietz et al., 2011). Er zijn geen voornemens om bomen te kappen ten aanzien van de beoogde ontwikkeling. Tevens is geen bebouwing aanwezig op de planlocatie. Vaste rust- en verblijfplaats van vleermuizen zijn uitgesloten.

De planlocatie is gesitueerd aan de rand van het dorp Rijnsaterwoude. In de directe omgeving van de locatie zijn vele rechte structuren als oeverzones, wegen, sloten en watergangen aanwezig. Het is aannemelijk dat vleermuizen de planlocatie passeren en/of er foerageren. De inrichting van de planlocatie bestaat uit (drassig) grasland. Vleermuizen foerageren opportunistisch waarbij het actuele prooi-aanbod een van de belangrijkste factoren is in de aan- dan wel afwezigheid en de duur van de foerageerperiode. De planlocatie is slechts beperkt geschikt als foerageergebied. Aangezien er nauwelijks sprake is van opgaande vegetatie en/of een variatie in struiken en bomen heeft de locatie slechts voor een beperkt aantal insectensoorten (lees prooi) een relevante functie. Tevens bevinden zich op de planlocatie geen relevante structuren ten aanzien van de vliegroute. De watergang langs de planlocatie wordt mogelijk (permanent of veelvuldig) gebruikt als migratie en/of (foerageer)route tussen de verblijfplaats(en) en foerageergebieden. Om effecten te voorkomen dienen maatregelen te worden getroffen om de functionaliteit van deze route zowel tijdens de bouw als in de nieuwe situatie te waarborgen.

Door (bouw)verlichting kunnen vleermuizen worden verstoord. Zowel tijdens de ontwikkeling als in de gebruiksfase dient derhalve een vleermuisvriendelijke verlichtingswijze te worden toegepast.

Amfibieën en reptielen

Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën en reptielen en/of sporen daarvan aangetroffen in het plangebied. In de directe omgeving is de aanwezigheid bekend van: gewone pad, kleine watersalamander, bruine kikker en meerkikker (Creemers en Van Delft, 2009; waarneming.nl, 2002-2017). Reptielen worden, gelet op verspreidingsgegevens en essentiële habitatkenmerken niet verwacht. Amfibieën leven in een terrestrisch (met name herfst/winter) en aquatisch (met name lente/zomer) habitat. Beide habitatonderdelen dienen op korte afstand van elkaar te liggen. Op de planlocatie is geen goed ontwikkelde vegetatie aanwezig. Enkel de meer algemene, opportunistische amfibieën als kleine watersalamander, gewone pad en bruine kikker komen incidenteel voor op de planlocatie. Bovendien kan een essentiële functie uitgesloten worden. De vorengenoemde soorten zijn opgenomen in vrijstellingsbesluiten conform de verordening van de provincie Zuid-Holland.

Vissen

Aangrenzend aan de westzijde is een watergang gelegen. De sloot is nagenoeg dichtgegroeid en er staat vrijwel geen water in. Behoudens oeverwerkzaamheden aan de watergang zijn geen ingrepen voorzien aan oppervlaktewater. Tevens kunnen door trillingen, geluid en licht vissen tijdelijk verstoord worden. De grote modderkruiper leeft in sterk verlande watergangen. Veelal is het leefgebied van de soort gelegen in (oude) stroomgebieden van rivieren en op plaatsen waar sprake is van kwel. In Zuid-Holland is het voorkomen van de soort slecht onderzocht waardoor er geen duidelijk beeld is waar de soort al dan niet voorkomt. De sloot maakt onderdeel uit van een relatief klein watersysteem wat bestaat uit een brede watergang langs de Herenweg met enkele kleine daarop aangesloten (uitlopers) van kavelsloten. Het leefgebied van de grote modderkruiper bestaat uit een watersysteem van langzaam stromende ondiepe, vegetatierijke sloten, plassen en oude meanders met een harde bodem en dikke sliblaag. In dit watersysteem is sprake van extensief beheer en vaak is er een (historische) relatie met oude rivierloop en/of bedding. Gelet op de (on)geschiktheid van het watersysteem en het ontbreken van concrete waarnemingen nabij de planlocatie en in de bredere omgeving hiervan is het aannemelijk dat de sloot geen relevant leefgebied vormt voor de grote modderkruiper. Voor overige vissen geldt dat in de directe omgeving voldoende vergelijkbaar habitat waar de eventueel aanwezige vissen zich al dan niet tijdelijk kunnen ophouden. Effecten op beschermde vissen zijn uitgesloten.

Insecten, libellen en ongewervelde

In het plangebied zijn tijdens het veldbezoek geen (sporen en/of delen van) beschermde vlinders, libellen of overige ongewervelde aangetroffen. Op de locatie en in de directe omgeving zijn slechts enkele algemene bomen en struiken aangetroffen.

Op de planlocatie zijn geen plantensoorten aangetroffen die als waardplant dienen. Tevens ontbreken oude stronken, zure vennetjes of andere specifieke omstandigheden die duiden op de mogelijke aanwezigheid van beschermde ongewervelde. Een essentiële functie voor beschermde soorten is uitgesloten.

Vogels

In het plangebied en de directe omgeving hiervan zijn tijdens het veldbezoek foeragerende, overvliegende en rustende vogels waargenomen. De waargenomen soorten betreffen: knobbelzwaan, kokmeeuw, kleine mantelmeeuw, waterhoender, merel, spreeuw, grote zilverreiger, winterkoning, kauw, koolmees en vink. Behoudens een eksternest buiten de planlocatie zijn er geen nesten aangetroffen.

De oevers op het terrein en in directe omgeving ervan zijn geschikt als nestlocaties van eenden en andere algemene watervogels. Derhalve dienen de werkzaamheden bij voorkeur buiten het broedseizoen te worden opgestart of, indien dit niet mogelijk is, dient de locatie voorafgaand aan de werkzaamheden geïnspecteerd te worden door een ter zake deskundige. Het broedseizoen vangt aan onder bepaalde klimatologische omstandigheden maar betreft indicatief de periode medio maart tot en met medio juli.

Gebiedsbescherming

De planlocatie maakt, behoudens het Nationaal Landschap 'Groene Hart', geen deel uit van een beschermd gebied en/of locatie betreffende: Natura 2000, Beschermd natuurmonument, Wetland, Nationaal Park, Nationaal Landschap of Natuurnetwerk Nederland. Op een afstand van 9,5km en meer liggen enkele Natura2000-gebieden (figuur 2). De planlocatie ligt op een afstand van 1,3km tot het Natuurnetwerk Nederland (figuur 3).



Figuur 2 De planlocatie (rood omcirkeld) ligt op een afstand van circa 9,5km tot het Natura2000-gebied Nieuwkoopse plassen & de Haack en op 12,0km van het Natura2000-gebied De Wilck (bron: pzh.b3p.nl).



Figuur 3 De planlocatie (rood omcirkeld) ligt op een afstand van 1,3km tot het Natuurnetwerk Nederland (bron: pzh.b3p.nl).

De realisatie van een woning leidt tot een zeer licht verkeerstrekkende werking. De woning wordt gerealiseerd tussen andere woonpercelen aan de grens van het dorp Rijsaterwoude. Een significante toename in stikstofdepositie is uitgesloten. Bovendien zal de nieuwe woning energiezuinig zijn. De nieuwbouw leidt tot een tijdelijke toename in stikstofdepositie (projecteffect). Een toename in stikstofdepositie kan een effect sorteren op kwetsbare en gevoelige habitattypen. Echter leert de ervaring dat het projecteffect bij soortgelijke en grotere projecten en de afstand tot kwetsbare habitats dat de stikstofdepositie onder de drempelwaarde van 0,05 mol/hectare/jaar blijft. Tevens geldt voor de overige effecten (trillingen, geluid, optische verstoring etc.) dat de afstand tot omliggende Natura2000-gebieden per definitie te groot is. Ten aanzien van het Natuurnetwerk Nederland geldt dat externe werking geen toetsingskader is.

Conclusies

In het plangebied of de directe omgeving daarvan komen geen beschermde diersoorten van de Wet natuurbescherming voor. Het plangebied heeft aannemelijk geen essentiële betekenis voor soorten die behoren tot het beschermingsregime habitatrichtlijnsoorten, vogelrichtlijnsoorten of overige soorten. Vleermuizen maken mogelijk incidenteel gebruik van de locatie tijdens het foerageren. De locatie maakt mogelijk onderdeel uit van het leefgebied van algemene (licht beschermde) amfibieën en zoogdieren. De oevers op de planlocatie zijn geschikt als broedlocatie voor algemene broedvogels.

De planlocatie maakt, behoudens het Nationaal Landschap 'Groene Hart', geen onderdeel uit van een Natura2000-gebied, Beschermd natuurmonument, Wetland, Nationaal Park, Nationaal Landschap of Ecologische Hoofdstructuur. Gelet op de aard van de werkzaamheden, de afstand tot de gebieden en de identieke nieuwe situatie is van externe werking op omliggende Natura2000-gebieden geen sprake.

Tabel 1 Overzicht van de functie van het plangebied voor beschermde flora en fauna alsmede de verwachte effecten naar aanleiding van de beoogde ingrepen en de eventueel daarop te nemen vervolgstap.

Legenda x = ongeschikt ja = geschikt m (mogelijk) = nader te bepalen of mits maatregelen getroffen worden	vaatplanten	zoogdieren	vleermuizen	amfibieën	reptielen	vissen	broedvogels (a)	broedvogels (j)
Geschikt habitat Vogelrichtlijnsoort							ja	x
Geschikt habitat Habitairichtlijnsoort	x	x	m	x	x	x	x	
Geschikt habitat overige soort	x	x		x	x	x		
Soortspecifiek onderzoek noodzakelijk	x	x	x	x	x	x	x	x
Gebiedsbescherming	afstand		effecten		nader onderzoek/ Aerius			
Natura2000	9,5km		geen		n.v.t.			
Natuurnetwerk Nederland	1,3km		geen		n.v.t.			

Uitvoerbaarheid bestemmingsplan

De bouwwerkzaamheden en het gebruik van een woning leidt niet tot aantasting van beschermde natuurwaarden en/of beschermde gebieden. Tijdens de uitvoering dient rekening te worden gehouden met de (mogelijke) aanwezigheid van vleermuizen en algemene broedvogels. Voor deze soorten dienen eventueel maatregelen te worden getroffen om effecten te voorkomen. De aanwezigheid van beschermde soorten (Wnb, art. 3.10) en hun leefgebied vormen geen bezwaar voor de beoogde bestemmingsplanwijziging (vrijstellingsbesluit).

Conclusie

De realisatie van een woning aan de Herenweg te Rijnsaterwoude is uitvoerbaar conform het bepaalde in de Wro (artikel 3.1.6 Bro).

Te treffen maatregelen

- Tijdens de werkzaamheden moet voorzichtig worden gehandeld met alle voorkomende flora en fauna (Zorgplicht).
- Wanneer ondanks zorgvuldig handelen, onderzoek en advies schade lijkt te ontstaan voor beschermde flora en fauna, dient direct contact opgenomen te worden met een ter zake deskundige.

- Alle aanwezige vegetatie of bodemmateriaal (takken, stronken) gefaseerd verwijderen. Dit om bodembewonende dieren de kans te geven in de nabijgelegen omgeving een ander leefgebied te benutten.
- Er wordt gelegenheid gegeven aan dieren, die tijdens de werkzaamheden worden gevonden, te vluchten of zich te verplaatsen naar een schuilplaats buiten het bereik van de werkzaamheden.
- De planlocatie tijdens de werkzaamheden en in de nieuwe situatie bij voorkeur minimaal verlichten en hierbij een vleermuisvriendelijke verlichtingswijze toepassen (amberkleurig licht, lichtbundel nederwaarts richten, toepassen geconvergeerde lichtbundel) en de werkzaamheden in de periode april-oktober tussen zonsopgang en zonsondergang uitvoeren (buiten schemerperiodes).
- De werkzaamheden opstarten/uitvoeren buiten het broedseizoen (medio maart t/m medio juli). Indien de werkzaamheden in het broedseizoen worden uitgevoerd dient voor de aanvang door een ter zake deskundig gecontroleerd te worden of er broedvogels aanwezig zijn. E.e.a. op aanwijzing van deskundige.

Literatuur

- Bang, P. & P. Dahlström, 2005. Tierspuren. Fährten, Fraßspuren, Losungen, Gewölle und andere. BLV Buchverlag GmbH & Co. KG, München
- Creemers, R.C.M & J.J.C.W. van Delft (raxon)(redactie), 2009. De amfibieën en reptielen van Nederland. -Nederlandse fauna 9. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, European Invertebrate Survey - Nederland, Leiden
- Dietz, C., O. von Helversen, D. Nill & P.H.C. Lina, 2011. Vleermuizen: alle soorten van Europa en Noordwest-Afrika: biologie, kenmerken en bedreigingen. Tirion Natuur, Utrecht.
- Limpens, H., K. Mostert & W. Bongers, 1997. Atlas van de Nederlandse vleermuizen. Onderzoek naar verspreiding en ecologie. KNNV Uitgeverij, Utrecht.

Geraadpleegde websites

phz.b3p.nl
 www.libellennet.nl
 www.raxon.nl
 www.ruimtelijkeplannen.nl
 www.synbiosys.alterra.nl
 www.vleermuisprotocol.nl
 www.waarneming.nl
 www.zoogdierenvereniging.nl

We hopen u met deze rapportage voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er desondanks vragen zijn kunt u vrijblijvend contact opnemen.

Met vriendelijke groet,



Blom Ecologie bv,
ing. T.J.P. den Otter

Bijlage 1 Fotografische impressie

© BLOM ECOLOGIE B.V.
KERKSTRAAT 4 - 4181 AB WAARDENBURG

Niets uit deze rapportage mag zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever en Blom Ecologie bv worden gebruikt door derden. Onder gebruik worden alle vormen van kopie, openbaarmaking en elke andere toepassing begrepen. Deze rapportage mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor het is samengesteld.

Blom Ecologie bv is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit toepassing van de resultaten van werkzaamheden en/of gegevens verkregen van Blom Ecologie bv.

Bijlage 1 Fotografische impressie



Figuur 1 De planlocatie is gelegen aan de Herenweg te Rijsaterwoude. In het midden van de planlocatie is sprake van een dichtgegroeiide sloot.



Figuur 2 De initiatiefnemer is voornemens om op het bestaande grasland een nieuwe woning te realiseren.



Figuur 3 De zoom van het zuidelijk aangrenzende perceel beschikt over een goed ontwikkelde vegetatiestructuur en is geschikt als broedlocaties voor algemene vogelsoorten.



Figuur 4 Aan de oostzijde van het perceel grenst een weide met kippen en schapen.