

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA



Vieruitersten 24, Meijel



Datum : 10 april 2024



Rapportnummer : 222-MVi24-nw-v3

**Project : Quick scan flora en fauna in de omgeving
Vieruitersten 24 te Meijel**

Opdrachtgever : Pijnenburg

Datum rapport : 10 april 2024

Van toepassing zijnde certificaat : NEN-EN-ISO 9001, 2015

Van toepassing zijnde protocollen : --

Nummer certificaat : EC-KWA-00044

Projectleider :

Collegiale toets :

Voor akkoord:

Inhoudsopgave

<u>Hfdst.</u>	<u>Titel</u>	<u>Blz.</u>
1.	Inleiding	1
2.	Inventarisatie flora en fauna	3
2.1	Algemeen	3
2.2	Beschrijving literatuuronderzoek	4
2.3	Natuurnetwerk Nederland	5
2.4	Vleermuissoorten	6
2.5	Informatie door de KNNV	7
2.6	Beschermde natuurgebieden	7
3.	Veldonderzoek door M&A	8
4.	Potentiële natuursoorten en relatie met ontwikkeling	12
5.	Conclusie	15

Bijlagen

Bijlage 1	: Situatietekening en luchtfoto
Bijlage 2a	: Foto's onderzoekslocatie en omgeving in november 2021
Bijlage 2b	: Foto's onderzoekslocatie en omgeving in juli 2022
Bijlage 3	: Natuurgegevens provincie Limburg
Bijlage 4	: Natuurdata Het Natuurloket

1. Inleiding

Op 20 oktober 2021 is door aan M&A Omgeving BV opdracht verleend tot het uitvoeren van een quick scan flora en fauna voor de sloop van de agrarische bedrijfs gebouwen en de nieuwbouw van een paarden-houderij op het perceel aan de Vieruitersten 24 in Meijel. De bestemming van de locatie wordt gewijzigd van ‘agrarisch-intensieve veehouderij’ naar ‘agra-risch grondgebonden’. Tevens wordt het bestemmings- en bouwvlak vergroot.

In verband met de sloop en nieuwbouw op de locatie dient te worden aangetoond dat er geen negatieve consequenties gelden voor de natuurwaarden in het gebied.

De onderzoekslocatie is gesitueerd in het buitengebied ten oosten van de bebouwde kom van Meijel.

Dit natuurwaardenonderzoek beschrijft of het voornemen van de sloop en nieuwbouw consequenties kunnen hebben voor de in het gebied aanwezige beschermde flora en fauna en met name voor jaarrond beschermde soorten.

Voor de locatie is een landschappelijke inpassing opgesteld, waarvan het ontwerp hierna is weergegeven. Met de landschappelijke inpassing worden impulsen aan natuurontwikkeling gegeven, door de toepassing van verschillende grassen etc. i.p.v. de akkers met maïs of gras.



De luchtfoto en situatietekening van de locatie is weergegeven in bijlage 1.

De tweede versie is opgesteld naar aanleiding van een aantal opmerkingen van de provincie Limburg op de rapportage. In de derde versie zijn een aantal zaken nader toegelicht i.v.m. zienswijzen tegen het ontwerp-bestemmingsplan.

2. Inventarisatie flora en fauna

2.1 Algemeen

In dit onderzoek zijn de huidige natuurwaarden onderzocht middels actuele literatuurgegevens. Hiervoor kan op een drietal manieren informatie worden verkregen:

1. Literatuuronderzoek door gegevens op te vragen bij het Natuurhistorisch Genootschappen, de provincie, SOVON, Vlinderstichting, RAVON, FLORON, VZZ en EIS.
2. Literatuuronderzoek middels het nemen van contact met plaatselijke natuur- en milieu instanties als IVN-afdelingen, vogelwachten, kringen van het Natuurhistorisch Genootschap etc.
3. Aanvullende hierop, het uitvoeren van een veldonderzoek.

In onderhavige situatie zijn in eerste instantie stappen 1 en 3 uitgevoerd. Het opnemen met plaatselijke natuurverenigingen was ons inziens in dit geval niet noodzakelijk, daar de inventarisatie voldoende duidelijke gegevens opleverde.

Algemeen doel van het onderzoek is een beeld te krijgen van de aanwezige flora en fauna. Daarbij is de nadruk gelegd op beschermde, bedreigde en schaarse soorten en soorten die specifieke milieumomstandigheden indiceren.

2.2 Literatuuronderzoek

Bij het literatuuronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd;

1. Het Natuurloket (SOVON, De Vlinderstichting, RAVON, EIS Nederland, FLORON, VZZ, BLWG, NMV)
2. Ministerie EZ; Vogel- en Habitatrichtlijngebieden
3. Natuurnetwerk Nederland (natuurbeheerplan Provincie Limburg)
4. Natuurbeheerplan van de gemeente Peel en Maas
5. Wet natuurbescherming (van kracht per 1-1-2017)

Vervolgens is gekeken naar de status van de waarnemingen binnen de Wet natuurbescherming (Wnb), Commissie van Bern en de Nederlandse Rode Lijst. Voor deze en een aantal extra soorten geldt het “Nee, tenzij” principe als deze soorten in het plangebied voorkomen en bij ingrepen die het leefgebied aantasten.

Indien beschermde vogel- en/of zoogdiersoorten voorkomen, gelden binnen de Wet natuurbescherming bij de aanleg van een nieuwe functie in een gebied de voorwaarden van hoofdstuk 3. Hierin wordt voor soorten volgens de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn het verbod om dieren te doden en verwonden, te verontrusten en de nesten, hollen of andere voortplantings- of vaste verblijfplaatsen van deze dieren te verstoren, te beschadigen of weg te nemen.

Dit betekent voor permanente nest- en/of verblijfplaatsen van beschermde soorten dat altijd een ontheffing van de Wnb aangevraagd dient te worden bij Gedeputeerde Staten. Binnen het broedseizoen wordt geen ontheffing verleend voor de verstoring hiervan.

Voor beschermde soorten die alleen in het broedseizoen op de locatie nestelen en/of verblijven, betekent dit dat geen bouw- en sloopwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd in deze periode. Over het algemeen betreft deze periode het voorjaar en begin van de zomer, globaal van 15 maart tot 15 juli. Indien binnen deze periode bouw- en / of sloopwerkzaamheden worden verricht, dan moet een ontheffing in het kader van de Wnb bij Gedeputeerde Staten worden aangevraagd.

2.3 Natuurnetwerk Nederland

Natuurnetwerk Nederland (voorheen ecologische hoofdstructuur) is een netwerk van natuurgebieden en verbindingszones. Planten en dieren kunnen zich zo van het ene naar het andere gebied verplaatsen. Op plekken waar gaten in het netwerk zitten, legt de provincie nieuwe natuur aan.

In de omgeving van de bouwlocatie zijn geen ecologische verbindingszones of Natura 2000 gebieden aanwezig. Het meest nabij gesitueerde gebied is de Deurnesche Peel & Mariapeel (deelgebied Het Zinkske) op 700 meter ten noorden van de locatie.

De gronden van de onderzoekslocatie zijn niet aangewezen als gewenste nieuwe natuur of te verwerven percelen in het kader van natuurbeheer. De percelen van Staatsbosbeheer aan de noord- en oostzijde zijn onderdeel van het Natuurwerk Limburg. De afstanden tot deze percelen wijzigen niet en blijft 0 meter.

De afstanden tot de EVZ en beschermde natuurgebieden zijn voldoende groot, om te kunnen stellen dat de invloed van de sloop en nieuwbouw op het perceel niet relevant zijn voor genoemde gebieden. Door het saneren van de intensieve veehouderij op de locatie zal de stikstofdepositie voor een groot gedeelte worden gereduceerd t.o.v. de nieuwe paardenhouderij op de locatie.

Via de Atlas Limburg zijn de gegevens van inventarisaties van broedvogels bestudeerd. Uit de laatste inventarisatieronde (2016) zijn op het perceel waarnemingen gedaan van de Holenduif en in 2001 is de Zwarte Roodstaart waargenomen.

Volgens de gegevens van de NDFF zijn een drietal waarnemingen op en nabij de onderzoekslocatie bekend:

- op het naastgelegen grasveld is een levendbarende hagedis waargenomen
- waarneming van een buizerd
- steenuil in één van de stallen op de onderzoekslocatie (waarneming uit 2021)

Deze soorten zullen specifiek nader worden beschouwd in deze quick scan.

2.4 Vleermuissoorten

De meest voorkomende soorten in Nederland volgens de ‘Verspreidingsatlas vleermuizen’, maar ook in het betreffende gebied, zijn de Bruine Grootoorvleermuis, de Gewone Dwergvleermuis en de Ruige Dwergvleermuis. Verder komen in de regio de Laatvlieger, Rosse Vleermuis en Baardvleermuis veelvuldig voor in de bebouwde omgeving.



Gewone Dwergvleermuis



Bruine Grootoorvleermuis

De vleermuissoorten hebben een divers leefgebied (bossen, begroeide landschappen, nabij open water etc.). Vleermuizen hebben hun habitat (winter-, kraam-, zomer- en paar-verblijfplaatsen) vaak in bebouwing, bomen of opgaande gewassen.

Foerageergebieden en vlieg-/migratieroutes zijn afhankelijk van landschappelijke kenmerken zoals water, lijnvormige landschapselementen (kust, dijken, duinen, rivierdalen en waterpartijen) en kleinschalige groenelementen (parken, kleine bossen).

Mogelijke verblijfplaatsen van de zoogdieren zijn gebouwen, bomen, grotten, groeves, kelders, bruggen, tunnels of andere objecten met ruimte.

2.5 Informatie door het KNNV

Bij het KNNV te Zeist, Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, een vereniging voor veldbiologie, is navraag gedaan over informatie met betrekking tot natuurdata over de locatie Vieruitersten 24 in Meijel.

Uit dit telefonisch contact is duidelijk geworden dat de vereniging van de omgeving geen nadere natuurinformatie heeft.

2.6 Resultaten literatuuronderzoek

2.6.1 Vogel- en Habitatrichtlijngebieden

Via het ministerie van EZ zijn de Vogel- en Habitatrichtlijnkaarten beschouwd en hieruit kan worden geconcludeerd dat er geen Natura 2000 gebieden in de directe omgeving aanwezig zijn. Het dichtst bij gesitueerde Natura 2000 gebied is 'Deurnesche Peel & Mariapeel', waarvan het deelgebied 'Het Zinkske' op een afstand van ongeveer 700 meter ten noorden van de locatie is gesitueerd.

De ontwikkelingen op het perceel hebben gezien de afstand tot het gebied geen invloed op beschermde natuurgebieden. Door het wegvallen van een groot gedeelte van de stikstof depositie door het saneren van de intensieve veehouderij op de locatie en daarvoor in de plaats de realisatie van een paardenhouderij, zal zelfs een positief effect worden bewerkstelligd voor de Natura 2000 gebieden.

3. Veldonderzoek door M&A

Op 5 november 2021, 12 juli en 22 juli 2022 zijn veldonderzoeken uitgevoerd op de onderzoekslocatie, door . heeft deskundigheid op het gebied van flora en fauna en in het bijzonder in inheemse zoogdieren en broedvogels.

De buitentemperatuur bedroeg op 5 november 2021 ongeveer 15 °C, luchtvochtigheid 50% en 5/8 bewolkingsgraad. Er was geen neerslag. In de avondperiode bedroeg de temperatuur nog 12 °C.

De buitentemperatuur bedroeg op 12 juli 2022 (07.00 - 09.00 uur) ongeveer 16 °C, luchtvochtigheid 40% en 6/8 bewolkingsgraad. Er was geen neerslag. In de avondperiode (20.00 - 22.30 uur) bedroeg de temperatuur 18 °C.

De buitentemperatuur bedroeg op 22 juli 2022 (07.00 - 0.900 uur) ongeveer 14 °C, luchtvochtigheid 50% en 3/8 bewolkingsgraad. Er was geen neerslag. In de avondperiode (20.00 - 22.30 uur) bedroeg de temperatuur 16 °C.

Broedvogelsoorten

Tijdens de veldbezoeken is gekeken naar flora en fauna. Daarbij is op de locatie van de te slopen gebouwen (stallen, werktuigenloods, sleufsilos en verhardingen) rastermatig het gebied verkend. De milieuhinder (geluid, geur, luchtkwaliteit, licht etc.), door de sloop van de gebouwen en de latere nieuwbouw van een paardenhouderij op het perceel, zal reeds op een afstand van 100 meter minimaal zijn.

Eventuele natuurwaarden op grotere afstand zullen geen enkele invloed meer ondervinden van de werkzaamheden.

Tijdens het veldonderzoek in november 2021 zijn een aantal inheemse soorten (Koolmees, Roodborst, Houtduif, Merel, Vink) waargenomen. Tijdens het veldonderzoek in de dagperiode zijn geen verblijfplaatsen / nesten van jaarrond beschermde soorten zoals bijvoorbeeld Huismussen of Gierzwaluwen waargenomen.

Tijdens de veldonderzoeken in juli 2022 zijn eveneens een aantal inheemse soorten (Koolmees, Houtduif, Zwarte Kraai, Merel, Vink) waargenomen. Tijdens het veldonderzoek in de dagperiode zijn geen verblijfplaatsen / nesten van jaarrond beschermde soorten zoals bijvoorbeeld Huismussen, Gierzwaluwen of uilen (met name de Steenuil) waargenomen. Gierzwaluwen zijn op de locatie niet waarschijnlijk, omdat de mogelijke uitvlieghoogten beperkt zijn. Gierzwaluwen verkiezen vaak een minimale uitvlieghoogte tussen 4 en 5 meter of hoger en dit is bij de gebouwen op het perceel nauwelijks mogelijk.

De agrarische bedrijfsgebouwen zijn onderzocht op eventuele nesten / verblijfplaatsen van vogels, vleermuizen en uilen. Hierbij is niets aangetroffen. Ook bij de nadere inventarisaties in juli 2022 zijn geen nesten of verblijfplaatsen van vogels aangetroffen. Bij de inventarisatie is ook speciale aandacht besteed aan andere kenmerken van broedende vogelsoorten, zoals uitwerpselen en achtergelaten nestmateriaal. In de gebouwen is in juli 2022 met name gelet op de aanwezigheid of kenmerken van voormalige aanwezigheid van de Steenuil of andere uilsoorten. Dit met name omdat bij de NDFF een waarneming bekend is van een Steenuil in één van de gebouwen. Bij de inventarisaties in juli 2022 zijn geen kenmerken van aanwezigheid van uilen aangetroffen in de bebouwing.

Ook de eerder geconstateerde waarneming van een Buizerd kon door de inventarisaties niet worden bevestigd. De Buizerd is echter in de regio volop aanwezig en het is zeer reëel om te veronderstellen dat deze in het gebied foerageert. Broedmogelijkheden zijn echter op de onderzoekslocatie niet aanwezig, vanwege het feit dat de Buizerd bij voorkeur broedt in bomen.

Kieren en gaten in de muren van de stallen / werktuigenstalling en de aansluitingen van de muren op de daken zijn met behulp van een camera (Novascope) geïnspecteerd. Hierbij is gelet op aanwezigheid van soorten, nesten en sporen van broedvogels en vleermuizen. Hierbij zijn geen aanwijzingen aangetroffen voor de aanwezigheid van fauna.

Vleermuizen

Bij het veldbezoek is met name speciaal gelet op de aanwezigheid van verblijfplaatsen voor vleermuizen. Deze zijn echter niet aangetroffen in de te slopen bebouwing. Op de onderzoekslocatie is verder weinig begroeiing aanwezig.

Bij de veldbezoeken op 5 november 2021 in de avondperiode (van 18.30 uur tot ongeveer 22.00 uur) en 12 en 22 juli 2022 (van 20.00 tot 22.30 uur) is gebruik gemaakt van een vleermuisdetector van het type Baton en een laptop met BatScan-software voor het herkennen van vleermuisspectra. Met de detector zijn ter plaatse van het onderzoeksperceel geen waarnemingen van vleermuissoorten gedaan.

Het gebruik van de detector in de avondperioden is uitgevoerd om te verifiëren of er sprake is van vleermuizen die de bebouwing op het perceel gebruiken als verblijfplaats. Dit is hier niet het geval. Ons inziens is geen verder onderzoek noodzakelijk volgens het vleermuisprotocol van het NGB.

Andere hulpmiddelen, zoals een mistnetonderzoek of boomcamera zijn niet toegepast omdat met onderhavig onderzoek reeds voldoende informatie is verkregen over de aanwezigheid van vleermuizen.

Overige soorten

Voor de overige soorten is met name gelet op marterachtigen, zoals de steenmarter, bunzing en hermelijn. Er zijn geen sluip- of vraatsporen aangetroffen van deze soorten. De kans dat deze zullen worden aangetroffen zijn als klein te beschouwen. De bebouwing leent zich namelijk niet als verblijfplaats voor deze soorten, vanwege het feit dat de stallen hermetisch gesloten zijn i.v.m. ongediertebestrijding en de werktuigenloods juist te open is, zodat geen schuilmogelijkheden voorhanden zijn.

Op de akkerlanden rondom het perceel zijn sporen van de Das en van reën aangetroffen. Deze gebruiken het gebied als foeragegebied, maar op de onderzoekslocatie zelf zijn geen sporen aangetroffen en er zijn voor deze soorten ook geen verblijfplaatsen op de onderzoekslocatie.

Op 12 en 22 juli zijn de aangrenzende graslanden / weien nader geïnspecteerd op de aanwezigheid van de levendbarende hagedis. Deze is volgens de NDFF waargenomen op het grasland. Op zich is deze waarneming discutabel omdat de levendbarende hagedis een vochtminnende soort is. Deze zal graag op oevers en vochtige terreindelen verblijven. Ook wordt de soort aangetroffen in het ruige gras. Dit soort grassen zijn alleen aanwezig aan de achterzijde (richting Molenbaan). Aan de west- en oostzijde zijn graslanden die regelmatig worden bewerkt (o.a. maaien).

Tijdens de inventarisaties in juli zijn geen hagedissen aangetroffen op het perceel of op de graslanden rond de onderzoekslocatie.

4. Potentiële natuursoorten en relatie met ontwikkeling

De fysieke ontwikkeling ter plaatse betreft de sloop van stallen, werktuigenloods, schuur, sleufsilo's en verhardingen en de realisatie van een nieuwe paardenhouderij op het perceel. Het aantal verkeersontwikkelingen zal door de werkzaamheden niet toenemen. De emissie van geluid, geur of stof zal door de nieuwe ontwikkeling ruimschoots binnen de te stellen normering blijven.

Door de sanering van de intensieve veehouderij op de locatie zal de stikstofdepositie voor een groot gedeelte wegvallen, zodat qua stikstofdepositie een positief effect wordt bewerkstelligd op de natuurgebieden.

De percelen grond zullen gebruikt worden als buitenpiste, buitenrijbak, paddocks en als grasland. De bedrijfsvoering is minder intensief dan bij de voormalige akkerbouwmatige activiteiten, zoals die voorheen plaatsvonden. Binnen deze percelen kunnen paarden, al dan niet met ruiters, aanwezig zijn. Deze zullen tot minder verstoring leiden, dan bij activiteiten met landbouwmachines.

De mate van verstoring en mogelijke vormen van overlast zijn in de beoogde situatie kleiner dan in de bestaande situatie. Dit geldt niet alleen voor mensen, maar tevens voor fauna die zich in de directe omgeving van het plangebied bevinden.

Per natuursoort zal worden aangegeven wat de invloed van de ontwikkeling is op de mogelijk voorkomende natuursoorten zal zijn.

Flora

Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde soorten planten aangetroffen. Er is dus geen invloed van de ontwikkeling hierop.

Vogels

Uit de bevindingen van het veldbezoek blijkt dat het onderzoeksgebied geschikt is als onderdeel van het foerageergebied. Er is weinig begroeiing aanwezig op het perceel, zodat broedplaatsen op het perceel schaars zijn. Er zijn tijdens het veldonderzoek een aantal inheemse soorten waargenomen.

Er zijn in de te slopen bebouwing geen broed- / verblijfplaatsen aanwezig. Omdat bij de inventarisatie geen beschermde soorten zijn waargenomen, is het niet waarschijnlijk dat verstoring optreedt bij de werkzaamheden.

De eerder uit waarnemingen van het NDFF aangetroffen Steenuil in 2021, is niet meer aangetroffen. Ook van andere uilen zijn geen sporen aangetroffen in de bebouwing op de locatie.

De Buizerd is evenmin aangetroffen op het perceel maar zal het gebied mogelijk gebruiken als foerageergebied. Broedmogelijkheden zijn niet aanwezig voor deze soort op het perceel.

In de nieuwe situatie blijven de foerageermogelijkheden aanwezig, zodat er netto geen wijzigingen in het gebied optreden voor broedvogelsoorten. Ook in de omgeving blijven ruimschoots voldoende mogelijkheden over, zodat de invloed op de vogels buiten het broedseizoen te verwaarlozen is.

Door de realisatie van het plan worden er ruim 100 nieuwe bomen geplant, hagen en struikgroepen aangeplant, bloemrijke grasranden aangelegd en een hemelwateropvang aangelegd die jaarrond water zal bevatten. Dit alles biedt nieuwe kansen voor flora en fauna.

Zoogdieren

Uit de bevindingen van het veldbezoek blijkt dat het onderzoeksgebied niet geschikt is voor grondgebonden zoogdieren, omdat het akkerbouwperceel regelmatig wordt bewerkt. Tijdens het veldbezoek zijn ook geen sporen aangetroffen van beschermde zoogdieren.

Rondom het plangebied zijn geen sporen of mogelijk verblijfplaatsen aangetroffen van vleermuizen. De te slopen bebouwing is hierop degelijk onderzocht. Het is wel mogelijk dat het gebied wordt gebruikt als foeragegebied.

De werkzaamheden tijdens de sloop en nieuwbouw zullen dus geen verstoring betekenen van eventueel vleermuizen. Ook hiervoor geldt dat er voldoende mogelijkheden in de directe omgeving resteren, zodat de invloed van de ontwikkeling op genoemde soorten als klein beschouwd kan worden.

Op de akkerlanden rondom het perceel zijn sporen van de Das en reeën aangetroffen. Deze gebruiken het gebied als foeragegebied, maar op de onderzoekslocatie zelf zijn geen sporen aangetroffen.

Reptielen en amfibieën

Uit de bevindingen van het veldbezoek blijkt dat de omgeving van het onderzoeksgebied niet geschikt is als onderdeel van het leefgebied van zowel reptielen als amfibieën. De voorwaarde hiervoor is de aanwezigheid van water in de onmiddellijke nabijheid en dat is hier niet het geval.

Voor reptielen die op droge gronden habiteren is het perceel minder geschikt, vanwege de aanwezigheid van de verhardingen. In de omgeving zijn er ruimschoots habitats mogelijk voor deze soorten.

De bij waarnemingen van het NDFF aangetroffen levendbarende hagedissen, zijn niet aangetroffen in het plangebied of de aangrenzende graslanden. De kans hierop is vanwege de bewerking (o.a. maaien) van de weiden minimaal. De plannen op de onderzoekslocaties hebben geen invloed op het leefgebied van de levendbarende hagedissen.

Vlinders en libellen

Uit de bevindingen van het veldbezoek blijkt dat het onderzoeksperceel zelf minder geschikt is als onderdeel van het leefgebied van zowel vlinders als libellen, vanwege het ontbreken van waadplanten op het perceel en van water in de directe nabijheid. In de omgeving van het onderzoeksgebied is wel een juiste biotoop voor vlinders en libellen aanwezig. Tijdens het veldbezoek zijn geen soorten geconstateerd.

Mieren en kevers of overige ongewervelden

Uit de bevindingen van het veldbezoek blijkt dat het onderzoeksgebied niet geschikt is voor beschermde soorten kevers, omdat er geen geschikte biotopen aanwezig zijn. Voor het voorkomen van beschermde soorten mieren is de aanwezigheid van open naaldbossen een voorwaarde.

Tijdens het veldbezoek zijn geen soorten geconstateerd. Ook hier geldt dat de ontwikkeling op het perceel geen invloed heeft op de aanwezigheid van mieren, kevers of overige ongewervelden in het gebied.

Vissen

Uit de bevindingen van het veldbezoek blijkt dat in de omgeving van het onderzoeksgebied geen vissen kunnen voorkomen, omdat er geen water in de directe nabijheid aanwezig is. De sloten in de directe omgeving zijn hiervoor niet geschikt.

5. Conclusie

Door het literatuuronderzoek van de inventarisatie is aangetoond dat het mogelijk is dat in het gebied beschermde flora of fauna (voornamelijk vleermuizen, broed- en wintervogels) voor kunnen komen (zie inventarisatie Natuurloket).

In de nabijheid van het perceel zijn tijdens de veldbezoeken in november 2021 en juli 2022 echter geen waarnemingen gedaan van schaarse soorten. Ook rondom het perceel zijn bij de inventarisaties geen waarnemingen gedaan van beschermde soorten (waaronder jaarrond beschermde soorten, zoals bijvoorbeeld Huismussen, (nesten van) Gierzwaluwen, uilen en vleermuissoorten.

De veldonderzoeken, uitgevoerd in de dag- en avondperiode op 5 november 2021 en 22 juli 2022, is buiten het broedvogelseizoen uitgevoerd. Daarom is er speciale aandacht besteed aan andere kenmerken van broedende vogelsoorten. Onder andere uitwerpselen van broedvogelsoorten, achtergebleven nestmaterialen en vraatsporen zijn kenmerken waarop speciaal is gelet. De veldonderzoeken op 12 juli 2022 zijn wel binnen het vogelbroedseizoen uitgevoerd. De veldonderzoeken kunnen daarom als vrij uitvoerig worden beschouwd.

Bij de inventarisaties is ook aandacht besteed aan verblijfplaatsen van vleermuizen en nestkasten en -mogelijkheden in het gebied. Bij de inventarisatie van de vleermuizen is extra aandacht besteed aan mestsporen, keutels en vraatsporen.

De kieren en openingen in de te slopen bebouwing zijn onderzocht met een camera (Novascope) en hierbij zijn geen aanwijzingen aangetroffen voor verblijfplaatsen van fauna.

De afstanden tot de ecologische verbindingzones en waardevolle natuurgebieden zijn voldoende groot om te kunnen stellen dat de ontwikkelingen in het plangebied een positieve invloed zullen hebben op deze gebieden. Dit is vanwege het wegvallen van een groot gedeelte van de stikstofdepositie door de sanering van de intensieve veehouderij op de locatie.

Op de akkerlanden rondom het perceel zijn sporen van de Das en van reeën aangetroffen. Deze gebruiken het gebied als foeragegebied, maar op de onderzoekslocatie zelf zijn geen sporen aangetroffen.

Door de sloop van de bebouwing en de realisatie van een nieuwe paardenhouderij op het perceel, wordt het karakter van het gebied niet beïnvloed. Er verdwijnen geen verblijfs- of broedmogelijkheden, gezien de resultaten van de veldonderzoeken.

De percelen grond zullen gebruikt worden als buitenpiste, buitenrijbak, paddocks en als grasland. De bedrijfsvoering is minder intensief dan bij de voormalige akkerbouwmatige activiteiten, zoals die voorheen plaatsvonden. Binnen deze percelen kunnen paarden, al dan niet met ruiters, aanwezig zijn. Deze zullen tot minder verstoring leiden, dan bij activiteiten met landbouwmachines.

De mate van verstoring en mogelijke vormen van overlast zijn in de beoogde situatie kleiner dan in de bestaande situatie. Dit geldt niet alleen voor mensen, maar tevens voor fauna die zich in de directe omgeving van het plangebied bevinden.

Bij de werkzaamheden dient niettemin aandacht te worden besteed aan eventuele verstoring van natuurwaarden in het algemeen. Door extra zorg hieraan te besteden tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden, wordt vermeden dat de dieren hiervan teveel hinder zullen ondervinden.

De zorgmaatregelen bestaan in elk geval uit de volgende aspecten:

1. Voor algemeen voorkomende broedvogels (waarvan het nest gedurende broedperiode beschermd is) dienen mitigerende maatregelen getroffen te worden:
 - Voer eventuele snoeiwerkzaamheden buiten het broedseizoen uit. Het broedseizoen loopt ongeveer van 15 maart tot 15 juli, maar kan afhankelijk van het weer en andere factoren verschuiven.
 - Indien het niet mogelijk is om buiten het broedseizoen te werken, dienen geschikte broedlocaties voorafgaand aan het broedseizoen ongeschikt te worden gemaakt en gehouden te worden totdat de werkzaamheden zijn afgerond.
 - Indien werkzaamheden starten binnen het broedseizoen, dient door een deskundig ecoloog onderzocht te worden of broedende vogels ter plaatse aanwezig zijn.

2. Door de voorgenomen werkzaamheden bestaat de kans dat holen van algemene soorten als konijn, egel en diverse muizensoorten worden vergraven. De volgende maatregelen zijn nodig om rekening te houden met deze soorten:
 - Indien verstoring plaatsvindt, dient een passende vluchtroute beschikbaar te zijn. Dit geldt in het bijzonder voor grondgebonden zoogdieren (zoals muizen en egels), maar ook voor vogels, om verkeersslachtoffers te voorkomen. Werk vanaf één zijde en bij voorkeur van een drukke naar een rustige locatie toe, zoals een open veld of ruigte. Werk ook op een aangepast tempo, zodat dieren kunnen vluchten.
 - Kunstmatige verlichting werkt verstorend op zoogdieren en andere fauna. Werk daarom niet tussen zonsondergang en zonsopkomst.
 - Voorkom of beperk daarnaast de toepassing van kunstlicht en de verstrooiing van licht buiten de projectlocatie. Voorkom ook het direct schijnen op wateroppervlakken en groenelementen, zoals bosschages en ruigtes (met name voor vleermuizen).
3. Gelet op de algemene zorgplicht dienen voorafgaand aan de werkzaamheden alle maatregelen te worden getroffen om nadelige gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk te voorkomen, beperken of ongedaan te maken. Dit geldt altijd en voor alle planten- en diersoorten.
 - Ook voor mogelijke aanwezigheid van egel en vestiging van de rugstreeppad dient de zorgplicht in acht te worden genomen. Voorkom opslag van materialen waaronder dieren kunnen gaan verblijven. Het ontstaan van poeltjes en plassen op het terrein dient gedurende het zomerhalfjaar (vanaf april) te worden voorkomen. Als deze soorten worden waargenomen, dienen zij zichzelf in veiligheid te kunnen brengen.
4. Indien een soort die niet in de quickscan wordt genoemd in het terrein wordt geconstateerd bij aanvang van de werkzaamheden, dient hier passend op te worden gereageerd. Het is hierbij nodig om contact op te nemen met een ter zake kundige en een maatregel toe te passen, zodat de wet niet wordt overtreden.

Op grond van deze inventarisatie gelden er geen belemmeringen voor de plannen op grond van de natuurwaarden. Uit de quick scan blijkt dat er op een afstand van 100 meter van het plangebied geen negatieve effecten te verwachten zijn.

Bijlage 1 : Situatietekening en luchtfoto

Vieruitersten 24, Meijel

Quick scan flora en fauna

Legenda



Vieruitersten 24

Vieruitersten 24

t' Molentje

Helenavaart

Kanaal van Deurne

Alcosh Medical B.V.


Molenbaan

Google Earth

200 m

N







LEGENDA

Plangebied

plangrens

Bestemmingen

Enkelbestemmingen

A Agrarisch

A-GRG Agrarisch - Grondgebonden

Dubbelbestemmingen

Waterstaat - Beschermingszone watergang

Gebiedsaanduidingen

overige zone - ecologisch hoofdstructuur

reconstructiewetzone - extensiveringsgebied

reconstructiewetzone - verwevingsgebied

wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 ko

wetgevingzone - wijzigingsgebied 6 bn

Functieaanduidingen

rijbak

specifieke vorm van groen - landschappelijke inpassing vieruitersten 24

specifieke vorm van wonen - huisvesting ruiters, grooms en/of stagiairs

Bouwvlakken

bouwvlak

Maatvoeringen

8.90 maximum bouwhoogte (m)

5.0 maximum goothoogte (m)

u 1 maximum ondergrondse bouwdiepte (m)

Figuren

relatie

Bestemmingsplan "Vieruitersten 24 Meijel"

Gemeente Peel en Maas

id: NL.IMMO.1854

datum: 30-01-2024

schaal: 1:1000

kaartblad: 1 van 1

formaat: A2

status: vastgesteld

Pijnburg
Spoonweg 4
5963 NL Hurd
+31 77-3962921
www.pijnburgadvies.nl

Bijlage 2a : Foto's onderzoekslocatie en omgeving november 2021









sporen van de Das 🦫



loopsporen van de Das 🦫



Bijlage 2b : Foto's onderzoekslocatie en omgeving juli 2022













Bijlage 3 : Natuurgegevens provincie Limburg





Kilometerblok 58-13-11

Broedvogels Vlakte 2

In dit kilometerblok zijn 53 territoria vastgesteld, afkomstig van 27 soorten. Klik op een soortnaam in de tabel voor de locatie van de stip en vice versa.
Klik nogmaals om een label te verwijderen.

Kwantitatief onderzochte soorten					
x-coörd	y-coörd	jaar	n	soort	label
190837	374782	2001	1	Bonte Vliegenvanger 1	
190874	374498	2001	1	Bonte Vliegenvanger 2	
190592	374923	2001	1	Boomklever 1	
190628	374785	2001	1	Boomklever 2	
190749	374599	2001	1	Boomklever 3	
190861	374418	2001	1	Boomklever 4	
190523	374976	2001	1	Boomkruiper 1	
190707	374813	2001	1	Boomkruiper 2	
190751	374586	2001	1	Boomkruiper 3	
190803	374398	2001	1	Boomkruiper 4	
190877	374821	2001	1	Boomkruiper 5	
190947	374522	2001	1	Boomkruiper 5	
190821	374681	2001	1	Boompieper 1	
190856	374967	2001	1	Boompieper 2	
190900	374894	2001	1	Boompieper 3	
190912	374615	2001	1	Boompieper 4	
190966	374741	2001	1	Boompieper 5	
190643	374929	2001	1	Bosrietzanger	
190896	374272	2001	1	Braamsluiper	
190863	374143	2001	1	Gekraagde Roodstaart	
190295	374137	2001	1	Grasmus 1	

☒ onvolledig onderzocht

☒ buiten provincie

☐ naar topografie

Extra ondergrond:

zoom uit

Beschikbare kaartlagen

Thema

periode

☐ Topografie oud

1980 - 1999

☒ Topografie recent

2000 - 2019

☐ Topografie nieuw grijs

2020 -

☐ Topografie nieuw kleur

2020 -

☐ Broedvogels Vlakte 1

1990 - 1997

☒ Broedvogels Vlakte 2

1998 - 2011

☐ Broedvogels Vlakte 3

2012 - 2020

☐ Broedvogels Goud-Groen 1

2015 - 2020

☐ Flora Vlakte 1

1983 - 1997

☐ Flora Vlakte 2

1998 - 2007

☐ Flora Vlakte 3

2006 - 2019

☐ Flora Goud-Groen 1

2012 - 2020

☐ Vegetatie Vlakte 1

1983 - 1997

☐ Vegetatie Vlakte 2

1998 - 2007

☐ Vegetatie Vlakte 3

2006 - 2019

☐ Vegetatie Goud-Groen 1

2012 - 2020

☐ Beheertypen

2011 - 2021

Legenda Broedvogels Vlakte 2

Soort van de Rode Lijst

Aandachtssoort (o.a. voormalige C-soorten)

Schaarse of zeldzame soort

Algemene soort (niet op de kaart, wel in de lijst)

sluit legenda

Bijlage 4 : Natuurdata Het Natuurloket

Beknpte levering uit de NDFF

Disclaimer

De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren. Nieuwe gegevens worden dagelijks toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn gevalideerd.

Nader(veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Besteldatum 30 augustus 2022
15:45


Projectnaam Vieruitersten 24,
Meijel

Projectdoel Inventarisatie
natuurwaarden

Inkoopnummer

Kilometerhokken 190-374

Vragen? Neem contact op met het Serviceteam van de NDFF:
Telefoon: 0800 2356333



190 - 374	vaatplanten	mossen	korstmossen	paddenstoelen	vleermuizen	landzoog- dieren	broedvogels	wintervogels	amfibieën	reptielen	vissen	dagvlinders	macronacht- vlinders	micronacht- vlinders	libellen	sprinkhanen en krekels	overige soortgroepen
Rode-Lijstsoorten	9	1		5		1	15			1		5					
Vogelrichtlijn							68	67									
Habitatrichtlijn						1			1								
Wnb-andere soorten (PROV)						2				1		1					
Wnb-andere soorten (NL)						5			2	1		1					
Aantal soorten	224	24	5	102		11	69	75	4	2	5	29	57	76	32	16	
Detailtering 0-0.25/0.251-1	82%/17%	96%/3%	100%/0%	99%/0%		78%/18%	86%/0%	73%/0%	100%/0%	100%/0%	100%/0%	100%/0%	100%/0%	100%/0%	99%/0%	100%/0%	
Volledigheid onderzoek	goed	redelijk	slecht	onbepaald	niet	redelijk	goed *	redelijk *	goed	redelijk	redelijk	goed	goed	goed	goed	onbepaald	niet
Onderzoeks- periode	2002-2022	2012-2022	2012-2022	2012-2022	2012-2022	2012-2022	2012-2022	2012-2022	2012-2022	2012-2022	2012-2022	2012-2022	2012-2022	2012-2022	2012-2022	2012-2022	2012-2022

Toelichting op de tabel

Soortgroepen

In de gehanteerde indeling is *Overige soortgroepen* een diverse groep met daarin alle wespen, bijen, mieren, netvleugelige, steenvliegen, kevers, vliegen, muggen, haften, wantsen, cicaden, luizen, schorpioenvliegen en overige insecten, spinnen, mijten, hooiwagens, duizendpoten, miljoenpoten, pissebedden, kakkerlakken, oorwormen, weinigpotigen, vlokreeften, lagere kreeftachtigen, weekdieren, slakken, ringwormen, snoerwormen en wormachtigen zoals bloedzuigers. Ook zeeorganismen als hydroidpoliepen, mosdiertjes, mysisgarnalen, ribkwallen, stekelhuidigen, zakpijpen, zeepissebedden, zeepokken, eendenmossels, krabbezakjes, zeespinnen en grote kreeftachtigen (kreeften, krabben en garnalen) en zeezoogdieren vallen in deze verzamelgroep.

Rode-Lijstsoorten

In de tabel staat voor elk kilometerhok per soortgroep vermeld hoeveel soorten op de Rode Lijst staan. Rode Lijsten worden formeel vastgesteld door de Rijksoverheid. De gehanteerde Rode Lijsten zijn:

amfibieën	Besluit Rode Lijsten 4 september 2009
bijen	Besluit Rode Lijsten 30 april 2018
broedvogels	Besluit Rode Lijsten 30 november 2017
dagvlinders	Besluit Rode Lijsten 28 februari 2019
korstmossen	Besluit Rode Lijsten 15 oktober 2015
libellen	Besluit Rode Lijsten 15 oktober 2015
macronachtvlinders	geen Rode Lijst
micronachtvlinders	geen Rode Lijst
mossen	Besluit Rode Lijsten 15 oktober 2015
overige soortgroepen	Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 ¹
paddenstoelen	Besluit Rode Lijsten 4 september 2009
reptielen	Besluit Rode Lijsten 4 september 2009
sprinkhanen en krekels	Besluit Rode Lijsten 15 oktober 2015
vaatplanten	Besluit Rode Lijsten 15 oktober 2015
vissen	Besluit Rode Lijsten 15 oktober 2015
zoogdieren	Besluit Rode Lijsten 3 november 2020

Wet Natuurbescherming – soorten van de Vogelrichtlijn

Alle soorten die wettelijke bescherming genieten en vallen onder Wet Natuurbescherming [paragraaf 3.1](#)

Wet Natuurbescherming – soorten van de Habitatrichtlijn

Alle soorten die wettelijke bescherming genieten en vallen onder Wet Natuurbescherming [paragraaf 3.2](#)

Wet Natuurbescherming – andere beschermde soorten (provinciale lijst)

Alle provinciale soorten die wettelijke bescherming genieten en vallen onder Wet Natuurbescherming [paragraaf 3.3](#)

Deze soortenlijst is limitatief benoemd in een Bijlage op de wet maar kan op provinciaal niveau worden bijgesteld. Wanneer een hok in meerdere provincies valt wordt de hoogste beschermingscategorie per aangetroffen soort aangehouden.

¹ Het gaat hier om de soortgroepen: bijen, kokerjuffers, steenvliegen, haften, platwormen en land- en zoetwaterweekdieren.

Wet Natuurbescherming – andere beschermde soorten (landelijke lijst)

Alle landelijk benoemde soorten die wettelijke bescherming genieten en vallen onder Wet Natuurbescherming [paragraaf 3.3](#)

Deze soortenlijst is limitatief benoemd in een Bijlage op de wet.

Aantal soorten

Het totaal aantal soorten per soortgroep per kilometerhok in de periode zoals aangegeven. Meegenomen zijn alle waarnemingen:

- die geheel of gedeeltelijk binnen de selectie liggen;
- die zijn gevalideerd en daarbij de classificatie 'betrouwbaar' hebben meegekregen;
- waarvan de bronhouder heeft aangegeven dat ze uitgeleverd mogen worden.

Indien er een asterisk (*) in het veld staat betekent dit dat een deel van de waarnemingen pas na expliciete toestemming van de bronhouder mag worden uitgeleverd. Het kan dus zijn dat in de standaardlevering niet alle waarnemingen worden geleverd die optellen tot de beknopte levering. Ook kan het zijn dat deze gegevens later worden geleverd.

Volledigheid onderzoek

Voor elke soortgroep is een indicatie gegeven hoe volledig een specifiek kilometerhok is onderzocht. Er wordt hierbij gewerkt met een normering in 5 klassen: (1) niet, (2) slecht, (3) redelijk onderzocht, (4) goed onderzocht en (5) onbepaald.

De volledigheid van onderzoek wordt geautomatiseerd berekend voor alle soortgroepen, waarbij elk kilometerhok meedraait in een cyclus van berekeningen over geheel Nederland. De doorlooptijd van deze rekencyclus is in de praktijk 2 tot 3 weken voor alle kilometerhokken in Nederland. In de toelichting is per soortgroep aangegeven welke regels hierbij gehanteerd zijn en over welke periode.

[Download de toelichting](#)

Detailering

Voor elke soortgroep is in de oppervlakteklassen '0-0.25 km²', '0.251- 1 km²' en 'groter dan 1 km²' bepaald welk aandeel de waarnemingen bezetten. De basis voor deze berekening is het aantal waarnemingen:

in de beschouwde periode;

dat geheel of gedeeltelijk in het kilometerhok valt;

waarvan de bronhouder heeft aangegeven dat ze uitgeleverd mogen worden.

Van de drie genoemde klassen worden de resultaten van de eerste twee achter elkaar geplaatst en gescheiden door een slash-teken (/).

Onderzoeksperiode

De onderzoeksperiode betreft voor vrijwel alle beschreven soortgroepen de recente 10 afgeronde veldseizoenen. Alleen voor vaatplanten wordt een langere periode gehanteerd. In de loop van het kalenderjaar wordt de beschouwde periode dus steeds iets langer.