

Betreft: Quick scan ecologie
Locatie: Boslaan 13 te Vreeland
Datum: 14 juni 2018
Ecoloog: 06-27564247
Steller: Peter van der Linden, ecoloog

Voor de ontwikkelingen aan de Boslaan 13 te Vreeland is een ecologisch onderzoek uitgevoerd. Hierover is gerapporteerd in de Quick scan ecologie Boslaan 13 te Vreeland. Op het rapport is gereageerd door het bevoegd gezag. In reactie daarop is een ecologisch werkprotocol opgesteld. Het bevoegd gezag heeft aangegeven dat het ecologisch werkprotocol voldoende garantie geeft dat effecten worden voorkomen. Aanvullend zijn er – volgens het bevoegd gezag – enkele onduidelijkheden in het rapport die toegelicht moeten worden. De aanvullingen op het rapport worden hierbij gegeven.

Vogels in de grote schuren

In het rapport is aangegeven dat een kerkuil bij de burens broedt. De fusieafstand voor de kerkuil is 500 meter. Dat betekent dat er – alleen al vanwege de geringe afstand – geen broedende kerkuil in de schuren kan zitten. Dit dier zou dan worden verjaagd door de kerkuil die bij de burens broedt.

De steenuil – de andere uilensoort die nabij gebouwen broedt – heeft een donkere nauwe ruimte nodig als broedplek. Deze zijn niet aanwezig. Er hangen ook geen kasten voor uilen in de schuren. Er zijn geen schijfsporen of andere aanwijzingen gevonden. De steenuil is niet uit de directe omgeving bekend, wel op grotere afstand.

Kerkuil bij de burens

De kerkuil heeft een vrij groot jachtgebied rondom het nest. Aan de overzijde van de Boslaan zijn muizenrijke graslanden aanwezig. Incidenteel zal de kerkuil op de Boslaan 13 jagen op muizen. De ontwikkelingen leiden tot meer open ruimte dan er nu aanwezig is. Het verlichtingsniveau zal niet of nauwelijks toenemen. De kerkuil zal ook na de ontwikkeling kunnen jagen binnen de Boslaan 13. Daarnaast is Boslaan 13 slechts een ondergeschikt qua oppervlakte met betrekking tot het jachtgebied. De kans dat door verlies aan jachtgebied de kerkuil niet meer tot broeden komt wordt als marginaal geschat.

Aanpassen waterstructuur

In de quick scan is inderdaad niet beschreven dat het aanpassen van de waterstructuur – lees graven natuurlijke oevers – een positief effect heeft op de functionele biodiversiteit. Ook het opruimen van allerlei bouwvallen – waardoor er minder “grijs” komt – is positief.

Rugstreeppad

De rugstreeppad is zeer beperkt bekend uit de omgeving. Ten noorden van de – niet oversteekbare – Vreelandseweg en ten westen van Loenen aan de Vecht zijn waarnemingen be-

kend (De Wild e.a. 2016). In 2015 (ten tijden van het schrijven van de Quick scan) waren geen waarnemingen bekend van de rugstreeppad in de omgeving van de Boslaan.

De waterpartij is te groot en te diep om als voortplantingswater te dienen en er waren/zijn geen aanwijzingen voor overwinterende dieren aan de Boslaan. De recente waarnemingen zijn gedaan op het erf van een boerderij – aannemelijk is dat de dieren daar overwinteren (en in de sloten zich voortplanten).

P.J.H. van der Linden
Els & Linde B.V.