

BURO SRO
t.a.v. mevr. ing. D. Mereboer
't Goylaan 11
3525 AA Utrecht

Datum 16 augustus 2016
Kenmerk BE/2016/222/r
Uw kenmerk Email d.d. 14 juli 2016
Auteur(s) ing. T.J.P. den Otter
Projectleider ing. C.J. Blom

BLOM ECOLOGIE
ADVIES & ONDERZOEK

Kerkstraat 4
4181 AB Waardenburg

t 06-44179899
e info@blomecologie.nl

i www.blomecologie.nl

RegioBank 85.01.07.326

BTW NL1182.37.020.B01

KvK 55488609

Oriënterend onderzoek naar beschermde flora en fauna aan de Steenfabriekweg ong. te Bergambacht

Aan de Steenfabriekweg ong. te Bergambacht is een braakliggend perceel gelegen met een agrarische bestemming. Dynamivast is voornemens om op het perceel een bedrijventerrein te realiseren. Tevens worden in het kader van de ontwikkelingen op het terrein de watergangen gedempt. Om de voorgenomen ontwikkelingen te kunnen realiseren dient er een gewijzigd bestemmingsplan opgesteld te worden. Het beoogde bedrijventerrein staat planologisch bekend als Nieuwe Wetering III

De beoogde ontwikkeling heeft mogelijk een negatief effect op beschermde flora en fauna en/of beschermde natuurgebieden. Ten behoeve van de ontwikkeling geldt de wettelijke verplichting onderzoek te verrichten naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de mogelijk effecten van de ruimtelijke ingreep daarop. Middels deze ecologische quickscan wordt de (potentiële) aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de betekenis van het plangebied voor deze soorten in kaart gebracht.

In opdracht van Dynamivast begeleidt Buro SRO de ruimtelijke procedure. Buro SRO heeft Blom Ecologie verzocht het plangebied te onderzoeken op aanwezigheid van beschermde flora en fauna en vervolgens deze te toetsen aan de effecten van de werkzaamheden en vigerend beleid. Tevens zal indien relevant bij conclusies en aanbevelingen de consequenties ten aanzien van de Wet natuurbescherming (van kracht per 1 januari 2017) cursief worden benoemd.

Onderzoeksdoel


Middels dit oriënterend onderzoek worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord:

- Welke, krachtens de Flora- en faunawet, beschermde flora en fauna zijn (potentieel) aanwezig in het plangebied?
- Welke negatieve effecten treden op voor (potentieel) aanwezige flora en fauna als gevolg van de werkzaamheden?
- Leiden de werkzaamheden, gelet op de verwachte negatieve effecten, tot overtreding van de Flora- en faunawet en/of vigerend beleid?

Planlocatie

De planlocatie is gelegen aan de Steenfabriekweg ong. te Bergambacht. Het betreft een braakliggend agrarisch perceel. Door het ontbreken van frequent beheer is er sprake van verwildering. De watergangen zijn tevens overwoekerd. In bijlage 1 zijn een aantal foto's opgenomen die een impressie geven van de planlocatie en de directe omgeving hiervan.

De planlocatie is gelegen aan de grens van het bedrijventerrein van Bergambacht (Nieuwe Wetering) en wordt derhalve aan de westzijde gekenmerkt door bedrijven en aan de oostzijde door agrarische structuren. Aan de noordzijde wordt de planlocatie begrensd door het perceel aan de Provincialeweg 9B, aan de oostzijde door een grasveld, aan de zuidzijde door de Steenfabriekweg en aan de westzijde door een bedrijfsgebouw aan de Nijverheidstraat 11. Op ca. 100m ten noorden van de planlocatie is de provinciale weg de N210 gesitueerd; op ca. 500m ten zuiden is de brede sloot de Nieuwe Wetering gelegen en op ca. 1,5km ten zuiden is de rivier de Lek gelegen.



Figuur 1 De rode stip weergeeft de ligging van de planlocatie aan de Steenfabriekweg ong. te Bergambacht (bron: ruimtelijkeplannen.nl).

Funcieverandering en effecten

De beoogde ingrepen zijn permanent van karakter. Onderstaand volgt een korte opsomming van de ingrepen en effecten:

- verwijderen groen: t.b.v. nieuwbouw worden struiken en planten verwijderd en bomen gekapt;
- dempen sloten: aanvoer grond;
- vergraven braakliggend perceel: herinrichting ruimte (grondverzet e.d.);
- realisatie bedrijfsbebouwing: diverse timmer-, beton-, metsel-, elektra- en loodgieterswerkzaamheden alsmede allerlei kleine bouwwerkzaamheden;
- revitalisatie terrein; allerlei (straat/hoveniers)werkzaamheden

Alle thans aanwezige (ecologische) functies van de planlocatie komen geheel te vervallen. Negatieve effecten die op kunnen treden voor beschermde soorten zijn: vernietiging en/of afname van geschikt leefgebied (permanent) en opzettelijke verstoring (tijdelijk).

Methode

Inventarisatie

De inventarisatie is een oriënterend onderzoek waarbij gedetailleerd een beoordeling wordt gegeven van de aanwezigheid van de specifieke potentie voor beschermde flora en fauna in het plangebied, de betekenis van het plangebied voor de aanwezige soorten en de effecten van de voorgenomen ingrepen op de soorten. De quickscan bestaat uit veldbezoek en raadpleging van externe bronnen.

Veldbezoek

Het veldbezoek is een momentopname van de aanwezige beschermde flora en fauna. Tijdens het veldbezoek wordt het plangebied nauwkeurig onderzocht waarbij ook gelet wordt op sporen en delen of restanten van planten en/of dieren. Het veldbezoek heeft plaatsgevonden op 9 augustus 2016. De inventarisatie is uitgevoerd op de planlocatie. De weersomstandigheden tijdens het veldbezoek waren; droog, 3/8 bewolkt, 17° Celsius en windkracht 3-4 (Bft.)

Externe bronnen

Vaak zijn er al gegevens bekend over een plangebied en de directe omgeving hiervan. Deze gegevens worden onder andere beheerd in rapporten en naslagwerken en door het Natuurloket (www.natuurloket.nl). Raadpleging van externe bronnen levert vaak nuttige aanvullende informatie op en daarmee een vollediger beeld van de (mogelijk) aanwezige flora en fauna.

Wet natuurbescherming

Per 1 januari 2017 wordt de huidige Flora- en faunawet samen met de Boswet en Natuurbeschermingswet vervangen door de Wet natuurbescherming (Wnb). Onder de Wet natuurbescherming vervallen de huidige tabellen 1, 2 en 3 waarin de beschermde soorten zijn opgenomen. Tevens zijn er circa 200 soorten niet langer beschermd en worden enkele bedreigde soorten toegevoegd. De soortenbescherming binnen de Wet natuurbescherming is opgedeeld in de volgende beschermingsregimes: Vogelrichtlijnsoorten, Habitatrichtlijnsoorten en andere soorten.

Voor alle beschermde soorten geldt een ontheffingsplicht. Het bevoegd gezag (de provincie) kunnen voor de soorten die zijn opgenomen in het 'beschermingsregime andere soorten' vrijstellingsbesluit nemen en hierin onderscheid maken tussen meer en minder strikt beschermde soorten. Naar verwachting zullen de thans licht beschermde soorten in de Wet natuurbescherming worden opgenomen in het vrijstellingsbesluit.

Beoordeling

Op basis van de bureaustudie en veldonderzoek wordt per soortgroep besproken wat de potentie van de planlocatie en de invloedssfeer daarvan is en welke effecten daarop te verwachten zijn. Omdat voor algemeen beschermde soorten per definitie vrijstelling geldt voor ruimtelijke ontwikkelingen, is specifiek gelet op zwaarder en strikt beschermde soorten (Ff-wet; tabel 2 & 3).

Vaatplanten

Zwaarder beschermde vaatplanten en/of sporen en delen hiervan zijn niet aangetroffen op de planlocatie (Ff-wet; tabel 2 & 3). De planlocatie bestaat uit een strook van beperkte grootte met verwilderde vegetatie. Op de planlocatie zijn voornamelijk algemene kruiden waargenomen. Waargenomen soorten zijn onder andere: wegdistel, grote lisodode, smeewortel, klein hoefblad, akkerdistel, haagwinde, zwarte els, perzikkruid, riet, wilgenroosje en moerasandoorn. Gelet op de waargenomen soorten, de functie en het gebruik van de locatie, alsmede de habitatpreferentie van kwetsbare en zeldzame soorten wordt de aanwezigheid van dergelijke soorten niet verwacht. Negatieve effecten ten aanzien van beschermde vaatplanten kunnen derhalve worden uitgesloten.

Zoogdieren

Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen van en/of (beschermde) zoogdieren aangetroffen. De locatie is ongeschikt voor grote in het wild levende zoogdieren. Op de planlocatie is een hoge mate van verstoring door de continue aanwezigheid van mensen op de omliggende terreinen. Voor soorten die in onverstoorde natuurlijke omstandigheden leven is de planlocatie ongeschikt.

Waterspitsmuizen maken gebruik van het habitat rond zuiver, niet te voedselrijk water met sterk ontwikkelde oever- en watervegetatie. Onder geschikte biotopen vallen voornamelijk natuurlijke poelen, vijvers, moerassen, nattere bossen etc. Een sterk ontwikkelde oever- en struikvegetatie binnen het leefgebied is een vereiste. Tevens jagen waterspitsmuizen ook buiten het optimaal geschikte habitat bij andere oppervlaktewateren. Bovendien dient er voldoende beschutting aanwezig te zijn in de oeverzone om te schuilen, met name om een gevangen prooi te verorberen. (zoogdiervereniging.nl). De planlocatie beschikt over alle vorgenoemde habitatseisen (ongeacht de beperkte mate) voor de waterspitsmuis. Uit raadpleging van waarnemingsdatabases blijkt dat de soort minimaal 10 jaar geleden voor het laatst binnen een straal van 15 km rondom de planlocatie waargenomen is. Daarnaast ontbreken geschikte migratieroutes van de waarnemingslocaties tot de planlocatie, alsmede de barrièrevorming van de continu drukke Provincialeweg (N210) is het aannemelijk dat de soort niet op de planlocatie voor zal komen. Derhalve kunnen effecten op de soort uitgesloten worden.

Het incidentele voorkomen van algemene en licht beschermde soorten zoals: vos, konijn, bruine rat en veldmuis kan niet worden uitgesloten. Gezien de geïsoleerde ligging alsmede de dispersie van beschermde grondgebonden zoogdieren worden dergelijke soorten niet verwacht. De voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen leiden niet tot een significante verstoring van beschermde zoogdieren. Bovendien geldt vrijstelling voor eerder genoemde soorten in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen. Negatieve effecten ten aanzien van beschermde zoogdieren kunnen derhalve worden uitgesloten.

Vleermuizen

Laanvormige bomenrijen, oude bomen met gaten en scheuren, (oude) gebouwen met kieren en spleten en/of andere structuurrijke groenelementen kunnen een functioneel onderdeel zijn van een vleermuishabitat (Limpens et al., 1997; Dietz et al., 2011). In het onderzoek t.b.v. Nieuwe Wetering I en II zijn gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger aangetroffen (Mertens, 2012). Er zijn geen landschapselementen aanwezig op de planlocatie die potentie bieden voor een vaste rust- en/of verblijfplaats voor vleermuizen. De planlocatie is echter wel geschikt als foerageergebied. Met name vanwege de rechte structuren, het oppervlaktewater en het ruime voedselaanbod. Negatieve effecten ten aanzien van de soortgroep kunnen derhalve niet zonder maatregelen uitgesloten worden. Om effecten op vleermuizen te voorkomen dient er rekening gehouden te worden met de foerageertijden en/of -periode.

Amfibieën en reptielen

Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën en reptielen en/of sporen daarvan aangetroffen in het plangebied. In de directe omgeving is het voorkomen van reptielen onbekend. In de omgeving van Bergambacht komen met name algemene amfibieënsoorten voor zoals kleine watersalamander, bruine kikker en gewone pad. Tevens is het voorkomen van de rugstreeppad bekend in de omgeving. Ten behoeve van de ontwikkeling van de Nieuwe Wetering I en II (voorliggende percelen) is in 2012 een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van rugstreeppad (Mertens, 2012). Naar aanleiding van dit onderzoek is geconcludeerd dat de planlocatie en directe omgeving hiervan geen relevante functie hebben voor rugstreeppad. Gelet op de landelijke verspreiding, situatie op de planlocatie en het geprefereerde habitat van beschermde amfibieën en reptielen is het voorkomen van dergelijke soorten uitgesloten. Aannemelijk is dat minder watergebonden soorten zoals gewone pad en bruine kikker gebruik maken van schaduwrijke- en relatief vochtige plaatsen en de wateren op en rondom de planlocatie. Bovendien geldt voor deze soorten vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen. Significante negatieve effecten op zwaardere en strikt beschermde amfibieën en reptielen kunnen uitgesloten worden.

Vissen

In de directe omgeving van de planlocatie is het voorkomen bekend van soorten als: kleine modderkruiper, bittervoorn, ruisvoorn, paling, vetje, brasem, winde en snoek. De wateren op de planlocatie zijn sterk begroeid en aangesloten op relatief open water met diepere delen. Voor zowel de zwaarder beschermde soorten kleine modderkruiper en bittervoorn (Ff-Wet, tab. 3) is het plangebied zeer geschikt. Tijdens het onderzoek in 2012 is alleen de kleine modderkruiper aangetroffen (Mertens, 2012). Gezien dat de werkzaamheden het dempen van sloten betreft dient er een geschikte werkwijze toegepast te worden om schade op kleine modderkruiper en bittervoorn te voorkomen. Een potentieel geschikte werkwijze is om alvorens de werkzaamheden de plannen met een ter zake deskundige te bespreken en zowel gedurende de voorbereidende werkzaamheden als bij de werkzaamheden aan het leefgebied van beschermde soorten een ter zake deskundige aanwezig te stellen. De ter zake deskundige zal het proces coördineren en eventueel aangetroffen (beschermde) vissen verzamelen en uitzetten op een locatie die niet onderhevig is aan de werkzaamheden. Een tweede optie is om de werkzaamheden na 1 januari 2017 uit te voeren, aangezien dat zowel de kleine modderkruiper als de bittervoorn in de Wet Natuurbescherming niet meer beschermd zijn. Mits een van de vorengenoemde maatregelen in acht wordt genomen kunnen negatieve effecten ten aanzien van vissen uitgesloten worden.

Insecten, libellen en ongewervelde


In het plangebied zijn tijdens het veldbezoek, behoudens klein koolwitje, oranje zandoogje en kleine vos, geen (sporen en/of delen van) vlinders, libellen of overige ongewervelde aangetroffen. De vegetatie in de nattere delen bestaat uit algemeen voorkomende soorten. De betreffende soorten dienen geen essentiële functie ten behoeve van beschermde watergebonden insecten. Specifieke omstandigheden die door beschermde insectensoorten worden geprefereerd zijn niet aanwezig (waardplanten, overwinteringslocaties e.d.). Tevens is er geen sprake van een aantal typische habitats zoals dood hout in oude loofbossen of vennetjes en is op basis van landelijke verspreidingsgegevens het voorkomen van slechts een beperkt aantal soorten bekend. Het is uitgesloten dat de beoogde ontwikkelingen een negatief effect hebben op beschermde ongewervelde.

Vogels

In het plangebied zijn tijdens het veldbezoek een aantal vogelsoorten, sporen en/of nesten hiervan waargenomen. De aangetroffen soorten zijn: merel, kauw, kokmeeuw, rietzanger en kneu. Dit betreft zowel overvliegende, foeragerende en rustende individuen. Vrijwel alle vegetatie is geschikt als broedlocaties voor kleinere zangvogels als kleine karekiet, rietzanger, rietgors etc.. Tevens is het aannemelijk dat watervogels aan de slootkant broeden. Voor soorten met jaarrond beschermde nesten zijn geen geschikte omstandigheden aangetroffen. Teneinde effecten op broedvogels te voorkomen dienen ten aanzien van algemene vogelsoorten de ontwikkelingen buiten het broedseizoen (15 maart- 15 juli) te worden uitgevoerd. De beoogde ingrepen leiden in het broedseizoen mogelijk tot overtreding van de Flora- en faunawet. Mits bovenstaande maatregel in acht wordt genomen zijn negatieve effecten op (broed)vogels uitgesloten.

Gebiedsbescherming

De planlocatie maakt, behoudens het Nationaal Landschap 'Groen Hart', geen deel uit van een beschermd gebied en/of locatie betreffende: Natura 2000, Beschermd natuurmonument, Wetland, Nationaal Landschap, Nationaal Park of Natuurnetwerk Nederland (NNN). Binnen een straal van 3 kilometer zijn het Nationaal Landschap "'Groene Hart' en diverse gebieden betreffende Natuurnetwerk Nederland gelegen (figuur 3).



Figuur 3 De rode stip weergeeft de ligging van de planlocatie bij benadering. Binnen een straal van 3 kilometer zijn het Nationaal Landschap 'Groene Hart' en diverse Natuurnetwerk Nederland (voormalige Ecologische hoofdstructuur) structuren gelegen (bronnen: sybiosys.alterra.nl; ruimtelijkeplannen.zuid-holland.nl).

Conclusies

- In het plangebied of de directe omgeving daarvan komen beschermde diersoorten van de Flora- en faunawet voor. Het plangebied heeft, behoudens kleine modderkruiper en bittervoorn, aannemelijk geen essentiële betekenis voor zwaarder en strikt beschermde soorten (tabel 2 & 3). De planlocatie is geschikt als foerageergebied voor vleermuizen. Jaarrond beschermde nesten zijn niet aangetroffen, nestlocaties van algemene broedvogels worden verwacht. De sloten zijn geschikt als leefgebied voor kleine modderkruiper en bittervoorn.

Voor licht beschermde soorten (Ef-wet, tab. 1) geldt momenteel vrijstelling ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen. Onder de Wet natuurbescherming geldt dat het aantasten van het leefgebied van deze soorten ontheffingsplichtig is. Voor deze zogenaamde 'overige soorten' geldt dat op provinciaal niveau mag worden bepaald in welke mate een soort beschermd moet worden. Naar verwachting worden voor deze algemene soorten nieuwe vrijstellingsbesluiten opgesteld.

- De ruimtelijke ingrepen leiden mogelijk tot een tijdelijke verstoring van algemeen voorkomende en licht beschermde soorten. Beschermde soorten, behoudens kleine modderkruiper en bittervoorn, waarvoor geen vrijstelling geldt in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen en conform de Flora- en faunawet worden niet verwacht. Indien maatregelen getroffen worden om effecten op kleine modderkruiper en bittervoorn te voorkomen wordt aanvullend onderzoek wordt niet nodig geacht.

Voor deze zwaarder- en strikt beschermde soorten (Ef-wet, tab. 2 en 3) geldt momenteel een ontheffingsplicht ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen. Onder de Wet natuurbescherming genieten de vorengenoemde soorten niet meer van een zwaarder- en strikt beschermingsregime. Na 1 januari 2017 dient er voor deze soorten enkel rekening gehouden te worden in het kader van de algemene zorgplicht, vorengenoemde maatregelen zijn dan niet meer van toepassing

- Mits gewerkt wordt zoals aanbevolen leiden de werkzaamheden aannemelijk niet tot overtreding van de Flora- en faunawet. Er behoeft geen ontheffing van de Flora- en faunawet (art. 75) aangevraagd te worden.
- De planlocatie is, behoudens het Nationaal Landschap "Groene Hart", geen onderdeel van een Natura 2000-gebied, Beschermd natuurmonument, Wetland, Nationaal Park, Nationaal Landschap of Ecologische Hoofdstructuur. Gezien de aard van de werkzaamheden en de afstand tot beschermde gebieden is van externe werking geen sprake.

Aanbevelingen

- Tijdens de werkzaamheden moet voorzichtig worden gehandeld met alle voorkomende flora en fauna (Zorgplicht).
- Wanneer ondanks zorgvuldig handelen, onderzoek en advies schade lijkt te ontstaan voor beschermde flora en fauna, dient direct contact opgenomen te worden met een ter zake deskundige.
- Alle aanwezige vegetatie of bodemmateriaal (takken, stronken) gefaseerd verwijderen. Dit om bodembewonende dieren de kans te geven in de nabijgelegen omgeving een ander leefgebied te benutten.
- Er wordt gelegenheid gegeven aan dieren, die tijdens de werkzaamheden worden gevonden, te vluchten of zich te verplaatsen naar een schuilplaats buiten het bereik van de werkzaamheden.
- Ten aanzien van vleermuizen dienen de werkzaamheden uitsluitend tussen zonsopkomst en zonsondergang uitgevoerd te worden of een vleermuisvriendelijke verlichtingswijze toegepast te worden. Hieronder kan onder ander worden verstaan; beperkte hoogte van lichtmasten, verlichting naar beneden richten en convergeren, toepassing van UV-vrije verlichting, gebruik van sterk bundellicht vermijden et cetera.
- Ten aanzien van kleine modderkruiper en bittervoorn dient de demping van de sloten buiten de kwetsbare periode uitgevoerd te worden en dient het betreffende deel afgevangen te worden. Dit houdt in dat dergelijke werkzaamheden in de periode 1 september – 1 november uitgevoerd dienen te worden in het bijzijn van een ter zake deskundige..
- Ten aanzien van broedvogels dienen de werkzaamheden buiten de kwetsbare periode te worden uitgevoerd c.q. opgestart. Het broedseizoen betreft indicatief de periode 15 maart t/m 15 juli. Indien de werkzaamheden om moverende redenen in het broedseizoen plaatsvinden dient, alvorens deze uitgevoerd worden, door een ter zake deskundige te worden vastgesteld of er broedende vogels of nesten aanwezig zijn. De deskundige geeft aan welke maatregelen eventueel van toepassing zijn.

Literatuur

- Arcadis, 2016. De Wet Natuurbescherming Op Hoofddijken. Arcadis Nederland B.V. 4 januari 2016. Arnhem.
- Bang, P. & P. Dahlström, 2005. Tierspuren. Fährten, Fraßspuren, Losungen, Gewölle und andere. BLV Buchverlag GmbH & Co. KG, München
- Creemers, R.C.M & J.J.C.W. van Delft (raxon)(redactie), 2009. De amfibieën en reptielen van Nederland. -Nederlandse fauna 9. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, European Invertebrate Survey - Nederland, Leiden
- Dietz, C., O. von Helvesen, D. Nill & P.H.C. Lina, 2011. Vleermuizen: alle soorten van Europa en Noordwest-Afrika: biologie, kenmerken en bedreigingen. Tirion Natuur, Utrecht.
- Limpens, H., K. Mostert & W. Bongers, 1997. Atlas van de Nederlandse vleermuizen. Onderzoek naar verspreiding en ecologie. KNNV Uitgeverij, Utrecht.
- Mertens, 2012. Fauna inventarisatie ontwikkelingslocatie provincialeweg Bergambacht. Adviesbureau Mertens BV, Wageningen
- RVO, 2014. Soortenstandaard Bittervoorn *Rhodeus amarus*. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Versie 2.0. December 2014.
- RVO, 2014. Soortenstandaard Kleine modderkruiper *Cobitis taenia*. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Versie 2.0. December 2014.

Websites

www.libellennet.nl
www.ravon.nl
www.ruimtelijkeplannen.nl
www.synbiosys.alterra.nl
www.vleermuisprotocol.nl
www.waarneming.nl
www.wilde-planten.nl
www.zoogdierenvereniging.nl
www.zuid-holland.nl

We hopen u met deze rapportage voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er desondanks vragen zijn kunt u vrijblijvend contact opnemen.

Met vriendelijke groet,



Blom Ecologie,
ing. T.J.P. den Otter

Bijlage 1 Fotografische impressie

© BLOM ECOLOGIE
KERKSTRAAT 4 - 4181 AB WAARDENBURG

Niets uit deze rapportage mag zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever en Blom Ecologie worden gebruikt door derden. Onder gebruik worden alle vormen van kopie, openbaarmaking en elke andere toepassing begrepen. Deze rapportage mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor het is samengesteld.

Blom Ecologie is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit toepassing van de resultaten van werkzaamheden en/of gegevens verkregen van Blom Ecologie.

Bijlage 1 Fotografische impressie



Figuur 1 De planlocatie is gelegen aan de Steenfabriekweg ong. te Bergambacht. De beoogde ontwikkeling bestaat uit het realiseren van nieuw bedrijventerrein.



Figuur 2 De planlocatie bestaat uit een verwilderd braakliggend terrein. Op de planlocatie zijn volop mogelijkheden aanwezig voor algemene fauna om zich te vestigen.