

QUICKSCAN SOORTENBESCHERMING

MOLENDIJK 60B TE SCHIJNDEL

Colofon

Quicksan soortenbescherming

Projectnummer: EP.20.1044

Versie: 1

Datum: 7 juli 2020

Opdrachtnemer

Agrifirm NWE BV
Bedrijfsontwikkeling Exlan
Waalkade 33
5347 KR Oss

Postbus 300
5340 AH Oss

Locatie

Molendijk 60B Schijndel

Opdrachtgever

Bergs Advies
Leveroyseweg 9A
6093 NE Heythuysen

Contactpersoon

Anton van Zeeland
T: 088 – 488 2929
F: 088 – 488 2102
E: a.vanzeeland@agrifirm.com

Uitvoerders

Ing. A. van Zeeland
L.F.A. van Sleeuwen LL.B.

Collegiale check

AvZ

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN VERVEELVOLDIGD DOOR MIDDEL VAN DRUK, FOTOKOPIE, MICROFILM, GELUIDSBAND, ELEKTRONISCH OF OP WELKE ANDERE WIJZE DAN OOK, EN EVENMIN IN EEN GEAUTOMATISEERD GEGEVENSBESTAND WORDEN OPGESLAGEN, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN AGRIFIRM EXLAN.

Inhoudsopgave

Quickscan soortenbescherming

INLEIDING	4
HOOFDSTUK 1	6
TOETSINGSKADER	6
HOOFDSTUK 2	9
ONDERZOEKSRESULTATEN	9
HOOFDSTUK 3	33
CONCLUSIE	33
LITERATUUR	34
WAARNEMINGEN	35
EFFECTEN INDICATOR SOORTEN	44

Inleiding

Planbeschrijving

Aanleiding

Het plangebied is gelegen aan de Molendijk 60B Schijndel. De locatie betreft een gesloten varkensbedrijf met zeugen en vleesvarkens. De plannen omvatten de sloop van alle varkensstallen en bijbehorende voorzieningen. De huidige loods/paardenstal blijft behouden. Er wordt ook een nieuwe loods terug gebouwd. In dit kader wordt door het bevoegde gezag een toets aan de soortenbescherming noodzakelijk geacht. Bij de uitvoering van de voorgenomen ingrepen moet rekening worden gehouden met het huidige voorkomen van de, op grond van de Wet natuurbescherming, beschermde soorten. Als de voorgenomen ingreep leidt tot het overtreden van verbodsbepalingen betreffende beschermde soorten, moet vrijstelling of ontheffing worden verkregen.

De voorliggende quickscan bevat een inventarisatie van de huidige aanwezigheid van beschermde soorten planten en dieren in en om het plangebied. Tevens worden de te verwachten effecten van de ingreep in het plangebied beoordeeld.

Plangebied

Het plangebied ligt in de plaats Schijndel in de gemeente Meierijstad. Het plangebied bevindt zich buiten de verkeerskundige en stedenbouwkundige bebouwde kom van Schijndel.



• Afbeelding 1: luchtfoto plangebied (bron: streetsmart.cyclomedia.com/streetsmart, geraadpleegd op 01/07/2020)

Onderzoeksmethode

Om een goede indicatie van de natuurwaarden binnen het plangebied te krijgen, wordt het onderzoek in verschillende stappen uitgevoerd. Op basis van bronnenonderzoek is nagegaan of er wettelijk beschermde planten- of diersoorten in het gebied voor kunnen komen waaraan extra aandacht geschonken dient te worden tijdens het terreinbezoek.

Na het bronnenonderzoek is een verkennend terreinbezoek gebracht aan het plangebied. Hierbij is, op basis van de gegevens van het literatuuronderzoek, beoordeeld voor welke soorten het gebied daadwerkelijk een geschikte habitat biedt en daarmee welke soorten er daadwerkelijk voor kunnen komen. Vervolgens zijn de mogelijke effecten op de verwachte beschermde soorten beschreven.

Op basis van de doorlopen procedures zijn conclusies getrokken met betrekking tot de eventuele negatieve effecten en/of obstakels inzake de Wet natuurbescherming.

Op donderdag 2 juli 2020 is de locatie tussen 15:30 en 16:30 uur ter plaatse geïnventariseerd, om te onderzoeken of het plangebied een zodanig belangrijke status heeft dat een aanvullend veldonderzoek noodzakelijk is. Op het moment van inventarisatie was het 18 graden Celsius en licht bewolkt.

Op basis van terreinkenmerken is beoordeeld of het terrein geschikt is voor de, in de regio voorkomende, beschermde soorten.

Doelstelling

Om een indicatie te krijgen van de effecten die de sloopwerkzaamheden hebben op de natuurwaarden binnen het plangebied, dienen de volgende vragen te worden beantwoord:

1. Welke wettelijk beschermde soorten komen in het plangebied voor? Welke status hebben deze soorten?
2. Welke invloed heeft de geplande ingreep in het betreffende gebied op de beschermde soorten en komt daarmee de staat van instandhouding in gevaar?
3. Hoe dient omgegaan te worden met eventuele negatieve effecten van het plan op wettelijk beschermde planten- en diersoorten, en welke vervolgstappen zijn nodig?

1 Toetsingskader

Wet natuurbescherming

De bescherming van natuur is in Nederland vastgelegd in nationale wetgeving. De nationale wetgeving is een Nederlandse implementatie van de belangrijkste Europese wetgevingselementen. Per 1 januari 2017 zijn de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998 vervangen door de Wet natuurbescherming. De uitvoering van deze nieuwe wet is grotendeels in handen van de provincies gekomen.

1.1 Gebiedsbescherming

De Wet natuurbescherming noemt bekende maar ook enkele nieuwe soorten natuurgebieden die bescherming behoeven: de Natura 2000-gebieden, het Natuurnetwerk Nederland (NNN), bijzondere provinciale natuurgebieden en landschappen, bijzondere nationale natuurgebieden en de nationale parken. Bij ontwikkelingen met name in het buitengebied moet rekening worden gehouden met het al dan niet van toepassing zijn van de beschermingsregimes van deze natuurgebieden. Ieder gebied kent een eigen beschermingsregime dat afzonderlijk gewogen dient te worden in relatie tot plannen, projecten en andere handelingen met mogelijk nadelige effecten voor de beschermde natuurwaarden.

Natura 2000-gebieden

De bekendste natuurgebieden zijn de Natura 2000-gebieden, zij kennen tevens het meest strikte beschermingsregime. De basis voor Natura 2000 zijn de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. In Nederland zijn 164 gebieden als Natura 2000-gebied aangewezen. Voor ieder gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen bepaald die betrekking kunnen hebben op de bescherming van specifieke flora en fauna alsook leefgebieden van soorten. Alle projecten en handelingen binnen of buiten de gebiedsgrenzen mogen geen verstorend of verslechterend effect hebben op de instandhoudingsdoelstellingen. Voor de voorgenomen ontwikkeling is hier, voor zover van toepassing, separaat aan getoetst. In deze rapportage wordt hier verder niet op ingegaan.

Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS) is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. De provincies zijn belast met de taak een dergelijk netwerk tot stand te laten te komen en in stand te laten. De uitvoering hiervan is hoofdzakelijk gestuurd vanuit de ruimtelijke ordening (provinciale verordeningen). Binnen het Natuurnetwerk Nederland geldt een “nee, tenzij”- benadering.

Overige gebieden

Naast de bovengenoemde gebieden kunnen gebieden aangewezen worden als ‘bijzondere provinciale natuurgebieden’, ‘bijzondere provinciale landschappen’ of ‘nationaal park’. De bescherming van deze gebieden vindt net als bij het NNN plaats via het ruimtelijk spoor. Daarnaast kan een gebied aangewezen worden als ‘bijzonder nationaal gebied’, een soort voorloper van de aanwijzing als Natura 2000-gebied. De bescherming van deze gebieden stemt dan ook overeen met de bescherming van Natura 2000-gebieden.

1.2 Soortenbescherming

De Wet natuurbescherming deelt soorten in drie beschermingsregimes in. Daarnaast zijn er vrijgestelde soorten en jaarrond beschermde vogelnesten.

- 1) Beschermingsregime soorten vogelrichtlijn
- 2) Beschermingsregime soorten habitatrichtlijn
- 3) Beschermingsregime ander soorten
- 4) Vrijgestelde soorten
- 5) Jaarrond beschermde vogelnesten

Vogelrichtlijn

Onder de soorten van de Vogelrichtlijn vallen alle van nature in Nederland in het wild levende vogels. Het is verboden om:

- Opzettelijk vogels te doden of te vangen;
- Opzettelijk vogelnesten, -rustplaatsen en – eieren te vernielen of te beschadigen of vogelnesten weg te nemen;
- Eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben;
- Opzettelijk vogels te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

Habitatrichtlijn

Onder de soorten van de Habitatrichtlijn vallen soorten die genoemd zijn in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage I van het Verdrag van Bonn. In de Bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd.

Wat betreft deze soorten is het verboden om:

- Opzettelijk dieren te doden of te vangen;
- Opzettelijk dieren te verstoren;
- Opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen;
- Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
- Opzettelijk planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken, te verzamelen, af te snijden, te onttwortelen of te vernielen.

Ook is het verboden deze soorten te verkopen, te vervoeren voor verkoop, te verhandelen, te ruilen of te kopen, tenzij het gaat om gefokte of gekweekte dieren of planten.

Andere soorten

Onder het beschermingsregime andere soorten vallen soorten waarvan er geen Europese verplichting tot bescherming is. Dit zijn soorten die vanuit nationaal belang extra bescherming behoeven. Het beschermingsniveau van deze soorten kan per provincie verschillen.

Het is verboden om:

- 1) Opzettelijk dieren te doden of te vangen;
- 2) Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
- 3) Opzettelijk (vaat)planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken te verzamelen, af te snijden, te onttwortelen of te vernielen.

Provincies hebben de bevoegdheid om bij provinciale verordening vrijstelling te verlenen voor nationaal beschermde soorten.

Vrijgestelde soorten

De verboden zijn niet van toepassing op de bosmuis, de huisspitsmuis en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevinden. Ook vallen de zwarte rat, bruine rat, huismuis, de mol en exoten niet onder beschermingsregime van de Wet natuurbescherming en mogen opzettelijk gedood en gevangen worden. Daarnaast geldt, zoals hierboven reeds aangegeven, dat provincies de bevoegdheid hebben vrijstelling te verlenen voor bepaalde soorten.

Jaarrond beschermde vogelnesten

De opgestelde lijst met jaarrond beschermde nesten voor vogels is een beleidsdocument dat voortvloeit uit de voormalige Flora- en faunawet en meegenomen is onder de Wet natuurbescherming. De nesten zijn ingedeeld in categorieën (1 t/m 5) waarvan de categorie 1 t/m 4 jaarrond beschermd zijn. Nesten in categorie 5 zijn enkel beschermd bij afwezigheid van voldoende alternatieven.

- 1) Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats
- 2) Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
- 3) Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
- 4) Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen.
- 5) Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen.

1.3 Houtopstanden

De regels van de Boswet zijn grotendeels onveranderd opgenomen in de Wet natuurbescherming. Een houtopstand is een zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend, die een oppervlakte van 10 are of meer beslaat ofwel een rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat.

Buiten de bescherming vallen:

- houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom (voor deze wet);
- houtopstanden op erven of in tuinen
- fruitbomen en windschermen om boomgaarden;
- naaldbomen bedoeld als kerstbomen en niet ouder dan twintig jaar
- kweekgoed;
 - uit populieren of wilgen bestaande wegbeplantingen,
 - beplantingen langs waterwegen, en
 - eenrijige beplantingen langs landbouwgronden;
- Het dunnen van een houtopstand;
- uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die zijn bedoeld voor de productie van houtige biomassa indien zij:
 - ten minste eens per tien jaar worden geoogst;
 - bestaan uit minstens tienduizend per hectare per beplantingseenheid
 - bestaande uit een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee meter;
 - zijn aangelegd na 1 januari 2013.

2

Onderzoeksresultaten

2.1 Bronnenonderzoek

In de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) zijn waarnemingen van flora en fauna in Nederland gebundeld. De Gegevensautoriteit Natuur staat ervoor in dat alleen gevalideerde waarneming worden opgenomen. Gegevens uit meer dan 100 databanken zijn gebundeld, waaronder die van de particuliere gegevens beherende organisaties (Zoogdiervereniging, Vlinderstichting, etc.), provincies en terrein beherende organisaties. De NDFF wordt dagelijks aangevuld met recente waarnemingen. De gegevens uit deze nationale databank geven een overzicht van alle in de nabijheid van het plangebied waargenomen beschermde planten- en diersoorten. Exacte locaties of datering van de waarnemingen zijn daarbij niet bekend. Het overzicht geeft een indicatie op welke soorten in het bijzonder gelet moet worden bij het veldbezoek.

Daarnaast zijn gegevens van websites als www.waarneming.nl geraadpleegd voor achtergrondinformatie. Deze gegevens zijn niet inhoudelijk voor deze quickscan gebruikt. Een groot aantal amateurs en professionals publiceert op deze bekende websites zijn natuurwaarnemingen, die worden gecontroleerd door een validatiecommissie. Zodoende zijn de waarnemingen uit deze bronnen redelijk betrouwbaar, maar moeilijk te verifiëren. De waarnemingen geven eventueel wel een indicatie van soorten waar tijdens het veldonderzoek extra aandacht aan besteed dient te worden.

Natuurnetwerk Nederland


Het natuurbeheerplan is een beleidskader om het Europese, rijks- en provinciale natuur- en landschapsbeleid te realiseren. Het gaat hier om bestaande natuurgebieden, gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt, landbouwgebieden worden ingericht en beheerd volgens agrarisch natuurbeheer en de Natura 2000-gebieden.

Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland en buiten andere natuurgebieden zoals Natura 2000. Het meest dichtbijgelegen Natura 2000-gebied is het Natura 2000-gebied "Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek".


Het Natuurnetwerk Brabant is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Het is een netwerk van deels bestaande en deels nieuwe natuurgebieden die door ecologische verbindingzones met elkaar verbonden zijn. Hierdoor kunnen dieren zich makkelijker verplaatsen tussen verschillende natuurgebieden. Zo wordt de biodiversiteit (het totaal aan planten en dieren) bevorderd. Ongeveer 90% van het Natuurnetwerk Brabant wordt gevormd door bestaande natuurgebieden zoals bijvoorbeeld de Biesbosch en de Maashorst. Maar het netwerk is nog niet compleet. Er ontbreken nog veel gebieden en verbindingen die belangrijk zijn voor dieren en planten. Vanwege de klimaatverandering veranderen hun leefomstandigheden en wordt dat nog urgenter. Zij moeten zich kunnen verplaatsen om genoeg voedsel te kunnen blijven vinden en zich voort te planten. Maar het Natuurnetwerk is er niet alleen voor planten en dieren, maar ook voor mensen. Mensen genieten, recreëren en ontspannen in de natuur en voelen zich gelukkiger. Natuur schept kansen voor ondernemers die natuur en hun bedrijf willen combineren en helpt tegen de gevolgen van klimaatverandering.

De provincie Noord-Brabant heeft een Natuurbeheerplan opgesteld. Het Natuurbeheerplan is een beleidskader om het Europese, rijks- en provinciale natuur- en landschapsbeleid te realiseren. Het gaat daarbij om bestaande natuurgebieden, gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt, landbouwgebieden worden ingericht en beheerd volgens agrarisch natuurbeheer en de Natura 2000-gebieden. Het Natuurbeheerplan beschrijft per (deel)gebied

welke natuur- en landschapsdoelen nagestreefd worden. Het plan bevat de begrenzing van de natuur- en agrarische natuurgebieden, met name toegespitst op de internationale biodiversiteitsdoelen en de internationale natuurgerichte agromilieus, water en klimaat doelen. Het plan is het beleidskader voor het provinciale natuurbeleid en ook voor de implementatie van artikel 28 van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Het plan is verankerd in de SVNL en SKNL en daarmee kaderstellend voor de SNL-subsidies.




• Afbeelding 2: ligging Natuurmetriek Nederland en Natura 2000 (bron: atlasleefomgeving.nl/kaarten, geraadpleegd op 01/07/2020)



• Afbeelding 3: ligging plangebied (bron: ruimtelijkeplannen.nl, geraadpleegd op 01/07/2020)

Het plangebied heeft op grond van het op 24 september 2015 vastgestelde bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Herijking' de bestemming 'Agrarisch met waarden – Kleinschalig landschap', de dubbelbestemming 'Waarde – Cultuurhistorisch waardevolle evenementen' en de functieaanduiding 'intensieve veehouderij'. Er is een bouwvlak aanwezig. Het plangebied is bestemd voor de uitoefening van intensieve veehouderij.



• Afbeelding 4: ligging plangebied (bron: ruimtelijkeplannen.nl, geraadpleegd op 01/07/2020)

Daarnaast vigeert het bestemmingsplan, vastgesteld en deels onherroepelijk in werking op 27 juni 2013 'Landelijk gebied'. Op grond van dit bestemmingsplan heeft het plangebied de enkelbestemming 'Agrarisch – Log'. Er is een bouwvlak aanwezig. Het plangebied is bestemd voor de uitoefening van een intensieve veehouderij.

Tot slot vigeert het bestemmingsplan 'Paraplubestemmingsplan parkeren', geheel in werking en vastgesteld op 31 januari 2019.

2.2 **Veldonderzoek**

Op verschillende punten in het plangebied zijn waarnemingen verricht. Tijdens het veldbezoek is het gebied beoordeeld op de aanwezigheid van beschermde soorten en de habitatgeschiktheid voor beschermde soorten. Er is extra aandacht besteed aan de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen en vogelnesten.

De ecologische factoren in de omgeving zijn met behulp van een digitale fotocamera vastgelegd. Om de flora en fauna te kunnen determineren, is gebruik gemaakt van eigen kennis en literatuur.

• Afbeelding 5: voorzijde te slopen varkensstal



- Afbeelding 6: voorzijde varkensstal (in de nok zit een spreekuwnest)



- Afbeelding 7: Linker varkensstal luchtinlaat



• Afbeelding 8: zijaanzicht varkensstallen



• Afbeelding 9: achteraanzicht varkensstal



• Afbeelding 10: achteraanzicht varkensstal



• Afbeelding 11: achteraanzicht varkensstallen



- Afbeelding 12: achterzijde varkensstallen geheel gesloten




- Afbeelding 13: Luchtinlaat voorzien van vogelgaas



• Afbeelding 14: luchtinlaat voorzien van vogelgaas




• Afbeelding 15: kieren gesloten met pur



- Afbeelding 16: muur varkensstallen waarvan gaten gedicht met zijn met pur



- Afbeelding 17: buitenzijde varkensstallen tussenbouw



• Afbeelding 18: zijaanzicht varkensstallen



• Afbeelding 19: achteraanzicht varkensstallen



• Afbeelding 20: buitenzijde varkensstallen



• Afbeelding 21: buitenzijde varkensstallen luchtinlaat gesloten met gaas



- Afbeelding 22 en 23: buitenzijde varkensstallen



- Afbeelding 24 en 25: buitenzijde varkensstallen



• Afbeelding 26: binnenzijde varkensstallen



• Afbeelding 27: binnenzijde varkensstallen



• Afbeelding 28 en 29: binnenzijde volledig geïsoleerd



• Afbeelding 30: binnenzijde varkensstallen



• Afbeelding 31: binnenzijde varkensstallen



• Afbeelding 32: buitenzijde planlocatie met erfverharding



• Afbeelding 33: binnenzijde loods (te behouden)



• Afbeelding 34: binnenzijde loods (te behouden)



- Afbeelding 35: binnenzijde loods met paardenstallen (te behouden)



- Afbeelding 36: te behouden loods met paardenstallen



- Afbeelding 37: te behouden loods met opslag diversen



- Afbeelding 38: achterzijde woonhuis



Flora algemeen

Bij de planlocatie zijn geen bijzondere beplantingen aangetroffen. Er is tevens gelet op de aanwezigheid van (beschermde) muurvegetatie. Rondom het erf staan naast een siertuin enkele bomen, namelijk Zomereiken, Hazelnoot en Tamme Kastanje.

Grondgebonden zoogdieren

Binnen het plangebied zijn geen grondgebonden zoogdieren aangetroffen.

Specifiek wordt bekeken of de betreffende inrichting verwacht kan worden of er streng beschermde zoogdieren; steenmarter, bunzing, hermelijn, wezel, eekhoorn, bever en das kunnen worden aangetroffen.

Steenmarter

De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor de steenmarter. Steenmarters gebruiken hoozolders, loze ruimtes onder het dak, schuurtjes en dergelijke, als verblijfplaats. Een steenmarter heeft binnen zijn territorium verscheidene verblijfplaatsen. Daarnaast laten steenmarters enorm veel sporen achter. Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen, zoals uitwerpselen of prooiresten aangetroffen die duiden op het gebruik van de onderzoekslocatie als vaste rust- of verblijfplaats door deze soort.

Kleine marterachtigen

De onderzoekslocatie biedt geen geschikte verblijflocaaties voor de hermelijn, wezel en bunzing. De soorten maken gebruik van oude hopen van onder andere mollen en muizen, maar ook houtwallen, steenhopen en ruimtes onder boomwortels. Desbetreffende soorten hebben binnen hun territorium verscheidene verblijfplaatsen. Tijdens het veldbezoek zijn er geen marters of sporen van marters aangetroffen op de onderzoekslocatie. Echter, dit betekent niet dat het gebied niet potentieel in gebruik is door de hermelijn, wezel en/of bunzing als migratieroute. Gezien de onderzoekslocatie kleiner is dan één hectare kan gesteld worden dat deze geen essentieel onderdeel uitmaakt van het leefgebied van een van genoemde soorten (Bouwens 2017). Indien bij sloop/herinrichting van het gebied groenstructuren rond het perceel behouden blijven, is er geen sprake van een negatief effect op genoemde soorten.

Eekhoorn

De onderzoekslocatie is vanwege de afwezigheid van voldoende bomen niet geschikt als habitat voor de eekhoorn. Er worden met de werkzaamheden geen bomen verwijderd. Een negatief effect als gevolg van de werkzaamheden is uitgesloten.

Bever

Voor de bever is op de onderzoekslocatie geen geschikt habitat aanwezig. Vaste rust- en verblijfplaatsen van de bever kunnen worden uitgesloten.

Das

Tijdens het veldbezoek zijn op de onderzoekslocatie en de directe omgeving geen loop- of eetsporen, latrines en/of wissels aangetroffen die duiden op de aanwezigheid en/of het gebruik van de onderzoekslocatie door de das. Dassen zullen eerder hun leefgebied hebben in de nabij gelegen natuurgebieden en de aansluitende weilanden. Verstoring ten aanzien van de das als gevolg van de voorgenomen ingreep is niet aan de orde.

Het voorkomen van overige grondgebonden zoogdieren waarvoor geen vrijstelling geldt, is tijdens het veldbezoek niet vastgesteld.

Vleermuizen

Het plangebied is zeer nauwkeurig beoordeeld op de mogelijke waarde voor vleermuizen. Hierbij is gelet op de geschiktheid van de aanwezige bebouwing als verblijfplaats voor deze dieren: aanwezigheid van spouwgaten en andere openingen in muren en daken, vetstrepen, uitwerpselen en prooiresten bij gevelopeningen.

Verblijfsruimte voor vleermuizen hebben specifieke voorwaarden zoals een stabiele temperatuur en het tochtvrij zijn. Bij vleermuizen worden drie verblijfplaatsen onderscheiden;

winterverblijven, zomerverblijven en paarverblijven. Aan de winterverblijven worden de hoogste eisen gesteld, daarna de zomerverblijven en tenslotte de paarverblijven, waarbij de vleermuizen een zeer korte tijd op een bepaalde locatie kunnen verblijven.

De te slopen stallen en gebouwen zijn in prima staat. Ze zijn geheel gesloten, kieren zijn dicht gemaakt met pur en de inlaten zijn voorzien van vogelschroot en vogelgaas. De te slopen gebouwen beschikken niet over geschikte holten voor vleermuizen. Daarnaast zijn asbestgolfplaten en overwegend damwand gevelbeplating te veel aan temperatuurschommelingen onderhevig, waardoor deze niet geschikt zijn als verblijfplaats voor vleermuizen.

Er zijn in en om de stallen geen sporen (vetstrepen, uitwerpselen, prooiresten) aangetroffen. Naast de onderzoekslocatie bevindt zich het woonhuis. Eventuele verblijfsplaatsen hierin ondervinden door de afstand tot de slooplocatie en de aard van de ingreep geen hinder.

Foerageerhabitat

De onderzoekslocatie zal, gelet op de aanwezige habitat, gebruikt kunnen worden door in de omgeving verblijvende vleermuizen om te foerageren. De plannen zullen echter geen aantasting van belangrijk foerageerhabitat vormen. Door de voorgenomen ingreep zal het aanbod van foerageermogelijkheden niet in het geding komen. In de directe omgeving is meer geschikt foerageerhabitat voor vleermuizen aanwezig in de vorm van bomenrijen en bosranden.

Vliegroutes

Vleermuizen maken veelal gebruik van lijnvormige (donkere) landschapselementen zoals houtsingels, beken en lanen om zich te verplaatsen tussen verblijfsplaatsen en foerageergebieden. Doordat dergelijke lijnvormige elementen ontbreken op de onderzoekslocatie, worden er geen potentiële vliegroutes verstoord.

Vogels

Tijdens het bezoek is met name gelet op de aanwezigheid van nesten en rustplaatsen voor vogels.

Er zijn broedvogels waarvan de nesten ook beschermd zijn op het moment dat ze niet voor de voortplanting in gebruik zijn. Binnen het agrarische (buiten)gebied kunnen dit zijn: boomvalk, buizerd, havik, sperwer, wespendif, huismus, steenuil en de kerkuil.

Boomvalk

De boomvalk is een soort die geen eigen nest maakt, maar broedt in gebruikte kraaien- en/of eksternesten in verschillende typen bos(randen) of in solitaire bomen, populierensingels, of op erven. De soort komt vooral voor in open en halfopen landschappen zoals boerenland en dorpen, alsook in buitenwijken van steden. De bomen op- en nabij de projectlocatie zijn gecontroleerd op dergelijke nesten, deze zijn niet aangetroffen. Evenmin worden er met de beoogde werkzaamheden bomen verwijderd. Negatieve effecten op de boomvalk als gevolg van de werkzaamheden zijn derhalve niet aan de orde.

Buizerd en havik

De buizerd en havik broeden op grote nesten van ongeveer een meter in doorsnede en 60 centimeter diep. Dergelijke nesten zijn tijdens het veldbezoek niet waargenomen. Een broedgeval van de buizerd en havik is daarom uit te sluiten. Eveneens worden er met de beoogde werkzaamheden geen bomen gekapt, zodat het wegnemen van een jaarrond beschermd nest kan worden uitgesloten.

Wespendief en sperwer

De wespendif is doorgaans gebonden aan grotere bosgebieden van zowel loof- als naaldbomen. Bij voorkeur is er afwisseling binnen het bosgebied aanwezig in de vorm van open plekken. De sperwer broedt bij voorkeur meer verborgen in naaldbomen. Beide situaties

zijn op de onderzoekslocatie niet aanwezig. Gezien de ligging van de onderzoekslocatie binnen agrarisch gebied en de afwezigheid van voldoende dekking is een nestplaats van de sperwer of wespandief niet te verwachten. Eveneens zijn er tijdens het veldbezoek geen nesten aangetroffen. Een broedgeval van zowel de wespandief als de sperwer zijn uitgesloten.

Steenuil en kerkuil

De kerkuil en steenuil hebben een voorkeur voor cultuurlandschappen met allerlei landschapselementen die voor afwisseling zorgen. Beide soorten broeden in gebouwen en gebruiken ook graag speciale nestkasten. Daarnaast worden door de steenuil ook wel boomholten gebruikt, mits er zich grote holten in bevinden. De gebouwen zijn in zijn geheel gecontroleerd op de aanwezigheid van steen- en kerkuilen en is vooral gelet op de aanwezigheid van sporen; braakballen, veren en uitwerpselen. De te slopen gebouwen beschikken niet over geschikte holten voor uilen. Er zijn geen (sporen van) steen- en kerkuilen waargenomen. Er is geen sprake van een afname van belangrijk foerageergebied. Er blijft er voldoende foerageergebied aanwezig in de omgeving.

Huismus

Ook voor de huismus, die veel te vinden is in agrarisch gebied en vooral gebonden aan gebouwen is, is het nest jaarrond beschermd. Er zijn geen nesten van huismussen gevonden in de te slopen bebouwing. De huismussen broeden waarschijnlijk in het woonhuis.

Overige broedvogels

De beplanting op de onderzoekslocatie kan nestgelegenheid bieden aan broedvogelsoorten zoals de merel en winterkoning. De nesten van deze soorten zijn alleen beschermd op het moment dat ze als zodanig in gebruik zijn. Aan de bovenzijde van de gevel (afbeelding 6) is een opening. In deze opening hebben spreeuwen een nest gehad.

Er zijn vogels gezien en gehoord, namelijk:

• Tabel 1: overzicht waargenomen vogels

Soort
Witte kwikstaart
Huismussen
Turkse tortel
Vink
Koolmees

• Tabel 2: overzicht waargenomen vogelnesten

Soort
Spreeuw (categorie indeling nestbescherming: 5)

Uitleg bij tabel:

Categorie 1:	Jaarrond gebruikte nesten (steenuil)
Categorie 2:	Zeer honkvaste koloniebroeders of afhankelijk bebouwing
Categorie 3:	Zeer honkvaste broeders of afhankelijk bebouwing (geen kolonie)
Categorie 4:	Vogels die ieder jaar terugkeren naar specifiek nest
Categorie 5:	Honkvaste broeders, maar voldoende flexibel

Reptielen, amfibieën en vissen

Er zijn tijdens het terreinbezoek geen reptielen, amfibieën en/of vissen waargenomen.

Voor de in Nederland voorkomende reptielsoorten zoals de hazelworm, de levendbarende hagedis en ringslang biedt de onderzoekslocatie geen geschikt habitat. Deze soorten vrijwel alleen aangetroffen worden in specifieke natuurgebieden.

Dit geldt ook voor de specifieke beschermende amfibieën soorten die veel eisen stellen aan zijn habitat; alpenwatersalamander, heikikker, vinpootsalamander, poelkikker en

rugstreeppad. Deze zijn allen uit te sluiten omdat de betreffende locatie geen goed habitat biedt voor deze soorten door het ontbreken van voldoende oppervlaktewater.

De onderzoekslocatie vormt wel een geschikt habitat voor algemene amfibieënsoorten als de bruine kikker en de gewone pad. Op de onderzoekslocatie kunnen deze soorten beschutting vinden tussen de begroeiing en onder de takken- of stenenhopen. Voor algemene amfibieënsoorten geldt in het kader van de Wet natuurbescherming een vrijstelling, zodat een ontheffing bij verstoring niet noodzakelijk is. Het is echter wel zaak om aandacht te schenken aan de zorgplicht.

Vissen

Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater op de onderzoekslocatie kan deze soortgroep buiten beschouwing worden gelaten.

Overige

Van de overige soortgroepen, zoals dagvlinders, insecten en libellen, kan worden aangenomen dat deze soorten gedurende het jaar in het plangebied aanwezig kunnen zijn of dit gebied in de migratieroute hebben liggen.

Afhankelijk van het seizoen zijn mogelijk algemene soorten te vinden op/of binnen de planlocatie. Specifieke beschermende soorten zijn voornamelijk afhankelijk van specifieke terreinkenmerken met specifieke biotopen. Binnen het plangebied is een dergelijk biotoop niet aanwezig.

2.3 Effecten van de ingreep

De effecten op beschermde soorten zijn onderzocht op basis van het voornemen binnen het plangebied.

Flora algemeen

Er is geen bijzondere flora aangetroffen binnen het plangebied, negatieve effecten zijn uitgesloten.

Grondgebonden zoogdieren

Verstoring van algemene zoogdieren vindt mogelijk plaats. De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor een aantal soorten grondgebonden zoogdieren. Het gaat daarbij om algemene soorten als de egel, konijn en diverse muissoorten. De verblijfsplaatsen van deze soorten worden door de voorgenomen ingreep echter niet aangetast. Verblijfsplaatsen van beschermde zoogdiersoorten zijn ter plaatse niet aangetroffen.

Vleermuizen

Er zijn geen sporen van vleermuizen aangetroffen waaruit blijkt dat de gebouwen als verblijfplaats worden gebruikt. Nader onderzoek in het kader van de soortenbescherming is niet noodzakelijk.

Vogels

Door de voorgenomen ingreep worden geen vogels en jaarrond beschermde nesten aangetast. Er is enkel een buiten gebruik zijnde spreeuwennest aangetroffen in de gevel. Deze zijn buiten het broedseizoen niet beschermd.

Reptielen, amfibieën en vissen

Er zijn geen reptielen, amfibieën en/of vissen waargenomen. De instandhoudingsdoelstellingen komen niet in het gedrang.

Overige

Omdat er geen geschikt biotoop is waargenomen voor overige beschermde soorten, zijn negatieve effecten uitgesloten. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

3

Conclusie en aanbevelingen

Het natuuronderzoek is gebaseerd op inventarisatiegegevens van derden, literatuuronderzoek en een verkennend veldbezoek aan het plangebied. Het beeld dat uit het onderzoek naar voren is gekomen vormt voldoende basis om gefundeerd uitspraken te doen over de gevolgen van de voorgenomen werkzaamheden voor beschermde soorten en gebieden.

3.1 Conclusie

Voor de bepaling van de effecten en voor de beantwoording van de vraag of men in strijd komt met de Wet natuurbescherming, wordt de relatie gelegd tussen het initiatief met deze wet door waar mogelijk antwoord te geven op de volgende vragen:

1. *Welke wettelijk beschermde soorten komen in het plangebied voor? Welke status hebben deze soorten?*
2. *Welke invloed heeft de geplande ingreep in het betreffende gebied op de beschermde soorten en de staat van instandhouding?*
3. *Hoe dient omgegaan te worden met eventuele negatieve effecten van het plan op wettelijk beschermde planten- en diersoorten, en welke vervolgstappen zijn nodig?*

Het voornemen zoals opgenomen in de inleiding en de daarbij behorende werkzaamheden, zal naar verwachting geen negatief effect hebben op staat van instandhouding van beschermde soorten. Binnen het plangebied zijn geen (verblijfplaatsen van) strikt beschermde soorten aangetroffen die door de werkzaamheden worden beïnvloed.

De gebouwen dienen gesloopt te worden buiten het broedseizoen.

Uit de effectenbeschrijving blijkt dat er geen onevenredige directe of indirecte gevolgen zijn van de voorgenomen activiteiten op de voortplanting en instandhouding van beschermde dier- en/of plantsoorten. Lokaal zullen mogelijk algemene soorten uit het plangebied trekken op zoek naar een vervangende biotoop.

Voor aanvang van de werkzaamheden dient derhalve geen aanvullend onderzoek plaats te vinden. Een ontheffing met betrekking tot aantasting van beschermde soorten is niet nodig. De werkzaamheden kunnen leiden tot een beschadiging of vernietiging van mogelijke verblijfplaatsen en/of verstoring van eventueel aanwezige algemene soorten. Een algehele vrijstelling op basis van de Verordening natuurbescherming voor ruimtelijke ontwikkelingen is hierop van toepassing. De algemene zorgplicht blijft onverminderd van toepassing.





Literatuur

- Broekhuizen, S., Hoekstra, B., Laar, van, V., Smeenk, C. & Thissen, J.B.M., 1992
Atlas van de Nederlandse zoogdieren. Stichting uitgeverij van de KNNV, Utrecht.
- Europese Gemeenschappen,
Richtlijn no 92/409 inzake het behoud van de vogelstand. Brussel, 1979.
- Europese Gemeenschappen,
Richtlijn no 92/43 inzake instandhouding van de natuurlijke habitat en de wilde flora en fauna. Brussel, 1992.
- Provinciale Verordening (Wet) natuurbescherming
- Hollander, H., & Geest, van der, P., 1994.
Rode-Lijst van bedreigde zoogdieren in Nederland.
Red data book of threatened mammals in the Netherlands. Vereniging voor Zoogkunde en Zoogdierbescherming, Utrecht.
- Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Ministerie van Volkshuisvesting.
Ruimtelijke Ordening en milieu, 2004. Nota Ruimte.
- De Nederlandse libellen, Nederlandse Fauna, deel 4
Nationaal historisch museum, KNNV uitgeverij (2002)
- Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ)
- Vleermuizen en planologie, Zoogdierverseniging (2010)
- Wet natuurbescherming.
Vastgesteld d.d. 1 januari 2017.
- www.waarneming.nl
- www.synbiosys.alterra.nl
- www.atlasleefomgeving.nl
- www.ravon.nl
- www.sovon.nl
- www.google.nl
- www.ndff.nl
- www.floron.nl
- www.ruimtelijkeplannen.nl
- www.natura2000.nl
- www.ecologica.eu

1 Bijlage

Waarnemingen



Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2020-06-24 10:58	▲ Scholekster - <i>Haematopus ostralegus</i>	1 adult, foeragerend	Lieseld	N.W. & D.A. Collectief.	■
2020-06-24 10:58	▲ Scholekster - <i>Haematopus ostralegus</i>	1 adult, foeragerend	Lieseld	Marc van Schaijk	■
2020-06-24 10:56	▲ Scholekster - <i>Haematopus ostralegus</i>	1 adult, foeragerend, gezien	Lieseld	Marc van Schaijk	✓ 📷
2020-06-24 10:58	▲ Witte Kwikstaart - <i>Motacilla alba</i>	1 foeragerend, gezien	Lieseld	Marc van Schaijk	■
2020-06-24 10:58	▲ Witte Kwikstaart - <i>Motacilla alba</i>	1 foeragerend, gezien	Lieseld	N.W. & D.A. Collectief.	■
2020-06-24 10:53	▲ Putter - <i>Carduelis carduelis</i>	2 adult, gezien en gehoord	Lieseld	N.W. & D.A. Collectief.	✓
2020-06-24 10:53	▲ Putter - <i>Carduelis carduelis</i>	2 adult, gezien en gehoord	Lieseld	Marc van Schaijk	✓
2020-06-23 18:42	■ Patrijs - <i>Perdix perdix</i>	1 adult, roepend, gezien en gehoord	Lieseld	Marc van Schaijk	✓
2020-06-23 18:42	■ Patrijs - <i>Perdix perdix</i>	1 adult, roepend, gezien en gehoord	Lieseld	N.W. & D.A. Collectief.	✓ 📷
2020-06-23 18:47	■ Vuurlibel - <i>Crocothemis erythraea</i>	1 ♂ imago, gezien	Lieseld	N.W. & D.A. Collectief.	✓
2020-06-23 18:47	■ Vuurlibel - <i>Crocothemis erythraea</i>	1 ♂ imago, gezien	Lieseld	Marc van Schaijk	✓ 📷
2020-06-23 18:49	● Cele kamilie - <i>Anthemis tinctoria</i>	1 bloeiend, natuurlijk, veldwaarneming	Lieseld	N.W. & D.A. Collectief.	■
2020-06-23	■ Gevlekte rietorchis - <i>Dactylorhiza praetermissa subsp. junialis</i> 📷	1 bloeiend, natuurlijk, veldwaarneming	Lieseld	N.W. & D.A. Collectief.	■ 🔒
2020-06-23 18:56	■ Brede lathyrus - <i>Lathyrus latifolius</i>	1 bloeiend, natuurlijk, veldwaarneming	Lieseld	N.W. & D.A. Collectief.	■
2020-06-22 16:43	▲ Wilde Eend - <i>Anas platyrhynchos</i>	5 ♀♀ subadult, gezien en gehoord	Lieseld	Marc van Schaijk	✓ 📷
2020-06-22 15:58	▲ Wilde Eend - <i>Anas platyrhynchos</i>	6 subadult, gezien en gehoord	Lieseld	Marc van Schaijk	✓ 📷
2020-06-22 16:44	▲ Houtduif - <i>Columba palumbus</i>	20 adult, gezien en gehoord	Lieseld	Marc van Schaijk	✓ 📷
2020-06-22 06:00	▲ Buizerd - <i>Buteo buteo</i>	1 adult, baltsend / zingend, gezien en gehoord	Lieseld	Marc van Schaijk	✓
2020-06-22 06:00	▲ Boerenzwaluw - <i>Hirundo rustica</i>	6 adult, gezien en gehoord	Lieseld	Marc van Schaijk	■
2020-06-22 06:00	▲ Kleine Karekiet - <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	1 adult, baltsend / zingend, gezien en gehoord	Lieseld	Marc van Schaijk	■
2020-06-22 06:00	■ Bosrietzanger - <i>Acrocephalus palustris</i>	1 adult, baltsend / zingend, gezien en gehoord	Lieseld	Marc van Schaijk	■
2020-06-22 06:00	■ Spotvogel - <i>Hippolais icterina</i>	1 ♂ adult, baltsend / zingend, gehoord	Lieseld	Marc van Schaijk	■
2020-06-22 06:00	▲ Zwartkop - <i>Sylvia atricapilla</i>	1 ♂ adult, baltsend / zingend, gezien en gehoord	Lieseld	Marc van Schaijk	✓
2020-06-22 06:00	▲ Tuinfluit - <i>Sylvia borin</i>	1 adult, baltsend / zingend, gehoord	Lieseld	Marc van Schaijk	■
2020-06-22 06:00	▲ Tuinfluit - <i>Sylvia borin</i>	1 adult, baltsend / zingend, gehoord	Lieseld	Marc van Schaijk	■

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2020-06-22 06:00	▲ Crasmus - <i>Sylvia communis</i>	1 ♂ adult, baltsend / zingend, gezien en gehoord	Liesseind	Marc van Schaijk	■
2020-06-22 06:00	▲ Huismus - <i>Passer domesticus</i>	4 adult zomerkleed, gezien en gehoord	Liesseind	Marc van Schaijk	■
2020-06-22 15:49	▲ Weidebeekjuffer - <i>Calopteryx splendens</i>	1 ♂ imago, overvliegend, gezien	Liesseind	Marc van Schaijk	📷
2020-06-22	▲ Azuurwaterjuffer - <i>Coenagrion puella</i>	5 imago, gezien	Liesseind	Marc van Schaijk	📷
2020-06-22 15:49	▲ Lantaarntje - <i>Ischnura elegans</i>	5 imago, gezien	Liesseind	Marc van Schaijk	📷 📷
2020-06-22 15:46	▲ Gewone oeverlibel - <i>Orthetrum cancellatum</i>	3 ♀ imago, gezien	Liesseind	Marc van Schaijk	📷 📷
2020-06-22 15:42	▲ Gewone oeverlibel - <i>Orthetrum cancellatum</i>	6 ♂ imago, gezien	Liesseind	Marc van Schaijk	📷 📷
2020-06-22 15:33	▲ Grote populierenhaan - <i>Chrysomela populi</i>	1 imago, gezien	Liesseind	Marc van Schaijk	■ 📷
2020-06-22 15:10	🟡 Cele kamilie - <i>Anthemis tinctoria</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Liesseind	Marc van Schaijk	✅ 📷
2020-06-22	■ Rietorchis - <i>Dactylorhiza praetermissa</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Liesseind	Marc van Schaijk	✅ 📷
2020-06-22 15:26	▲ Koninginnekruid - <i>Eupatorium cannabinum</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Liesseind	Marc van Schaijk	📷 📷
2020-06-22 15:23	▲ Boekweit - <i>Fagopyrum esculentum</i>	101 bloeiend, ingezaaid, veldwaarneming	Liesseind	Marc van Schaijk	■ 📷 📷 📷
2020-06-22 15:02	▲ Moerasspirea - <i>Filipendula ulmaria</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Liesseind	Marc van Schaijk	📷 📷
2020-06-22 16:22	■ Hennepnetel spec. - <i>Galeopsis spec.</i>	1 vegetatief, veldwaarneming	Liesseind	Marc van Schaijk	✅ 📷 📷
2020-06-22 16:28	▲ Moeraswalstro - <i>Galium palustre</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Liesseind	Marc van Schaijk	✅ 📷 📷
2020-06-22 16:16	▲ Creppelrus - <i>Juncus bufonius</i>	1 vruchtdragend, veldwaarneming	Liesseind	Marc van Schaijk	■ 📷
2020-06-22 16:49	■ Brede lathyrus - <i>Lathyrus latifolius</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Liesseind	Marc van Schaijk	■ 📷
2020-06-22 16:49	■ Brede lathyrus - <i>Lathyrus latifolius</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Liesseind	Marc van Schaijk	■ 📷
2020-06-22 15:13	▲ Kleine leeuwentand - <i>Leontodon saxatilis</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Liesseind	Marc van Schaijk	✅ 📷
2020-06-22 16:22	▲ Grote wederk - <i>Lysimachia vulgaris</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Liesseind	Marc van Schaijk	■ 📷
2020-06-22 16:21	▲ Grote wederk - <i>Lysimachia vulgaris</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Liesseind	Marc van Schaijk	📷 📷
2020-06-22 15:32	▲ Grote wederk - <i>Lysimachia vulgaris</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Liesseind	Marc van Schaijk	■ 📷
2020-06-22 16:41	▲ Grote kattenstaart - <i>Lythrum salicaria</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Liesseind	Marc van Schaijk	✅ 📷
2020-06-22 15:27	▲ Grote kattenstaart - <i>Lythrum salicaria</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Liesseind	Marc van Schaijk	✅ 📷
2020-06-22 16:15	▲ Zompvergeet-mij-nietje s.s. - <i>Myosotis laxa subsp. cespitosa</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Liesseind	Marc van Schaijk	✅ 📷

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2020-06-22 15:28	▲ Phacelia - <i>Phacelia tanacetifolia</i>	1001 bloeiend, ingezaaid	Lieseind	Marc van Schaijk	✓ 📷 🗨️ 📷
2020-06-22 15:22	▲ Phacelia - <i>Phacelia tanacetifolia</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	✓ 📷
2020-06-22 15:21	▲ Phacelia - <i>Phacelia tanacetifolia</i>	1001 bloeiend, ingezaaid, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	✓ 📷 🗨️ 📷
2020-06-22 15:13	■ Hertshoornweegbree - <i>Plantago coronopus</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	✓ 📷
2020-06-22 16:12	▲ Moeraskers - <i>Rorippa palustris</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	✓ 📷
2020-06-22 16:23	▲ Echte koekoeksbloem - <i>Silene flos-cuculi</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	🗨️ 📷
2020-06-22 15:30	▲ Bosandoorn - <i>Stachys sylvatica</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	✓ 📷
2020-06-22 15:54	▲ Vogelwikke - <i>Vicia cracca</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	■ 📷
2020-06-22 16:53	▲ Tuinviooltje - <i>Viola x wittrockiana</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	■ 📷
2020-06-14	■ Ooievaar - <i>Ciconia ciconia</i>	1 rustend	Lieseind	Wouter Thijs	■ 🗨️
2020-05-12 13:11	■ Vaste lupine - <i>Lupinus polyphyllus</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	✓ 🗨️ 📷
2020-05-09	■ Spotvogel - <i>Hippolais icterina</i>	1 ♂ adult, baltsend / zingend, gehoord	Lieseind	Marc van Schaijk	■
2020-05-09	▲ Zwartkop - <i>Sylvia atricapilla</i>	1 ♂ adult, baltsend / zingend, gezien en gehoord	Lieseind	Marc van Schaijk	🗨️
2020-05-09	▲ Tuinluiter - <i>Sylvia borin</i>	1 ♂ adult, baltsend / zingend, gehoord	Lieseind	Marc van Schaijk	■
2020-05-09	▲ Grasmus - <i>Sylvia communis</i>	1 ♂ adult, baltsend / zingend, gezien en gehoord	Lieseind	Marc van Schaijk	■
2020-05-09	■ Nachttegaal - <i>Luscinia megarhynchos</i>	1 adult, baltsend / zingend, gehoord	Lieseind	Marc van Schaijk	■
2020-05-08 20:18	■ Koekoek - <i>Cuculus canorus</i>	1 adult, baltsend / zingend, gezien en gehoord	Lieseind	N.W. & D.A. Collectief.	✓ 🗨️ 🗨️
2020-05-08 19:16	▲ Kievit - <i>Vanellus vanellus</i>	1 adult, overvliegend, gezien	Lieseind	N.W. & D.A. Collectief.	■
2020-05-08 19:13	▲ Boerenzwaluw - <i>Hirundo rustica</i>	1 overvliegend, gezien	Lieseind	N.W. & D.A. Collectief.	■
2020-05-08 20:08	▲ Fitis - <i>Phylloscopus trochilus</i>	1 adult, baltsend / zingend, gehoord	Lieseind	N.W. & D.A. Collectief.	✓ 🗨️
2020-05-08 19:13	▲ Grasmus - <i>Sylvia communis</i>	1 adult, gezien en gehoord	Lieseind	N.W. & D.A. Collectief.	■
2020-05-08 19:27	■ Nachttegaal - <i>Luscinia megarhynchos</i>	1 baltsend / zingend, gehoord	Lieseind	N.W. & D.A. Collectief.	✓ 🗨️
2020-05-08 19:11	■ Roodborsttapuit - <i>Saxicola rubicola</i>	2 ♂ adult, paar in broedbiotoop, gezien en gehoord	Lieseind	N.W. & D.A. Collectief.	■
2020-05-08 20:24	▲ Bruine Rat - <i>Rattus norvegicus</i>	1 dood, gezien	Lieseind	N.W. & D.A. Collectief.	🗨️ 📷
2020-05-08 20:07	▲ Gele lis - <i>Iris pseudacorus</i>	1 bloeiend, natuurlijk, veldwaarneming	Lieseind	N.W. & D.A. Collectief.	🗨️ 📷

<u>Datum</u>	<u>Soort</u>	<u>Aantal</u>	<u>Locatie</u>	<u>Waarnemer</u>	
2020-05-08 19:09	Grote maagdenpalm - <i>Vinca major</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Lieseind	N.W. & D.A. Collectief.	✓ 📷
2020-05-03 13:40	Boerenwaluw - <i>Hirundo rustica</i>	1 overvliegend	Lieseind	Daan van Werven	■
2020-05-03 13:41	Tjiftjaf - <i>Phylloscopus collybita</i>	1 baltsend / zingend	Lieseind	Daan van Werven	🔊
2020-05-03 13:57	Zwartkop - <i>Sylvia atricapilla</i>	1 baltsend / zingend	Lieseind	Daan van Werven	🔊
2020-05-03 13:55	Roodborst - <i>Erithacus rubecula</i>	1 baltsend / zingend	Lieseind	Daan van Werven	■
2020-05-03 13:09	Heggenmus - <i>Prunella modularis</i>	1	Lieseind	Daan van Werven	■
2020-05-03 13:04	Vink - <i>Fringilla coelebs</i>	1 baltsend / zingend	Lieseind	Daan van Werven	🔊
2020-05-03 13:42	Oranjetipje - <i>Anthocharis cardamines</i>	1 ♂ imago, gezien	Lieseind	Daan van Werven	🔊
2020-05-03 13:58	Klein geaderd witje - <i>Pieris napi</i>	1 imago, gezien	Lieseind	Daan van Werven	🔊
2020-05-03 13:41	Boomblauwtje - <i>Celastrina argiolus</i>	1 imago, gezien	Lieseind	Daan van Werven	🔊
2020-05-03 13:05	Bont zandoogje - <i>Pararge aegeria</i>	1 imago, gezien	Lieseind	Daan van Werven	🔊
2020-05-03 13:08	Vuurjuffer - <i>Pyrrosoma nymphula</i>	1 imago, gezien	Lieseind	Daan van Werven	🔊
2020-05-03 13:07	Boomhommel - <i>Bombus hypnorum</i>	1 imago	Lieseind	Daan van Werven	🔊 📷
2020-05-03 13:17	Anthomyia procellaris	1 imago	Lieseind	Daan van Werven	■ 📷
2020-04-21 16:23	Boomblauwtje - <i>Celastrina argiolus</i>	1 imago, gezien	Lieseind	Marc van Schaijk	🔊 📷
2020-04-21 17:06	Grote vossenstaart - <i>Alopecurus pratensis</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	✓ 📷 🗨
2020-04-21 15:45	Bosanemoon - <i>Anemone nemorosa</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	🔊 📷
2020-04-21 15:37	Bosanemoon - <i>Anemone nemorosa</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	🔊 📷
2020-04-21 15:33	Bosanemoon - <i>Anemone nemorosa</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	✓ 📷
2020-04-21 15:50	IJle dravik - <i>Anisantha sterilis</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	✓ 📷
2020-04-21 16:54	Gewoon reukgras - <i>Anthoxanthum odoratum</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	✓ 📷
2020-04-21 16:20	Fluitenkruid - <i>Anthriscus sylvestris</i>	1 bladontplooiing, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	✓ 📷 🗨
2020-04-21 16:52	Ruwe berk - <i>Betula pendula</i>	1 vegetatief, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	✓ 📷
2020-04-21 15:40	Kleine veldkers - <i>Cardamine hirsuta</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	✓ 📷
2020-04-21 15:35	Pinksterbloem - <i>Cardamine pratensis</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	✓ 📷

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2020-04-21 15:34	▲ Pinksterbloem - <i>Cardamine pratensis</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	✓ 📷
2020-04-21 17:03	▲ Haagbeuk - <i>Carpinus betulus</i>	1 bladontplooiing, aangeplant	Lieseind	Marc van Schaijk	✓ 📷 📷 📷 📷
2020-04-21 16:04	▲ Gewone hoornbloem - <i>Cerastium fontanum</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	✓ 📷
2020-04-21 15:51	▲ Gewone hoornbloem - <i>Cerastium fontanum</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	✓ 📷
2020-04-21 15:38	▲ Kluwenhoornbloem - <i>Cerastium glomeratum</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	✓ 📷
2020-04-21 16:29	■ Tweestijlige meidoorn - <i>Crataegus laevigata</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	✓ 📷 📷
2020-04-21 16:59	▲ Eenstijlige meidoorn - <i>Crataegus monogyna</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	✓ 📷 📷
2020-04-21 18:00	▲ Brem - <i>Cytisus scoparius</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	✓ 📷
2020-04-21 16:36	▲ Mannetjesvaren - <i>Dryopteris filix-mas</i>	1 vegetatief, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	✓ 📷
2020-04-21 16:02	▲ Harig wilgenroosje - <i>Epilobium hirsutum</i>	1 bladontplooiing, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	✓ 📷
2020-04-21 15:34	▲ Lidrus - <i>Equisetum palustre</i>	1 bladontplooiing, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	✓ 📷
2020-04-21 15:37	▲ Gewoon speenkruid - <i>Ficaria verna</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	🔍 📷
2020-04-21 15:53	▲ Hondsdraf - <i>Glechoma hederacea</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	✓ 📷
2020-04-21 15:36	▲ Hondsdraf - <i>Glechoma hederacea</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	🔍 📷
2020-04-21 17:07	▲ Mannagras - <i>Glyceria fluitans</i>	1 vegetatief, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	✓ 📷 📷
2020-04-21 16:09	■ Basterdhyacint - <i>Hyacinthoides x massartiana</i> (<i>H. non-scripta</i> x <i>hispanica</i>)	1 bloeiend, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	✓ 📷 📷 📷
2020-04-21 17:19	▲ Gewoon biggenkruid - <i>Hypochaeris radicata</i>	1 in knop, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	✓ 📷
2020-04-21 17:13	▲ Cele lis - <i>Iris pseudacorus</i>	1 vegetatief, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	✓ 📷 📷 📷
2020-04-21 17:18	▲ Zomprus - <i>Juncus articulatus</i>	1 afwijkend, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	✓ 📷 📷
2020-04-21 16:06	▲ Witte dovenetel - <i>Lamium album</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	🔍 📷
2020-04-21 15:56	▲ Paarse dovenetel - <i>Lamium purpureum</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	🔍 📷
2020-04-21 16:16	■ Gewone veldbies - <i>Luzula campestris</i>	1 vruchtdragend, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	✓ 📷
2020-04-21 16:11	■ Gewone veldbies - <i>Luzula campestris</i>	1 vruchtdragend, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	✓ 📷
2020-04-21 17:09	▲ Riet - <i>Phragmites australis</i>	1 bovengronds afgestorven, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	✓ 📷
2020-04-21 17:02	▲ Riet - <i>Phragmites australis</i>	1 bovengronds afgestorven, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	✓ 📷 📷 📷

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2020-04-21 17:00	Knolbeemdgras - <i>Poa bulbosa</i> ?	1 bovengronds afgestorven, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	📷 📱 📸
2020-04-21 16:57	Vogelkers - <i>Prunus padus</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	✅ 📸
2020-04-21 15:52	Vogelkers - <i>Prunus padus</i>	1 in knop, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	✅ 📸
2020-04-21 17:52	Amerikaanse vogelkers - <i>Prunus serotina</i>	1 bladontplooiing, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	✅ 📸
2020-04-21 16:05	Japanse bamboe - <i>Pseudosasa japonica</i>	1 vegetatief, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	✅ 📷 📱 📸
2020-04-21 16:54	Wintereik - <i>Quercus petraea</i>	1 bladontplooiing, aangeplant, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	✅ 📷 📱 📸 📱
2020-04-21 16:03	Scherpe boterbloem - <i>Ranunculus acris</i>	1 vegetatief, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	✅ 📸
2020-04-21 15:37	Scherpe boterbloem - <i>Ranunculus acris</i>	1 in knop, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	✅ 📸
2020-04-21 16:08	Cele waterkers - <i>Rorippa amphibia</i>	1 in knop, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	📷 📸
2020-04-21 18:01	Veldzuring - <i>Rumex acetosa</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	✅ 📸 📱
2020-04-21 15:45	Veldzuring - <i>Rumex acetosa</i>	1 vegetatief, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	📷 📸
2020-04-21 15:44	Veldzuring - <i>Rumex acetosa</i>	1 vegetatief, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	✅ 📸
2020-04-21 17:21	Schapenzuring - <i>Rumex acetosella</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	✅ 📸
2020-04-21 17:16	Boswilg - <i>Salix caprea</i> ?	1 bloeiend, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	📷 📱 📸
2020-04-21 15:52	Boswilg - <i>Salix caprea</i> ?	1 vegetatief, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	📷 📱 📸
2020-04-21 17:04	Rietzwenkgras - <i>Schedonorus arundinaceus</i>	1 vegetatief, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	✅ 📸 📱
2020-04-21 17:43	Knopig helmkruid - <i>Scrophularia nodosa</i>	1 bladontplooiing, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	✅ 📸
2020-04-21 17:17	Dagkoekoeksbloem - <i>Silene dioica</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	✅ 📸
2020-04-21 16:58	Late guldenroede - <i>Solidago gigantea</i>	1 bladontplooiing, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	✅ 📸
2020-04-21 17:13	Wilde lijsterbes - <i>Sorbus aucuparia</i>	1 bladontplooiing, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	📷 📸
2020-04-21 15:58	Gewone smeerwortel - <i>Symphytum officinale</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	📷 📸
2020-04-21 16:17	Kleine klaver - <i>Trifolium dubium</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	✅ 📸
2020-04-21 16:13	Rode klaver - <i>Trifolium pratense</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	✅ 📸
2020-04-21 16:08	Rode klaver - <i>Trifolium pratense</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	✅ 📷 📱 📸
2020-04-21 16:12	Gewone ereprijs - <i>Veronica chamaedrys</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	📷 📸

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2020-04-21 16:00	▲ Gewone ereprijs - <i>Veronica chamaedrys</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	📷 📷
2020-04-21 15:48	▲ Gewone ereprijs - <i>Veronica chamaedrys</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	📷 📷
2020-04-21 15:48	▲ Gewone ereprijs - <i>Veronica chamaedrys</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	📷 📷
2020-04-21 15:46	▲ Gewone ereprijs - <i>Veronica chamaedrys</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	📷 📷
2020-04-21 17:39	▲ Voederwikke - <i>Vicia sativa</i>	1 in knop, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	✅ 📷 📷
2020-04-21 15:31	■ Grote maagdenpalm - <i>Vinca major</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Lieseind	Marc van Schaijk	✅ 📷
2020-03-30 14:30	▲ Scholekster - <i>Haematopus ostralegus</i>	4 adult, gezien	Lieseind	Marc van Schaijk	📷
2020-02-28 11:12	▲ Houtduif - <i>Columba palumbus</i>	1 overvliegend	Lieseind	Daan van Werven	■
2020-02-28 11:47	■ Steenuil - <i>Athene noctua</i>	1	Lieseind	Daan van Werven	■
2020-02-28 11:43	▲ Gaai - <i>Garrulus glandarius</i>	1	Lieseind	Daan van Werven	📷
2020-02-28 11:16	▲ Ekster - <i>Pica pica</i>	1	Lieseind	Daan van Werven	📷
2020-02-28 11:21	▲ Zwarte Kraai - <i>Corvus corone</i>	1 overvliegend	Lieseind	Daan van Werven	■
2020-02-28 11:12	▲ Pimpelmees - <i>Cyanistes caeruleus</i>	1	Lieseind	Daan van Werven	📷
2020-02-28 11:12	▲ Koolmees - <i>Parus major</i>	1	Lieseind	Daan van Werven	📷
2020-02-28 11:12	▲ Winterkoning - <i>Troglodytes troglodytes</i>	1 baltsend / zingend	Lieseind	Daan van Werven	■
2020-02-28 11:15	▲ Spreeuw - <i>Sturnus vulgaris</i>	1	Lieseind	Daan van Werven	📷
2020-02-28 11:12	▲ Merel - <i>Turdus merula</i>	1	Lieseind	Daan van Werven	📷
2020-02-28 11:12	▲ Roodborst - <i>Erithacus rubecula</i>	1 baltsend / zingend	Lieseind	Daan van Werven	■
2020-02-28 11:28	▲ Huismus - <i>Passer domesticus</i>	10	Lieseind	Daan van Werven	■
2020-02-28 11:15	▲ Vink - <i>Fringilla coelebs</i>	1 baltsend / zingend	Lieseind	Daan van Werven	📷
2020-01-31 12:20	▲ Holenduif - <i>Columba oenas</i>	2 adult, foeragerend, gezien	Lieseind	Marc van Schaijk	✅ 📷
2020-01-31 12:20	▲ Kokmeeuw - <i>Chroicocephalus ridibundus</i>	1 tweede winter, foeragerend, gezien en gehoord	Lieseind	Marc van Schaijk	✅ 📷
2020-01-31 12:20	▲ Kokmeeuw - <i>Chroicocephalus ridibundus</i>	1 adult winterkleed, foeragerend, gezien en gehoord	Lieseind	Marc van Schaijk	✅ 📷
2020-01-31 12:21	▲ Kauw - <i>Coloeus monedula</i>	1 adult, foeragerend, gezien en gehoord	Lieseind	Marc van Schaijk	✅ 📷
2020-01-31 12:19	▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>	5 adult, foeragerend, gezien en gehoord	Lieseind	Marc van Schaijk	✅ 📷

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2020-01-29 11:00	▲ Holenduif - <i>Columba oenas</i>	4 adult, gezien	Lieseind	Marc van Schaijk	☑
2020-01-29 11:00	▲ Houtduif - <i>Columba palumbus</i>	1 adult, gezien	Lieseind	Marc van Schaijk	☑
2020-01-29 11:00	▲ Kokmeeuw - <i>Chroicocephalus ridibundus</i>	1 adult winterkleed, gezien	Lieseind	Marc van Schaijk	☑
2020-01-29 11:00	▲ Ekster - <i>Pica pica</i>	2 adult, gezien	Lieseind	Marc van Schaijk	☑
2020-01-29 11:00	▲ Kauw - <i>Coloeus monedula</i>	1 adult, gezien	Lieseind	Marc van Schaijk	☑
2020-01-29 11:00	▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>	2 adult, gezien	Lieseind	Marc van Schaijk	☑
2020-01-29 11:00	▲ Zwarte Kraai - <i>Corvus corone</i>	1 adult, gezien	Lieseind	Marc van Schaijk	☑
2020-01-29 11:00	▲ Merel - <i>Turdus merula</i>	1 ♂ adult, gezien	Lieseind	Marc van Schaijk	☑
2020-01-25 11:48	▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>	1 foeragerend, gezien	Lieseind	Vogelwerkgroep NMC Schijndel	☑
2020-01-25 11:48	▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>	1 foeragerend, gezien	Lieseind	N.W. & D.A. Collectief.	☑ ☑
2020-01-25 11:48	▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>	1 foeragerend, gezien	Lieseind	Marc van Schaijk	☑ ☑
2019-12-27	▲ Kleine Mantelmeeuw - <i>Larus fuscus</i>	1 adult, foeragerend, gezien	Lieseind	Marc van Schaijk	■
2019-12-24	▲ Kokmeeuw - <i>Chroicocephalus ridibundus</i>	1 adult winterkleed, foeragerend, gezien	Lieseind	Marc van Schaijk	☑
2019-12-24	▲ Stormmeeuw - <i>Larus canus</i>	5 adult, foeragerend, gezien	Lieseind	Marc van Schaijk	■
2019-12-24	▲ Ekster - <i>Pica pica</i>	1 adult, foeragerend, gezien	Lieseind	Marc van Schaijk	☑
2019-12-24	▲ Kauw - <i>Coloeus monedula</i>	1 adult, foeragerend, gezien	Lieseind	Marc van Schaijk	☑
2019-12-24	▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>	6 adult, foeragerend, gezien	Lieseind	Marc van Schaijk	■
2019-12-24	▲ Zwarte Kraai - <i>Corvus corone</i>	4 adult, foeragerend, gezien	Lieseind	Marc van Schaijk	☑
2019-12-13 13:02	▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>	40 adult, foeragerend, gezien	Lieseind	Marc van Schaijk	■
2019-12-13	▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>	3 adult, foeragerend, gezien	Lieseind	Marc van Schaijk	■
2019-12-13	▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>	7 adult, foeragerend, gezien	Lieseind	Marc van Schaijk	■
2019-12-13	▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>	1 adult, foeragerend, gezien	Lieseind	Marc van Schaijk	■
2019-12-01 15:37	▲ Buizerd - <i>Buteo buteo</i>	1 adult, rustend, gezien	Lieseind	Marc van Schaijk	☑

2

Bijlage

Effecten indicator soorten



Beschermde natuur in Nederland: soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Effectenindicator soorten

Maatregelenindicator soorten

Routeplanner beschermde natuur

Effectenindicator Natura2000-gebieden

Effectenindicator soorten

1 Locatie


2 Activiteiten

3 Indicatie

Zoek en selecteer een locatie op postcode, of zoom in op de kaart en teken de grenzen van het plangebied: zet punten en sluit af met een dubbel-klik.

Postcode

5482 WX



1 Locatie

2 Activiteiten

3 Indicatie

Geef aan voor welke OLO-activiteit(en) u een indicatie van effecten wilt ontvangen.

Top-10 activiteiten

[Alle activiteiten](#)

- ☒ Slopen en/of asbest verwijderen
- ☐ Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
- ☐ Bijbehorend bouwwerk bouwen
- ☐ Kappen
- ☐ Overig bouwwerk bouwen
- ☐ Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
- ☐ Dakkapel plaatsen
- ☐ Woning bouwen
- ☐ Nieuw kozijn plaatsen of bestaand kozijn of gevelpaneel veranderen
- ☐ Uitrit aanleggen of veranderen

Toon effecten

1 Locatie

2 Activiteiten

3 Indicatie

Locatie: 5,4166/51,6443 Oppervlakte: 105,13 ha

Disclaimer

- > De dekkingsgraad van waarnemingen uit de NDFF per locatie wisselt sterk. Als er geen waarnemingen uit de NDFF zijn, kunnen er dus wel beschermde soorten voorkomen. Een gebruiker is zelf verantwoordelijk om (eventueel met hulp van de gemeente) te achterhalen of er daadwerkelijk beschermde soorten in het plangebied voorkomen.
- > Beschermde soorten die naar verwachting geen schadelijke effecten ondervinden, worden niet in de uitvoer getoond.
- > De informatie uit de effectenindicator soorten is generiek. Om vast te stellen of een activiteit in de praktijk daadwerkelijk schadelijk is, is meer specifieke informatie nodig over de betreffende activiteit, de werklocatie en over het voorkomen van beschermde soorten in en rond het plangebied.

Activiteiten

[Slopen en/of asbest verwijderen](#)

Overige Wettelijk beschermde soorten

In het door u opgegeven plangebied komen bovendien de volgende aantallen Wettelijk beschermde soorten per soortengroep voor volgens de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) die mogelijk schadelijke effecten ondervinden van de door u geselecteerde activiteit(en).

Soortgroepen	
Vogels (3)	
Mogelijke negatieve effecten	
Hieronder ziet u de storende factoren die op kunnen treden bij de geselecteerde activiteit en de hierboven genoemde soort. Per storende factor kunt u een korte toelichting lezen. Er is ook een pdf met  geraadpleegde literatuur over de effecten per soortgroep.	
Storende factoren per verbodsbepaling	Gevoeligheid
Het is verboden (opzettelijk) nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of vernielen.	
 verlies vaste voortplantings- rust- of verblijfplaatsen	 gevoelig
 verlies functioneel leefgebied	 gevoelig
Het is verboden opzettelijk beschermde soorten te doden en vangen.	
 directe sterfte	 gevoelig
Het is verboden vogels opzettelijk te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de soort.	
 verstoring door geluid	 gevoelig
 verstoring door trilling	 gevoelig

Zoogdieren (2)	
Mogelijke negatieve effecten	
Hieronder ziet u de storende factoren die op kunnen treden bij de geselecteerde activiteit en de hierboven genoemde soort. Per storende factor kunt u een korte toelichting lezen. Er is ook een pdf met  geraadpleegde literatuur over de effecten per soortgroep.	
Storende factoren per verbodsbepaling	Gevoeligheid
Het is verboden (opzettelijk) nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of vernielen.	
 verlies vaste voortplantings- rust- of verblijfplaatsen	 gevoelig
 verlies functioneel leefgebied	 gevoelig
Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren.	
 verstoring door geluid	... onbekend
 verstoring door trilling	 gevoelig
Het is verboden opzettelijk beschermde soorten te doden en vangen.	
 directe sterfte	 gevoelig