



Veldbiologische Werken

Ecologisch onderzoek en advies

Memo

Aanvullende Memo

d.d. 25 maart 2022

*Ecologisch onderzoek naar Roofvogels, Uilen,
Marterachtigen, Das, Rode eekhoorn,
Levendbarende hagedis, Alpenwatersalamander,
Vleermuizenplanlocatie Peelkant, Sint Anthonis
2021*

Geachte,

Deze aanvullende memo is opgesteld naar aanleiding van enkele vragen vanuit Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) t.a.v. Ransuil en Vleermuizen.

Vraag ODBN

In de rapportage van het nader onderzoek staat aangegeven dat er in september een ransuil is aangetroffen in de houtwal. Er wordt uitgesloten dat ransuilen een rustplaats hebben in het plangebied. Echter, eind september beginnen ransuilen vaak met het vormen van de roest, later verplaatsen ze zich naar de roestplaats waar ze de gehele winter doorbrengen. De houtwal vormt mogelijk een vaste rustplaats van de ransuil. Het is onduidelijk of het plan leidt tot een aantasting van deze vaste rustplaats en of er sprake is van een ontheffingsplicht. Ga hier nader op in.

Antwoord:

De Peelkant Sint Anthonis is een planlocatie welke vanaf begin februari 2021 t/m eind september 2021 met regelmaat grondig is onderzocht op aanwezigheid van Uilen. Het onderzoek heeft zich gericht op fysieke aanwezigheid van uilen, potentiële nestplaatsen en roestplaatsen. Gedurende de onderzoeksronde werd eenmalig Ransuil waargenomen binnen de planlocatie in de houtwal welke zal worden behouden. Deze waarneming is gedaan buiten de aanbevolen onderzoeksperiode (begin september 2021). Mogelijk is er sprake van een jonge vogel.

Er zijn verder binnen het plangebied **geen** uilen of sporen van uilen (braakballen, prooi-resten, uitwerpselen) aangetroffen. De voor hun kenmerkende braakballen of uitwerpselen van uilen zijn **niet** aangetroffen binnen de planlocatie, ook niet op de locatie waar begin september Ransuil eenmalig werd waargenomen.

Binnen de planlocatie is er gedurende de onderzoeksperiode dus **geen** aanwezigheid aangetoond die duidt op vaste nest, rust- of roestplaats van Ransuil of diens continue/regelmatische aanwezigheid ter plaatse. Deze conclusie is gebaseerd op aanwezigheid van veldonderzoekers tijdens avond- en ochtend onderzoek naar Uilen en Vleermuizen en gebaseerd op grondig onderzoek gedurende daglicht van de houtwallen, bomen en bosschages, waarbij gezocht is naar braakballen, veren, uitwerpselen en prooiresten. Bij aanvang van de onderzoeken in februari 2021 (nog voor het groeiseizoen) hadden sporen van uilen moeten zijn opgevallen. Er werden in februari 2021 (en bij vervolgonderzoeken) **geen** recente sporen en **geen** oude sporen (uit winterperiode) van uilen aangetroffen.

De (jonge) Ransuil vermeld in de rapportage 'Aanvullende onderzoeken' en welke werd waargenomen in de houtwal is ons inziens een incidentele waarneming geweest. De houtwal waarin de Ransuil werd waargenomen is opgenomen in de planvorming en zal behouden blijven. Verder is het mogelijk dat de gedane waarneming een jonge Ransuil betreft. Jonge Ransuilen zijn erom bekend dat zij grote afstanden kunnen afleggen vanaf hun geboortegrond, soms wel meer dan 100 km. (bron: vogelbescherming.nl).

Brononderzoek naar recente waarnemingen uit het gebied (binnen of nabij de planlocatie) levert geen waarnemingen op van Ransuilen.


Op basis van het verrichte onderzoek en onderzoek intensiteit is het ons inziens uit te sluiten dat Ransuil een vaste rustplaats heeft binnen het plangebied.

Vraag ODBN

In de rapportage van het nader onderzoek is geconcludeerd dat er foerageergebied en een vliegrouete van diverse vleermuissoorten aanwezig is. Het is onduidelijk of de realisatie- en/of gebruiksfase van het plan een negatief effect hebben op de aanwezige vliegrouete en foerageergebied. Ga hier nader op in.

Antwoord:

Gedurende het onderzoekseizoen 2021 is Veldbiologische Werken gevraagd een onderbouwing te geven omtrent het schetsontwerp in relatie tot de ecologische bevindingen. Om een samenvatting te geven gaan wij uit van het schets planontwerp De Peelkant.



Het schets planontwerp zal met de onderbouwing (01 t/m 06) redelijkerwijs geen negatieve effecten veroorzaken t.a.v. vliegroutes en foerageergebied van diverse vleermuissoorten. Bestaande vliegroutes worden niet onderbroken. Bij de realisatie en gebruiksfase van het plan zal voor vleermuizen interessant en geschikt nieuw foerageergebied ontstaan in het zuidoostelijk deel van het plangebied waar een bloemrijke en kruidenrijke wadi (vochtige laagte) van 2850 m² gerealiseerd gaat worden inclusief verbindingsroutes via bestaande houtwallen. Doelsoorten voor deze bloemrijke en kruidenrijke wadi betreffen inheemse soorten als: Kattestaart, Gele lis, Watermunt, Moerasspirea, Poelruit, Echte valeriaan, Pinksterbloem, Gewone dotterbloem etc. Naast deze wadi zullen twee terreindelen worden ingericht als boomgaard met sierfruitbomen en een deel worden ingericht als bloemrijk- en kruidenrijk grasland met als inheemse doelsoorten: Duizendblad, Gewone margriet, Kleine ratelaar, Slangenkruid, Scherpe boterbloem, Knoopkruid en Dagkoekoeksbloem. Ook andere toe te passen beplanting zal bestaan uit inheemse soorten.

De beoogde situatie zal een rijke entomofauna tot gevolg hebben en ruime een verbetering zijn voor foerageermogelijkheden van vleermuissoorten ten opzichte van de huidige situatie. In de huidige situatie wordt het zuidoostelijk deel van het plangebied gebruikt als intensief beheerd agrarisch grasland (soortenarme Engels raaigrasweide), dan wel als maisakker.

Ik hoop dat deze informatie toereikend is voor uw doeleinden. Indien u nog vragen heeft verneem ik die graag.

Met vriendelijke groet,

Coen Knotters

Veldbiologische Werken

06 - 204 31 422