

QUICKSCAN SOORTENBESCHERMING

BURGEMEESTER MOORENSTRAAT 65 TE HAPS

Colofon

Quicksan soortenbescherming

Projectnummer: EP.22.1098

Versie: 3

Datum: 4 januari 2023

Opdrachtnemer

Agrifirm NWE BV
Bedrijfsontwikkeling Exlan
Waalkade 33
5347 KR Oss

Postbus 300
5340 AH Oss

Locatie

Burgemeester Moorenstraat 65 Haps

Opdrachtgever

Geling Advies
Burg. Wijnvlietlaan 1
5764 PD De Rips

Contactpersoon

Anton van Zeeland
T: 088 – 488 2929
F: 088 – 488 2102
E: a.vanzeeland@agrifirm.com

Uitvoerders

Ing. A. van Zeeland
J. de Hollander

Collegiale check

AvZ

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN VERVEELVOLDIGD DOOR MIDDEL VAN DRUK, FOTOKOPIE, MICROFILM, GELUIDSBAND, ELEKTRONISCH OF OP WELKE ANDERE WIJZE DAN OOK, EN EVENMIN IN EEN GEAUTOMATISEERD GEGEVENSBESTAND WORDEN OPGESLAGEN, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN AGRIFIRM EXLAN.

Inhoudsopgave

Quickscan soortenbescherming

INLEIDING	4
HOOFDSTUK 1	6
TOETSINGSKADER	6
HOOFDSTUK 2	9
ONDERZOEKSRESULTATEN	9
HOOFDSTUK 3	25
CONCLUSIE	25
LITERATUUR	26
WAARNEMINGEN	27
EFFECTEN INDICATOR SOORTEN	32
PLAN PROJECTLOCATIE	37

Inleiding

Planbeschrijving

Aanleiding

Het plangebied is gelegen aan de Burgemeester Moorenstraat 65 te Haps. De plannen omvatten de sloop van twee oude schuren ten behoeve van de realisatie van een ruimte voor ruimte woning. In fase 1 wordt links van de woning een ruimte van ruimte woning gerealiseerd. Deze is reeds als zodanig bestemd. In fase 2 wordt rechts van de woning een ruimte voor ruimte woning gerealiseerd. Voor fase 2 wordt naar aanleiding van een zienswijze een toets aan de soortenbescherming noodzakelijk geacht. Bij de uitvoering van de voorgenomen ingrepen moet rekening worden gehouden met het huidige voorkomen van de, op grond van de Wet natuurbescherming, beschermde soorten. Als de voorgenomen ingreep leidt tot het overtreden van verbodsbepalingen betreffende beschermde soorten, moet vrijstelling of ontheffing worden verkregen.

De voorliggende quickscan bevat een inventarisatie van de huidige aanwezigheid van beschermde soorten planten en dieren in en om het plangebied. Tevens worden de te verwachten effecten van de ingreep in het plangebied beoordeeld.

Plangebied

Het plangebied ligt in de plaats Haps in de gemeente Cuijk. Het plangebied bevindt zich binnen de verkeerskundige en buiten stedenbouwkundige bebouwde kom van Haps.



- Afbeelding 1: luchtfoto plangebied (bron: ruimtelijkeplannen.nl, geraadpleegd op 12/12/2022) fase 1 links, fase 2 rechts van de bestaande woning

Onderzoeksmethode

Om een goede indicatie van de natuurwaarden binnen het plangebied te krijgen, wordt het onderzoek in verschillende stappen uitgevoerd. Op basis van bronnenonderzoek is nagegaan of er wettelijk beschermde planten- of diersoorten in het gebied voor kunnen komen waaraan extra aandacht geschonken dient te worden tijdens het terreinbezoek.

Na het bronnenonderzoek is een verkennend terreinbezoek gebracht aan het plangebied. Hierbij is, op basis van de gegevens van het literatuuronderzoek, beoordeeld voor welke soorten het gebied daadwerkelijk een geschikte habitat biedt en daarmee welke soorten er daadwerkelijk voor kunnen komen. Vervolgens zijn de mogelijke effecten op de verwachte beschermde soorten beschreven.

Op basis van de doorlopen procedures zijn conclusies getrokken met betrekking tot de eventuele negatieve effecten en/of obstakels inzake de Wet natuurbescherming.

Op dinsdag 6 december 2022 is de locatie tussen 10:00 en 12:00 uur ter plaatse geïnventariseerd, om te onderzoeken of het plangebied een zodanig belangrijke status heeft dat een aanvullend veldonderzoek noodzakelijk is. Op het moment van inventarisatie was het 5 graden Celsius en zeer licht bewolkt.

Op basis van terreinkenmerken is beoordeeld of het terrein geschikt is voor de, in de regio voorkomende, beschermde soorten.

Doelstelling

Om een indicatie te krijgen van de effecten die de sloop- en bouwwerkzaamheden hebben op de natuurwaarden binnen het plangebied, dienen de volgende vragen te worden beantwoord:

1. Welke wettelijk beschermde soorten komen in het plangebied voor? Welke status hebben deze soorten?
2. Welke invloed heeft de geplande ingreep in het betreffende gebied op de beschermde soorten en komt daarmee de staat van instandhouding in gevaar?
3. Hoe dient omgegaan te worden met eventuele negatieve effecten van het plan op wettelijk beschermde planten- en diersoorten, en welke vervolgstappen zijn nodig?

1 Toetsingskader

Wet natuurbescherming

De bescherming van natuur is in Nederland vastgelegd in nationale wetgeving. De nationale wetgeving is een Nederlandse implementatie van de belangrijkste Europese wetgevingselementen. Per 1 januari 2017 zijn de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998 vervangen door de Wet natuurbescherming. De uitvoering van deze nieuwe wet is grotendeels in handen van de provincies gekomen.

1.1 Gebiedsbescherming

De Wet natuurbescherming noemt bekende maar ook enkele nieuwe soorten natuurgebieden die bescherming behoeven: de Natura 2000-gebieden, het Natuurnetwerk Nederland (NNN), bijzondere provinciale natuurgebieden en landschappen, bijzondere nationale natuurgebieden en de nationale parken. Bij ontwikkelingen met name in het buitengebied moet rekening worden gehouden met het al dan niet van toepassing zijn van de beschermingsregimes van deze natuurgebieden. Ieder gebied kent een eigen beschermingsregime dat afzonderlijk gewogen dient te worden in relatie tot plannen, projecten en andere handelingen met mogelijk nadelige effecten voor de beschermde natuurwaarden.

Natura 2000-gebieden

De bekendste natuurgebieden zijn de Natura 2000-gebieden, zij kennen tevens het meest strikte beschermingsregime. De basis voor Natura 2000 zijn de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. In Nederland zijn 164 gebieden als Natura 2000-gebied aangewezen. Voor ieder gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen bepaald die betrekking kunnen hebben op de bescherming van specifieke flora en fauna alsook leefgebieden van soorten. Alle projecten en handelingen binnen of buiten de gebiedsgrenzen mogen geen verstorend of verslechterend effect hebben op de instandhoudingsdoelstellingen. Voor de voorgenomen ontwikkeling is hier, voor zover van toepassing, separaat aan getoetst. In deze rapportage wordt hier verder niet op ingegaan.

Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS) is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. De provincies zijn belast met de taak een dergelijk netwerk tot stand te laten te komen en in stand te laten. De uitvoering hiervan is hoofdzakelijk gestuurd vanuit de ruimtelijke ordening (provinciale verordeningen). Binnen het Natuurnetwerk Nederland geldt een “nee, tenzij”- benadering.

Overige gebieden

Naast de bovengenoemde gebieden kunnen gebieden aangewezen worden als ‘bijzondere provinciale natuurgebieden’, ‘bijzondere provinciale landschappen’ of ‘nationaal park’. De bescherming van deze gebieden vindt net als bij het NNN plaats via het ruimtelijk spoor. Daarnaast kan een gebied aangewezen worden als ‘bijzonder nationaal gebied’, een soort voorloper van de aanwijzing als Natura 2000-gebied. De bescherming van deze gebieden stemt dan ook overeen met de bescherming van Natura 2000-gebieden.

1.2 Soortenbescherming

De Wet natuurbescherming deelt soorten in drie beschermingsregimes in. Daarnaast zijn er vrijgestelde soorten en jaarrond beschermde vogelnesten.

- 1) Beschermingsregime soorten vogelrichtlijn
- 2) Beschermingsregime soorten habitatrichtlijn
- 3) Beschermingsregime andere soorten
- 4) Vrijgestelde soorten
- 5) Jaarrond beschermde vogelnesten

Vogelrichtlijn

Onder de soorten van de Vogelrichtlijn vallen alle van nature in Nederland in het wild levende vogels. Het is verboden om:

- Opzettelijk vogels te doden of te vangen;
- Opzettelijk vogelnesten, -rustplaatsen en – eieren te vernielen of te beschadigen of vogelnesten weg te nemen;
- Eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben;
- Opzettelijk vogels te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

Habitatrichtlijn

Onder de soorten van de Habitatrichtlijn vallen soorten die genoemd zijn in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage I van het Verdrag van Bonn. In de Bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd.

Wat betreft deze soorten is het verboden om:

- Opzettelijk dieren te doden of te vangen;
- Opzettelijk dieren te verstoren;
- Opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen;
- Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
- Opzettelijk planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken, te verzamelen, af te snijden, te onttwortelen of te vernielen.

Ook is het verboden deze soorten te verkopen, te vervoeren voor verkoop, te verhandelen, te ruilen of te kopen, tenzij het gaat om gefokte of gekweekte dieren of planten.

Andere soorten

Onder het beschermingsregime andere soorten vallen soorten waarvan er geen Europese verplichting tot bescherming is. Dit zijn soorten die vanuit nationaal belang extra bescherming behoeven. Het beschermingsniveau van deze soorten kan per provincie verschillen.

Het is verboden om:

- 1) Opzettelijk dieren te doden of te vangen;
- 2) Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
- 3) Opzettelijk (vaat)planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken te verzamelen, af te snijden, te onttwortelen of te vernielen.

Provincies hebben de bevoegdheid om bij provinciale verordening vrijstelling te verlenen voor nationaal beschermde soorten.

Vrijgestelde soorten

De verboden zijn niet van toepassing op de bosmuis, de huisspitsmuis en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevinden. Ook vallen de zwarte rat, bruine rat, huismuis, de mol en exoten niet onder beschermingsregime van de Wet natuurbescherming en mogen opzettelijk gedood en gevangen worden. Daarnaast geldt, zoals hierboven reeds aangegeven, dat provincies de bevoegdheid hebben vrijstelling te verlenen voor bepaalde soorten.

Jaarrond beschermde vogelnesten

De opgestelde lijst met jaarrond beschermde nesten voor vogels is een beleidsdocument dat voortvloeit uit de voormalige Flora- en faunawet en meegenomen is onder de Wet natuurbescherming. De nesten zijn ingedeeld in categorieën (1 t/m 5) waarvan de categorie 1 t/m 4 jaarrond beschermd zijn. Nesten in categorie 5 zijn enkel beschermd bij afwezigheid van voldoende alternatieven.

- 1) Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats
- 2) Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
- 3) Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
- 4) Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen.
- 5) Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen.

1.3 Houtopstanden

De regels van de Boswet zijn grotendeels onveranderd opgenomen in de Wet natuurbescherming. Een houtopstand is een zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend, die een oppervlakte van 10 are of meer beslaat ofwel een rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat.

Buiten de bescherming vallen:

- houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom (voor deze wet);
- houtopstanden op erven of in tuinen
- fruitbomen en windschermen om boomgaarden;
- naaldbomen bedoeld als kerstbomen en niet ouder dan twintig jaar
- kweekgoed;
 - uit populieren of wilgen bestaande wegbeplantingen,
 - beplantingen langs waterwegen, en
 - eenrijige beplantingen langs landbouwgronden;
- Het dunnen van een houtopstand;
- uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die zijn bedoeld voor de productie van houtige biomassa indien zij:
 - ten minste eens per tien jaar worden geoogst;
 - bestaan uit minstens tienduizend per hectare per beplantingseenheid
 - bestaande uit een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee meter;
 - zijn aangelegd na 1 januari 2013.

2

Onderzoeksresultaten


2.1 Bronnenonderzoek

Gegevens van websites als www.waarneming.nl zijn geraadpleegd voor achtergrondinformatie. Een groot aantal amateurs en professionals publiceert op deze bekende websites zijn natuurwaarnemingen, die worden gecontroleerd door een validatiecommissie. Zodoende zijn de waarnemingen uit deze bronnen redelijk betrouwbaar, maar moeilijk te verifiëren. De waarnemingen geven eventueel wel een indicatie van soorten waar tijdens het veldonderzoek extra aandacht aan besteed dient te worden.

Natuurnetwerk Nederland

Het natuurbeheerplan is een beleidskader om het Europese, rijks- en provinciale natuur- en landschapsbeleid te realiseren. Het gaat hier om bestaande natuurgebieden, gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt, landbouwgebieden worden ingericht en beheerd volgens agrarisch natuurbeheer en de Natura 2000-gebieden.

Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland en buiten andere natuurgebieden zoals Natura 2000. Het meest dichtbijgelegen Natura 2000-gebied is het Natura 2000-gebied "Oeffelter Meent".



• Afbeelding 2: ligging Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000
(bron: atlasleefomgeving.nl/kaarten, geraadpleegd op 12/12/2022)

Het Natuurnetwerk Brabant is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Het is een netwerk van deels bestaande en deels nieuwe natuurgebieden die door ecologische verbindingzones met elkaar verbonden zijn. Hierdoor kunnen dieren zich makkelijker verplaatsen tussen verschillende natuurgebieden. Zo wordt de biodiversiteit (het totaal aan planten en dieren) bevorderd. Ongeveer 90% van het Natuurnetwerk Brabant wordt gevormd door bestaande natuurgebieden zoals bijvoorbeeld de Biesbosch en de Maashorst. Maar het netwerk is nog niet compleet. Er ontbreken nog veel gebieden en verbindingen die belangrijk zijn voor dieren en planten. Vanwege de klimaatverandering veranderen hun leefomstandigheden en wordt dat nog urgenter. Zij moeten zich kunnen verplaatsen om genoeg voedsel te kunnen blijven vinden en zich voort te planten. Maar het Natuurnetwerk is er niet alleen voor planten en dieren, maar ook voor mensen. Mensen genieten, recreëren en ontspannen in de natuur en voelen zich gelukkiger. Natuur schept kansen voor ondernemers

die natuur en hun bedrijf willen combineren en helpt tegen de gevolgen van klimaatverandering.

2.2 Veldonderzoek

Op verschillende punten in het plangebied zijn waarnemingen verricht. Tijdens het veldbezoek is het gebied beoordeeld op de aanwezigheid van beschermde soorten en de habitatgeschiktheid voor beschermde soorten. Er is extra aandacht besteed aan de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen en vogelnesten.

De ecologische factoren in de omgeving zijn met behulp van een digitale fotocamera vastgelegd. Om de flora en fauna te kunnen determineren, is gebruik gemaakt van eigen kennis en literatuur.

Te slopen schuur 1

De schuur zoals te zien op afbeelding 3 is geheel bedekt met wingerd en heeft een golplaten dak. Deze is niet geïsoleerd en bestaat uit asbest golfplaten. De zolder is bekeken en daar zijn weinig sporen van vogels, maar er zijn wel ratten keutels te vinden. In de wingerd is op een enkele plekken een oud vogelnest te vinden maar dit is zeer beperkt.



• Afbeelding 3: de te slopen schuur



- Afbeelding 4: binnezijde schuur



- Afbeelding 5: zolder ongeïsoleerd met asbest golfplaten



- Afbeelding 6: aanzicht op dak



- Afbeelding 7: binnezijde te slopen in schuur 2



- Afbeelding 8: aangevreten noten door ratten schuur 2



- Afbeelding 9: overwinterende vlinder "kleine vos" schuur 2

Te slopen schuur 2

De schuur zoals te zien op afbeelding 10 en 11 bestaat vrijwel geheel uit oude stalen golfplaten. De schuur wordt nu gebruikt als garage daarnaast duidelijk sporen van ratten die de noten verwerken.



• Afbeelding 10: te slopen schuur 2 geheel stalen profiel platen



• Afbeelding 11: zijkant te slopen schuur 2



- Afbeelding 12: begroeiing geluidswal met voornamelijk bijvoet



- Afbeelding 13: berken en een zomereik, berken worden waarschijnlijk gekapt



- Afbeelding 14: uitzicht op de poel en schuren



- Afbeelding 15: konijnenkeutels



- Afbeelding 16: uitzicht op planlocatie



- Afbeelding 17: ecodeuct onder het spoor



- Afbeelding 18: binnezijde schuur 1



- Afbeelding 19: dassenburscht tenminste 150 meter van woning



- Afbeelding 20: bewoonde pijp van de dassenburcht



- Afbeelding 21: recreatiepad langs het spoor loopt recht over de dassenburcht

Flora algemeen

Bij de planlocatie zijn geen bijzondere beplantingen aangetroffen. Er is tevens gelet op de aanwezigheid van (beschermde) muurvegetatie. Op de locatie waar de woning komt blijven zoveel mogelijk de bestaande bomen zoals de notenbomen en de zomer eiken bestaan. Er zullen enkele berken worden gekapt

Grondgebonden zoogdieren

Specifiek wordt bekeken of binnen de betreffende inrichting verwacht kan worden of er streng beschermde zoogdieren; steenmarter, bunzing, hermelijn, wezel, eekhoorn, bever en das kunnen worden aangetroffen.

Steenmarter

De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor de steenmarter. Steenmarters gebruiken hooizolders, loze ruimtes onder het dak, schuurtjes en dergelijke, als verblijfplaats. Een steenmarter heeft binnen zijn territorium verscheidene verblijfplaatsen. Daarnaast laten steenmarters enorm veel sporen achter. Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen, zoals uitwerpselen of prooiresten aangetroffen die duiden op het gebruik van de onderzoekslocatie als vaste rust- of verblijfplaats door deze soort.

Kleine marterachtigen

De onderzoekslocatie biedt geen geschikte verblijflocaaties voor de hermelijn, wezel en bunzing. De soorten maken gebruik van oude holen van onder andere mollen en muizen, maar ook houtwallen, steenhopen en ruimtes onder boomwortels. Desbetreffende soorten hebben binnen hun territorium verscheidene verblijfplaatsen. Tijdens het veldbezoek zijn er geen marters of sporen van marters aangetroffen op de onderzoekslocatie. Echter, dit betekent niet dat het gebied niet potentieel in gebruik is door de hermelijn, wezel en/of bunzing als migratieroute. Gezien de onderzoekslocatie kleiner is dan één hectare kan gesteld worden dat deze geen essentieel onderdeel uitmaakt van het leefgebied van een van genoemde soorten (Bouwens 2017). Indien bij sloop/herinrichting van het gebied groenstructuren rond het perceel behouden blijven, is er geen sprake van een negatief effect op genoemde soorten.

Eekhoorn

De onderzoekslocatie is vanwege de afwezigheid van voldoende bomen niet geschikt als habitat voor de eekhoorn. Wel staan voldoende bomen in de buurt van de projectlocatie. Tevens worden er met de werkzaamheden vrijwel geen bomen verwijderd. Een negatief effect als gevolg van de werkzaamheden is uitgesloten. Wel is er opslag van noten op dit perceel aangetroffen dus wordt deze locatie ook door eekhoorns bezocht als de noten rijp zijn.

Bever

Voor de bever is op de onderzoekslocatie geen geschikt habitat aanwezig. Vaste rust- en verblijfplaatsen van de bever kunnen worden uitgesloten.

Das

Tijdens het veldbezoek zijn op de onderzoekslocatie en de directe omgeving een aantal kenmerken van een leefomgeving van de das aangetroffen. Allereerst zit achter bij het spoor een ecoduct waardoor dassen onder het spoor door kunnen. Verder bevindt zich naast het spoor een brede strook bos met vooral zomereiken, berken, bramen, vlier, populier, Amerikaanse vogelkers, waarin zich een pad bevindt die heel veel gebruikt wordt voor recreatie. Dit pad loop over een bewoonde dassenburcht, die hier al meer dan 40 jaar ligt. Deze dassenburcht ligt ruim 150 meter van de planlocatie verwijderd, zie onderstaande afbeelding.



- Afbeelding 22: recreatiepad langs het spoor loopt recht over de dassenburcht (blauw), afstand is zeker 150 meter.

Op moment van het locatiebezoek, was de burcht bewoond. Onduidelijk is groot de populatie van de dassen op dat moment was en of er wisselwerking is met burchten in de buurt. Het is bekend dat dassen meerdere burchten kunnen gebruiken en de populatie in een burcht zeer kan wisselen. Er zijn echter wel weinig directe sporen zoals latrineveldjes en duidelijke wissels aangetroffen. Hierdoor is de verwachting dat de populatie op dat moment niet erg groot was.

Wel is het zo dat deze dat deze burcht in een bijzonder onrustig gebied ligt met vlakbij een spoorlijn en een snelweg (A73). Daarnaast loopt er een intensief recreatiepad midden over de burcht. De omgeving is erg intensief en heeft weinig rustige stukken bos, waarin zich meerdere burchten kunnen ontwikkelen.

Algemene zoogdieren

Verder zijn er sporen gevonden van muizen, konijnen, mollen en ratten. Hiervoor geldt een vrijstelling. De ratten worden aangetrokken door oa. de noten.

Vleermuizen

Het plangebied is zeer nauwkeurig beoordeeld op de mogelijke waarde voor vleermuizen. Hierbij is gelet op de geschiktheid van de aanwezige bebouwing als verblijfplaats voor deze dieren: aanwezigheid van spouwopeningen en andere openingen in muren en daken, vetstrepen, uitwerpselen en prooiresten bij gevelopeningen.

Verblijfsruimte voor vleermuizen hebben specifieke voorwaarden zoals een stabiele temperatuur en het tochtvrij zijn. Bij vleermuizen worden vier verblijfplaatsen onderscheiden; winterverblijven, zomerverblijven, kraamverblijven en paarverblijven. Aan de winterverblijven worden de hoogste eisen gesteld, daarna de kraamverblijven, dan de zomerverblijven en tenslotte de paarverblijven, waarbij de vleermuizen een zeer korte tijd op een bepaalde locatie kunnen verblijven.

Er zijn in en om de schuren geen sporen (vetstrepen, uitwerpselen, prooiresten) aangetroffen. De schuren zijn ook ongeschikt als eventuele verblijfplaats voor vleermuizen omdat schuur 1 uit steense muren en enkel golplaten dak bestaat daarnaast is het gehele gebouw overwoekerd met wingerd en daardoor niet bereikbaar voor vleermuizen. Schuur bestaat geheel uit oude stalen golfplaten en dus ook niet geschikt voor vleermuizen. Naast de onderzoekslocatie bevindt zich het woonhuis dit is de meest geschikte plek voor vleermuizen maar gezien de afstand ondervinden deze geen hinder van de realisatie van de plannen.

Foerageerhabitat

De onderzoekslocatie zal, gelet op de aanwezige habitat, gebruikt kunnen worden door in de omgeving verblijvende vleermuizen om te foerageren. De plannen zullen echter geen

aantasting van belangrijk foerageerhabitat vormen. Door de voorgenomen ingreep zal het aanbod van foerageermogelijkheden niet in het geding komen. In de directe omgeving is meer geschikt foerageerhabitat voor vleermuizen aanwezig in de vorm van bomenrijen en bosranden.

Vliegroutes

Vleermuizen maken veelal gebruik van lijnvormige (donkere) landschapselementen zoals houtsingels, beken en lanen om zich te verplaatsen tussen verblijfplaatsen en foerageergebieden. Doordat dergelijke lijnvormige elementen ontbreken op de onderzoekslocatie, worden er geen potentiële vliegroutes verstoord.

Vogels

Tijdens het bezoek is met name gelet op de aanwezigheid van nesten en rustplaatsen voor vogels.

Er zijn broedvogels waarvan de nesten ook beschermd zijn op het moment dat ze niet voor de voortplanting in gebruik zijn. Binnen het agrarische (buiten)gebied kunnen dit zijn: boomvalk, buizerd, havik, sperwer, wespendif, huismus, steenuil en de kerkuil.

Boomvalk

De boomvalk is een soort die geen eigen nest maakt, maar broedt in gebruikte kraaien- en/of eksternesten in verschillende typen bos(randen) of in solitaire bomen, populierensingels, of op erven. De soort komt vooral voor in open en halfopen landschappen zoals boerenland en dorpen, alsook in buitenwijken van steden. De bomen op- en nabij de projectlocatie zijn gecontroleerd op dergelijke nesten, deze zijn niet aangetroffen. Negatieve effecten op de boomvalk als gevolg van de werkzaamheden zijn derhalve niet aan de orde.

Buizerd en havik

De buizerd en havik broeden op grote nesten van ongeveer een meter in doorsnede en 60 centimeter diep. Dergelijke nesten zijn tijdens het veldbezoek niet waargenomen. Een broedgeval van de buizerd en havik is daarom uit te sluiten. Eveneens worden er met de beoogde werkzaamheden geen bomen gekapt, zodat het wegnemen van een jaarrond beschermd nest kan worden uitgesloten.

Wespendif en sperwer

De wespendif is doorgaans gebonden aan grotere bosgebieden van zowel loof- als naaldbomen. Bij voorkeur is er afwisseling binnen het bosgebied aanwezig in de vorm van open plekken. De sperwer broedt bij voorkeur meer verborgen in naaldbomen. Beide situaties zijn op de onderzoekslocatie niet aanwezig. Gezien de ligging van de onderzoekslocatie binnen agrarisch gebied en de afwezigheid van voldoende dekking is een nestplaats van de sperwer of wespendif niet te verwachten. Eveneens zijn er tijdens het veldbezoek geen nesten aangetroffen. Een broedgeval van zowel de wespendif als de sperwer zijn uitgesloten.

Steenuil en kerkuil

De kerkuil en steenuil hebben een voorkeur voor cultuurlandschappen met allerlei landschapselementen die voor afwisseling zorgen. Beide soorten broeden in gebouwen en gebruiken ook graag speciale nestkasten. Daarnaast worden door de steenuil ook wel boomholten gebruikt, mits er zich grote holten in bevinden. De gebouwen zijn in zijn geheel gecontroleerd op de aanwezigheid van steen- en kerkuilen en is vooral gelet op de aanwezigheid van sporen; braakballen, veren en uitwerpselen. Er zijn geen (sporen van) steen- en kerkuilen waargenomen. Er is geen sprake van een afname van belangrijk foerageergebied. Er blijft er voldoende foerageergebied aanwezig in de omgeving.

Huisumus

Ook voor de huismus, die veel te vinden is in agrarisch gebied en vooral gebonden aan gebouwen is, is het nest jaarrond beschermd. Er zijn geen nesten van huismussen gevonden in de te slopen bebouwing.

Overige broedvogels

De beplanting op de onderzoekslocatie kan nestgelegenheid bieden aan broedvogelsoorten zoals de merel en winterkoning. De nesten van deze soorten zijn alleen beschermd op het moment dat ze als zodanig in gebruik zijn. Er zijn geen nesten van overige broedvogels aangetroffen in de te slopen bebouwing.

Er zijn vogels gezien en gehoord, namelijk:

• Tabel 1: overzicht waargenomen vogels

Soort
Kauwen
Ganzen
Merel
Vink
Pimpelmees
Houtduif

Reptielen, amfibieën en vissen

Er zijn tijdens het terreinbezoek geen reptielen, amfibieën en/of vissen waargenomen.

Voor de in Nederland voorkomende reptielsoorten zoals de hazelworm, de levendbarende hagedis en ringslang biedt de onderzoekslocatie geen geschikt habitat. Deze soorten worden vrijwel alleen aangetroffen in specifieke natuurgebieden.

Dit geldt ook voor de specifieke beschermende amfibieënsoorten die veel eisen stellen aan zijn habitat; alpenwatersalamander, heikikker, vinpootsalamander, poelkikker en rugstreeppad. Deze zijn allen uit te sluiten omdat de betreffende locatie geen goed habitat biedt voor deze soorten door het ontbreken van voldoende oppervlaktewater.

De onderzoekslocatie vormt wel een geschikt habitat voor algemene amfibieënsoorten als de bruine kikker en de gewone pad. Op de onderzoekslocatie kunnen deze soorten beschutting vinden tussen de begroeiing en onder de takken- of stenenhopen. Voor algemene amfibieënsoorten geldt in het kader van de Wet natuurbescherming een vrijstelling, zodat een ontheffing bij verstoring niet noodzakelijk is. Het is echter wel zaak om aandacht te schenken aan de zorgplicht. Daarom bij voorkeur de rommel buiten schuren opruimen in het vroege voorjaar als de meeste amfibieën in de poel te vinden zijn.

Vissen

Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater op de onderzoekslocatie kan deze soortgroep buiten beschouwing worden gelaten.

Overige

Van de overige soortgroepen, zoals dagvlinders, insecten en libellen, kan worden aangenomen dat deze soorten gedurende het jaar in het plangebied aanwezig kunnen zijn of dit gebied in de migratieroute hebben liggen.

Afhankelijk van het seizoen zijn mogelijk algemene soorten te vinden op/of binnen de planlocatie. Specifieke beschermende soorten zijn voornamelijk afhankelijk van specifieke terreinkenmerken met specifieke biotopen. Binnen het plangebied is een dergelijk biotoop niet aanwezig.

2.3 Effecten van de ingreep

De effecten op beschermde soorten zijn onderzocht op basis van het voornemen binnen het plangebied.

Flora algemeen

Er is geen bijzondere flora aangetroffen binnen het plangebied, negatieve effecten zijn uitgesloten.

Grondgebonden zoogdieren

Verstoring van algemene zoogdieren vindt mogelijk plaats. De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor een aantal soorten grondgebonden zoogdieren. Het gaat daarbij om algemene soorten als de egel, konijn en diverse muissoorten. De verblijfsplaatsen van deze soorten worden door de voorgenomen ingreep echter niet aangetast.

Das

Het betreffende plangebied bevindt zich op meer dan 150 meter van de burcht en het plan betreft de realisatie van een woning bestaan. Er worden meer vierkante meters gebouwen gesloopt, dan er in de toekomst wordt bijgebouwd. Daarnaast wordt het perceel aanzienlijk verder ingeplant met opgaande beplanting (bomen en struiken). Hierdoor worden de fourageer mogelijkheden voor de das uitgebreid en nemen zeker niet af. Doordat het weiland minder intensief wordt beheerd, kunnen de bomen en struiken vruchten, zaden en noten leveren. De invloed van de extra woning op het burchtgebied van de das is te verwaarlozen, omdat de spoorlijn en zeker het recreatie pad over de burcht veel meer invloed hebben. Het is zelfs te verwachten dat de dassen die deze burcht bewonen een zeker gewenning hebben voor extra geluid en activiteiten van mensen in de buurt. Het effect van een extra woning zal daardoor te verwaarlozen zijn. Er wordt geen extra hekwerk of opstakels geplaatst waardoor de mitigerende maatregelen zeker niet in het gedrang komen.

Vleermuizen

Er zijn geen sporen van vleermuizen aangetroffen waaruit blijkt dat de gebouwen als verblijfplaats worden gebruikt. Nader onderzoek in het kader van de soortenbescherming is niet noodzakelijk.

Vogels

Door de voorgenomen ingreep worden geen vogels en jaarrond beschermde nesten aangetast.

Reptielen, amfibieën en vissen

Er zijn geen reptielen, amfibieën en/of vissen waargenomen. De instandhoudingsdoelstellingen komen niet in het gedrang.

Overige

Omdat er geen geschikt biotoop is waargenomen voor overige beschermde soorten, zijn negatieve effecten uitgesloten. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

3

Conclusie en aanbevelingen

Het natuuronderzoek is gebaseerd op inventarisatiegegevens van derden, literatuuronderzoek en een verkennend veldbezoek aan het plangebied. Het beeld dat uit het onderzoek naar voren is gekomen vormt voldoende basis om gefundeerd uitspraken te doen over de gevolgen van de voorgenomen werkzaamheden voor beschermde soorten en gebieden.

3.1 Conclusie

Voor de bepaling van de effecten en voor de beantwoording van de vraag of men in strijd komt met de Wet natuurbescherming, wordt de relatie gelegd tussen het initiatief met deze wet door waar mogelijk antwoord te geven op de volgende vragen:

1. *Welke wettelijk beschermde soorten komen in het plangebied voor? Welke status hebben deze soorten?*
2. *Welke invloed heeft de geplande ingreep in het betreffende gebied op de beschermde soorten en de staat van instandhouding?*
3. *Hoe dient omgegaan te worden met eventuele negatieve effecten van het plan op wettelijk beschermde planten- en diersoorten, en welke vervolgstappen zijn nodig?*

Het voornemen zoals opgenomen in de inleiding en de daarbij behorende werkzaamheden, zal naar verwachting geen negatief effect hebben op de staat van instandhouding van beschermde soorten. Binnen het plangebied zijn geen (verblijfplaatsen van) strikt beschermde soorten aangetroffen die door de werkzaamheden worden beïnvloed.

Uit de effectenbeschrijving blijkt dat er geen onevenredige directe of indirecte gevolgen zijn van de voorgenomen activiteiten op de voortplanting en instandhouding van beschermde dieren/of plantsoorten. Lokaal zullen mogelijk algemene soorten uit het plangebied trekken op zoek naar een vervangende biotoop. De voormalige bedrijfsgebouwen dienen bij voorkeur gesloopt te worden buiten het broedseizoen.

Voor aanvang van de werkzaamheden dient derhalve geen aanvullend onderzoek plaats te vinden. Een ontheffing met betrekking tot aantasting van beschermde soorten is niet nodig. De werkzaamheden kunnen leiden tot een beschadiging of vernietiging van mogelijke verblijfplaatsen en/of verstoring van eventueel aanwezige algemene soorten. Een algehele vrijstelling is hierop van toepassing. De algemene zorgplicht blijft onverminderd van toepassing.



Literatuur

- Broekhuizen, S., Hoekstra, B., Laar, van, V., Smeenk, C. & Thissen, J.B.M., 1992
Atlas van de Nederlandse zoogdieren. Stichting uitgeverij van de KNNV, Utrecht.
- Europese Gemeenschappen,
Richtlijn no 92/409 inzake het behoud van de vogelstand. Brussel, 1979.
- Europese Gemeenschappen,
Richtlijn no 92/43 inzake instandhouding van de natuurlijke habitat en de wilde flora en fauna. Brussel, 1992.
- Provinciale Verordening (Wet) natuurbescherming
- Hollander, H., & Geest, van der, P., 1994.
Rode-Lijst van bedreigde zoogdieren in Nederland.
Red data book of threatened mammals in the Netherlands. Vereniging voor Zoogkunde en Zoogdierbescherming, Utrecht.
- Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Ministerie van Volkshuisvesting.
Ruimtelijke Ordening en milieu, 2004. Nota Ruimte.
- De Nederlandse libellen, Nederlandse Fauna, deel 4
Nationaal historisch museum, KNNV uitgeverij (2002)
- Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ)
- Vleermuizen en planologie, Zoogdierverseniging (2010)
- Wet natuurbescherming.
Vastgesteld d.d. 1 januari 2017.


- www.waarneming.nl
- www.synbiosys.alterra.nl
- www.atlasleefomgeving.nl
- www.ravon.nl
- www.sovon.nl
- www.google.nl
- www.ndff.nl
- www.floron.nl
- www.ruimtelijkeplannen.nl
- www.natura2000.nl
- www.ecologica.eu

1 Bijlage

Waarnemingen

Haps - Lokkant Noord-Brabant

Details	Waarnemingen	Foto's	Geluiden	Soorten gezien	Ranglijst waarnemers
Naam	Haps - Lokkant	Data	Aantal	Gebruiker	Waarnemingen
Oppervlakte	1,86 km ²	waarnemingen	1.672	Louis Geraets	508
Gemeente	Land van Cuijk (gemeente)	gebruikers	203	Gert-Jan Caspers	307
Provincie	Noord-Brabant	foto's	234	Wouter Bosgra	86
		geluiden	0	Julian Overweg	35
		soorten	286	Floor Arts	27



6 recente waarnemingen binnen dit gebied (in de laatste 30 dagen). [toon waarnemingen](#)

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2022-11-25 09:44	▲ Gewone berenklauw - <i>Heracleum sphondylium</i>	1	Oeffelt	Rob	📷
2022-11-25 09:43	▲ Bijvoet - <i>Artemisia vulgaris</i>	1	A73 hmp 843 Li	Rob	📷
2022-11-25 09:43	▲ Bezemkruiskruid - <i>Senecio inaequidens</i>	1	A73 hmp 845 Li	Rob	📷
2022-11-25 09:43	▲ Grote brandnetel - <i>Urtica dioica</i>	1	Oeffelt	Rob	📷
2022-11-21 14:50	■ Grote Zilverreiger - <i>Ardea alba</i>	1	Lokkant	Louis Geraets	■
2022-11-18	■ Grote Zilverreiger - <i>Ardea alba</i>	1	Lokkant	Ernst-Jan van Haaften	■
2022-11-12 14:15	▲ Boomkruiper - <i>Certhia brachydactyla</i>	1 roepend	Oeffelt	Gert-Jan Caspers	📷
2022-11-08 12:55	▲ Buizerd - <i>Buteo buteo</i>	1 slachtoffer verkeer	A73 hmp 837 Li	Rick Karsenbarg	📷
2022-10-24 16:11	▲ Gewone oorworm - <i>Forficula auricularia</i>	1 imago	Lokkant	Henk Lemmen	■ 📷
2022-10-24 16:08	▲ Vliegenzwam - <i>Amanita muscaria</i>	1	Lokkant	Henk Lemmen	✅ 📷 🗣️
2022-10-24 11:25	▲ Sombere honingzwam - <i>Armillaria ostoyae</i>	1	Lokkant	Erik van Hassel	■ 📷
2022-10-24 11:21	▲ Paarse korstzwam - <i>Chondrostereum purpureum</i>	1	Lokkant	Erik van Hassel	■ 📷
2022-10-21 11:56	■ Alpenwatersalamander - <i>Ichthyosaura alpestris</i>	1	Oeffelt	lucie wessel	✅ 📷
2022-10-20 11:27	▲ Ekster - <i>Pica pica</i>	2	Lokkant	Martijn van der Weijde	📷
2022-10-20 11:26	▲ Zwarte Kraai - <i>Corvus corone</i>	1	Lokkant	Martijn van der Weijde	📷
2022-10-20 11:26	▲ Zwarte Kraai - <i>Corvus corone</i>	1	Lokkant	Martijn van der Weijde	📷
2022-10-12 13:34	▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>	58 foeragerend	Lokkant	Louis Geraets	■
2022-10-12 13:34	▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>	12 foeragerend	Lokkant	Louis Geraets	■
2022-09-23 15:47	▲ Grauwe abeel - <i>Populus x canescens (P. alba x tremula)</i>	1	Oeffelt	Laura Spa	✅ 📷
2022-09-09 09:19	▲ Fazant - <i>Phasianus colchicus</i>	1	Oeffelt	Niels Zwartjes	■
2022-09-09 09:19	▲ Ekster - <i>Pica pica</i>	1	Oeffelt	Niels Zwartjes	📷
2022-09-09 09:19	▲ Pimpelmees - <i>Cyanistes caeruleus</i>	1	Oeffelt	Niels Zwartjes	📷
2022-09-09 09:19	▲ Koolmees - <i>Parus major</i>	1	Oeffelt	Niels Zwartjes	■
2022-09-09 09:19	▲ Staartmees - <i>Aegithalos caudatus</i>	1	Oeffelt	Niels Zwartjes	📷
2022-09-09 09:20	▲ Winterkoning - <i>Troglodytes troglodytes</i>	1 baltsend / zingend	Oeffelt	Niels Zwartjes	■
2022-09-09 09:20	▲ Vink - <i>Fringilla coelebs</i>	1	Oeffelt	Niels Zwartjes	📷
2022-09-04 15:13	▲ Gewoon bootsmannetje - <i>Notonecta glauca</i>	1 imago	Oeffelt	T. A. de Jong	■ 📷
2022-08-27 09:19	▲ Holenduif - <i>Columba oenas</i>	1	Lokkant	Louis Geraets	■
2022-08-27 09:22	▲ Houtduif - <i>Columba palumbus</i>	1 foeragerend	Lokkant	Louis Geraets	📷
2022-08-27 09:19	▲ Boerenzwaluw - <i>Hirundo rustica</i>	1	Lokkant	Louis Geraets	■
2022-08-27 09:20	▲ Wilde cichorei - <i>Cichorium intybus</i>	1 bloeiend	Lokkant	Louis Geraets	■
2022-08-23	▲ Japanse duizendknoop + Sachalinse duizendknoop + Basterdduizendknoop - <i>Fallopia japonica</i> + <i>Fallopia sachalinensis</i> + <i>Fallopia x bohemica</i>	100001	Lokkant	Bernd-Jan Bultink	■
2022-07-12 08:56	▲ Gewone snelzwemmer - <i>Agabus bipustulatus</i> ?	1	Lokkant	Iems Tervoort	■ 📷
2022-07-10 08:35	▲ Holenduif - <i>Columba oenas</i>	1	Lokkant	Louis Geraets	📷
2022-07-09 14:36	▲ Prikneus - <i>Silene coronaria</i>	1 bloeiend	Lokkant	Louis Geraets	📷

2022-07-08	■ Eikenpage - <i>Favonius quercus</i>	1 imago	Oeffelt	Rik Wever	📷
2022-06-27 09:45	■ Rapunzelklokje - <i>Campanula rapunculus</i>	500 bloeiend, natuurlijk, veldwaarneming	Oeffelt	Toon Verrijdt	📷
2022-06-25 14:02	▲ Duizendblad - <i>Achillea millefolium</i>	1	Oeffelt	Gijs Weenink	✅ 📷
2022-06-24 09:20	▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>	5 bezet nest	Oeffelt	Tim Asbreuk	📷
2022-06-24 09:12	▲ Bloemvlieg onbekend - <i>Anthomyiidae indet.</i>	1	Oeffelt	Carien Oldenburger	📷
2022-06-24 09:17	▲ Gewone driehoekszweefvlieg - <i>Melanostoma mellinum</i>	1 imago	A73 hmp 838	Niek Otten	📷
2022-06-24 09:04	▲ Groene schaduwants - <i>Apolygus lucorum</i>	1	A73 hmp 838	Tim Asbreuk	📷
2022-06-24 09:17	▲ Rode halsbandwants - <i>Deraeocoris ruber</i>	1 imago	A73 hmp 838	Niek Otten	📷
2022-06-24 09:12	▲ Rode halsbandwants - <i>Deraeocoris ruber</i>	1	A73 hmp 838	Tim Asbreuk	📷
2022-06-20 08:11	▲ Zomervlinder - <i>Geometra papilionaria</i>	1 imago	Oeffelt	Thomas Hol	✅ 📷
2022-06-19 14:57	▲ Zwarte Kraai - <i>Corvus corone</i>	3	Oeffelt	Robin Drenth	📷
2022-06-15 09:25	▲ Grasmus - <i>Curruca communis</i>	1 baltsend / zingend	Lokkant	Gert-Jan Caspers	📷
2022-06-13 11:50	▲ Japanse duizendknoop + Sachalinse duizendknoop + Basterdduizendknoop - <i>Fallopia japonica</i> + <i>Fallopia sachalinensis</i> + <i>Fallopia x bohémica</i>	51	Lokkant	Bernd-Jan Bultink	📷
2022-06-10 19:05	■ Das - <i>Meles meles</i>	1	Oeffelt	Ton van Duren	✅ 📷
2022-06-09	▲ Witte tijger - <i>Spilosoma lubricipeda</i>	1	Oeffelt	Matthijs Courbois	📷
2022-06-08 02:33	■ Ransuil - <i>Asio otus</i>	1 overvliegend	Oeffelt	Reinoud Vermoolen	📷
2022-05-19 08:15	▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>	1	Oeffelt	Gert-Jan Caspers	📷
2022-05-18 09:48	▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>	5	Oeffelt	David Tempelman	📷
2022-05-15 08:42	■ Bonte Vliegenvanger - <i>Ficedula hypoleuca</i>	1 baltsend / zingend	Lokkant	Gert-Jan Caspers	📷
2022-05-15 08:42	■ Zwarte Roodstaart - <i>Phoenicurus ochruros</i>	1 baltsend / zingend	Lokkant	Gert-Jan Caspers	📷
2022-05-14 07:03	▲ Zwarte Kraai - <i>Corvus corone</i>	1	Oeffelt	Ben Koks	📷
2022-05-13	■ Ooievaar - <i>Ciconia ciconia</i>	1	Lokkant	Michel Lebon	📷
2022-05-08 18:29	▲ Kauw - <i>Coloeus monedula</i>	1	Lokkant	Teun van Kessel	📷
2022-05-08 18:28	▲ Kauw - <i>Coloeus monedula</i>	1	Lokkant	Teun van Kessel	📷
2022-05-08 18:28	▲ Zwarte Kraai - <i>Corvus corone</i>	1	Lokkant	Teun van Kessel	📷
2022-05-07 09:45	■ Grauwe Kiekendief - <i>Circus pygargus</i>	1 ♂ overvliegend noord	Lokkant	Maurice Rieker	📷
2022-05-07 09:45	■ Grauwe Kiekendief - <i>Circus pygargus</i>	1 ♂ overvliegend noord	Lokkant	Tom van den Berge	✅ 📷
2022-05-07 09:45	■ Grauwe Kiekendief - <i>Circus pygargus</i>	1 ♂ overvliegend noord	Lokkant	Max Van der Wielen	📷
2022-05-07 09:45	■ Grauwe Kiekendief - <i>Circus pygargus</i>	1 ♂ tweede kalenderjaar, overvliegend noord	Lokkant	Dennis Jansen	✅ 📷
2022-05-07 10:17	■ Spotvogel - <i>Hippolais icterina</i>	1 baltsend / zingend	Lokkant	Jeroen Veeken	📷
2022-05-01 12:27	▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>	10	Lokkant	Roald Krijns	📷
2022-05-01 16:05	▲ Brandnetelbladroller - <i>Celypha lacunana</i>	1 imago	Lokkant	Martien van den Heuvel	📷
2022-05-01 16:04	■ Dovenetelgraafwants - <i>Tritomegas bicolor</i>	1 imago	Lokkant	Martien van den Heuvel	📷
2022-04-21 14:35	▲ Deens lepelblad - <i>Cochlearia danica</i>	1	Oeffelt	Han Brendeke	📷
2022-04-18 09:33	▲ Gaai - <i>Garrulus glandarius</i>	2	Haps	Louis Geraets	📷
2022-04-18 20:07	▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>	10 adult, bezet nest, gezien	Oeffelt	Rens Huizinga	📷
2022-04-18 09:44	▲ Zwartkop - <i>Sylvia atricapilla</i>	1 baltsend / zingend	Lokkant	Louis Geraets	📷
2022-04-18 09:44	▲ Groenling - <i>Chloris chloris</i>	1 baltsend / zingend	Lokkant	Louis Geraets	📷
2022-04-10 07:46	▲ Houtduif - <i>Columba palumbus</i>	1	Lokkant	Ben Koks	📷
2022-04-10 07:46	▲ Buizerd - <i>Buteo buteo</i>	1	Lokkant	Ben Koks	📷

2022-04-10 07:46	▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>	35 bezet nest	Lokkant	Ben Koks	🔍
2022-04-09 09:53	▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>	17 bezet nest	Oeffelt	Louis Geraets	🔍
2022-04-09 09:49	▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>	32 bezet nest	Lokkant	Louis Geraets	🔍
2022-04-09 09:42	▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>	4 bezet nest	Lokkant	Louis Geraets	🔍
2022-04-09 09:42	▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>	34 bezet nest	Oeffelt	Louis Geraets	🔍
2022-04-09 09:50	▲ Tjiftjaf - <i>Phylloscopus collybita</i>	1 baltsend / zingend	Lokkant	Louis Geraets	🔍
2022-04-09 10:00	▲ Witte Kwikstaart - <i>Motacilla alba</i>	1	Lokkant	Louis Geraets	■
2022-04-09 09:34	▲ Europese Haas - <i>Lepus europaeus</i>	1	Lokkant	Louis Geraets	🔍
2022-04-06 09:39	▲ Scholekster - <i>Haematopus ostralegus</i>	2	Lokkant	Gert-Jan Caspers	■
2022-03-25 14:08	▲ Waterhoen - <i>Gallinula chloropus</i>	1	Lokkant	Louis Geraets	🔍
2022-03-25 15:02	▲ Scholekster - <i>Haematopus ostralegus</i>	2 foeragerend	Lokkant	Louis Geraets	■
2022-03-25 15:02	▲ Kievit - <i>Vanellus vanellus</i>	1 baltsend / zingend	Lokkant	Louis Geraets	🔍
2022-03-25 15:00	▲ Buizerd - <i>Buteo buteo</i>	1	Lokkant	Louis Geraets	🔍
2022-03-25 14:47	▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>	25 bezet nest	Lokkant	Louis Geraets	🔍
2022-03-25 14:34	▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>	72 bezet nest	Lokkant	Louis Geraets	🔍
2022-03-25 14:08	▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>	2 bezet nest	Lokkant	Louis Geraets	■
2022-03-25 14:51	▲ Langbladige druifhyacint - <i>Muscari armeniacum</i>	1 bloeiend	Lokkant	Louis Geraets	✅ 📷
2022-03-25 14:08	▲ Groot hoefblad - <i>Petasites hybridus</i>	1 bloeiend	Lokkant	Louis Geraets	🔍 📷
2022-03-25 15:05	▲ Kluwenhoornbloem - <i>Cerastium glomeratum</i>	1	Lokkant	Louis Geraets	🔍
2022-03-25 14:10	▲ Hondsdraf - <i>Glechoma hederacea</i>	1 bloeiend	Lokkant	Louis Geraets	🔍
2022-03-23 13:05	▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>	1	Oeffelt	Familie Beijer	✅ 📷
2022-03-19 12:48	▲ Scholekster - <i>Haematopus ostralegus</i>	2 foeragerend	Lokkant	Gert-Jan Caspers	■
2022-03-19 12:51	▲ Tjiftjaf - <i>Phylloscopus collybita</i>	1 baltsend / zingend	Oeffelt	Gert-Jan Caspers	🔍
2022-03-19 12:50	▲ Citroenvlinder - <i>Gonepteryx rhamni</i>	1 ♂ imago	Lokkant	Gert-Jan Caspers	🔍
2022-03-18 15:07	▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>	21 nestbouw	Lokkant	Louis Geraets	🔍
2022-03-18 15:01	▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>	52 nestbouw	Lokkant	Louis Geraets	🔍
2022-03-18 15:27	▲ Tjiftjaf - <i>Phylloscopus collybita</i>	1 baltsend / zingend	Oeffelt	Louis Geraets	🔍
2022-03-07 11:54	▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>	10 paar in broedbiotoop, gezien	Oeffelt	Jeroen Veldman	🔍
2022-02-27 14:25	▲ Holenduif - <i>Columba oenas</i>	10 foeragerend	Lokkant	Gert-Jan Caspers	🔍
2022-02-27 11:06	■ Kraanvogel - <i>Grus grus</i>	12 overvliegend	Lokkant	Louis Geraets	✅ 📷
2022-02-27 14:25	▲ Scholekster - <i>Haematopus ostralegus</i>	2	Lokkant	Gert-Jan Caspers	■
2022-02-27 11:12	▲ Scholekster - <i>Haematopus ostralegus</i>	2 foeragerend	Lokkant	Louis Geraets	■
2022-02-27 14:25	▲ Kokmeeuw - <i>Chroicocephalus ridibundus</i>	330	Lokkant	Gert-Jan Caspers	🔍
2022-02-27 11:11	▲ Kokmeeuw - <i>Chroicocephalus ridibundus</i>	230 foeragerend	Lokkant	Louis Geraets	🔍
2022-02-27 11:02	▲ Kauw - <i>Coloeus monedula</i>	14 foeragerend	Lokkant	Louis Geraets	■
2022-02-27 14:25	▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>	52 foeragerend	Lokkant	Gert-Jan Caspers	🔍
2022-02-27 11:08	▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>	1	Lokkant	Louis Geraets	🔍
2022-02-27 09:47	▲ Vink - <i>Fringilla coelebs</i>	1 baltsend / zingend	Lokkant	Louis Geraets	🔍

2022-02-23 08:48	▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>	20	A73 hmp 838	J prangsmas	🔍
2022-02-13 15:08	▲ Holenduif - <i>Columba oenas</i>	4	Lokkant	Louis Geraets	🔍
2022-02-13 15:03	▲ Kokmeeuw - <i>Chroicocephalus ridibundus</i>	182 foeragerend	Lokkant	Louis Geraets	🔍
2022-02-13 15:03	▲ Stormmeeuw - <i>Larus canus</i>	2 foeragerend	Lokkant	Louis Geraets	■
2022-02-13 15:04	▲ Kauw - <i>Coloeus monedula</i>	116 foeragerend	Lokkant	Louis Geraets	■
2022-02-13 15:04	▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>	128 foeragerend	Lokkant	Louis Geraets	🔍
2022-02-13 13:38	▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>	2 in braakbal	Lokkant	Louis Geraets	■
2022-02-13 15:06	▲ Zwarte Kraai - <i>Corvus corone</i>	2 foeragerend	Lokkant	Louis Geraets	■
2022-02-07 08:49	▲ Heggenmus - <i>Prunella modularis</i>	1 baltsend / zingend	Oeffelt	Jos Welbedacht	■
2022-02-05 13:03	▲ Blauwe Reiger - <i>Ardea cinerea</i>	2	Lokkant	Gert-Jan Caspers	🔍
2022-02-05 16:00	▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>	300 foeragerend, gezien	Lokkant	Piet Thijssen	🔍 🗨
2022-01-20 09:37	▲ Waterhoen - <i>Gallinula chloropus</i>	1	Lokkant	Louis Geraets	■
2022-01-20 09:37	▲ Kauw - <i>Coloeus monedula</i>	2	Lokkant	Louis Geraets	■
2022-01-20 09:39	▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>	1 nestbouw	Lokkant	Louis Geraets	■
2022-01-20 09:37	▲ Zwarte Kraai - <i>Corvus corone</i>	1	Lokkant	Louis Geraets	■
2022-01-16 10:18	▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>	1 gezien	Oeffelt	Py van Beelen	✅ 📷
2022-01-16 10:18	▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>	1 gezien	Oeffelt	Py van Beelen	✅ 📷 🗨
2022-01-16 10:18	▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>	1 gezien	Oeffelt	Py van Beelen	✅ 📷
2022-01-16 10:18	▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>	1 gezien	Oeffelt	Py van Beelen	✅ 📷 🗨
2022-01-16 10:17	▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>	1 gezien	Oeffelt	Py van Beelen	✅ 📷
2022-01-16 10:17	▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>	2 gezien	Oeffelt	Py van Beelen	✅ 📷
2022-01-16 10:17	▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>	2 gezien	Oeffelt	Py van Beelen	✅ 📷
2022-01-16 10:17	▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>	3 gezien	Oeffelt	Py van Beelen	✅ 📷
2022-01-16 10:17	▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>	1 gezien	Oeffelt	Py van Beelen	✅ 📷
2022-01-16 10:16	▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>	2 gezien	Oeffelt	Py van Beelen	✅ 📷
2022-01-16 10:16	▲ Roek - <i>Corvus frugilegus</i>	2 gezien	Oeffelt	Py van Beelen	✅ 📷
2022-01-16 10:17	▲ Vink - <i>Fringilla coelebs</i>	1 gezien	Oeffelt	Py van Beelen	🔍 📷
2022-01-10 15:35	▲ Staartmees - <i>Aegithalos caudatus</i>	5 adult, gezien	Lokkant	Bernd-Jan Bultink	🔍
2021-12-31 16:31	▲ Buizerd - <i>Buteo buteo</i>	1 slachtoffer verkeer, gezien	Oeffelt	Dirk Kerkhoff	✅ 🗨 📷
2021-12-30 09:34	▲ Blauwe Reiger - <i>Ardea cinerea</i>	1	Lokkant	Gert-Jan Caspers	🔍
2021-12-30 09:34	■ Grote Zilverreiger - <i>Ardea alba</i>	1	Lokkant	Gert-Jan Caspers	■
2021-12-25 14:59	■ Kraanvogel - <i>Grus grus</i>	39 overvliegend	A73 hmp 845 Li	Paul van Els	■

2

Bijlage

Effecten indicator soorten

Effectenindicator soorten

1 Locatie

2 Activiteiten

3 Indicatie

Zoek en selecteer een locatie op postcode, of zoom in op de kaart en teken de grenzen van het plangebied: zet punten en sluit af met een dubbel-klik.

Postcode

5443 AC



1 Locatie

2 Activiteiten

3 Indicatie

Geef aan voor welke OLO-activiteit(en) u een indicatie van effecten wilt ontvangen.

Top-10 activiteiten

[Alle activiteiten](#)

- ☒ Slopen en/of asbest verwijderen
- ☐ Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
- ☐ Bijbehorend bouwwerk bouwen
- ☐ Kappen
- ☐ Overig bouwwerk bouwen
- ☐ Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
- ☐ Dakkapel plaatsen
- ☒ Woning bouwen
- ☐ Nieuw kozijn plaatsen of bestaand kozijn of gevelpaneel veranderen
- ☐ Uitrit aanleggen of veranderen

Locatie: 5,8731/51,688 Oppervlakte: 0,95 ha

Disclaimer

- > De dekkingsgraad van waarnemingen uit de NDFF per locatie wisselt sterk. Als er geen waarnemingen uit de NDFF zijn, kunnen er dus wél beschermde soorten voorkomen. Een gebruiker is zelf verantwoordelijk om (eventueel met hulp van de gemeente) te achterhalen of er daadwerkelijk beschermde soorten in het plangebied voorkomen.
- > Beschermde soorten die naar verwachting geen schadelijke effecten ondervinden, worden niet in de uitvoer getoond.
- > De informatie uit de effectenindicator soorten is generiek. Om vast te stellen of een activiteit in de praktijk daadwerkelijk schadelijk is, is meer specifieke informatie nodig over de betreffende activiteit, de werklocatie en over het voorkomen van beschermde soorten in en rond het plangebied.

Activiteiten

☐ **Slopen en/of asbest verwijderen**

Een bouwwerk helemaal of voor een gedeelte slopen of van asbest ontdoen.
Deze activiteit kan leiden tot schadelijke effecten voor beschermde soorten door verlies van verblijfplaatsen in en rondom het te slopen gebouw. Denk hierbij met name aan vogels, zoals kerkuil en steenuil en vleermuizen.

☐ **Woning bouwen**

Het in zijn geheel nieuw plaatsen van een woning of een wijziging op een nog te bouwen nieuwe woning waarvoor al een vergunning is verleend.
Deze activiteit kan leiden tot schadelijke effecten als de bouwlocatie onderdeel is van het leefgebied van beschermde soorten.

Overige Wettelijk beschermde soorten

In het door u opgegeven plangebied komen bovendien de volgende aantallen Wettelijk beschermde soorten per soortengroep voor volgens de Nationale Databank Flora en Fauna (NDBF) die mogelijk schadelijke effecten ondervinden van de door u geselecteerde activiteit(en).

Soortgroepen
☐ Zoogdieren (1)

Mogelijke negatieve effecten

Hieronder ziet u de storende factoren die op kunnen treden bij de geselecteerde activiteit en de hierboven genoemde soort. Per storende factor kunt u een korte toelichting lezen. Er is ook een pdf met  geraadpleegde literatuur over de effecten per soortgroep.

Storende factoren per verbodsbepaling	Gevoeligheid
Het is verboden (opzettelijk) nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of vernielen.	
☐ verlies vaste voortplantings- rust- of verblijfplaatsen	 gevoelig
☐ verlies functioneel leefgebied	 gevoelig
☐ versnippering leefgebied	 gevoelig
☐ verontreiniging	 gevoelig
☐ verdroging	 gevoelig
Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren.	
☐ verstoring door geluid	... onbekend
☐ verstoring door licht	... onbekend
☐ verstoring door trilling	 gevoelig
☐ verstoring door beweging	 gevoelig
Het is verboden opzettelijk beschermde soorten te doden en vangen.	
☐ directe sterfte	 gevoelig
Het is verboden (opzettelijk) nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of vernielen.	
☐ verlies vaste voortplantings- rust- of verblijfplaatsen	 gevoelig
☐ verlies functioneel leefgebied	 gevoelig
☐ versnippering leefgebied	 gevoelig
☐ verontreiniging	 gevoelig
☐ verdroging	 gevoelig
Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren.	

☐ verstoring door geluid	... onbekend
☐ verstoring door licht	... onbekend
☐ verstoring door trilling	 gevoelig
☐ verstoring door beweging	 gevoelig
Het is verboden opzettelijk beschermde soorten te doden en vangen.	
☐ directe sterfte	 gevoelig

Amfibieën en reptielen (1)

Mogelijke negatieve effecten

Hieronder ziet u de storende factoren die op kunnen treden bij de geselecteerde activiteit en de hierboven genoemde soort. Per storende factor kunt u een korte toelichting lezen. Er is ook een pdf met  geraadpleegde literatuur over de effecten per soortgroep.

Storende factoren per verbodsbepaling	Gevoeligheid
Het is verboden (opzettelijk) nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of vernielen.	
☐ verlies vaste voortplantings- rust- of verblijfplaatsen	 gevoelig
☐ verlies functioneel leefgebied	 gevoelig
☐ versnippering leefgebied	 gevoelig
☐ verontreiniging	 gevoelig
☐ verdroging	 gevoelig
Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren.	
☐ verstoring door geluid	 gevoelig
☐ verstoring door licht	 gevoelig
☐ verstoring door trilling	 gevoelig
☐ verstoring door beweging	 gevoelig
Het is verboden opzettelijk beschermde soorten te doden en vangen.	
☐ directe sterfte	 gevoelig
Het is verboden (opzettelijk) nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of vernielen.	
☐ verlies vaste voortplantings- rust- of verblijfplaatsen	 gevoelig
☐ verlies functioneel leefgebied	 gevoelig
☐ versnippering leefgebied	 gevoelig
☐ verontreiniging	 gevoelig
☐ verdroging	 gevoelig
Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren.	
☐ verstoring door geluid	 gevoelig
☐ verstoring door licht	 gevoelig
☐ verstoring door trilling	 gevoelig
☐ verstoring door beweging	 gevoelig
Het is verboden opzettelijk beschermde soorten te doden en vangen.	
☐ directe sterfte	 gevoelig

3

Bijlage Plan locatie

